# Notas de aula - MAT01156

Leonardo Suarez

Dezembro de 2025

Notas de aula da disciplina de Álgebra Linear II, ministrada pelo prof. Carlos Hoppen no semestre letivo 25/2.

## Conteúdo

**I Espaços Vetoriais** **2**
1 $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$ 2
2 Definição de Espaço Vetorial 2
3 Subespaços 3

**II Espaços Vetoriais de Dimensão Finita** **3**
1 Span e Independência Linear 3
2 Bases 4
3 Dimensão 4

**III Transformações Lineares** **5**
1 Espaços Vetoriais de Transformaçõess Lineares 5
2 Espaço Nulo e Imagem 6
3 Matrizes 7
4 Invertibilidade e Isomorfismos 8
5 Dualidade 10

**IV Autovalores e Autovetores** **11**
1 Subespaços Invariantes 11
2 Matrizes Triangular-Superiores 12
3 Operadores Diagonalizáveis 13

**V Espaços com Produto Interno** **13**
1 Produtos Internos e Normas 13
2 Bases Ortonormais 15
3 Complementos Ortogonais e Problemas de Minimização 16

**VI Operadores em Espaços com Produto Interno** **17**
1 Operadores Autoadjuntos e Operadores Normais 17
2 Teorema Espectral 19
3 Operadores Positivos 19

**VII Operadores em Espaços Vetoriais Complexos** **20**
1 Autovetores Generalizados e Operadores Nilpotentes 20

2 Decomposição de Autoespaços Generalizados 21
3 Consequências da Decomposição em Autoespaços Generalizados 22

# I Espaços Vetoriais

## 1 $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$

**Proposição 1.** *(propriedades da aritmética complexa).*

*(a)* ***comutatividade*** $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ *e* $\alpha\beta = \beta\alpha \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$

*(b)* ***associatividade*** $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ *e* $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma) \quad \forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$

*(c)* ***identidades*** $\alpha + 0 = \alpha$ *e* $\alpha 1 = \alpha \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}$

*(d)* ***inverso aditivo*** $\forall \alpha \in \mathbb{C}\ \exists! \beta \in \mathbb{C} : \alpha + \beta = 0$.

*(e)* ***inverso multiplicativo*** $\forall \alpha \in \mathbb{C}, \alpha \neq 0\ \exists! \beta \in \mathbb{C} : \alpha\beta = 1$.

*(f)* ***distributividade*** $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma \quad \forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$

**Definição 1.** Suponha que $n$ seja um inteiro não-negativo. Uma *lista* de *tamanho* $n$ é uma coleção ordenada de $n$ elementos (que podem ser números, outras listas, ou outros objetos mais abstratos). Duas listas são iguais sse têm o mesmo tamanho e os mesmos elementos na mesma ordem.

**Definição 2.** A *soma* em $\mathbb{F}^n$ é definida somando as coordenadas correspondentes:

$$(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n).$$

**Proposição 2.** *(comutatividade da soma em $\mathbb{F}^n$). Para todo $x, y \in \mathbb{F}^n$, $x + y = y + x$.*

**Definição 3.** Para todo $x \in \mathbb{F}^n$, o *inverso aditivo* de $x$ é o vetor $-x \in \mathbb{F}^n$ tal que $x + (-x) = 0$. Explicitamente, se $x = (x_1, \ldots, x_n)$, então $-x = (-x_1, \ldots, -x_n)$.

**Definição 4.** O *produto* de um número $\lambda$ e um vetor em $\mathbb{F}^n$ é computado multiplicando cada coordenada do vetor por $\lambda$:

$$\lambda(x_1, \ldots, x_n) = (\lambda x_1, \ldots, \lambda x_n);$$

onde $\lambda \in \mathbb{F}$ e $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{F}^n$.

**Definição 5.** Uma *soma* em um conjunto $V$ é uma função que associa um elemento $u + v \in V$ a cada par de elementos $u, v \in V$. Um *produto por escalar* em $V$ é uma função que associa um elemento $\lambda v \in V$ a cada escalar $\lambda \in \mathbb{F}$ e cada elemento $v \in V$.

## 2 Definição de Espaço Vetorial

**Definição 6.** Um *espaço vetorial* é um conjunto $V$ munido com as operações de soma e produto por escalar que satisfaz as seguintes propriedades.

(A1) **comutatividade** $u + v = v + u$, para todo $u, v \in V$.

(A2) **associatividade** $(u + v) + w = u + (v + w)$, para todo $u, v, w \in V$.

(A3) **identidade aditiva** Existe $0 \in V$ tal que $v + 0 = v$, para todo $v \in V$.

(A4) **inverso aditivo** Para todo $v \in V$ existe $-v \in V$ tal que $v + (-v) = 0$.

(A5) **identidade multiplicativa** $1v = v$, para todo $v \in V$, onde $1$ é o elemento identidade em $\mathbb{F}$.

(A6) **distributividade** $a(u + v) = au + av$ e $(a + b)v = av + bv$, para todo $a, b \in \mathbb{F}$ e todo $u, v \in V$.

**Proposição 3.** *Um espaço vetorial possui identidade aditiva única.*

**Proposição 4.** *Todo elemento de um espaço vetorial possui inverso aditivo único.*

**Proposição 5.** $0v = 0$ *e* $a0 = 0$*, para todo* $a \in \mathbb{F}$ *e todo* $v \in V$*.*

**Proposição 6.** $(-1)v = -v$*, para todo* $v \in V$*.*

## 3 Subespaços

**Definição 7.** Um subconjunto $U$ de um espaço vetorial $V$ é dito um *subespaço* de $V$ se $U$ é um espaço vetorial com as mesmas operações de soma e produto por escalar definidas em $V$.

**Proposição 7.** *(condições para subespaço). Um subconjunto* $U$ *de um espaço vetorial* $V$ *é um subespaço de* $V$ *sse os seguintes três itens são satisfeitos.*

- $0 \in U$*.*
- *Se* $u, v \in U$*, então* $u + v \in U$*.*
- *Se* $u \in U$ *e* $a \in \mathbb{F}$*, então* $au \in U$*.*

**Definição 8.** Suponha que $V_1, \ldots, V_m$ são subespaços de $V$. A *soma* $V_1 + \cdots + V_m$ é o conjunto de todas as somas possíveis de elementos de $V_1, \ldots, V_m$, isto é,

$$V_1 + \cdots + V_m = \{v_1 + \cdots + v_m : v_1 \in V_1, \ldots, v_m \in V_m\}.$$

**Proposição 8.** *Se* $V_1, \ldots, V_m$ *são subespaços de* $V$*, então* $V_1 + \cdots + V_m$ *é o menor subespaço de* $V$ *que contém* $V_1, \ldots, V_m$*.*

**Definição 9.** Sejam $V_1, \ldots, V_m$ subespaços de $V$. A soma $V_1 + \cdots + V_m$ é dita *direta* se todo $v \in V_1 + \cdots + V_m$ pode ser escrito de maneira única como $v = v_1 + \cdots + v_m$, onde $v_k \in V_k$. Se a soma é direta, escrevemos $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_m$.

**Proposição 9.** *(condição para soma direta). Suponha que* $V_1, \ldots, V_m$ *são subespaços de* $V$*. Então* $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_m$ *sse a única maneira de escrever* $0$ *como* $0 = v_1 + \cdots + v_m$*, onde* $v_k \in V_k$ *para cada* $k$*, é com* $v_1 = \cdots = v_m = 0$*.*

**Proposição 10.** *Sejam* $U$ *e* $W$ *subespaços de* $V$*. Então*

$$U + W \text{ é soma direta} \iff U \cap W = \{0\}.$$

# II Espaços Vetoriais de Dimensão Finita

## 1 Span e Independência Linear

**Proposição 1.** *(span é o menor subespaço que contém todos os vetores). O span de uma lista de vetores em* $V$ *é o menor subespaço de* $V$ *que contém todos os vetores da lista.*

**Definição 1.** Um espaço vetorial $V$ é dito de *dimensão finita* se existe uma lista finita de vetores em $V$ que gera $V$. Caso contrário, $V$ é dito de *dimensão infinita*.

**Definição 2.** Uma lista $v_1, \ldots, v_n$ de vetores em $V$ é dita *linearmente independente* se a única escolha de escalares $a_1, \ldots, a_n$ em $\mathbb{F}$ que satisfaz

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n = 0 \tag{1}$$

é $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$. Caso contrário, a lista é dita *linearmente dependente*. A lista vazia é dita linearmente independente.

**Lema.** *(lema de dependência linear). Suponha que $v_1, \ldots, v_n$ é linearmente dependente em $V$. Então existe $j \in \{1, \ldots, n\}$ tal que*

$$v_j \in \text{span}(v_1, \ldots, v_{j-1}). \tag{2}$$

*Ainda, se $j$ satisfaz a condição acima e o $j$-ésimo vetor for removido da lista, então o span dos vetores restantes é igual a* $\text{span}(v_1, \ldots, v_n)$.

**Proposição 2.** *Em um espaço vetorial $V$ de dimensão finita, o tamanho de qualquer lista linearmente independente é menor ou igual ao tamanho de qualquer lista geradora.*

**Proposição 3.** *Todo subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita é de dimensão finita.*

## 2 Bases

**Definição 3.** Uma *base* de um espaço vetorial $V$ é uma lista de vetores $v_1, \ldots, v_n$ em $V$ que é linearmente independente e gera $V$.

**Proposição 4.** *(critério para base). Uma lista de vetores $v_1, \ldots, v_n$ em um $V$ é uma base de $V$ sse todo vetor em $V$ pode ser escrito de maneira única como uma combinação linear de $v_1, \ldots, v_n$, isto é,*

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n, \tag{3}$$

*onde $a_1, \ldots, a_n$ são escalares em $\mathbb{F}$.*

**Proposição 5.** *Toda lista geradora em um espaço vetorial pode ser reduzida a uma base do espaço vetorial.*

**Corolário 5.1.** *Todo espaço vetorial de dimensão finita possui uma base.*

**Proposição 6.** *Toda lista linearmente independente em um espaço vetorial de dimensão finita pode ser estendida a uma base do espaço vetorial.*

**Proposição 7.** *Suponha que $V$ seja um espaço vetorial de dimensão finita e $U$ é um subespaço de $V$. Então existe um subespaço $W$ de $V$ tal que $V = U \oplus W$.*

## 3 Dimensão

**Proposição 8.** *(o tamanho da base não depende da base). Se $V$ é um espaço vetorial de dimensão finita, então todas as bases de $V$ têm o mesmo tamanho.*

**Definição 4.** A *dimensão* de um espaço vetorial $V$ de dimensão finita é o tamanho de qualquer base de $V$.

**Proposição 9.** *Se $V$ é um espaço vetorial de dimensão finita e $U$ é um subespaço de $V$, então* $\dim(U) \leq \dim(V)$.

**Teorema 10.** *Se $V$ é um espaço vetorial de dimensão finita, então toda lista linearmente independente de vetores em $V$ com tamanho igual a $\dim(V)$ é uma base de $V$.*

**Corolário 10.1.** *Se $V$ é um espaço vetorial de dimensão finita, então todo subespaço $U$ de $V$ com $\dim(U) = \dim(V)$ é igual a $V$.*

**Teorema 11.** *Se $V$ é um espaço vetorial de dimensão finita, então toda lista geradora de vetores em $V$ com tamanho igual a $\dim(V)$ é uma base de $V$.*

**Proposição 12.** *(dimensão de soma). Se $V_1$ e $V_2$ são subespaços de um espaço vetorial de dimensão finita $V$, então*

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2). \tag{4}$$

# III Transformações Lineares

## 1 Espaços Vetoriais de Transformaçõess Lineares

**Definição 1.** Uma transformação linear de $V$ em $W$ é uma função $T : V \to W$ com as seguintes propriedades.

1. $T(u + v) = Tu + Tv$, para todo $u, v \in V$. *(aditividade)*
2. $T(\lambda u) = \lambda Tu$, para todo $u \in V$ e todo escalar $\lambda \in \mathbb{F}$. *(homogeneidade)*

**Lema.** *Suponha que $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de $V$ e $w_1, \ldots, w_n \in W$. Então existe uma única transformação linear $T : V \to W$ tal que $Tv_k = w_k$, para $k = 1, \ldots, n$.*

**Definição 2.** Suponha $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. A *soma* $S + T$ e o *produto por escalar* $\lambda T$ são as transformações lineares de $V$ em $W$ definidas por

$$(S + T)(v) = S(v) + Tv \quad \text{e} \quad (\lambda T)(v) = \lambda(Tv),$$

para todo $v \in V$.

**Corolário 0.1.** *Com as operações de soma e produto escalar definidas acima, $\mathcal{L}(V, W)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$.*

**Definição 3.** Se $T \in \mathcal{L}(U, V)$ e $S \in \mathcal{L}(V, W)$, então o *produto* $ST$ é a transformação linear de $U$ em $W$ definida por

$$(ST)(u) = S(Tu),$$

para todo $u \in U$.

**Proposição 1.** *(propriedades algébricas do produto de transformações lineares).*

- $(T_1T_2)\,T_3 = T_1\,(T_2T_3)$ *sempre que $T_1, T_2, T_3$ são transformações lineares tais que os produtos são definidos.* (associatividade)
- $T_1I = IT_1 = T_1$ *sempre que $T_1 \in \mathcal{L}(V, W)$, onde o primeiro $I$ é a identidade em $V$ e o segundo $I$ é a identidade em $W$.* (elemento neutro)
- $(S_1 + S_2)\,T = S_1T + S_2T$ *e* $S\,(T_1 + T_2) = ST_1 + ST_2$, *sempre que $T, T_1, T_2 \in \mathcal{L}(U, V)$ e $S, S_1, S_2 \in \mathcal{L}(V, W)$.* (distributividade)

**Corolário 1.1.** *Suponha que $T$ seja uma transformação linear de $V$ em $W$. Então $T(0) = 0$.*

## 2 Espaço Nulo e Imagem

**Definição 4.** Para $T \in \mathcal{L}(V, W)$, o *espaço nulo* de $T$ é o subconjunto de $V$ definido por

$$\ker(T) = \{v \in V : Tv = 0\}.$$

**Proposição 2.** *Seja $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\ker(T)$ é um subespaço de $V$.*

**Definição 5.** Uma função $T : V \to W$ é *injetora* se $Tv_1 = TTv_2$ implica $v_1 = v_2$, para todo $v_1, v_2 \in V$.

**Proposição 3.** *Seja $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $T$ é injetora se e somente se $\ker(T) = \{0\}$.*

**Definição 6.** Para $T \in \mathcal{L}(V, W)$, a *imagem* de $T$ é o subconjunto de $W$ definido por

$$\mathrm{Im}(T) = \{Tv : v \in V\}.$$

**Proposição 4.** *Seja $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\mathrm{im}(T)$ é um subespaço de $W$.*

**Definição 7.** Uma função $T : V \to W$ é *sobrejetora* se para todo $w \in W$ existe $v \in V$ tal que $Tv = w$.

**Teorema 5.** *(teorema fundamental das transformações lineares). Suponha que $V$ seja um espaço vetorial de dimensão finita e que $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\mathrm{im}(T)$ é de dimensão finita e*

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \mathrm{im}\, T. \tag{5}$$

*Demonstração.* Sejam $u_1, \ldots, u_n$ uma base de $\ker T$ e $u_1, \ldots, u_n, v_1, \ldots, v_m$ uma base de $V$. Então temos que $\dim \ker T = n$ e $\dim V = n + m$. Resta provar que $\dim \mathrm{im}\, T = m$. Escreve

$$v = a_1 u_1 + \cdots + a_n u_n + b_1 v_1 + \cdots + b_m v_m$$

para qualquer $v \in V$ e com $a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_m \in \mathbb{F}$. Aplica $T$ e fica

$$Tv = b_1 Tv_1 + \cdots + b_m Tv_m,$$

isto é, $Tv_1, \ldots, Tv_m$ gera $\mathrm{im}\, T$. Para provar que $Tv_1, \ldots, Tv_m$ é LI, considere a equação

$$c_1 Tv_1 + \cdots + c_m Tv_m = 0 \tag{6}$$
$$T(c_1 v_1 + \cdots + c_m v_m) = 0, \tag{7}$$

com $c_1, \ldots, c_m \in \mathbb{F}$, e nota que $c_1 v_1 + \cdots + c_m v_m \in \ker T$. Então escreve

$$c_1 v_1 + \cdots + c_m v_m = d_1 u_1 + \cdots + d_n u_n \tag{8}$$
$$c_1 v_1 + \cdots + c_m v_m - d_1 u_1 - \cdots - d_n u_n = 0. \tag{9}$$

Como $u_1, \ldots, u_n, v_1, \ldots, v_m$ é base, a última equação acima possui apenas a solução trivial $c_1 = \cdots = c_m = d_1 = \cdots = d_n = 0$. Logo a lista $Tv_1, \ldots, Tv_m$ é LI e forma, portanto, uma base para $\mathrm{im}\, T$. □

**Corolário 5.1.** *Suponha que $V$ e $W$ são espaços vetoriais de dimensão finita com $\dim V > \dim W$. Então nenhuma transformação linear de $V$ em $W$ é injetora.*

**Corolário 5.2.** *Suponha que $V$ e $W$ são espaços vetoriais de dimensão finita com $\dim V < \dim W$. Então nenhuma transformação linear de $V$ em $W$ é sobrejetora.*

## 3 Matrizes

**Definição 8.** Suponha que $m$ e $n$ são inteiros não-negativos. Uma *matriz* $m$ por $n$ é uma tabela retangular de elementos de $\mathbb{F}$ com $m$ linhas e $n$ colunas:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \cdots & A_{mn} \end{bmatrix},$$

onde $A_{jk} \in \mathbb{F}$ é o elemento na $j$-ésima linha e $k$-ésima coluna de $A$.

**Definição 9.** (matriz de uma transformação linear). Suponha que $T \in \mathcal{L}(V, W)$ e que $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de $V$ e $w_1, \ldots, w_m$ é uma base de $W$. A *matriz* de $T$ com respeito a essas bases é a matriz $\mathcal{M}(T)$ de tamanho $m$ por $n$ cujas entradas $A_{jk}$ são definidas por

$$Tv_k = A_{1k}w_1 + \cdots + A_{mk}w_m.$$

**Definição 10.** A *soma de duas matrizes de mesmo tamanho* é a matriz obtida somando as entradas correspondentes:

$$A + B = \begin{bmatrix} A_{11} + B_{11} & \cdots & A_{1n} + B_{1n} \\ A_{21} + B_{21} & \cdots & A_{2n} + B_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} + B_{m1} & \cdots & A_{mn} + B_{mn} \end{bmatrix}.$$

**Proposição 6.** *(matriz da soma de transformações lineares). Sejam $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\mathcal{M}(S+T) = \mathcal{M}(S) + \mathcal{M}(T)$.*

**Definição 11.** O produto de uma matriz por um escalar é a matriz obtida multiplicando cada entrada da matriz pelo escalar:

$$\lambda A = \begin{bmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} & \cdots & \lambda A_{1n} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} & \cdots & \lambda A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda A_{m1} & \lambda A_{m2} & \cdots & \lambda A_{mn} \end{bmatrix}.$$

**Proposição 7.** *(matriz do produto por escalar de uma transformação linear). Sejam $T \in \mathcal{L}(V, W)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Então $\mathcal{M}(\lambda T) = \lambda \mathcal{M}(T)$.*

**Proposição 8.** $(\dim \mathbb{F}^{m,n} = mn)$. *Suponha que $m$ e $n$ sejam inteiros positivos. Com as operações de soma e produto por escalar definidas acima, $\mathbb{F}^{m,n}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$ com dimensão $mn$.*

**Definição 12.** (multiplicação de matrizes). Sejam $A$ uma matriz $m$ por $n$ e $B$ uma matriz $n$ por $p$. O *produto* $AB$ é a matriz $m$ por $p$ cujas entradas são definidas por

$$(AB)_{jk} = \sum_{r=1}^{n} A_{jr}B_{rk}.$$

**Proposição 9.** *(matriz do produto de transformações lineares). Sejam $T \in \mathcal{L}(U, V)$ e $S \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\mathcal{M}(ST) = \mathcal{M}(S)\mathcal{M}(T)$.*

**Proposição 10.** *(entrada do produto de matrizes é igual ao produto de vetores linha por coluna). Sejam $A$ uma matriz $m$ por $n$ e $B$ uma matriz $n$ por $p$. Então a entrada $(j,k)$ de $AB$ é igual ao produto do $j$-ésimo vetor linha de $A$ pelo $k$-ésimo vetor coluna de $B$:*

$$(AB)_{jk} = A_{j.}B_{.k},$$

*se $1 \leq j \leq m$ e $1 \leq k \leq p$.*

**Proposição 11.** *(coluna do produto de matrizes é igual ao produto da matriz pela coluna). Sejam $A$ uma matriz $m$ por $n$ e $B$ uma matriz $n$ por $p$. Então a $k$-ésima coluna de $AB$ é igual ao produto de $A$ pela $k$-ésima coluna de $B$:*

$$(AB)_{.k} = AB_{.k},$$

*se $1 \leq k \leq p$.*

**Corolário 11.1.** *(combinação linear de colunas). Sejam $A$ uma matriz $m$ por $n$ e $b$ uma matriz $n$ por $1$. Então o produto $Ab$ é uma combinação linear das colunas de $A$ com os coeficientes dados pelas entradas de $b$:*

$$Ab = b_1A_{.1} + b_2A_{.2} + \cdots + b_nA_{.n}.$$

**Corolário 11.2.** *(multiplicação de matrizes como combinação linear de colunas). Suponha que $C$ é uma matriz $m$ por $c$ e $R$ é uma matriz $c$ por $n$.*

*(a) Se $k \in \{1, \ldots, n\}$, então a $k$-ésima coluna de $CR$ é uma combinação linear das colunas de $C$ com os coeficientes dados pelas entradas da $k$-ésima coluna de $R$.*

*(b) Se $j \in \{1, \ldots, m\}$, então a $j$-ésima linha de $CR$ é uma combinação linear das linhas de $R$ com os coeficientes dados pelas entradas da $j$-ésima linha de $C$.*

**Definição 13.** Seja $A$ uma matriz $m$ por $n$. O *posto* de $A$, denotado por rank $A$, é a dimensão do span das colunas de $A$ em $\mathbb{F}^{m1}$. O *posto transposto* de $A$, denotado por rank $A^t$, é a dimensão do span das linhas de $A$ em $\mathbb{F}^{1n}$.

**Definição 14.** A transposta de uma matriz $A$, denotada por $A^t$, é a matriz obtida trocando as linhas por colunas, isto é, a entrada $(j,k)$ de $A^t$ é a entrada $(k,j)$ de $A$:

$$(A^t)_{jk} = A_{kj}.$$

**Proposição 12.** *(fatoração coluna-linha). Seja $A$ uma matriz $m$ por $n$ com entradas em $\mathbb{F}$ e posto $c \geq 1$. Então existem uma matriz $C$ $m$ por $c$ e uma matriz $R$ $c$ por $n$, ambas com entradas em $\mathbb{F}$, tais que $A = CR$.*

**Proposição 13.** *(posto é igual ao posto transposto). Se $A$ é uma matriz com entradas em $\mathbb{F}$, então* rank $A =$ rank $A^t$.

## 4 Invertibilidade e Isomorfismos

**Definição 15.** Uma transformação linear $T \in \mathcal{L}(V,W)$ é dita *invertível* se existe uma transformação linear $S \in \mathcal{L}(W,V)$ tal que $ST$ é igual ao operador identidade em $V$ e $TS$ é igual ao operador identidade em $W$. Uma transformação linear $S \in \mathcal{L}(W,V)$ que satisfaz $ST = I$ e $TS = I$ é dita a *inversa* de $T$.

**Proposição 14.** *Uma transformação linear invertível tem uma única inversa. Se $T \in \mathcal{L}(V,W)$ é invertível, então $T^{-1} \in \mathcal{L}(W,V)$ é o único elemento de $\mathcal{L}(W,V)$ tal que $T^{-1}T = I$ e $TT^{-1} = I$.*

**Proposição 15.** *Uma transformação linear é invertível sse é bijetora.*

**Proposição 16.** *Sejam $V$ e $W$ espaços vetoriais de dimensão finita e que* $\dim V = \dim W$. *Então uma transformação linear $T \in \mathcal{L}(V, W)$ é invertível sse $T$ é injetora sse $T$ é sobrejetora.*

*Demonstração.* Sejam $V$ e $W$ espaços vetoriais de dimensão finita e $\dim V = \dim W$. Seja $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Suponha que $T$ é injetora. Do Teorema do Posto, temos

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{im} T \tag{10}$$
$$\dim W = \dim \operatorname{im} T \tag{11}$$

Logo, $T$ é sobrejetora. Agora, suponha que $T$ é sobrejetora. Novamente, do Teorema do Posto, escreve

$$\dim V = \dim \ker T + \dim W \tag{12}$$
$$\dim \ker T = 0, \tag{13}$$

o que prova que $T$ é injetora. Portanto, temos a equivalência $T$ é invertível sse $T$ é injetora sse $T$ é sobrejetora. □

**Proposição 17.** *Sejam $V$ e $W$ espaços vetoriais de dimensão finita, $\dim V = \dim W$, $S \in \mathcal{L}(V, W)$ e $T \in \mathcal{L}(W, U)$. Então $ST = I$ sse $TS = I$.*

**Definição 16.** Um *isomorfismo* é uma transformação linear invertível. Se existe um isomorfismo de $V$ em $W$, então $V$ e $W$ são ditos *isomorfos*.

**Proposição 18.** *Dois espaços vetoriais de dimensão finita são isomorfos sse têm a mesma dimensão.*

*Demonstração.* Sejam $V$ e $W$ espaços vetoriais de dimensão finita isomorfos. Então existe uma transformação linear $T$ invertível de $V$ em $W$. Do Teorema do Núcleo e da Imagem, temos

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{im} T.$$

Como $T$ é injetora e sobrejetora, vem

$$\dim V = \dim W,$$

o que prova a primeira direção. Suponha agora que $\dim V = \dim W$. Sejam $v_1, \ldots, v_n$ uma base de $V$ e $w_1, \ldots, w_n$ uma base de $W$. Define $T \in \mathcal{L}(V, W)$ como

$$T(a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n) = a_1 w_1 + \cdots + a_n w_n.$$

Dado que $v_1, \ldots, v_n$ é base de $V$, $T$ está bem-definida. Nota que $a_1 w_1 + \cdots + a_n w_n = 0$ possui apenas a solução trivial, logo $T$ é injetora. Por fim, como $\dim V = \dim W$, $T$ é também sobrejetora. □

**Proposição 19.** *Suponha $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de $V$ e $w_1, \ldots, w_n$ é base de $W$. Então $\mathcal{M}$ é um isomorfismo de $\mathcal{L}(V, W)$ em $\mathbb{F}^{m,n}$.*

**Corolário 19.1.** *Sejam $V$ e $W$ espaços vetoriais de dimensão finita. Então $\mathcal{L}(V, W)$ é de dimensão finita e*

$$\dim \mathcal{L}(V, W) = (\dim V)(\dim W).$$

**Definição 17.** (matriz de um vetor). Seja $v \in V$ e $v_1, \ldots, v_n$ uma base de $V$. A *matriz de $v$* com respeito a essa base é a matriz $n$ por 1 definida por

$$\mathcal{M}(v) = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix},$$

onde $v = b_1 v_1 + b_2 v_2 + \cdots + b_n v_n$.

**Corolário 19.2.** *Suponha $T \in \mathcal{L}(V,W)$ e $v_1,\ldots,v_n$ é uma base de $V$ e $w_1,\ldots,w_m$ é uma base de $W$. Seja $1 \leq k \leq n$. Então a $k$-ésima coluna de $\mathcal{M}(T)$ é igual a $\mathcal{M}(Tv_k)$.*

**Proposição 20.** *(transformações lineares atuam como multiplicação de matrizes). Suponha $T \in \mathcal{L}(V,W)$, $v_1,\ldots,v_n$ é uma base de $V$ e $w_1,\ldots,w_m$ é uma base de $W$. Se $v \in V$, então*

$$\mathcal{M}(Tv) = \mathcal{M}(T)\mathcal{M}(v).$$

**Proposição 21.** *Sejam $V$ e $W$ espaços vetoriais de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V,W)$. Então* $\dim \operatorname{im}(T)$ *é igual ao posto de $\mathcal{M}(T)$.*

## 5 Dualidade

**Definição 18.** Um *funcional linear* em $V$ é uma transformação linear de $V$ em $\mathbb{F}$. Em outras palavras, um funcional linear é um elemento de $\mathcal{L}(V,\mathbb{F})$.

**Definição 19.** O *dual* de $V$, denotado por $V'$, é o espaço vetorial de todos os funcionais lineares sobre $V$, ou seja, $V' = \mathcal{L}(V,\mathbb{F})$.

**Proposição 22.** *Se $V$ é um espaço vetorial de dimensão finita, então $V'$ é de dimensão finita e* $\dim V' = \dim V$.

**Definição 20.** Se $v_1,\ldots,v_n$ é uma base de $V$, então a *base dual* de $v_1,\ldots,v_n$ é a lista $\varphi_1,\ldots,\varphi_n$ de elementos em $V'$, onde cada $\varphi_j$ é o funcional linear em $V$ definido por

$$\varphi_i(v_j) = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}, \quad \forall i,j = 1,\ldots,n.$$

**Proposição 23.** *(base dual fornece os coeficientes para combinação linear). Suponha que $v_1,\ldots,v_n$ é base de $V$ e que $\varphi_1,\ldots,\varphi_n$ é a base dual. Então*

$$v = \varphi_1(v)v_1 + \cdots + \varphi_n(v)v_n, \tag{14}$$

*para todo $v \in V$.*

**Proposição 24.** *Suponha que $V$ seja um espaço vetorial de dimensão finita. Então a base dual de qualquer base de $V$ é uma base de $V'$.*

**Definição 21.** (transformação dual). Suponha que $T \in \mathcal{L}(V,W)$. A *transformação dual* de $T$ é a transformação linear $T' \in \mathcal{L}(W',V')$ definida por

$$T'(\varphi) = \varphi \circ T,$$

para todo $\varphi \in W'$.

**Proposição 25.** *(propriedades algébricas da transformação dual). Sejam $T \in \mathcal{L}(V,W)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Então*

*(a)* $(S+T)' = S' + T'$ *para todo $S \in \mathcal{L}(V,W)$.*

*(b)* $(\lambda T)' = \lambda T'$.

*(c)* $(ST)' = T'S'$ *para todo $S \in \mathcal{L}(W,U)$.*

# IV Autovalores e Autovetores

## 1 Subespaços Invariantes

**Definição 1.** Uma transformação linear de um espaço vetorial em si mesmo é dita um *operador* no espaço vetorial. O conjunto de todos os operadores em $V$ é denotado por $\mathcal{L}(V)$.

**Definição 2.** Suponha $T \in \mathcal{L}(V)$. Um subespaço $U$ de $V$ é dito *invariante* sob $T$ se $Tu \in U$ para todo $u \in U$.

**Definição 3.** Suponha $T \in \mathcal{L}(V)$. Um escalar $\lambda \in \mathbb{F}$ é dito um *autovalor* de $T$ se existe $v \in V$ tal que $v \neq 0$ e $Tv = \lambda v$.

**Proposição 1.** *(condições equivalentes para autovalor). Seja $V$ um espaço vetorial de dimensão finita, $T \in \mathcal{L}(V)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Então as seguintes condições são equivalentes.*

*(a) $\lambda$ é um autovalor de $T$.*

*(b) $T - \lambda I$ não é injetora.*

*(c) $T - \lambda I$ não é sobrejetora.*

*(d) $T - \lambda I$ não é invertível.*

**Definição 4.** Suponha $T \in \mathcal{L}(V)$ e $\lambda$ é um autovalor de $T$. O *autovetor* de $T$ correspondente a $\lambda$ é qualquer vetor $v \in V$ tal que $v \neq 0$ e $Tv = \lambda v$.

**Teorema 2.** *Seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Então toda lista de autovetores de $T$ correspondente a autovalores distintos de $T$ é linearmente independente.*

*Demonstração.* Seja $v_1, \ldots, v_p$ uma lista de autovetores de $T$ correspondentes a autovalores distintos $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$. Suponha, por absurdo, que $v_1, \ldots, v_p$ seja LD. Então toma o menor inteiro $n$ tal que os coeficientes da equação

$$a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n = 0$$

sejam todos não nulos (pela minimalidade de $n$). Aplica $T - \lambda_n I$ e fica

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_n)v_1 + \cdots + a_{n-1}(\lambda_{n-1} - \lambda_n)v_{n-1} = 0.$$

Como os autovalores são distintos, todos os coeficientes são não nulos. Então, encontramos uma lista de autovetores LD de tamanho $n - 1$, o que contradiz a minimalidade de $v_1, \ldots, v_n$. □

**Definição 5.** Suponha $T \in \mathcal{L}(V)$ e $m$ é um inteiro positivo.

- $T^m \in \mathcal{L}(V)$ é definido por $T^m = TT \cdots T$ ($m$ vezes).
- $T^0$ é definido como o operador identidade em $V$.
- Se $T$ é invertível com inversa $T^{-1}$, então $T^{-m} = (T^{-1})^m$.

**Definição 6.** Suponha $T \in \mathcal{L}(V)$ e $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ é um polinômio dado por

$$p(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_m z^m.$$

para todo $z \in \mathbb{F}$. Então $p(T) \in \mathcal{L}(V)$ é o operador em $V$ definido por

$$p(T) = a_0 I + a_1 T + a_2 T^2 + \cdots + a_m T^m.$$

**Definição 7.** (produto de polinômios). Se $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, então o *produto* $pq$ é o polinômio em $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ definido por

$$(pq)(z) = p(z)q(z),$$

para todo $z \in \mathbb{F}$.

**Proposição 3.** *(propriedades multiplicativas). Sejam $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então*

*(a)* $(pq)(T) = p(T)q(T)$;

*(b)* $p(T)q(T) = q(T)p(T)$.

**Proposição 4.** *(espaço nulo e imagem de $p(T)$ são invariantes sob $T$). Sejam $T \in \mathcal{L}(V)$ e $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$. Então os subespaços* $\ker p(T)$ *e* $\operatorname{im} p(T)$ *são invariantes sob $T$.*

## 2 Matrizes Triangular-Superiores

**Definição 8.** Seja $T \in \mathcal{L}(V)$. A *matriz* de $T$ com respeito a uma base $v_1, \ldots, v_n$ de $V$ é a matriz $\mathcal{M}(T)$ de tamanho $n$ por $n$

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix},$$

cujas entradas $A_{jk}$ são definidas por

$$Tv_k = A_{1k}v_1 + A_{2k}v_2 + \cdots + A_{nk}v_n.$$

A notação $\mathcal{M}(T, (v_1, \ldots, v_n))$ também é usada para denotar a matriz de $T$ com respeito à base $v_1, \ldots, v_n$.

**Definição 9.** A *diagonal* de uma matriz quadrada consiste nas entradas na linha do canto superior esquerdo até a linha do canto inferior direito.

**Definição 10.** Uma matriz quadrada é dita *triangular-superior* se todas as entradas abaixo da diagonal são zero.

**Proposição 5.** *(condições para matriz triangular-superior). Seja $T \in \mathcal{L}(V)$ e $v_1, \ldots, v_n$ uma base de $V$. Então as seguintes condições são equivalentes.*

*(a) A matriz de $T$ com respeito à base $v_1, \ldots, v_n$ é triangular-superior.*

*(b)* $\operatorname{span}(v_1, \ldots, v_k)$ *é invariante sob $T$, para $k = 1, \ldots, n$.*

*(c)* $Tv_k \in \operatorname{span}(v_1, \ldots, v_k)$*, para $k = 1, \ldots, n$.*

**Proposição 6.** *Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ e que $V$ tem uma base tal que a matriz de $T$ com respeito a essa base é triangular-superior com entradas diagonais $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. então*

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I) = 0.$$

**Proposição 7.** *(determinação de autovalores a partir de matriz triangular-superior). Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ tem uma matriz triangular-superior com respeito a alguma base de $V$. Então os autovalores de $T$ são exatamente as entradas na diagonal da matriz.*

**Proposição 8.** *(condição necessária e suficiente para existência de matriz triangular-superior). Suponha que $V$ é um espaço vetorial de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então $T$ tem uma matriz triangular-superior com respeito a alguma base de $V$ sse o polinômio mínimo de $T$ é igual a $(z-\lambda_1)\cdots(z-\lambda_m)$, para alguns $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{F}$.*

**Corolário 8.1.** *(se $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, então todo operador em $V$ tem matriz triangular-superior). Sejam $V$ um espaço vetorial complexo de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então $T$ tem uma matriz triangular-superior com respeito a alguma base de $V$.*

## 3 Operadores Diagonalizáveis

**Definição 11.** Uma *matriz diagonal* é uma matriz quadrada cujas entradas fora da diagonal são todas zero.

**Definição 12.** Um operador em $V$ é dito *diagonalizável* se o operador tem uma matriz diagonal com respeito a alguma base de $V$.

**Definição 13.** Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. O *autoespaço* de $T$ correspondente a $\lambda$ é o subespaço $E(\lambda, T)$ de $V$ definido por

$$E(\lambda, T) = \ker(T - \lambda I) = \{v \in V : Tv = \lambda v\}.$$

Então, $E(\lambda, T)$ é o conjunto de todos os autovetores de $T$ correspondentes a $\lambda$, juntamente com o vetor nulo.

**Proposição 9.** *(soma de autoespaços é direta). Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ e que $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ são autovalores distintos de $T$. Então a soma $E(\lambda_1, T) + \cdots + E(\lambda_m, T)$ é direta. Além disso, se $V$ é de dimensão finita, então*

$$\dim E(\lambda_1, T) + \cdots + \dim E(\lambda_m, T) \leq \dim V.$$

**Teorema 10.** *(condições para diagonalizabilidade). Suponha que $V$ é um espaço vetorial de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$. Sejam $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ autovalores distintos de $T$. Então as seguintes condições são equivalentes.*

*(a)* $T$ *é diagonalizável.*

*(b)* $V$ *tem uma base de autovetores de* $T$*.*

*(c)* $V = E(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus E(\lambda_m, T)$*.*

*(d)* $\dim V = \dim E(\lambda_1, T) + \cdots + \dim E(\lambda_m, T)$*.*

**Proposição 11.** *(autovalores suficientes implicam diagonalizabilidade). Suponha que $V$ é um espaço vetorial de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$. Se $T$ tem $\dim V$ autovalores distintos, então $T$ é diagonalizável.*

# V Espaços com Produto Interno

## 1 Produtos Internos e Normas

**Definição 1.** Para $x, y \in \mathbb{R}^n$, o *produto interno* de $x$ e $y$ é o número real $x \cdot y$ definido por

$$x \cdot y = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n,$$

onde $x = (x_1, \ldots, x_n)$ e $y = (y_1, \ldots, y_n)$.

**Definição 2.** Um *produto interno* em $V$ é uma função que toma um par ordenado $(u, v)$ de elementos de $V$ e atribui a ele um número escalar $\langle u, v\rangle \in \mathbb{F}$ e tem as seguintes propriedades.

- **positividade:** $\langle v, v\rangle \geq 0$, para todo $v \in V$, e $\langle v, v\rangle = 0$ sse $v = 0$;
- **aditividade na primeira variável:** $\langle u + v, w\rangle = \langle u, w\rangle + \langle v, w\rangle$, para todos $u, v, w \in V$;
- **homogeneidade na primeira variável:** $\langle \lambda v, w\rangle = \lambda\langle v, w\rangle$, para todo $\lambda \in \mathbb{F}$ e todos $v, w \in V$;
- **conjugação simétrica:** $\langle w, v\rangle = \overline{\langle v, w\rangle}$, para todos $v, w \in V$.

**Definição 3.** Um *espaço com produto interno* é um par $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$, onde $V$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$ e $\langle\cdot,\cdot\rangle$ é um produto interno em $V$.

Para os resultados a seguir, sejam $V$ e $W$ espaços com produto interno sobre $\mathbb{F}$.

**Proposição 1** (propriedades básicas do produto interno). *Da definição de produto interno, temos as seguintes propriedades.*

*(a) Para cada $v \in V$ fixado, a função que toma $u$ em $\langle u, v\rangle$ é uma transformação linear em $V$.*

*(b) $\langle 0, v\rangle = 0$ para todo $v \in V$.*

*(c) $\langle v, 0\rangle = 0$ para todo $v \in V$.*

*(d) $\langle u, v + w\rangle = \langle u, v\rangle + \langle u, w\rangle$, para todos $u, v, w \in V$.*

*(e) $\langle u, \lambda v\rangle = \overline{\lambda}\langle u, v\rangle$, para todo $\lambda \in \mathbb{F}$ e todos $u, v \in V$.*

**Definição 4.** Para $v \in V$, a *norma* de $v$, denotada por $\|v\|$, é o número real não-negativo definido por $\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$.

**Proposição 2** (propriedades básicas da norma). *Seja $v \in V$.*

*(a) $\|v\| \geq 0$ e $\|v\| = 0$ sse $v = 0$.*

*(b) $\|\lambda v\| = |\lambda|\|v\|$, para todo $\lambda \in \mathbb{F}$.*

**Definição 5.** Dois vetores $u, v \in V$ são ditos *ortogonais* se $\langle u, v\rangle = 0$.

**Proposição 3.** *Seja $v \in V$. Então*

*(a) O vetor nulo é ortogonal a todo vetor $v \in V$.*

*(b) O vetor nulo é o único vetor em $V$ que é ortogonal a si mesmo.*

**Teorema 4** (teorema de Pitágoras). *Sejam $u, v \in V$. Se $u$ e $v$ são ortogonais, então*

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

**Proposição 5** (decomposição ortogonal). *Suponha que $u, v \in V$, com $v \neq 0$. Faça $c = \dfrac{\langle u, v\rangle}{\|v\|^2}$ e $w = u - \dfrac{\langle u, v\rangle}{\|v\|^2}v$. Então $u = cv + w$ e $\langle w, v\rangle = 0$.*

**Teorema 6** (desigualdade de Cauchy-Schwarz). *Sejam $u, v \in V$. Então*

$$|\langle u, v\rangle| \leq \|u\|\|v\|. \tag{15}$$

*Além disso, a igualdade ocorre sse um de $u, v$ é um múltiplo escalar do outro.*

**Corolário 6.1** (desigualdade triangular). *Sejam $u, v \in V$. Então*

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|. \tag{16}$$

*Essa desigualdade é uma igualdade sse um de $u, v$ é um múltiplo escalar do outro com escalar não-negativo.*

**Corolário 6.2** (igualdade do paralelogramo). *Sejam $u, v \in V$. Então*

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2. \tag{17}$$

## 2 Bases Ortonormais

**Definição 6.** Uma lista de vetores é dita *ortonormal* se cada vetor na lista tem norma 1 e é ortogonal a todos os outros vetores na lista. Em outras palavras, uma lista $e_1, \ldots, e_m$ de vetores em $V$ é ortonormal se

$$\langle e_j, e_k \rangle = \begin{cases} 1 & \text{se } j = k \\ 0 & \text{se } j \neq k \end{cases}, \quad \forall j, k = 1, \ldots, m.$$

**Proposição 7.** *Se $e_1, \ldots, e_m$ é uma lista ortonormal de vetores em $V$, então*

$$\|a_1 e_1 + a_2 e_2 + \cdots + a_m e_m\|^2 = |a_1|^2 + |a_2|^2 + \cdots + |a_m|^2, \tag{18}$$

*para todos os escalares $a_1, a_2, \ldots, a_m \in \mathbb{F}$.*

**Corolário 7.1.** *Toda lista ortonormal de vetores é linearmente independente.*

**Proposição 8** (desigualdade de Bessel). *Suponha que $e_1, \ldots, e_m$ é uma lista ortonormal de vetores em $V$. Então, para todo $v \in V$,*

$$|\langle v, e_1 \rangle|^2 + |\langle v, e_2 \rangle|^2 + \cdots + |\langle v, e_m \rangle|^2 \leq \|v\|^2. \tag{19}$$

**Definição 7.** Uma *base ortonormal* de $V$ é uma base de $V$ que é uma lista ortonormal de vetores.

**Proposição 9.** *Seja $V$ um espaço vetorial de dimensão finita. Então toda lista ortonormal de vetores em $V$ de tamanho* $\dim V$ *é uma base ortonormal de $V$.*

**Proposição 10** (vetor como combinação linear de uma base ortonormal). *Suponha que $e_1, \ldots, e_n$ é uma base ortonormal de $V$. Então, para todo $v \in V$,*

*(a)* $v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2 + \cdots + \langle v, e_n \rangle e_n$ *(identidade de Parseval);*

*(b)* $\|v\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + |\langle v, e_2 \rangle|^2 + \cdots + |\langle v, e_n \rangle|^2$.

*(c)* $\langle u, v \rangle = \langle u, e_1 \rangle \overline{\langle v, e_1 \rangle} + \langle u, e_2 \rangle \overline{\langle v, e_2 \rangle} + \cdots + \langle u, e_n \rangle \overline{\langle v, e_n \rangle}$, *para todo $u \in V$.*

**Teorema 11** (processo de ortogonalização de Gram-Schmidt). *Suponha que $v_1, \ldots, v_m$ é uma lista de vetores linearmente independente em $V$. Faça $f_1 = v_1$. Para $k = 2, \ldots, m$, defina $f_k$ indutivamente por*

$$f_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, f_j \rangle}{\|f_j\|^2} f_j.$$

*Para todo $k = 1, \ldots, m$, defina $e_k = f_k / \|f_k\|$. Então $e_1, \ldots, e_m$ é uma lista ortonormal de vetores em $V$ tal que*

$$\operatorname{span}(e_1, \ldots, e_k) = \operatorname{span}(v_1, \ldots, v_k).$$

**Proposição 12.** *Todo espaço vetorial de dimensão finita tem uma base ortonormal.*

**Corolário 12.1.** *Suponha que $V$ é um espaço vetorial de dimensão finita. Então toda lista ortonormal de vetores em $V$ pode ser estendida a uma base ortonormal de $V$.*

**Proposição 13.** *Seja $V$ um espaço vetorial de dimensão finita com produto interno e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então $T$ tem uma matriz triangular-superior com respeito a alguma base ortonormal de $V$ sse o polinômio mínimo de $T$ é igual a $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$, para alguns $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{F}$.*

**Teorema 14** (teorema de Schur). *Todo operador em um espaço vetorial complexo de dimensão finita tem uma matriz triangular-superior com respeito a alguma base ortonormal.*

**Teorema 15** (teorema de representação de Riesz). *Suponha que $V$ é um espaço vetorial de dimensão finita e $\varphi \in V'$. Então existe um único vetor $v \in V$ tal que*

$$\varphi(u) = \langle u, v \rangle,$$

*para todo $u \in V$.*

## 3 Complementos Ortogonais e Problemas de Minimização

**Definição 8.** Se $U$ é um subconjunto de $V$, então o *complemento ortogonal* de $U$, denotado por $U^\perp$, é o conjunto de todos os vetores em $V$ que são ortogonais a todos os vetores em $U$:

$$U^\perp = \{v \in V : \langle v, u \rangle = 0 \quad \forall\, u \in U\}.$$

**Proposição 16** (propriedades do complemento ortogonal). *(a) Se $U$ é um subconjunto de $V$, então $U^\perp$ é um subespaço de $V$.*

*(b) $\{0\}^\perp = V$.*

*(c) $V^\perp = \{0\}$.*

*(d) Se $U$ é um subconjunto de $V$, então $U \cap U^\perp \subset \{0\}$.*

*(e) Se $U$ e $W$ são subconjuntos de $V$ com $U \subset W$, então $W^\perp \subset U^\perp$.*

**Proposição 17.** *Seja $U$ um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita $V$. Então*

$$V = U \oplus U^\perp.$$

**Corolário 17.1.** *Seja $U$ um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita $V$. Então*

$$\dim U^\perp = \dim V - \dim U.$$

**Corolário 17.2.** *Seja $U$ um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita $V$. Então*

$$(U^\perp)^\perp = U.$$

**Corolário 17.3.** *Suponha que $U$ é um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita $V$. Então*

$$U^\perp = \{0\} \iff U = V.$$

**Definição 9.** Seja $U$ um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita $V$. A *projeção ortogonal* de $V$ sobre $U$ é o operador $P_U \in \mathcal{L}(V)$ definido por

$$P_U v = u,$$

onde $v = u + w$ com $u \in U$ e $w \in U^\perp$, para todo $v \in V$.

**Proposição 18** (propriedades da projeção ortogonal). *Suponha que $U$ é um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita com produto interno $V$ e $P_U$ é a projeção ortogonal de $V$ sobre $U$. Então*

*(a)* $P_U \in \mathcal{L}(V)$;

*(b)* $P_U u = u$, *para todo* $u \in U$;

*(c)* $P_U w = 0$, *para todo* $w \in U^\perp$;

*(d)* $\operatorname{im} P_U = U$;

*(e)* $\ker P_U = U^\perp$;

*(f)* $v - P_U v \in U^\perp$, *para todo* $v \in V$.

*(g)* $P_U^2 = P_U$;

*(h)* $\|P_U v\| \leq \|v\|$, *para todo* $v \in V$.

*(i) se* $e_1, \ldots, e_m$ *é uma base ortonormal de* $U$ *e* $v \in V$, *então*

$$P_U v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2 + \cdots + \langle v, e_m \rangle e_m.$$

**Proposição 19** (minimização da distância a um subespaço). *Seja $U$ um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita $V$, $v \in V$ e $u \in U$. Então*

$$\|v - P_U v\| \leq \|v - u\|. \tag{20}$$

*Além disso, a igualdade ocorre sse* $u = P_U v$.

*Demonstração.* □

# VI Operadores em Espaços com Produto Interno

Suponha que $\mathbb{F}$ seja $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ e que $V$ e $W$ são espaços vetoriais de dimensão finita com produto interno sobre $\mathbb{F}$.

## 1 Operadores Autoadjuntos e Operadores Normais

**Definição 1.** Suponha que $T \in \mathcal{L}(V, W)$. A *adjunta* de $T$ é a função $T^* : W \to V$ tal que

$$\langle Tv, w \rangle = \langle v, T^* w \rangle, \tag{21}$$

para todo $v \in V$ e todo $w \in W$.

*Observação.* Na equação (21), o produto interno à esquerda é o produto interno em $W$ e o produto interno à direita é o produto interno em $V$.

**Proposição 1.** *Se $T \in \mathcal{L}(V, W)$, então $T^* \in \mathcal{L}(W, V)$.*

**Proposição 2** (propriedades da adjunta). *(a) $(S + T)^* = S^* + T^*$, para todos $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$.*

*(b) $(\lambda T)^* = \overline{\lambda} T^*$, para todo $\lambda \in \mathbb{F}$ e todo $T \in \mathcal{L}(V, W)$.*

*(c) $(T^*)^* = T$;*

*(d) $(ST)^* = T^* S^*$, para todos $S \in \mathcal{L}(W, X)$ e $T \in \mathcal{L}(V, W)$.*

*(e) $I^* = I$, onde $I$ é o operador identidade em $V$.*

*(f) Se $T$ é invertível, então $T^*$ é invertível e $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.*

**Proposição 3** (espaço nulo e imagem da adjunta). *Se $T \in \mathcal{L}(V, W)$, então*

*(a)* $\ker T^* = (\operatorname{im} T)^\perp$;

*(b)* $\operatorname{im} T^* = (\ker T)^\perp$;

*(c)* $\ker T = (\operatorname{im} T^*)^\perp$;

*(d)* $\operatorname{im} T = (\ker T^*)^\perp$.

**Definição 2.** A *conjugada tranposta* de uma matriz $A$ $m$ por $n$ é a matriz $A^*$ $n$ por $m$ definida por

$$(A^*)_{jk} = \overline{A_{kj}},$$

para todo $j = 1, \ldots, n$ e todo $k = 1, \ldots, m$.

**Proposição 4.** *Seja $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Se $e_1, \ldots, e_n$ é uma base ortonormal de $V$ e $f_1, \ldots, f_m$ é uma base ortonormal de $W$, então*

$$\mathcal{M}(T^*, (f_1, \ldots, f_m), (e_1, \ldots, e_n)) = (\mathcal{M}(T, (e_1, \ldots, e_n), (f_1, \ldots, f_m)))^*. \tag{22}$$

**Definição 3.** Um operador $T \in \mathcal{L}(V)$ é chamado de *autoadjunto* se $T = T^*$.

*Observação.* Um operador $T \in \mathcal{L}(V)$ é autoadjunto sse

$$\langle Tv, w \rangle = \langle v, Tw \rangle$$

para todos $v, w \in V$.

**Proposição 5.** *Todo autovalor de um operador autoadjunto é real.*

*Demonstração.* □

**Proposição 6.** *Suponha que $V$ é um espaço vetorial complexo com produto interno e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então $Tv$ é ortogonal a $v$ para todo $v \in V$ sse $T = 0$.*

**Proposição 7.** *Suponha que $V$ é um espaço vetorial complexo com produto interno e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então $\langle Tv, v \rangle$ é real para todo $v \in V$ sse $T$ é autoadjunto.*

**Proposição 8.** *Suponha que $T$ é um operador autoadjunto em $V$. Então $\langle Tv, v \rangle = 0$ para todo $v \in V$ sse $T = 0$.*

**Definição 4.** Um operador $T \in \mathcal{L}(V)$ é chamado de *normal* se $TT^* = T^*T$.

*Observação.* Todo operador autoadjunto é normal.

**Proposição 9**. *Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$. Então $T$ é normal se, e somente se, $\|Tv\| = \|T^*v\|$ para todo $v \in V$.*

**Proposição 10** (imagem, núcleo e autovetores de um operador normal). *Seja $T \in \mathcal{L}(V)$ um operador normal. Então*

*(a)* $\ker T = \ker T^*$;

*(b)* $\operatorname{im} T = \operatorname{im} T^*$;

*(c)* $V = \ker T \oplus \operatorname{im} T$;

*(d)* $T - \lambda I$ *é normal, para todo* $\lambda \in \mathbb{F}$;

*(e) se* $v \in V$ *e* $\lambda \in \mathbb{F}$, *então* $Tv = \lambda v \iff T^*v = \overline{\lambda}v$.

**Proposição 11**. *Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ é um operador normal. Então autovetores de $T$ correspondentes a autovalores distintos são ortogonais.*

## 2 Teorema Espectral

**Teorema 12** (teorema espectral sobre $\mathbb{R}$). *Suponha que $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então as seguintes condições são equivalentes.*

*(a) $T$ é autoadjunto.*

*(b) $V$ tem uma base ortonormal de autovetores de $T$.*

*(c) $T$ tem uma matriz diagonal com respeito a alguma base ortonormal de $V$.*

**Teorema 13** (teorema espectral sobre $\mathbb{C}$). *Suponha que $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então as seguintes condições são equivalentes.*

*(a) $T$ é normal.*

*(b) $V$ tem uma base ortonormal de autovetores de $T$.*

*(c) $T$ tem uma matriz diagonal com respeito a alguma base ortonormal de $V$.*

## 3 Operadores Positivos

**Definição 5**. Um operador $T \in \mathcal{L}(V)$ é chamado de *positivo* se $T$ é autoadjunto e $\langle Tv, v\rangle \geq 0$ para todo $v \in V$.

**Definição 6**. Um operador $R$ é chamado de *raiz quadrada* de um operador $T$ se $R^2 = T$.

**Proposição 14** (caracterização de operadores positivos). *Seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Então as seguintes condições são equivalentes.*

*(a) $T$ é um operador positivo.*

*(b) $T$ é autoadjunto e todos os autovalores de $T$ são não negativos.*

*(c) Com respeito a alguma base ortonormal de $V$, a matriz de $T$ é diagonal e todos os elementos da diagonal são não negativos.*

*(d)* $T$ *tem uma raiz quadrada positiva.*

*(e)* $T$ *tem uma raiz quadrada autoadjunta.*

*(f)* $T = R^*R$ *para algum* $R \in \mathcal{L}(V)$.

**Proposição 15.** *Todo operador positivo* $T \in \mathcal{L}(V)$ *tem uma única raiz quadrada positiva* $\sqrt{T}$.

**Proposição 16.** *Suponha que* $T$ *é um operador positivo em* $V$ *e* $v \in V$ *tal que* $\langle Tv, v\rangle = 0$. *Então* $Tv = 0$.

# VII Operadores em Espaços Vetoriais Complexos

## 1 Autovetores Generalizados e Operadores Nilpotentes

**Proposição 1.** *Suponha que* $T \in \mathcal{L}(V)$. *Então*

$$\{0\} \subseteq \ker T^0 \subseteq \ker T^1 \subseteq \cdots \subseteq \ker T^k \subseteq \ker T^{k+1} \subseteq \cdots . \tag{23}$$

*Demonstração.* □

**Proposição 2.** *Suponha que* $T \in \mathcal{L}(V)$ *e* $m$ *é um inteiro não negativo tal que*

$$\ker T^m = \ker T^{m+1}.$$

*Então* $\ker T^m = \ker T^k$ *para todo* $k \geq m$.

**Proposição 3** (espaços nulos estabilizam). *Suponha que* $T \in \mathcal{L}(V)$. *Então*

$$\ker T^{\dim V} = \ker T^{\dim V+1} = \ker T^{\dim V+2} = \cdots .$$

**Proposição 4.** *Suponha que* $T \in \mathcal{L}(V)$. *Então*

$$V = \ker T^{\dim V} \oplus \operatorname{im} T^{\dim V}. \tag{24}$$

**Definição 1.** Seja $T \in \mathcal{L}(V)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Um vetor $v \in V$ é chamado de *autovetor generalizado* de $T$ correspondente ao autovalor $\lambda$ se $v \neq 0$ e existe um inteiro positivo $k$ tal que

$$(T - \lambda I)^k v = 0.$$

**Proposição 5.** *Suponha que* $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ *e* $T \in \mathcal{L}(V)$. *Então* $V$ *tem uma base de autovetores generalizados de* $T$.

**Proposição 6.** *Seja* $T \in \mathcal{L}(V)$ *e* $v \in V$ *um autovetor generalizado de* $T$. *Então existe um único autovalor* $\lambda$ *de* $T$ *tal que* $v$ *é um autovetor generalizado de* $T$ *correspondente a* $\lambda$.

**Proposição 7.** *Seja* $T \in \mathcal{L}(V)$. *Então toda lista de autovetores generalizados de* $T$ *correspondentes a autovalores distintos é linearmente independente.*

**Definição 2.** Um operador $T \in \mathcal{L}(V)$ é chamado de *nilpotente* se existe um inteiro positivo $k$ tal que $T^k = 0$.

**Proposição 8.** *(operador nilpotente na potência da dimensão é zero). Suponha que* $T \in \mathcal{L}(V)$ *é um operador nilpotente. Então* $T^{\dim V} = 0$.

**Proposição 9.** *(autovalor de operador nilpotente). Todo autovalor de um operador nilpotente é* $0$. *Se* $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ *e* $0$ *é o único autovalor de* $T$, *então* $T$ *é nilpotente.*

**Proposição 10.** *(polinômio mínimo e matriz triangular-superior de operador nilpotente). Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$. Então as seguintes condições são equivalentes.*

*(a) $T$ é nilpotente.*

*(b) O polinômio mínimo de $T$ é igual a $z^m$, para algum inteiro positivo $m$.*

*(c) Existe uma base de $V$ com respeito à qual a matriz de $T$ tem a forma*

$$\begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}$$

## 2 Decomposição de Autoespaços Generalizados

**Definição 3.** Seja $T \in \mathcal{L}(V)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. O *autoespaço generalizado* de $T$ correspondente ao autovalor $\lambda$ é o subespaço

$$G(\lambda, T) = \{v \in V : (T - \lambda I)^k v = 0\}.$$

para algum inteiro positivo $k$. Então, $G(\lambda, T)$ é o conjunto de todos os autovetores generalizados de $T$ correspondentes ao autovalor $\lambda$, juntamente com o vetor zero.

**Proposição 11.** *Seja $T \in \mathcal{L}(V)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Então $G(\lambda, T) = \ker(T - \lambda I)^{\dim V}$.*

**Teorema 12** (decomposição em autoespaços generalizados). *Suponha que $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e $T \in \mathcal{L}(V)$. Sejam $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ os autovalores distintos de $T$. Então*

*(a) $G(\lambda_k, T)$ é invariante sob $T$, para todo $k = 1, \ldots, m$;*

*(b) $(T - \lambda_k I)|_{G(\lambda_k, T)}$ é nilpotente, para todo $k = 1, \ldots, m$;*

*(c) $V = G(\lambda_1, T) \oplus G(\lambda_2, T) \oplus \cdots \oplus G(\lambda_m, T)$.*

**Definição 4.** Seja $T \in \mathcal{L}(V)$. A *multiplicidade* de um autovalor $\lambda$ de $T$ é definida como a dimensão do autoespaço generalizado correspondente $G(\lambda, T)$. Em outras palavras, a multiplicidade de $\lambda$ é $\dim \ker(T - \lambda I)^{\dim V}$.

**Corolário 12.1.** *Suponha que $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então a soma das multiplicidades de todos os autovalores de $T$ é igual a $\dim V$.*

**Definição 5.** Uma *matriz diagonal em bloco* é uma matriz quadrada da forma

$$\begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_m \end{pmatrix}$$

onde $A_1, A_2, \ldots, A_m$ são matrizes quadradas (não necessariamente da mesma dimensão) na diagonal principal e os outros elementos são todos zero.

**Proposição 13.** *Suponha que $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e $T \in \mathcal{L}(V)$. Sejam $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ os autovalores distintos de $T$ com multiplicidades $d_1, \ldots, d_m$, respectivamente. Então existe uma base de $V$ com respeito à qual a matriz de $T$ é uma matriz diagonal em bloco da forma*

$$\begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_m \end{pmatrix}$$

*onde cada $A_k$ é uma matriz $d_k$ por $d_k$ triangular-superior com $\lambda_k$ em cada entrada da diagonal principal, para todo $k = 1, \ldots, m$.*

## 3 Consequências da Decomposição em Autoespaços Generalizados

**Proposição 14.** *Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ seja nilpotente. Então $I + T$ possui uma raiz quadrada.*

**Proposição 15** (sobre $\mathbb{C}$, operadores invertíveis possuem raiz quadrada)**.** *Suponha que $V$ seja um espaço vetorial complexo e $T \in \mathcal{L}(V)$ seja invertível. Então $T$ possui uma raiz quadrada.*

**Definição 6.** Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$. Uma base de $V$ é chamada de *base de Jordan* para $T$ se a matriz de $T$ com respeito a essa base é uma matriz diagonal em bloco

$$\begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_m \end{pmatrix}$$

onde cada $A_k$ é uma matriz triangular-superior da forma

$$\begin{pmatrix} \lambda_k & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_k & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_k \end{pmatrix}.$$

**Proposição 16.** *Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ seja nilpotente. Então $V$ tem uma base de Jordan para $T$.*

**Proposição 17.** *Suponha que $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então $V$ tem uma base de Jordan para $T$.*