

Assim, podemos concluir que, no Sistema Internacional, a unidade de campo elétrico também pode ser volt por metro (V/m), além do newton por coulomb (N/C). Uma partícula carregada que se move em um campo elétrico de intensidade 1 V/m vence uma diferença de potencial de 1 V a cada metro de deslocamento na direção da linha de força.

Exercícios resolvidos

ER1. Em um ponto P , distante 50 cm de uma carga puntiforme fixa Q , a energia potencial elétrica adquirida por uma partícula de prova $q = +1 \mu\text{C}$ é de $9 \cdot 10^{-2} \text{ J}$.

Estando as cargas no vácuo, onde $k_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$, determine:

- o valor da carga Q ;
- o potencial elétrico no ponto P .

Resolução:

Pelos dados, temos:

$$d = 50 \text{ cm} = 5 \cdot 10^{-1} \text{ m};$$

$$q = +1 \mu\text{C} = +1 \cdot 10^{-6} \text{ C};$$


$$E_{pe} = -9 \cdot 10^{-2} \text{ J e}$$

$$k_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

- Vamos determinar o valor da carga Q através da expressão:

$$E_{pe} = k_0 \cdot \frac{Q \cdot q}{d} \Rightarrow Q = \frac{E_{pe} \cdot d}{k_0 \cdot q} = \frac{-9 \cdot 10^{-2} \cdot 5 \cdot 10^{-1}}{9 \cdot 10^9 \cdot 1 \cdot 10^{-6}} = -\frac{5 \cdot 10^{-3}}{10^3} \Rightarrow Q = -5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

- Como a carga Q resultou negativa, desenhemos a seguinte figura:



O potencial elétrico no ponto P é calculado pela expressão:

$$V_P = \frac{E_{pe}}{q} = \frac{-9 \cdot 10^{-2}}{1 \cdot 10^{-6}} \Rightarrow V_P = -9 \cdot 10^4 \text{ V}$$

ER2. Em um campo elétrico, o potencial elétrico de um ponto A é de $5 \cdot 10^5 \text{ V}$. Uma carga de prova de $-2 \mu\text{C}$ é levada desse ponto até um ponto infinitamente afastado dele. Considerando o infinito como o referencial dos potenciais, determine:

- a energia potencial elétrica no ponto A ;
- o trabalho da força elétrica nesse deslocamento.

Resolução:

São dados:

$$V_A = 5 \cdot 10^5 \text{ V}; q = -2 \mu\text{C} = -2 \cdot 10^{-6} \text{ C}.$$

Considerando o infinito como referencial, seu potencial elétrico vale $V_\infty = 0$.

- A energia potencial elétrica é calculada através de:

$$E_{pe_A} = q \cdot V_A \Rightarrow E_{pe_A} = -2 \cdot 10^{-6} \cdot 5 \cdot 10^5 = -10 \cdot 10^{-1} \Rightarrow E_{pe_A} = -1 \text{ J}$$

- Pela expressão do trabalho:

$$\tau_{AB} = q \cdot (V_A - V_\infty) \Rightarrow \tau_{AB} = -2 \cdot 10^{-6} \cdot (5 \cdot 10^5 - 0) = -10 \cdot 10^{-1} \Rightarrow \tau_{AB} = -1 \text{ J}$$

Logicamente, ambos os resultados ficaram iguais $E_{pe_A} = \tau_{AB} = -1 \text{ J}$, pois a energia potencial armazenada em A foi toda usada para que a força elétrica realizasse o trabalho resistente de deslocar a carga de prova de A até o infinito.

ER3. Em dois vértices de um triângulo equilátero de 1,0 m de lado são colocadas duas cargas puntiformes $Q_1 = Q_2 = 4 \mu\text{C}$, no vácuo, onde a constante eletrostática vale $9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$.

- Calcule o potencial elétrico no ponto C , terceiro vértice do triângulo, e no ponto D , médio, entre as duas cargas.
- Qual o trabalho das forças elétricas sobre a carga $q = 1,0 \mu\text{C}$, que se desloca de C para D ?

Resolução:

Pelos dados, temos:

$$\ell = 1,0 \text{ m};$$

$$Q_1 = Q_2 = 4 \mu\text{C} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ C}; k_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

Figura mostrando a situação:

