

Subproblemas de SQP - Questões práticas

$$\min f(x) \text{ s.a. } h(x)=0, \quad l \leq x \leq u.$$

Subproblema:

$$QP_k : \min_x \frac{1}{2} (x-x^k)^t B_k (x-x^k) + \nabla f(x^k)^t (x-x^k)$$

$$\text{s.a. } \nabla h(x^k)^t (x-x^k) - \nabla h(x^k)^t (x_{\text{nor}}^k - x^k) = 0$$

$$l \leq x \leq u, \quad \|x-x^k\| \leq \Delta_k.$$

Como escolher B_k ?

- O SQP básico (= Newton sobre o sistema KKT) sugere que $B_k = \nabla^2 L(x^k, \lambda^k)$.
- Mas, como vimos, $\nabla^2 L$ pode não ser definida positiva...

Possibilidades para B_k (definida positiva)

① $B_k = \nabla^2 L(x^k, \lambda^k) + \alpha I$, onde $\alpha \gg 1$.

$$0 < d^T B_k d = d^T \nabla^2 L d + \alpha \|d\|^2, \quad \forall d \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha > - \frac{d^T \nabla^2 L d}{\|d\|^2}, \quad \forall d \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha > -\lambda_{\min}(\nabla^2 L), \quad \text{onde}$$

λ_{\min} denota o menor autovetor.

1.1) Computar $\lambda_{\min}(\nabla^2 L)$ e tomar

$$\alpha = -\lambda_{\min}(\nabla^2 L) + 1, \quad \text{ou ainda}$$

$$\alpha = \max\{0, -\lambda_{\min}(\nabla^2 L) + 1\}.$$

↳ o cálculo de $\lambda_{\min}(\nabla^2 L)$ é caro
(adequado p/ problemas pequenos).

1.2) Computar um limitante inferior para $\lambda_{\min}(\nabla^2 L)$ de forma barata.

↳ Discos de Gerschgorin:

$A = (a_{ij})_{n \times n}$ simétrica.

$$D_i = \left\{ \lambda \in \mathbb{R}; |\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right\}$$

$$A = \begin{bmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} \\ \boxed{2} & \boxed{-1} & \boxed{4} \\ \boxed{3} & \boxed{4} & \boxed{5} \end{bmatrix}$$

$$\lambda_{\min}(A) \geq -7.$$

↑
TEO

$$D_1 = \{ \lambda \in \mathbb{R} ; |\lambda - 1| \leq |2| + |3| \} = [-4, 6]$$

$$D_2 = \{ \lambda \in \mathbb{R} ; |\lambda - (-1)| \leq |2| + |4| \} = [-7, 5]$$

$$D_3 = \{ \lambda \in \mathbb{R} ; |\lambda - 5| \leq |3| + |4| \} = [-2, 12]$$

Teorema: Todo autovalor λ de A pertence a algum D_i .

Prova: Seja λ um autovalor de A associado ao autovetor $v \neq 0$. Considere o índice i tal que $|v_i| = \max_{j=1, \dots, n} |v_j|$. A linha i do

sistema $Av = \lambda v$ é

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} v_j = \lambda v_i \Leftrightarrow \lambda v_i - a_{ii} v_i = \sum_{j \neq i} a_{ij} v_j$$

$$\Rightarrow |\lambda v_i - a_{ii} v_i| = \left| \sum_{j \neq i} a_{ij} v_j \right| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \cdot |v_j|$$

$w_i \neq 0$ pois $v \neq 0$.

$$\Rightarrow |\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \underbrace{\frac{|w_j|}{|w_i|}}_{\leq 1} \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

Seja, $\lambda \in D_i$.


Exemplos:

1) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

$D_1 = [-4, 6]$

$D_2 = [-7, 5]$

$D_3 = [-2, 12]$



$$\lambda_{\min}(A) \in D_i \Rightarrow \lambda_{\min}(A) \in D_1 \cup D_2 \cup D_3.$$

" $[-7, 12]$

$$\Rightarrow \lambda_{\min}(A) \geq -7.$$

2) $C = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \\ 2 & -1 & 7 \end{bmatrix}$

$D_1 = \{\lambda \in \mathbb{R}; |\lambda - 5| \leq 3\}$
 $= [2, 8]$

$D_2 = \{\lambda \in \mathbb{R}; |\lambda - 4| \leq 2\} = [2, 6]$

$D_3 = \{\lambda \in \mathbb{R}; |\lambda - 7| \leq 3\} = [4, 10]$

$\lambda_{\min}(A) \in \bigcup D_i = [2, 10] \Rightarrow \lambda_{\min}(A) \geq 2$
 $\Rightarrow A$ é definida positiva.

Queramos $\alpha > -\lambda_{\min}(\nabla^2 L)$.

Se σ for o extremo esquerdo do conjunto $\bigcup_{i=1}^n D_i$, então $\lambda_{\min}(\nabla^2 L) \geq \sigma$. Assim,

$\alpha > -\sigma \geq -\lambda_{\min}(\nabla^2 L)$, ou seja, o limitante obtido por Gerschgorin fornece um α válido ($\nabla^2 L + \alpha I$ definida positiva).

Podemos tomar

$$\alpha = \max\{0, -\sigma + 1\}.$$

Isso é empregado no pacote SQP WORHP
(+ heurísticas para redução de α : $\nabla^2 L + p\alpha I$
com $p \in (0, 1]$).

\hookrightarrow adequado a problemas grandes.

② $B_k =$ "atualização quase-Newton"


$$\nabla^2 L(x, \lambda) \rightarrow \nabla^2 f(x) \quad "x^{k+1} \approx x^k"$$

$$\nabla f(x^{k+1}) \approx \nabla f(x^k) + \nabla^2 f(x^k)(x^{k+1} - x^k)$$

B_{k+1} será solução do sistema

$$B_{k+1}(x^{k+1} - x^k) = \nabla f(x^{k+1}) - \nabla f(x^k)$$

$$\Rightarrow \boxed{B_{k+1} s = y} \quad \text{(equação secante)}$$



Teorema: A equação secante possui solução B .

Prova: Feito na disciplina "Otimização I" ~~na~~

A equação possui várias soluções B !!!

- Suponha B_k simétrica e definida positiva
- $B_{k+1} = B_k + \alpha y y^t + \beta B_k s s^t B_k$

Obrigamos B_{k+1} satisfazer a eq. secante!

Uma solução é tomar $\alpha = \frac{1}{y^t s}$ e $\beta = -\frac{1}{s^t B_k s}$

ou seja,

$$B_{k+1} = B_k + \frac{y y^t}{y^t s} - \frac{B_k s s^t B_k}{s^t B_k s}$$

atualização BFGS (Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shanno).

- BFGS é uma das mais utilizadas, e funciona bem.
- B_{k+1} como BFGS resolve a equação secante (exercício)
- B_k simétrica e definida positiva e $y^t s > 0$, então B_{k+1} é definida positiva.

↳ prova: veja Teorema abaixo

- QP_0 é construído com $B_0 = I$ (identidade)
- QP_{k+1} é " " " B_{k+1} como BFGS, usando a matriz anterior B_k .
- Se em uma dada iteração $y^t s \leq 0$, então BFGS pode fornecer uma matriz B_{k+1} não definida positiva.
↳ uma solução $B_{k+1} = B_k$.

Teorema: Suponha que B_k seja simétrica e definida positiva. Então, se $y^t s > 0$, temos a matriz B_{k+1} da atualização BFGS satisfaz:

- (i) B_{k+1} está bem definida;
- (ii) B_{k+1} é simétrica;
- (iii) B_{k+1} é definida positiva.

Prova: Como $y^t s > 0$, em particular $s \neq 0$.
Assim $s^t B_k s > 0$ dado que B_k é definida positiva. Logo é possível construir B_{k+1} .

É trivial mostrar que B_{k+1} é simétrica. Isso ficará como exercício.

Vamos mostrar que B_{k+1} é definida positiva.

Considere o produto $x^t B_{k+1} x$:

$$\begin{aligned} x^t B_{k+1} x &= x^t B_k x + \frac{(x^t y)^2}{y^t s} - \frac{(x^t B_k s)^2}{s^t B_k s} \\ &= \frac{(x^t y)^2}{y^t s} + \frac{(s^t B_k s)(x^t B_k x) - (x^t B_k s)^2}{s^t B_k s}. (*) \end{aligned}$$

Como B_k é simétrica e definida positiva, possui fatoração Cholesky, digamos

$$B_k = G G^t,$$

com G triangular inferior com diagonal toda positiva ($\Rightarrow G$ é invertível). Temos

- $s^t B_k s = (s^t G)(G^t s) = \|G^t s\|^2$
- $x^t B_k x = (x^t G)(G^t x) = \|G^t x\|^2$
- $x^t B_k s = (x^t G)(G^t s) = (G^t x)^t (G^t s)$.

Da desigualdade de Cauchy-Schwarz obtemos $(G^t x)^t (G^t s) \leq \|G^t x\|^2 \cdot \|G^t s\|^2$, ou seja,

$$(x^t B_k x)(s^t B_k s) - (x^t B_k s)^2 \geq 0. \quad (**)$$

Usando esta desigualdade em (*), concluímos que $x^t B_{k+1} x \geq 0$. Sendo x arbitrário, B_{k+1} é semi-definida positiva. Agora, de (*),

$$x^t B_{k+1} x = 0 \Rightarrow x^t y = 0 \text{ e } (**) = 0.$$

Sabemos que (**) só se realiza como igualdade se $G^t x$ e $G^t s$ forem colineares. Isto é, se $G^t x = \mu G^t s$ para algum $\mu \in \mathbb{R}$. Como G^t é invertível, então multiplicando à esquerda por G^{-1}

obtemos $x = \mu s$. Daí $x^t y = \mu \underbrace{(y^t s)}_{>0} \Rightarrow \mu = 0 \Rightarrow x = 0$.

Ou seja, $x^t B_{k+1} x = 0 \Rightarrow x = 0$. Assim B_{k+1} é definida positiva. 