Primary outcome: ISUP grade group 1 detection per man randomized/invited

Study or Subgroup	Intervention Events	Intervention Total	Comparator Events	Comparator Total	Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI
A. Screening invitation vs no screening / usual care						
ERSPC 2009	4325	72890	2360	89353	16.4%	2.25 [2.14; 2.36]
PLCO 2009	2269	38343	1793	38350	16.4%	1.27 [1.19; 1.34]
CAP 2018	3263	189386	2440	219439	16.4%	1.55 [1.47; 1.63]
PROBASE 2022	15	23341	2	23301	3.2%	7.49 [1.71; 32.74]
ProScreen 2024	39	15201	65	45544	12.7%	1.80 [1.21; 2.67]
Total (95% CI)		**339161**		**415987**	**65.1%**	**1.76 [1.09; 2.84]**
Heterogeneity: $Tau^2 = 0.0841$; $Chi^2 = 231.42$, df = 4 ($P < 0.0001$); $I^2 = 98.3\%$						
B. Diagnostic / biopsy strategy (both arms screened)						
STHLM3−MRI 2021	34	7609	73	5134	12.5%	0.31 [0.21; 0.47]
MVP 2022	4	259	4	266	3.6%	1.03 [0.26; 4.06]
GOTEBORG−2 2024	68	6575	159	6578	14.3%	0.43 [0.32; 0.57]
PROSA 2026	9	374	4	385	4.5%	2.32 [0.72; 7.46]
Total (95% CI)		**14817**		**12363**	**34.9%**	**0.56 [0.15; 2.08]**
Heterogeneity: $Tau^2 = 0.2270$; $Chi^2 = 11.79$, df = 3 ($P = 0.0081$); $I^2 = 74.6\%$						
Total (95% CI)		**353978**		**428350**	**100.0%**	**1.17 [0.62; 2.19]**
Heterogeneity: $Tau^2 = 0.1355$; $Chi^2 = 388.26$, df = 8 ($P < 0.0001$); $I^2 = 97.9\%$						
Test for subgroup differences: $Chi^2 = 6.51$, df = 1 ($P = 0.0107$)