Secondary outcome: ISUP grade group >=2 detection per man randomized/invited

Study or Subgroup	Intervention Events	Intervention Total	Comparator Events	Comparator Total	Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI
A. Screening invitation vs no screening / usual care						
ERSPC 2009	1665	72890	1947	89353	19.6%	1.05 [0.98; 1.12]
PLCO 2009	1104	38343	1120	38350	19.0%	0.99 [0.91; 1.07]
CAP 2018	4013	189386	4459	219439	20.3%	1.04 [1.00; 1.09]
PROBASE 2022	33	23341	0	23301	0.2%	66.89 [4.10; 1091.53]
ProScreen 2024	172	15201	282	45544	14.1%	1.83 [1.51; 2.21]
Total (95% CI)		**339161**		**415987**	**73.3%**	**1.16 [0.76; 1.77]**
Heterogeneity: Tau^2 = 0.0181; Chi^2 = 43.97, df = 4 (P < 0.0001); I^2 = 90.9%						
B. Diagnostic / biopsy strategy (both arms screened)						
STHLM3−MRI 2021	192	7609	106	5134	12.0%	1.22 [0.97; 1.55]
MVP 2022	11	259	4	266	1.2%	2.82 [0.91; 8.76]
GOTEBORG−2 2024	117	6575	139	6578	11.6%	0.84 [0.66; 1.07]
PROSA 2026	17	374	7	385	1.9%	2.50 [1.05; 5.96]
Total (95% CI)		**14817**		**12363**	**26.7%**	**1.29 [0.57; 2.92]**
Heterogeneity: Tau^2 = 0.1069; Chi^2 = 11.44, df = 3 (P = 0.0096); I^2 = 73.8%						
Total (95% CI)		**353978**		**428350**	**100.0%**	**1.15 [0.89; 1.50]**
Heterogeneity: Tau^2 = 0.0198; Chi^2 = 55.48, df = 8 (P < 0.0001); I^2 = 85.6%						
Test for subgroup differences: Chi^2 = 0.14, df = 1 (P = 0.7109)