Any prostate cancer detection per man randomized/invited

Study or Subgroup	Intervention Events	Intervention Total	Comparator Events	Comparator Total	Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI
A. Screening invitation vs no screening / usual care						
ERSPC 2009	5990	72890	4307	89353	15.7%	1.70 [1.64; 1.77]
PLCO 2009	3452	38343	2974	38350	15.7%	1.16 [1.11; 1.22]
CAP 2018	8054	189386	7853	219439	15.8%	1.19 [1.15; 1.23]
PROBASE 2022	48	23341	2	23301	1.7%	23.96 [5.82; 98.56]
ProScreen 2024	219	15201	355	45544	14.2%	1.85 [1.56; 2.19]
Total (95% CI)		**339161**		**415987**	**63.1%**	**1.53 [0.80; 2.90]**
Heterogeneity: $Tau^2 = 0.0498$; $Chi^2 = 280.35$, df = 4 ($P < 0.0001$); $I^2 = 98.6\%$						
B. Diagnostic / biopsy strategy (both arms screened)						
STHLM3−MRI 2021	226	7609	179	5134	13.7%	0.85 [0.70; 1.03]
MVP 2022	15	259	8	266	4.0%	1.93 [0.83; 4.46]
GOTEBORG−2 2024	185	6575	298	6578	13.9%	0.62 [0.52; 0.74]
PROSA 2026	26	374	11	385	5.3%	2.43 [1.22; 4.85]
Total (95% CI)		**14817**		**12363**	**36.9%**	**1.06 [0.39; 2.87]**
Heterogeneity: $Tau^2 = 0.1445$; $Chi^2 = 21.75$, df = 3 ($P < 0.0001$); $I^2 = 86.2\%$						
Total (95% CI)		**353978**		**428350**	**100.0%**	**1.30 [0.83; 2.03]**
Heterogeneity: $Tau^2 = 0.0620$; $Chi^2 = 371.54$, df = 8 ($P < 0.0001$); $I^2 = 97.8\%$						
Test for subgroup differences: $Chi^2 = 0.87$, df = 1 ($P = 0.3501$)