Prostate biopsies per man screened, by screening strategy

Trial (arm)	Events	N	%	95% CI
PSA				
ERSPC 2009 (I)	17543	59923	29.28	[28.91; 29.64]
CAP 2018 (I)	5850	67313	8.69	[8.48; 8.91]
PROBASE 2022 (I)	120	23301	0.51	[0.43; 0.62]
PROBASE 2022 (C)	37	23301	0.16	[0.11; 0.22]
STHLM3−MRI 2021 (C)	438	5134	8.53	[7.78; 9.33]
MVP 2022 (C)	28	248	11.29	[7.63; 15.90]
Random effects model		**179220**	**3.80**	**[0.82; 15.84]**
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 3.7997, χ^2_5 = 11276.76 (p = 0)				
PSA −> MRI				
GOTEBORG−2 2024 (I)	254	6575	3.86	[3.41; 4.36]
GOTEBORG−2 2024 (C)	588	6578	8.94	[8.26; 9.65]
PROSA 2026 (C)	20	383	5.22	[3.22; 7.95]
Random effects model		**13536**	**5.70**	**[3.69; 8.71]**
Heterogeneity: I^2 = 98.5%, τ^2 = 0.1462, χ^2_2 = 135.43 (p < 0.0001)				
Biomarker −> MRI				
ProScreen 2024 (I)	262	7744	3.38	[2.99; 3.81]
STHLM3−MRI 2021 (I)	311	7609	4.09	[3.65; 4.56]
Random effects model		**15353**	**3.72**	**[3.27; 4.24]**
Heterogeneity: I^2 = 81.1%, τ^2 = 0.0060, χ^2_1 = 5.28 (p = 0.0216)				
MRI−first				
MVP 2022 (I)	24	246	9.76	[6.35; 14.17]
PROSA 2026 (I)	40	369	10.84	[7.86; 14.47]
Random effects model		**615**	**10.41**	**[8.23; 13.08]**
Heterogeneity: I^2 = 0%, τ^2 = 0, χ^2_1 = 0.19 (p = 0.6664)				
Random effects model		**208724**	**4.84**	**[2.33; 9.78]**
Heterogeneity: I^2 = 99.9%, τ^2 = 1.9240, χ^2_{12} = 14345.32 (p = 0)				
Test for subgroup differences: χ^2_3 = 55.14, df = 3 (p < 0.0001)