Matemática

188 questões · conteúdo: Probabilidade; Sistema métrico decimal; Massa e capacidade; Medidas de tempo; Polígonos; Estatística e medidas de tendência central; Gráficos estatísticos

Nome: Turma: Data:

Probabilidade

1. Espaço amostral (Ω) é:

a) o resultado mais provável de um evento
b) o conjunto de todos os resultados possíveis de um evento
c) o número de casos favoráveis
d) a chance de um evento não acontecer

2. Qual é o espaço amostral do lançamento de uma moeda?

a) {1, 2, 3, 4, 5, 6}
b) {coroa, coroa}
c) {cara}
d) {cara, coroa}

3. Qual é o espaço amostral do lançamento de um dado comum?

a) {2, 4, 6}
b) {1, 2, 3, 4, 5, 6}
c) {0, 1, 2, 3, 4, 5}
d) {1, 6}

4. A probabilidade de um evento A é calculada por:

a) P(A) = n(A) · n(Ω)
b) P(A) = n(A)/n(Ω), casos favoráveis divididos pelos casos possíveis
c) P(A) = n(A) − n(Ω)
d) P(A) = n(Ω)/n(A)

5. O resultado de uma probabilidade pode ser representado como:

a) apenas fração
b) fração, número decimal ou porcentagem
c) apenas número inteiro
d) apenas porcentagem

6. Em um jogo, o jogador tem bônus de 3 casas e quer andar 6 ou mais casas jogando um dado. Qual a probabilidade?

a) 2/3, cerca de 66,7%
b) 1/2
c) 1/6
d) 1/3

7. Qual a probabilidade de um evento impossível, como tirar 7 em um dado comum?

a) 1/7
b) 7/6
c) 1
d) 0

8. Qual a probabilidade de um evento certo, como tirar um número menor que 7 em um dado comum?

a) 0
b) 1, ou 100%
c) 1/6
d) 6/7

9. Ao lançar um dado comum, qual a probabilidade de sair um número par?

a) 1/6
b) 1/2
c) 3/9
d) 1/3

10. Ao lançar um dado comum, qual a probabilidade de sair um número ímpar?

a) 3/9
b) 1/6
c) 1/3
d) 1/2

11. Ao lançar um dado comum, qual a probabilidade de sair um múltiplo de 3?

a) 1/2
b) 1/3
c) 2/3
d) 2/8

12. Ao lançar um dado comum, qual a probabilidade de sair um número maior que 4?

a) 1/3
b) 2/3
c) 1/2
d) 2/8

13. Ao lançar um dado comum, qual a probabilidade de sair um número menor que 3?

a) 1/2
b) 2/3
c) 2/8
d) 1/3

14. Ao lançar um dado comum, qual a probabilidade de sair o número 5?

a) 1/6
b) 1/7
c) 5/6
d) 1/2

15. Ao lançar um dado comum, qual a probabilidade de sair um número primo?

a) 1/6
b) 1/2
c) 3/9
d) 1/3

16. Ao lançar um dado comum, qual a probabilidade de sair um divisor de 6?

a) 2/3
b) 1/4
c) 1/3
d) 4/10

17. Uma caixa tem 8 bolas azuis, 10 amarelas e 12 roxas, iguais no formato. Retirando uma ao acaso, qual a probabilidade de ela NÃO ser roxa?

a) 1/30
b) 3/2
c) 3/5
d) 2/5

18. Uma caixa tem 5 bolas azuis, 7 amarelas e 8 roxas, iguais no formato. Retirando uma ao acaso, qual a probabilidade de ela NÃO ser azul?

a) 3
b) 1/4
c) 3/4
d) 1/20

19. Uma caixa tem 4 bolas azuis, 6 amarelas e 10 roxas, iguais no formato. Retirando uma ao acaso, qual a probabilidade de ela NÃO ser amarela?

a) 3/10
b) 7/3
c) 1/20
d) 7/10

20. Uma caixa tem 3 bolas azuis, 9 amarelas e 6 roxas, iguais no formato. Retirando uma ao acaso, qual a probabilidade de ela NÃO ser roxa?

a) 1/18
b) 2
c) 2/3
d) 1/3

21. Uma caixa tem 6 bolas azuis, 6 amarelas e 8 roxas, iguais no formato. Retirando uma ao acaso, qual a probabilidade de ela NÃO ser amarela?

a) 7/3
b) 1/20
c) 7/10
d) 3/10

22. Numa turma de 30 alunos presentes, 6 não fizeram a tarefa. Sorteando um aluno, qual a chance de ele ter feito a tarefa?

a) 1/30
b) 24/7
c) 1/5
d) 4/5

23. Numa turma de 40 alunos presentes, 10 não fizeram a tarefa. Sorteando um aluno, qual a chance de ele ter feito a tarefa?

a) 3/4
b) 30/11
c) 1/40
d) 1/4

24. Numa turma de 25 alunos presentes, 5 não fizeram a tarefa. Sorteando um aluno, qual a chance de ele ter feito a tarefa?

a) 1/25
b) 20/6
c) 1/5
d) 4/5

25. Numa turma de 36 alunos presentes, 9 não fizeram a tarefa. Sorteando um aluno, qual a chance de ele ter feito a tarefa?

a) 3/4
b) 1/36
c) 1/4
d) 27/10

26. Numa turma de 32 alunos presentes, 8 não fizeram a tarefa. Sorteando um aluno, qual a chance de ele ter feito a tarefa?

a) 3/4
b) 1/32
c) 24/9
d) 1/4

Sistema métrico decimal

27. A unidade padrão de medida de comprimento no Brasil é:

a) a milha
b) o pé
c) a polegada
d) o metro (m)

28. Por que o sistema métrico é chamado de decimal?

a) Porque foi criado no ano 10
b) Porque as conversões entre as unidades de comprimento são feitas em potências de 10
c) Porque usa base 60
d) Porque só tem dez unidades

29. Qual destas NÃO é uma unidade do sistema métrico decimal?

a) quilômetro
b) milímetro
c) jarda
d) decímetro

30. Na tabela de conversão de comprimento, a ordem correta do maior para o menor é:

a) mm, cm, dm, m, dam, hm, km
b) km, dam, hm, m, cm, dm, mm
c) km, hm, dam, m, dm, cm, mm
d) m, km, hm, dam, dm, cm, mm

31. A unidade padrão de medida de superfície (área) é:

a) o litro (L)
b) o metro cúbico (m^3)
c) o metro (m)
d) o metro quadrado (m^2)

32. Nas unidades de área, de uma unidade para a vizinha, multiplica-se ou divide-se por:

a) 60
b) 1 000
c) 10
d) 100

33. A unidade padrão de volume no sistema métrico decimal é:

a) o metro cúbico (m^3)
b) o quilômetro (km)
c) o grama (g)
d) o metro quadrado (m^2)

34. Nas unidades de volume, de uma unidade para a vizinha, multiplica-se ou divide-se por:

a) 60
b) 10
c) 100
d) 1 000

35. Quanto é 8 km em dm?

a) 80 000 dm
b) 0,0008 dm
c) 8 000 dm
d) 800 000 dm

36. Quanto é 3 m em cm?

a) 30 cm
b) 0,03 cm
c) 3 000 cm
d) 300 cm

37. Quanto é 5 km em m?

a) 0,005 m
b) 50 000 m
c) 500 m
d) 5 000 m

38. Quanto é 250 cm em m?

a) 2,5 m
b) 25 m
c) 25 000 m
d) 0,25 m

39. Quanto é 4 500 m em km?

a) 0,45 km
b) 4 500 000 km
c) 4,5 km
d) 45 km

40. Quanto é 7 dam em dm?

a) 0,07 dm
b) 70 dm
c) 700 dm
d) 7 000 dm

41. Quanto é 12 cm em mm?

a) 1,2 mm
b) 1 200 mm
c) 12 mm
d) 120 mm

42. Quanto é 30 mm em cm?

a) 30 cm
b) 0,3 cm
c) 300 cm
d) 3 cm

43. Quanto é 2,5 km em m?

a) 250 m
b) 2 500 m
c) 0,0025 m
d) 25 000 m

44. Quanto é 60 dm em m?

a) 600 m
b) 6 m
c) 0,6 m
d) 60 m

45. Quanto é 500 000 m² em km²?

a) 0,005 km²
b) 500 km²
c) 0,5 km²
d) 0,0005 km²

46. Quanto é 3 m² em cm²?

a) 3 000 cm²
b) 300 cm²
c) 3 000 000 cm²
d) 30 000 cm²

47. Quanto é 2 km² em m²?

a) 200 000 000 m²
b) 2 000 m²
c) 2 000 000 000 m²
d) 2 000 000 m²

48. Quanto é 40 000 cm² em m²?

a) 40 m²
b) 400 m²
c) 0,04 m²
d) 4 m²

49. Quanto é 5 m² em dm²?

a) 50 dm²
b) 5 000 dm²
c) 50 000 dm²
d) 500 dm²

50. Quanto é 2 m³ em dm³?

a) 0,002 dm³
b) 20 dm³
c) 2 000 dm³
d) 200 dm³

51. Quanto é 5 000 cm³ em dm³?

a) 5 000 000 dm³
b) 5 dm³
c) 50 dm³
d) 500 dm³

52. Quanto é 1 m³ em cm³?

a) 0 cm³
b) 10 000 cm³
c) 100 cm³
d) 1 000 000 cm³

53. Quanto é 3 dm³ em cm³?

a) 0,003 cm³
b) 3 000 cm³
c) 30 cm³
d) 300 cm³

Massa e capacidade

54. A unidade padrão de massa no Brasil é:

a) o litro (L)
b) o metro (m)
c) a tonelada apenas
d) o grama (g)

55. Qual a ordem correta das unidades de massa, da maior para a menor?

a) kg, dag, hg, g, cg, dg, mg
b) kg, hg, dag, g, dg, cg, mg
c) g, kg, hg, dag, dg, cg, mg
d) mg, cg, dg, g, dag, hg, kg

56. Qual a diferença entre volume e capacidade?

a) Volume é o espaço que o objeto ocupa; capacidade é o quanto ele pode armazenar
b) São exatamente a mesma coisa
c) Volume mede massa e capacidade mede tempo
d) Capacidade é o espaço que o objeto ocupa; volume é o que ele armazena

57. Numa garrafa térmica, o espaço que ela ocupa é maior que o volume máximo de líquido que armazena porque:

a) a lateral tem espessura maior que a de uma garrafa comum
b) o líquido dilata dentro dela
c) ela não tem tampa
d) ela é feita de papel

58. A unidade padrão de capacidade é:

a) o metro quadrado (m^2)
b) o grama (g)
c) o litro (L)
d) o metro cúbico (m^3)

59. Quanto vale 1 dm^3 em litros?

a) 1 L
b) 0,1 L
c) 1 000 L
d) 10 L

60. Quanto vale 1 m^3 em litros?

a) 1 L
b) 100 L
c) 10 L
d) 1 000 L

61. Quanto vale 1 cm^3 em mililitros?

a) 1 000 mL
b) 0,1 mL
c) 10 mL
d) 1 mL

62. Uma confeiteira encheu 4 travessas de 15 cm × 10 cm × 5 cm e separou porções de 150 mL. Quantas porções?

a) 30
b) 15
c) 20
d) 5

63. Quanto é 13 kg em dg?

a) 0,0013 dg
b) 130 000 dg
c) 13 000 dg
d) 1 300 000 dg

64. Quanto é 2 kg em g?

a) 0,002 g
b) 200 g
c) 2 000 g
d) 20 000 g

65. Quanto é 3 500 g em kg?

a) 35 kg
b) 0,35 kg
c) 3 500 000 kg
d) 3,5 kg

66. Quanto é 250 mg em g?

a) 2,5 g
b) 0,25 g
c) 0,025 g
d) 250 000 g

67. Quanto é 4 g em mg?

a) 4 000 mg
b) 40 000 mg
c) 400 mg
d) 0,004 mg

68. Quanto é 2 500 mL em L?

a) 2 500 000 L
b) 25 L
c) 2,5 L
d) 0,25 L

69. Quanto é 3 L em mL?

a) 0,003 mL
b) 30 000 mL
c) 300 mL
d) 3 000 mL

70. Quanto é 5 L em cL?

a) 500 cL
b) 0,05 cL
c) 5 000 cL
d) 50 cL

71. Quanto é 750 mL em L?

a) 7,5 L
b) 0,75 L
c) 0,075 L
d) 750 000 L

72. Quanto é 2 kL em L?

a) 2 000 L
b) 0,002 L
c) 20 000 L
d) 200 L

73. Um recipiente tem 2 m³. Quantos litros cabem nele?

a) 2 000 L
b) 2 000 000 L
c) 200 L
d) 20 000 L

74. Um recipiente tem 5 dm³. Quantos litros cabem nele?

a) 5 000 L
b) 0,5 L
c) 50 L
d) 5 L

75. Um recipiente tem 3 000 cm³. Quantos litros cabem nele?

a) 30 L
b) 3 L
c) 0,3 L
d) 3 000 L

76. Um recipiente tem 0,5 m³. Quantos litros cabem nele?

a) 50 L
b) 500 L
c) 500 000 L
d) 5 000 L

77. Uma caixa tem 20 cm × 10 cm × 5 cm. Qual é a sua capacidade em litros?

a) 35 L
b) 1 000 L
c) 1 L
d) 10 L

78. Uma caixa tem 30 cm × 20 cm × 10 cm. Qual é a sua capacidade em litros?

a) 6 000 L
b) 6 L
c) 0,6 L
d) 60 L

79. Uma caixa tem 50 cm × 40 cm × 20 cm. Qual é a sua capacidade em litros?

a) 400 L
b) 40 000 L
c) 40 L
d) 110 L

Medidas de tempo

80. O tempo é medido em uma escala:

a) centesimal, de base 100
b) sexagesimal, de base 60
c) decimal, de base 10
d) binária, de base 2

81. Quantos segundos tem 1 hora?

a) 60 s
b) 600 s
c) 360 s
d) 3 600 s

82. Quantos meses tem um trimestre?

a) 6
b) 4
c) 2
d) 3

83. Quantos meses tem um semestre?

a) 6
b) 2
c) 12
d) 3

84. Quantos meses tem um bimestre?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 6

85. Um ano bissexto tem:

a) 360 dias
b) 364 dias
c) 365 dias
d) 366 dias

86. Nos cálculos de juros, o "mês comercial" e o "ano comercial" têm, respectivamente:

a) 28 dias e 336 dias
b) 31 dias e 365 dias
c) 30 dias e 365 dias
d) 30 dias e 360 dias

87. Quantos anos tem um quadriênio?

a) 40
b) 10
c) 2
d) 4

88. Um mês tem entre:

a) 28 e 31 dias
b) 25 e 30 dias
c) 30 e 32 dias
d) 29 e 30 dias

89. O cálculo de horas, minutos e segundos é semelhante ao cálculo de:

a) ângulos, que usam graus, minutos e segundos
b) massas, em gramas
c) volumes, em m^3
d) áreas, em m^2

90. Quanto é 3 min 35 s em segundos?

a) 215 s
b) 180 s
c) 38 s
d) 335 s

91. Quanto é 4 min 35 s em segundos?

a) 39 s
b) 240 s
c) 275 s
d) 435 s

92. Quanto é 2 min 51 s em segundos?

a) 251 s
b) 171 s
c) 53 s
d) 120 s

93. Quanto é 5 min 10 s em segundos?

a) 310 s
b) 15 s
c) 300 s
d) 510 s

94. Quanto é 1 min 45 s em segundos?

a) 145 s
b) 60 s
c) 105 s
d) 46 s

95. Quanto é 275 segundos em unidades maiores?

a) 4 min 45 s
b) 2 min 75 s
c) 5 min 35 s
d) 4 min 35 s

96. Quanto é 1011 segundos em unidades maiores?

a) 17 min 51 s
b) 16 min 51 s
c) 16 min 61 s
d) 10 min 11 s

97. Quanto é 150 segundos em unidades maiores?

a) 2 min 30 s
b) 1 min 50 s
c) 3 min 30 s
d) 2 min 40 s

98. Quanto é 500 segundos em unidades maiores?

a) 5 min 0 s
b) 8 min 20 s
c) 9 min 20 s
d) 8 min 30 s

99. Quanto é 3725 segundos em unidades maiores?

a) 1 h 2 min 5 s
b) 37 min 25 s
c) 1 h 3 min 5 s
d) 62 h 5 min

100. Quantos minutos há em 2 horas?

a) 48 min
b) 7200 min
c) 120 min
d) 200 min

101. Quantos minutos há em 3 horas?

a) 72 min
b) 180 min
c) 300 min
d) 10800 min

102. Quantos minutos há em 5 horas?

a) 500 min
b) 120 min
c) 18000 min
d) 300 min

103. Uma luta de jiu-jítsu dura 6 minutos. O cronômetro mostra que faltam 275 segundos. Quanto tempo já se passou?

a) 3 min 25 s
b) 4 min 35 s
c) 1 min 25 s
d) 2 min 75 s

104. Uma playlist soma 1 389 s e o treino dura 40 min. Qual é a diferença de tempo?

a) 26 min 51 s
b) 16 min 51 s
c) 10 min 11 s
d) 16 min 11 s

105. Ives segurava a respiração por 43 s e melhora 8 s por semana. Após 14 semanas, quanto tempo ele consegue?

a) 1 min 55 s
b) 3 min 5 s
c) 2 min 35 s
d) 2 min 15 s

106. Quantas semanas inteiras há em um quadriênio sem anos bissextos (4 × 365 dias)?

a) 208
b) 1 460
c) 200
d) 48

Polígonos

107. Polígonos são:

a) sólidos geométricos como o cubo
b) retas paralelas infinitas
c) figuras planas fechadas, formadas por segmentos de reta que se cruzam apenas nas extremidades
d) figuras com lados curvos

108. Os pontos de encontro dos lados de um polígono são chamados de:

a) arestas curvas
b) ângulos externos
c) diagonais
d) vértices

109. Diagonal de um polígono é o segmento que liga:

a) um lado ao outro, paralelamente
b) dois vértices não consecutivos
c) o centro a um vértice
d) dois vértices consecutivos

110. O ângulo externo de um polígono é formado:

a) por dois lados opostos
b) por duas diagonais
c) pelo centro e um vértice
d) pelo prolongamento de um lado e o lado adjacente

111. Se o ângulo interno de um polígono convexo mede 110°, o ângulo externo correspondente mede:

a) 250°
b) 70°
c) 90°
d) 110°

112. Polígonos regulares são aqueles que têm:

a) lados e ângulos diferentes
b) todos os lados e todos os ângulos iguais
c) pelo menos um ângulo maior que 180°
d) apenas os lados iguais

113. Um polígono côncavo (não convexo) tem:

a) pelo menos um ângulo interno maior que 180°
b) todos os ângulos internos menores que 180°
c) todos os lados iguais
d) nenhuma diagonal

114. Na fórmula $d = n(n - 3)/2$, por que se subtrai 3?

a) Porque de cada vértice não se traça diagonal para ele mesmo nem para os dois vértices adjacentes
b) Porque são 3 ângulos retos
c) Porque todo polígono tem 3 lados
d) Porque o triângulo tem 3 diagonais

115. Na fórmula $d = n(n - 3)/2$, por que se divide por 2?

a) Porque é a média dos lados
b) Porque o polígono tem dois lados
c) Porque cada diagonal é contada duas vezes, uma por extremidade
d) Porque metade das diagonais é externa

116. Qual é o polígono com o menor número de lados?

a) O quadrado
b) O segmento
c) O pentágono
d) O triângulo

117. A soma dos ângulos internos de um triângulo é:

a) 180°
b) 90°
c) 540°
d) 360°

118. A soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é:

a) $n \cdot 360°$
b) $n \cdot 180°$
c) $(n - 3) \cdot 180°$
d) $(n - 2) \cdot 180°$

119. Quantas diagonais tem um quadrilátero (4 lados)?

a) 6
b) 2
c) 4
d) 1

120. Quantas diagonais tem um pentágono (5 lados)?

a) 10
b) 5
c) 2
d) 2,5

121. Quantas diagonais tem um hexágono (6 lados)?

a) 3
b) 15
c) 9
d) 18

122. Quantas diagonais tem um heptágono (7 lados)?

a) 21
b) 4
c) 14
d) 28

123. Quantas diagonais tem um octógono (8 lados)?

a) 5
b) 20
c) 28
d) 40

124. Quantas diagonais tem um eneágono (9 lados)?

a) 54
b) 27
c) 36
d) 6

125. Quantas diagonais tem um decágono (10 lados)?

a) 7
b) 45
c) 35
d) 70

126. Quantas diagonais tem um dodecágono (12 lados)?

a) 54
b) 66
c) 108
d) 9

127. Quantas diagonais tem um icoságono (20 lados)?

a) 340
b) 170
c) 17
d) 190

128. Qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero (4 lados)?

a) 720°
b) 540°
c) 360°
d) 180°

129. Qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono (5 lados)?

a) 360°
b) 540°
c) 900°
d) 1 080°

130. Qual é a soma dos ângulos internos de um hexágono (6 lados)?

a) 720°
b) 360°
c) 1 080°
d) 540°

131. Qual é a soma dos ângulos internos de um heptágono (7 lados)?

a) 360°
b) 720°
c) 1 260°
d) 900°

132. Qual é a soma dos ângulos internos de um octógono (8 lados)?

a) 1 440°
b) 1 080°
c) 900°
d) 360°

133. Qual é a soma dos ângulos internos de um eneágono (9 lados)?

a) 360°
b) 1 260°
c) 1 080°
d) 1 620°

134. Qual é a soma dos ângulos internos de um decágono (10 lados)?

a) 1 260°
b) 1 440°
c) 1 800°
d) 360°

135. Qual é a soma dos ângulos internos de um dodecágono (12 lados)?

a) 1 800°
b) 360°
c) 1 620°
d) 2 160°

136. Quanto mede cada ângulo interno de um quadrado?

a) 90°
b) 360°
c) 100°
d) 180°

137. Quanto mede cada ângulo interno de um hexágono regular?

a) 60°
b) 720°
c) 70°
d) 120°

138. Quanto mede cada ângulo interno de um pentágono regular?

a) 82°
b) 72°
c) 540°
d) 108°

139. Quanto mede cada ângulo interno de um octógono regular?

a) 135°
b) 45°
c) 1 080°
d) 55°

Estatística e medidas de tendência central

140. Uma variável quantitativa é aquela que:

a) representa uma qualidade, como a cor do cabelo
b) não pode ser medida
c) só aparece em gráficos de linha
d) pode ser representada por um número, como idade ou altura

141. Qual destas é uma variável qualitativa?

a) Número de filhos
b) Idade
c) Altura
d) Cor do cabelo

142. Qual destas é uma variável quantitativa?

a) Gênero
b) Número de filhos
c) Estado civil
d) Religião

143. O que é um rol em Estatística?

a) Um tipo de gráfico de barras
b) A média dos dados
c) Uma lista de dados organizada em ordem crescente ou decrescente
d) O valor que mais se repete

144. O rol em ordem crescente de 12, 3, 7, 19 e 5 é:

a) 3, 7, 5, 12, 19
b) 3, 5, 7, 12, 19
c) 12, 3, 7, 19, 5
d) 19, 12, 7, 5, 3

145. A média aritmética de um conjunto de dados é:

a) o valor que mais se repete
b) o valor do meio do rol
c) a diferença entre o maior e o menor valor
d) a soma de todos os valores dividida pela quantidade de valores

146. A mediana é:

a) a soma dos valores
b) o valor que fica no centro de um conjunto de dados em ordem
c) o maior valor do conjunto
d) o valor mais frequente

147. A moda é:

a) o valor central do rol
b) o menor valor do conjunto
c) a média dos valores
d) o valor que aparece com maior frequência

148. Quando o número de dados é par, a mediana é:

a) sempre zero
b) a média dos dois termos centrais do rol
c) o termo que mais se repete
d) o primeiro termo

149. Na média ponderada, cada valor:

a) recebe um peso que influencia proporcionalmente o resultado
b) é multiplicado por 10
c) vale sempre o mesmo
d) é descartado se for menor

150. Média, mediana e moda são chamadas de:

a) medidas de tendência central
b) espaços amostrais
c) gráficos estatísticos
d) variáveis qualitativas

151. Qual é a média aritmética dos valores 7; 8; 5,5; 2; 9,5; 9; 10?

a) 8
b) 7,29
c) 51
d) 6,38

152. Qual é a mediana dos valores 7; 8; 5,5; 2; 9,5; 9; 10?

a) 2
b) 7,29
c) 10
d) 8

153. Qual é a média aritmética dos valores 3; 5; 7; 12; 19?

a) 7,67
b) 46
c) 7
d) 9,2

154. Qual é a mediana dos valores 3; 5; 7; 12; 19?

a) 7
b) 9,2
c) 3
d) 19

155. Qual é a média aritmética dos valores 2; 4; 4; 6; 9?

a) 5
b) 25
c) 4
d) 4,17

156. Qual é a mediana dos valores 2; 4; 4; 6; 9?

a) 4
b) 9
c) 2
d) 5

157. Qual é a moda dos valores 2; 4; 4; 6; 9?

a) 9
b) 5
c) 2
d) 4

158. Qual é a média aritmética dos valores 10; 20; 30; 40?

a) 100
b) 25
c) 26
d) 20

159. Qual é a mediana dos valores 10; 20; 30; 40?

a) 40
b) 26
c) 25
d) 30

160. Qual é a média aritmética dos valores 5; 8; 8; 9; 10; 2?

a) 8
b) 6
c) 42
d) 7

161. Qual é a mediana dos valores 5; 8; 8; 9; 10; 2?

a) 10
b) 9
c) 8
d) 7

162. Qual é a moda dos valores 5; 8; 8; 9; 10; 2?

a) 7
b) 8
c) 2
d) 10

163. Qual é a média aritmética dos valores 1; 3; 3; 3; 5; 9?

a) 4
b) 24
c) 3,43
d) 3

164. Qual é a mediana dos valores 1; 3; 3; 3; 5; 9?

a) 9
b) 1
c) 3
d) 4

165. Qual é a moda dos valores 1; 3; 3; 3; 5; 9?

a) 3
b) 9
c) 4
d) 1

166. Qual é a média aritmética dos valores 6; 7; 7; 8; 12?

a) 7
b) 40
c) 6,67
d) 8

167. Qual é a mediana dos valores 6; 7; 7; 8; 12?

a) 12
b) 8
c) 6
d) 7

168. Qual é a moda dos valores 6; 7; 7; 8; 12?

a) 6
b) 8
c) 12
d) 7

169. Qual é a média aritmética dos valores 15; 10; 20; 15; 25; 5?

a) 12,86
b) 90
c) 15
d) 16

170. Qual é a mediana dos valores 15; 10; 20; 15; 25; 5?

a) 5
b) 25
c) 16
d) 15

171. Qual é a moda dos valores 15; 10; 20; 15; 25; 5?

a) 15
b) 5
c) 25
d) 105

172. Qual é a média ponderada de: nota 7 com peso 2 e nota 8 com peso 3?

a) 7,6
b) 38
c) 19
d) 7,5

173. Qual é a média ponderada de: nota 6 com peso 1 e nota 9 com peso 2?

a) 7,5
b) 12
c) 8
d) 24

174. Qual é a média ponderada de: nota 5 com peso 2 e nota 10 com peso 3?

a) 40
b) 7,5
c) 8
d) 20

175. Qual é a média ponderada de: nota 8 com peso 1 e nota 6 com peso 1 e nota 10 com peso 2?

a) 8,5
b) 8
c) 11,33
d) 34

Gráficos estatísticos

176. O principal objetivo de um gráfico estatístico é:

a) substituir todos os cálculos
b) mostrar apenas um número
c) esconder os dados
d) tornar mais fácil a comparação e a identificação de padrões nos dados

177. Em um gráfico de barras, o comprimento de cada barra é:

a) aleatório
b) sempre igual
c) inversamente proporcional ao valor
d) proporcional ao valor da categoria que ela representa

178. No gráfico de barras horizontais, os dados variáveis ficam:

a) no eixo vertical
b) fora do gráfico
c) no eixo horizontal
d) no título

179. No gráfico de barras verticais, os dados variáveis ficam:

a) no eixo vertical
b) no título
c) no eixo horizontal
d) na legenda

180. O gráfico de linhas é geralmente usado para:

a) comparar partes de um todo em fatias
b) mostrar a mudança de uma variável ao longo de um fenômeno, como temperatura ao longo dos dias
c) listar nomes em ordem alfabética
d) calcular diagonais

181. No gráfico de linhas, os dados são representados por:

a) barras de comprimentos diferentes
b) pontos ligados por linhas contínuas
c) fatias de um círculo
d) figuras de polígonos

182. Para mostrar a temperatura média em cada um dos 15 primeiros dias de julho, o gráfico mais adequado é:

a) o gráfico de barras horizontais com clubes
b) uma tabela de polígonos
c) o espaço amostral
d) o gráfico de linhas

183. Os clubes do livro, da música e dos esportes têm 20, 30 e 50 integrantes. Em um gráfico de barras, qual barra é a maior?

a) A do clube do livro
b) A do clube da música
c) Todas são iguais
d) A do clube dos esportes

184. Os clubes têm 20, 30 e 50 integrantes. Quantos integrantes há no total?

a) 80
b) 50
c) 60
d) 100

185. Os clubes têm 20, 30 e 50 integrantes. Qual a média de integrantes por clube?

a) 33,33 (aproximadamente)
b) 30
c) 50
d) 100

186. O clube do livro leu 10 livros em janeiro, 17 em fevereiro e 13 em março. Em que mês leu mais?

a) Fevereiro
b) Março
c) Leu igual nos três
d) Janeiro

187. O clube do livro leu 10, 17 e 13 livros em três meses. Quantos livros leu no total?

a) 37
b) 30
c) 27
d) 40

188. O clube do livro leu 10, 17 e 13 livros em três meses. Qual a mediana?

a) 40
b) 10
c) 13
d) 17