คู่มือสุขภาพสำหรับคุณพ่อคุณแม่

การดูแลเด็กเมื่อกลับบ้าน

หลังผ่าตัด Cheiloplasty & Palatoplasty




4 เมื่อไรต้องมาโรงพยาบาล

หากพบอาการผิดปกติข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือมาพบแพทย์ก่อนวันนัดทันที

- โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

5 มาตรวจตามนัด



มาตรวจตามนัดทุกครั้ง
เพื่อประเมินแผล ผ่าตัดเย็บ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และติดตามการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง


ใบนัดและสมุดสุขภาพเด็ก
นำติดตัวมาทุกครั้งเพื่อบันทึกประวัติ

ยาเดิมที่กำลังรับประทาน
นำมาให้แพทย์ตรวจเช็กปริมาณและขนาด

นมและอุปกรณ์ดูแลเด็ก
เตรียมของใช้จำเป็นสำหรับลูกน้อยระหว่างรอ

ลูกน้อยแข็งแรงและฟื้นตัวได้ไว
เมื่อคุณพ่อคุณแม่มาตรวจสม่ำเสมอ

6 ติดต่อเรา



หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ตกแต่ง และแผลใหม่
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม

055-270-300

ต่อ 1846, 18407

พร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

"ดูแลด้วยหัวใจ เพื่อรอยยิ้มที่สดใสของลูกน้อย"

1 การดูแลแผล

ล้างมือให้สะอาดก่อน-หลัง
ล้างด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสบริเวณแผลเด็ก

รักษาแผลให้สะอาดและแห้ง
ระวังไม่ให้แผลเปียกน้ำหรือสัมผัสสิ่งสกปรกเด็ดขาด

ห้ามแกะ เกา ดึง หรือกดแผล
ป้องกันไหมเย็บหลุดหรือแผลแยกก่อนเวลาอันควร

ใช้ยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
ป้อนยาตรงเวลาและครบตามจำนวนที่แพทย์กำหนด

ไม่ทายาหรือสมุนไพรเอง
ห้ามใช้แป้ง ยาสมุนไพร หรือสารอื่นทาแผลเด็ดขาด

แผลแห้งสนิท สมานตัวไว
ลดการติดเชื้อได้เมื่อดูแลถูกต้อง

✨ การรักษาแผลให้สะอาด ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ดีที่สุด

2 ดูแลเด็กที่บ้าน

ป้องกันเด็กจับหรือเกาแผล
คอยสังเกตและดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้มือสัมผัสแผล

ไม่ให้ดูดนิ้วหรืออมของเล่น
ระวังไม่ให้นำของแข็งหรือนิ้วมือเข้าช่องปาก

ใช้ที่ดามแขนตามคำแนะนำ
ใส่ที่ดามแขนสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เด็กงอแขนมาสัมผัสใบหน้า

ดูแลช่องปากตามวิธีที่สอน
เช็ดทำความสะอาดช่องปากอย่างนุ่มนวลตามคำแนะนำ

ให้อาหารและนมตามวิธีที่กำหนด
ป้อนด้วยช้อนหรือ Syringe ตามแนวทางเฉพาะรายที่แพทย์แจ้ง

ป้อนด้วย Syringe หรือช้อน
งดใช้ขวดนมหรือหลอดดูดตามแพทย์สั่ง

🍼 ห้ามใช้จุกนมหรือหลอดดูดในผู้ป่วยผ่าตัดเพดานโหว่

3 อาการผิดปกติที่ต้องระวัง

เลือดออกมาก / ซึมไม่หยุด
มีเลือดสดไหลออกจากแผลหรือช่องปาก

แผลแยก ไหมหลุด บวมแดง
บริเวณแผลบวมตึง ร้อน หรือไหมเย็บหลุดออก

มีหนองหรือมีกลิ่นผิดปกติ
มีน้ำเหลืองปนหนอง หรือมีกลิ่นเหม็นจากแผล

มีไข้ ตัวร้อน กระสับกระส่าย
วัดอุณหภูมิได้เกิน 37.8°C หรือเด็กงอแงผิดปกติ

หายใจลำบากหรือปากเขียว
หายใจเสียงดัง หอบเหนื่อย ปลายมือปลายเท้าเขียว

กินไม่ได้ อาเจียนมาก ขาดน้ำ
ปัสสาวะออกน้อย ปากแห้ง ซึมลงอย่างเห็นได้ชัด

🚨 **พบอาการเหล่านี้ รีบมาโรงพยาบาลทันทีไม่ต้องรอวันนัด**