NRS-2002 — Dépistage du risque nutritionnel

Patient : _____ Date : ____ / ____ / _____ Service : _____

1. Dépistage initial

Question	Oui	Non
IMC < 20,5 kg.m² ?	☐	☐
Perte de poids au cours des 3 derniers mois ?	☐	☐
Diminution des apports alimentaires durant la dernière semaine ?	☐	☐
Maladie grave (p. ex. soins intensifs) ?	☐	☐

Au moins une réponse « Oui » : passer à l'évaluation complète. Toutes « Non » : répéter le dépistage chaque semaine.

2. Évaluation complète — retenir le score le plus élevé dans chaque colonne

Score	A. Altération de l'état nutritionnel	B. Gravité de la maladie (exemples)
0 — Absente	État nutritionnel normal.	Besoins nutritionnels normaux.
1 — Légère	Perte de poids > 5 % en 3 mois OU apports de 50–75 % des besoins pendant la dernière semaine.	Fracture de hanche ; cirrhose ou BPCO compliquée ; hémodialyse chronique ; diabète ; oncologie.
2 — Modérée	Perte de poids > 5 % en 2 mois OU IMC 18,5–20,5 avec altération de l'état général OU apports de 25–50 % des besoins pendant la dernière semaine.	Chirurgie abdominale majeure ; AVC ; pneumonie sévère ; hémopathie maligne.
3 — Sévère	Perte de poids > 5 % en 1 mois (ou > 15 % en 3 mois) OU IMC < 18,5 avec altération de l'état général OU apports de 0–25 % des besoins pendant la dernière semaine.	Traumatisme crânien grave ; greffe de moelle osseuse ; réanimation avec APACHE II > 10.

Les critères d'une catégorie sont alternatifs (OU). La gravité doit être appréciée selon la situation clinique.

3. Calcul et interprétation

Élément	Score à inscrire
A — État nutritionnel (0–3)	_____
B — Gravité de la maladie (0–3)	_____
Âge ≥ 70 ans (+1 si oui)	_____
TOTAL NRS-2002 (0–7)	_____

Score ≥ 3 : risque nutritionnel → évaluation et plan de soins nutritionnels. Score < 3 : surveillance et nouveau dépistage hebdomadaire.

Notes / action entreprise

_____

_____

_____

_____

Référence : Kondrup J. et al., ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002, Clinical Nutrition (2003), 22(4), 415–421. Adaptation française de la grille NRS-2002.