

Habilitation à diriger des recherches

This manuscript ([permalink](#)) was automatically generated from lesommer/habilitation-recherche@199a563 on January 3, 2021.

Auteur

- **Julien Le Sommer**

 [0000-0002-6882-2938](#) ·  [lesommer](#) ·  [jlesommer](#)

Univ. Grenoble Alpes, CNRS, IRD, G-INP, IGE, 38000 Grenoble, France

Résumé

Ce mémoire d'*habilitation à diriger des recherche* porte sur les activités que j'ai menées au sein de l'équipe MEOM depuis mon recrutement au CNRS. Il a pour objet d'illustrer mon travail de direction de recherche sur cette période. On y trouvera en introduction une présentation générale portant sur les modèles de circulation océanique et sur mon approche de travail. Le contenu du mémoire est ensuite divisé en trois parties portant respectivement sur trois séquences de travail qui illustrent ma pratique de la recherche, et discutent certains résultats scientifiques auxquels j'ai pu contribuer. Ces trois illustrations ont respectivement pour objet (i) l'étude de la réponse de l'océan austral à l'intensification des vents, (ii) l'étude des processus d'interaction entre cryosphère et océan dans l'océan austral subpolaire et (iii) l'étude des interactions d'échelles dans l'océan Atlantique Nord. Une dernière section porte sur un bilan de mon activité et les orientations que je souhaite donner à mes travaux au cours des années à venir.

Introduction générale

Dans cette introduction générale, je présente quelques éléments de contexte sur mon domaine d'activité scientifique, sur ma pratique de la recherche ainsi qu'une explication de l'approche que j'ai retenue dans la rédaction de ce mémoire.

La modélisation océanique comme outil et comme objet de recherche

Pour une large part, mes activités de recherche utilisent des données de simulations numériques de la circulation océanique ou contribuent au développement et à l'étude des modèles de circulation océanique. Il apparaît donc incontournable de commencer ce mémoire par une brève description des concepts et des domaines d'application de cet outil essentiel de l'océanographie moderne qu'est devenu la modélisation numérique au cours des dernières décennies.

Les modèles numériques de circulation océanique

La modélisation de la circulation océanique est une branche de la modélisation numérique qui s'attache à représenter de manière quantitative les processus physiques qui gouvernent l'évolution des propriétés physiques de l'océan (température T , salinité S , et courants (u, v, w)). Cette pratique est basée sur l'héritage combiné de la physique (notamment de la mécanique des fluides), des mathématiques appliquées (notamment les méthodes de résolution numérique des équations aux dérivées partielles) et de l'informatique (notamment le domaine du calcul scientifique). Cette pratique a émergé à la fin des années soixante [1,2] et son évolution a suivi depuis lors l'accroissement des capacités de calcul et la densification des réseaux d'observation de l'océan.

Modéliser la circulation océanique demande une bonne compréhension des processus physiques à l'oeuvre dans l'océan. En effet, à la différence de certains écoulements rencontrés dans des contextes expérimentaux ou industriels, la géométrie complexe des bassins océaniques, l'importance de la rotation de la Terre ainsi que la diversité des forcages mécaniques et thermodynamiques de la circulation océanique ont pour conséquence l'émergence de classes de mouvement aux propriétés distinctes et spécifiques, que l'on rassemble sous le terme générique de *processus physiques*.

Si décrire, même de manière superficielle, les principales propriétés de chacune de ces classes de processus dépasse l'ambition de ce mémoire, la Figure 1 donne toutefois un aperçu de la diversité du *zoo* des processus océaniques. On retiendra que ces processus diffèrent généralement par les classes d'échelles spatiales et temporelles où ils émergent, ainsi que par l'équilibre des forces mécaniques qui les gouvernent. Evidemment, on gardera à l'esprit que cette classification n'est qu'une idéalisation correspondant à des régimes dynamiques qui ne sont réalisés que dans des situations asymptotiques très particulières. En réalité, la circulation océanique est une soupe complexe de mouvements à toutes les échelles échangeant continuellement de l'énergie et de l'information.

La modélisation numérique de la circulation océanique est fondamentalement articulée à la compréhension des processus physiques à l'oeuvre dans l'océan. Cette compréhension des processus est en effet essentielle à la construction des modèles, où l'on veillera à la bonne représentation des processus résolus *explicitement* ou de manière simplifiée via des *paramétrisations*.

Symétriquement, les modèles de circulation sont devenus au fil du temps un outil de choix pour comprendre les processus océaniques, leurs interactions et leur impact à grande échelle, notamment dans des applications idéalisées qui permettent de capturer l'essence dynamique de ces processus.



Figure 1: Echelles de temps et d'espace des grandes classes de processus physiques à l'oeuvre dans l'océan (D. Chelton). On y distingue en particulier les processus équilibrés de meso-échelles (50-500km, 15-500j) et de submeso-échelle (1km-50km, 3h-30jours), les processus ondulatoires (10m-100km, 1min-1jour) et les processus turbulents tri-dimensionnels (<50m, <3h)

Les modèles de circulation océaniques les plus avancés sont aujourd'hui en mesure de décrire, dans une même simulation, la circulation océanique de l'échelle globale¹ à l'échelle du kilomètre en représentant de manière explicite des processus de l'échelle de l'heure à la décennie [3,4]. Bien que de telles simulations décrivent une part importante du spectre des échelles de la turbulence océanique, il doit être souligné que ces simulations ne représentent pas explicitement toutes les interactions d'échelle dans l'océan de sorte qu'une part d'entre elles doivent être paramétrisées au moyen de fermetures sous-mailles; selon toute vraisemblance ce sera le cas pour longtemps dans le futur également (voir par exemple [5] pour une discussion quantitative de cet aspect).

Sur un plan plus pratique, les modèles de circulation océaniques sont des programmes informatiques qui résolvent de manière approximative un jeu d'équations aux dérivées partielles, dites *équations primitives*, basé sur une simplification des équations de Navier-Stokes. Ces équations sont résolues de manière discrète dans un domaine de géométrie fixée, à partir de conditions initiales fixées et sous la contrainte de conditions limites liées au forçage de la circulation océanique par les milieux environnants. Cette approche est toujours essentiellement basée sur les concepts proposés par Bryan [2,6]. Le lecteur intéressé par les fondements physiques et mathématiques de la formulation des modèles de circulation océanique pourra consulter l'excellente synthèse de [7].

Sur un plan encore plus pratique, les modèles de circulation océanique sont des applications générées à partir de quelques dizaines de milliers à centaines de milliers de lignes de code, généralement rédigés en FORTRAN (plus rarement en C/C++, ou plus récemment en Julia). Ils peuvent être compilés et déployés sur un ordinateur portable ou sur les super-calculateurs CPU les plus avancés. Leur développement est généralement le fruit d'au moins 5 à 10 années de travail de la part

de communautés rassemblant des experts en physique de l'océan, en mathématiques appliquées et en informatique.

Il existe aujourd'hui une dizaine de modèles de circulation océanique (globaux) activement développés. La plupart (sinon tous) sont distribués sous licence logicielle libre et open-source, et leurs modes de développement sont généralement ouverts. Ces codes ont chacun leurs spécificités (choix de discréétisation, type de grille, ...), et leurs domaines d'application de prédilection. Aussi important à mes yeux, ils rassemblent chacun une communauté d'utilisateurs scientifiques, un *écosystème scientifique*, qui contribue ponctuellement à leur développement. L'équipe MEOM de l'IGE à laquelle j'appartiens fait partie depuis plus de 20 ans de l'écosystème des utilisateurs du code NEMO, c'est donc naturellement dans ce cadre que s'est déployée mon activité scientifique.

Les différents usages et pratiques liés à la modélisation numérique de l'océan

Les modèles de circulation océanique sont aujourd'hui utilisés pour trois grands types d'applications. Comme *outil de recherche scientifique*, ils permettent d'améliorer notre compréhension de l'océan et de ces interactions avec les milieux environnants. Intégrés comme *composantes de système de prévision opérationnelle*, ils permettent d'extrapoler les données d'observations et de prédire la circulation sur des échéances de l'ordre d'une semaine. En tant que *composantes des modèles du système Terre* (Earth System Models, ESM), ils contribuent à établir les projections climatiques, qui sont notamment utilisées dans le cadre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Les configurations spécifiques de ces modèles (résolutions, paramétrisations) ainsi que les processus qu'ils résolvent varient entre ses différentes applications. Elles diffèrent en particulier par leur résolution spatiale et par l'horizon temporel sur lequel les modèles sont intégrés (voir Table 1).

Table 1: Caractéristiques indicatives des modèles de circulation océanique selon le type d'application.

	Recherche	Prévision opérationnelle	Projection climatique
Domaine géographique	Régional/Global	Régional/Global	Global
Resolution spatiale typique	~1km	~10km	~100km
Contexte d'intégration	forcé par l'atmosphère	forcé avec assimilation de données	couplé (ESM)
Horizon temporel typique	1-20 ans	10 jours	10-1000 ans
Processus (partiellement) résolus	submesoéchelle balancée, interactions onde/vortex	ondes internes, tourbillons de mesoéchelle	gyres océaniques, circulation méridienne globale
Processus non-résolus	dynamique non-hydrostatique	submesoéchelle balancée	tourbillons et fronts de mésoscale

Comme outil de recherche scientifique, les modèles océaniques sont généralement mis en oeuvre pour des simulations forcées par l'atmosphère, et peuvent éventuellement être couplés à d'autre composantes (comme par exemple des modèles de banquise ou de biogéochimie marine). Lorsqu'ils sont mis en oeuvre dans des configurations réalistes, ils servent, en lien avec des observations, à l'étude de processus ou des mécanismes de variabilité océanique. Ils offrent alors aux océanographes physiciens des descriptions plausibles de la circulation océanique en quatre dimensions (x, y, z, t) qui

sont utilisées pour formuler ou tester des hypothèses quant à la physique sous-jacente. Les expériences de sensibilité notamment au forçage ou à la résolution, permettent de mieux comprendre ces processus. Cette compréhension peut alors nourrir la formulation de paramétrisations physiques pour des modèles ne résolvant pas explicitement les processus en cause. Les expériences réalisées au moyen de configurations plus idéalisées ou de complexité intermédiaire sont également un complément très utile aux expériences réalistes.

Intégrés comme composantes de systèmes opérationnels, les modèles de circulation permettent d'interpoler dans l'espace ou d'extrapoler dans le temps les données d'observations disponibles, de manière physiquement consistante. Les simulations sont alors généralement forcées par l'atmosphère mais également contrainte par des procédures d'assimilation de données. L'assimilation de données recouvre l'ensemble des méthodes permettant d'établir un compromis entre les contraintes dynamiques exprimées par le modèle et les contraintes liées aux observation, en prenant explicitement en compte les incertitudes inhérentes à chacun de ces deux sources d'information [8]. Ces simulations sont en pratique produites dans des centres opérationnels et visent la prévision de la circulation océanique sur de échelles de temps courtes (*forecast*, typiquement à une semaine), ou la reconstruction retrospective de la circulation sur des échelles de temps plus longues (*réanalyses*, typiquement quelques décennies). La mise en oeuvre de ces systèmes requièrent des moyens techniques et humains susbtanciels, comme par exemple ceux déployés en Europe dans le cadre des services marins du programme Copernicus (Copernicus Marine Environment Monitoring Service, CMEMS).

En tant que composantes des modèles du système Terre, les modèles d'océan sont intégrés en parallèle à d'autre modèles, qui chacun représentent une composante fonctionnelle de la machine climatique terrestre (physique et chimie de l'atmosphère, cryosphère continentale, biosphère marine, biosphère continentale, ...). Ces modèles du système Terre sont alors utilisés pour fournir des réalisations scientifiquement plausibles de la trajectoire du système climatique pour les décennies et siècles à venir en réponse à différents scénarios d'évolution des activités humaines. Ces modèles sont systématiquement confrontés aux observations du climat récent (ou à des proxy paléoclimatiques pour des périodes plus anciennes) et leurs réponses aux différents scénarios sont confrontées dans le cadre d'exercices d'intercomparaison de modèles, comme par exemple le Coupled Model Intercomparison project (CMIP). Plus généralement, les modèles du système Terre (complets ou dans des formes simplifiées) sont également utilisés, dans le cadre d'expériences de sensibilité comme outil conceptuels permettant de comprendre la sensibilité et le fonctionnement du système climatique.

Cette classification des applications des modèles de circulation océaniques est évidemment assez arbitraire. Il existe en fait un continuum d'applications émergentes à l'interface entre ces catégories arbitraires. Des modèles couplés océan-banquise-atmosphère à plus haute résolution ont ainsi par exemple été développés au court des dernières années dans le but de produire des projections climatiques aux échelle interannuelle à décennale (voir 2). Des systèmes couplés comparables sont également développés dans le contexte de la *prévision saisonnière*. Ces applications émergentes à l'interface entre prévision opérationnelle et projection climatique motivent des développements très actifs dans le domaine de l'assimilation de données pour les modèles couplés [9,10]. Plus généralement, ces nouvelles applications sont rendues possibles par l'adoption du paradigme de la modélisation *seamless*, où les différentes applications des modèles géoscientifiques utilisent les mêmes codes bien qu'elles s'intéressent à des échelles spatiales et des horizons temporels différents [11,12].




Figure 2: Intensité des courants océaniques de surface dans trois modèles océanique globaux couplés (atmosphère-océan/glace) basés sur NEMO à trois résolutions différentes - (à gauche) 25km-1/12 degrés, (au milieu) 60km-1/4 degrés, (à droite) 130km-1 degrés (crédit : Malcolm Roberts)

Un autre usage important des modèles de circulation océanique qui n'est pas listé ci-dessus est lié au développement des plateformes et des réseaux d'observation de l'océan. Les simulations océaniques servent en effet le développement des futurs réseaux d'observation dans le cadre d'expériences dites *Observing System Simulation Experiments* (OSSEs), qui aident à évaluer l'impact de différents scénarios d'observations sur les systèmes de prédiction [13]. Ces approches sont désormais couramment mises en oeuvre pour optimiser les réseaux de capteurs, comme l'illustrent par exemple les exemples de TPOS [14] et d'AtlantOS [15]. Les données virtuelles fournies par les modèles de circulation peuvent également s'avérer cruciales dans la spécification de missions satellites et pour préparer les chaînes de traitement avalés avant que les données effectives ne soient disponibles. Ce type d'approches s'est ainsi avéré essentiel dans la préparation de la future mission altimétrique SWOT [16] dont le lancement est prévu en 2022, notamment dans le cadre d'OSSE [17,18].

Il est d'ailleurs important de souligner que, si le développement des modèles s'appuie sur les champs de l'océanographie physique, des mathématiques appliquées et de l'informatique, il est aussi le fruit d'un contexte qui implique les possibilités du calcul haute performance (High Performance Computing, HPC) et les besoins en terme d'application et de capacités observationnelles. On peut noter par exemple que le développement des modèles réalistes décrivant explicitement la meso-échelle océanique est lié à l'émergence de l'altimétrie et aux échelles physiques qu'elle a permis d'observer dès les années 90' (avec les missions TOPEX et ERS-1). De même le développement des modèles résolvant aujourd'hui des échelles kilométriques à l'échelle globale est largement motivé par l'évolution des capacités des calculateurs et des altimètres (notamment avec la mission SWOT). Il faut donc reconnaître la dimension du contexte technologique autant que scientifique dans l'évolution de la modélisation océanique.

Force est également de constater qu'au delà de la science du développement des modèles en tant que tels, un champ disciplinaire spécifique lié à leur mise en oeuvre et à leur configuration s'est structuré au cours des deux dernières décennies. En effet, le développement de configurations de modèles de circulation océanique implique de choisir un nombre important de paramètres et d'options. Le nombre de paramètres, le coût calcul des simulations et le temps humain disponible rendent très délicate l'exploration systématique de l'espace des options disponibles de sorte que les choix sont souvent peu contraints par l'expérience. C'est dans ce contexte que se sont développés des efforts d'intercomparaison systématiques des modèles et de leurs configurations, comme par

exemple les intercomparaisons CORE et OMIP portées successivement le Working Group on Ocean Model Development (WGOMD) devenu aujourd’hui le CLIVAR Ocean Model development Panel (OMDP).

Ce besoin de coordination et d’échanges scientifiques sur la science de la mise en oeuvre des modèles est également le principal moteur pour des initiatives structurées comme le consortium DRAKKAR, qui rassemble une part importante des utilisateurs du modèle NEMO, ou plus récemment le consortium COSIMA en Australie autour du modèle MOM. C’est dans le cadre du consortium DRAKKAR, de ces outils et de ces protocoles, que sont développées une part importante des activités que je décrirai dans ce mémoire.

Représentation des interactions d'échelles dans les modèles de circulation océanique

Parce que la circulation océanique est essentiellement turbulente, la représentation des interactions d'échelles est un enjeu crucial pour les modèles de circulation océanique; cette question concentre ainsi une part importante des efforts de la communauté des modélisateurs. En pratique, cette question peut se poser de deux manières, selon que l'on souhaite représenter des interactions entre des échelles a priori explicitement résolues par le modèle ou non. La bonne représentation des interactions entre échelles explicitement résolues passe généralement par un travail sur les méthodes de discréétisation dans le but de garantir une bonne *précision* numérique, notamment pour l'approximation discrete des termes *non-lineaires* des équations primitives. La représentation des interactions impliquant des échelles non-explicitement résolues par le modèle pose quant à elle un problème classique, dit de fermeture sous-maille; ce problème est abordé en formulant des *paramétrisations physiques* qui visent à modéliser de manière simplifiée le résultat net des interactions sur les échelles résolues et non le détail phénoménologique des processus en jeu.

Bien que le terme de *paramétrisation physique* soit un terme de jargon assez spécifique au champ de la modélisation des fluides environnementaux, le problème de la fermeture sous-maille est un problème générique en modélisation numérique des systèmes non-linéaires, notamment en mécanique des fluides. Comme le rappellent Griffies et Treguier (2013) [5], les écoulements océaniques sont turbulents jusqu’aux échelles de 10^{-3} m et 1s de sorte que simuler explicitement toutes les échelles de la circulation océanique demanderait environ 10^{27} points de grilles, ce qui dépasse de très loin la capacité des calculateurs. Les modèles de circulation océanique ont donc pour objet de décrire une version tronquée de la dynamique océanique, valide en *moyenne* pour les échelles que l’on souhaite décrire explicitement. On peut s’en convaincre en repartant des équations primitives qui, de manière schématique, peuvent s’écrire

$$\partial_t \mathbf{u} + \mathcal{L}_u \mathbf{u} + \mathcal{N}_u (\mathbf{u}) = 0 \quad \partial_t b + \mathcal{L}_b \mathbf{b} + \mathcal{N}_b (\mathbf{b}) = 0 \quad (1)$$

où \mathbf{u} , \mathbf{b} désignent respectivement le champ de vitesse horizontale et le champ de flottabilité, \mathcal{L}_u , \mathcal{L}_b désignent des opérateurs linéaires et \mathcal{N}_u , \mathcal{N}_b des opérateurs non-linéaires. Notons qu'on a négligé ici la non-linéarité de l'équation d'état de l'eau de mer et supposé égales les diffusivités moléculaires de la température et de la salinité. De manière générique, les équations qui décrivent l'évolution des propriétés moyennes de la circulation $\bar{\mathbf{u}}$, $\bar{\mathbf{b}}$, au sens d'une *moyenne spatio-temporelle* (possiblement partiellement lagrangienne) ou d'une *moyenne d'ensemble* sur les réalisations possibles de la circulation (étant données les informations dont on dispose à une certaine échelle), sont alors

$$\partial_t \bar{\mathbf{u}} + \mathcal{L}_u \bar{\mathbf{u}} + \mathcal{N}_u(\bar{\mathbf{u}}) = \underbrace{\mathcal{N}_u(\bar{\mathbf{u}}) - \overline{\mathcal{N}_u(\mathbf{u})}}_{\simeq \mathcal{M}_u(\bar{\mathbf{u}}, \bar{\mathbf{b}})} \quad \partial_t \bar{\mathbf{b}} + \mathcal{L}_b \bar{\mathbf{b}} + \mathcal{N}_b(\bar{\mathbf{b}}) = \underbrace{\mathcal{N}_b(\bar{\mathbf{b}}) - \overline{\mathcal{N}_b(\mathbf{b})}}_{\simeq \mathcal{M}_b(\bar{\mathbf{u}}, \bar{\mathbf{b}})}. \quad (2)$$

On voit que ces équations ne sont pas *fermées*, à savoir qu'il n'est pas possible de les trouver des solutions sans disposer d'information supplémentaire sur les champs \mathbf{u}, \mathbf{b} afin d'évaluer les termes des membres de droite. Ce problème de fermeture est en fait fondamentalement lié au caractère non-linéaire des équations de la dynamique océanique, une propriété qui est également la cause de la nature essentiellement turbulente des écoulements océaniques. Ces nonlinéarités permettent en effet des échanges d'énergie et d'information entre des échelles très différentes et sont donc un moteur essentiel des interactions d'échelle. Développer une fermeture sous-maille (ou une paramétrisation physique) consiste à obtenir de bonnes approximations $\mathcal{M}_u, \mathcal{M}_b$ des termes de droite des équations (2), qui soient calculables à partir des variables moyennes $\bar{\mathbf{u}}, \bar{\mathbf{b}}$ de sorte qu'on obtienne un système d'équation qui puisse être intégré numériquement.

Il existe deux grands cadres conceptuels pour concevoir des fermetures sous-mailles en mécanique des fluides et les modèles océaniques piochent alternativement dans l'un ou l'autre de ces cadres selon les cas ou les processus d'intérêt. L'approche RANS (pour *Reynolds Averaged Navier Stokes*) est basé sur l'idée que le détail de la réalisation d'un processus turbulent n'est ni accessible à la modélisation, ni important pour prédire l'évolution de l'état moyen du système [19]. L'état moyen s'entend alors comme moyenne d'ensemble sur tous les états possibles du système. On admet généralement par hypothèse que l'état moyen varie à des échelles macroscopiques; en pratique l'hypothèse *ergodique* permet également de remplacer la moyenne d'ensemble par une moyenne temporelle sur des temps longs. L'approche LES (pour *Large Eddy Simulation*) suppose quant à elle que les propriétés d'invariance d'échelles de la turbulence fluide peuvent permettre de décrire l'effet des fluctuations à très fine échelle (non-résolues) sur des échelles plus grandes (résolues) pour peu que ces échelles plus grandes soit déjà turbulentes [20]. L'opération de moyenne sous-jacente distinguant les fines échelles (*micro-états*) des plus grande échelles (*macro-états*) est ici une moyenne spatiale, typiquement basée sur un filtre convolutif. Les cadres RANS et LES permettent de développer des modèles phénoménologiques de la turbulence et du lien entre micro-états et macro-états. Ce lien est généralement supposé déterministe mais c'est une restriction assez forte que rien n'impose a priori, certains communautés défendent d'ailleurs l'utilisation d'approches stochastiques pour décrire ce type de lien.

Bien que le développement de fermeture sous-maille pour les modèles de circulation océanique s'appuie sur des cadres conceptuels pré-existants, il doit être noté qu'il existe relativement peu de cas dans lesquels des fermetures issues d'autres champs de la dynamique des fluides sont directement appliquées aux modèles de circulation océanique. Le problème de la formulation de paramétrisations physiques est en effet généralement abordé processus par processus; on s'intéresse ainsi par exemple de manière indépendante au mélange dû aux vagues de surface et au transport dû aux tourbillons de mesoéchelle. Il s'agit alors, sur la base de considérations physiques, de formuler des expressions algébriques correspondant à la contribution de la classe de processus considéré à $\mathcal{M}_u, \mathcal{M}_b$. De plus les grilles discrètes des modèles de circulation océanique étant généralement très anisotropes, avec des résolutions de l'ordre de 1 – 100m sur la verticale et 1 – 100km sur l'horizontale, la formulation des paramétrisations distinguera généralement les directions verticales et horizontales. Même en gardant en tête ces différences d'ordre pratique, on peut légitimement s'interroger sur les raisons pour lesquelles il existe si peu de transferts directs des fermetures RANS et LES existantes vers les modèles de circulation océaniques [21].

Une première spécificité des modèles de circulation océanique tient au caractère très anisotropes de processus turbulents dans l'océan. En effet, la stratification de l'océan et la rotation de la Terre ont

pour effet de rendre relativement plus facile les mouvements latéraux que les mouvements verticaux [??]; plus précisément, les mouvements le long des surfaces d'égal densité potentielle (les *isopycnes*) demandent moins d'énergie car il ne requièrent pas de travailler contre les forces de flottabilité. Comme la géométrie en couche mince de l'océan incite par ailleurs à utiliser des grilles discrètes très anisotropes entre les directions horizontales et verticales, les diffusivités turbulentes sont donc en pratique très différentes dans ces deux directions, avec des valeurs de l'ordre de $10^{-5} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$ dans la direction verticale, et de l'ordre de $10^3 \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$ sur l'horizontale. Cette différence pose non seulement des problèmes d'erreurs de discréétisation numérique [22], mais rend également non triviale la définition de l'opération de moyenne qui permet de formuler les fermetures sous-maille. En effet, cet opérateur de moyenne doit être partiellement lagrangien afin de ne pas mélanger la signature des processus qui agissent en moyenne au travers ou le long des *isopycnes*. Ce n'est finalement qu'au terme de décennies de débats scientifiques qu'un cadre général fait aujourd'hui l'objet d'un certain consensus [23].

Une deuxième spécificité de la formulation des fermetures sous-maille pour les modèles de circulation océanique est liée à l'imbrication entre erreurs de discréétisation numérique et termes de fermetures. Les modèles océaniques utilisent en effet traditionnellement des schémas de discréétisation numérique d'ordre relativement bas (typiquement d'ordre 2). Ceci est en partie un héritage historique et un choix permettant de garantir plus naturellement la conservation de propriétés intégrales, ce qui est important dans un contexte de modélisation climatique. Ce choix permet également de ne pas avoir à dégrader la précision du modèles dans les couches limites latérales et auprès de la bathymétrie. Mais une conséquence directe est alors que les erreurs de discréétisation numérique sont du même ordre de grandeur que les termes sous-mailles [24]. De même, on prend aujourd'hui graduellement conscience que l'effet macroscopique des fermetures dépend de la manière dont elles sont discrétisées [25]. Ces difficultés liées à l'imbrication entre discréétisation et paramétrisations sont assez rarement soulevées mais elles rendent en pratique plus difficile l'adoption de fermetures issues d'autres champs de la modélisation des écoulements fluides.

Une troisième spécificité tient au fait que les non-linearités convectives liés au terme de transport des équations primitives ne sont pas les seules susceptibles de justifier le développement de fermetures sous-maille. En effet, l'importance de la non-linéarité de l'équation d'état de l'eau de mer est connue depuis très longtemps [26,27], mais ce n'est que relativement récemment que des travaux ont montré à quel point il est nécessaire de développer des fermetures représentant l'effet à grande échelle des fluctuations sous-maille via cette non-linéarité [28]. De même, les échanges à l'interface air-mer et la réponse océanique à ces échanges sont notamment non-linéaires et nécessitent à ce titre le développement de fermetures spécifiques. En effet les formules bulk qui prescrivent les flux air-mer dépendent non-linéairement des propriétés de surface de l'océan [29] et comme de plus la réponse de l'océan aux flux air-mer est également nonlinéaire, la présence de variabilité à fine échelle peut en effet induire des réponses à grande échelle [30,31,32]. Force est de constater cependant que les non-linearités convectives liées au processus de transport ont reçu beaucoup plus d'attention de la part de la communauté des océanographes modélisateurs.

Mais la spécificité la plus importante des problèmes de fermeture pour les modèles de circulation océanique est sans doute liée à la variété de processus dynamique à l'oeuvre et à leur dépendance vis-à-vis des échelles spatiales. On doit en effet noter que les cadres RANS et LES sont implicitement formulés pour des situations dans lesquelles la nature de la turbulence est supposée essentiellement invariante d'échelle [33,34]. La turbulence océanique est cependant très particulière sur ce plan. Les contraintes liées à la géométrie de l'océan ainsi que la présence de rotation, ont pour effet de rendre possibles certains types de processus uniquement sur certaines gammes d'échelles : la turbulence balancée de mésoéchelle domine les échelles entre 50km et 500km, la turbulence tridimensionnelle domine aux échelles <10m, tandis que les échelles entre 50km et 10m sont le siège de processus de processus de submesoéchelle et de processus ondulatoires. Ces classes de processus ont de plus des propriétés très différentes en termes de flux inter-échelles de variance scalaire et d'énergie, sans

compter qu'elles peuvent échanger très activement de l'énergie entre elles. Ainsi, s'il ne fait aucun doute dans un cadre de LES tridimensionnelle homogène que l'énergie doit être échangée des grandes vers les fines échelles, cette propriété n'est pas vérifiée à toutes les échelles dans l'océan. Les fermetures LES et RANS traditionnelles étant formulées pour reproduire le comportement fonctionnel typique de la turbulence tri-dimensionnelle homogène, elles ne sont donc pas *a priori* adaptées aux situations océaniques (bien qu'elles puissent toutefois servir de base pour des adaptations au contexte océanique [21]).

Pour conclure sur un plan plus fondamental, il nous faut également reconnaître que la question de l'importance des processus de fine échelle dans la circulation océanique est encore largement ouverte. L'océan vu dans son ensemble est en effet un système thermodynamique ouvert, forcé et dissipatif. Dans un tel système, il est généralement difficile d'établir dans quelle mesure le détail des processus de fine échelle est important pour l'évolution macroscopique du système. Les processus turbulents sont-ils asservis aux forcages à grande échelle et aux apport d'énergie qu'ils induisent ou fixent-ils au contraire les flux à grande échelle en contrôlant le taux des échanges inter-échelles ? Ces questions dépassent sans doute le cadre de notre discussion, et nous tiendrons pour acquis le fait que le détail phénoménologique de l'évolution de l'océan aux échelles intermédiaires est directement affecté, et pour partie contrôlé, par les processus de fine échelle.

Limites et infléxions récentes des approches de modélisation en océanographie

Le cadre général de la modélisation océanique tel que nous l'avons décrit jusqu'ici traduit une démarche et une vision scientifique selon lesquelles les modèles de circulation sont construits sur la base d'une compréhension physique fine traduite en équations déterministes. Cette approche construite au fil du temps a montré sa pertinence, toutefois le cadre de travaux comme ceux du consortium DRAKKAR fait ressortir certaines limites intrinsèques et quelques infléxions importantes dans la manière dont sont développés et mis en œuvre les modèles de circulation océanique. Ces inflexions récentes concernent les limites des simulations forcées par l'atmosphère, le bénéfice des simulations d'ensembles, la représentation des erreurs des modèles ainsi que l'utilisation d'approches basées données pour le développement des modèles. Sans remettre en cause le cadre décrit plus haut, ces inflexions ouvrent de nouvelles pistes de recherche qui font actuellement l'objet de beaucoup de travaux.

Une première inflexion récente des approches de modélisation océanique concerne donc la prise de conscience des limitations des approches de modélisation forcées (par l'atmosphère) pour l'étude des processus et de la variabilité océanique. On sait depuis longtemps que l'absence de rétroactions entre évaporation et précipitation est une limitation importante des protocoles de simulations forcées qui induit des dérives non-physiques de la structure thermohaline simulée par les modèles. Cette limitation est à l'origine de la forte sensibilité de la circulation méridienne au rappel en salinité de surface [35,36]. Ce n'est toutefois que plus récemment que l'on a pris conscience de l'importance des mécanismes d'interactions à fine échelle entre les propriétés océaniques de surface et celles de la couche limite atmosphérique [37]. Représenter ou non ses interactions peut affecter notablement l'activité de mesoscale simulée [38] mais également les grands systèmes de courants de bord ouest [39]. Plus généralement, on observe un intérêt croissant sur les questions liées à la représentation des processus d'échange et de couplage à l'interface air-mer, ce qui inclut notamment les vagues de surface et leur impact sur la couche limite atmosphérique et la turbulence océanique.

Une deuxième inflexion concerne la prise de conscience de l'intérêt des simulations d'ensemble en modélisation océanique. La simulation d'ensemble consiste à produire et analyser non pas une simulation déterministe unique mais un ensemble de simulations balayant une certaine gamme de formulations possibles d'un même modèle. Cette approche permet ainsi de définir objectivement le degré de confiance qu'on peut accorder à une prédiction d'un modèle étant donnée l'incertitude sur

ces paramètres ou sur l'état initial du système. Cette approche est particulièrement pertinente pour les systèmes physiques chaotiques dont la dynamique est fortement non-linéaire; elle est ainsi couramment utilisée en prévision météorologique depuis très longtemps [40,41]. Cette approche est aujourd'hui également mise en oeuvre pour comprendre et prévoir la variabilité océanique, ceci notamment avec la découverte du rôle essentiel joué par la turbulence océanique dans la variabilité océanique basse fréquence (interannuelle à décennales) [42]. On sait en effet désormais que cette source de variabilité *intrinsèque* à l'océan peut dominer sur une large gamme d'échelles les fluctuations de l'état de l'océan, comme en particulier celles de la dénivellation de surface [43], de la circulation méridienne [44,45] ou du contenu thermique des couches superficielles [46,47]. Dans ce contexte, la simulation d'ensemble est utilisée pour prendre en compte l'incertitude liée à la phase des processus turbulents de méso-échelle [48]. Plus généralement, cette pratique accompagne l'émergence d'une vision probabiliste de l'utilisation et du développement des modèles de circulation océanique [49].

L'émergence d'une vision probabiliste de la modélisation océanique est également le résultat d'une troisième inflexion en cours, à savoir le recours plus systématique à des approches de modélisation *stochastique*. Le terme de modélisation stochastique désigne un champ de la modélisation numérique dans lequel les incertitudes sont modélisées explicitement au moyen de variables aléatoires. Cette rupture du caractère déterministe de la formulation des modèles de circulation océanique est tout d'abord intervenue dans le domaine des fermetures sous-maille (dites *paramétrisations stochastiques*, voir [50]). Les paramétrisations stochastiques permettent de prendre en compte le caractère incertain des fermetures sous-maille ou de représenter la nature non-déterministe du lien micro-état/macro-état [51,52]. Les modèles de circulation océanique ont ainsi recours à des approches stochastiques pour représenter les flux d'énergie cinétique depuis les échelles sous-maille [53,54] ou l'effet des nonlinearités de l'équation d'état de l'eau de mer [28]. Un fil de réflexion plus générique motive également l'utilisation d'approches stochastiques dans les modèles océaniques en défendant que des perturbations stochastiques permettent d'améliorer la représentation de l'état moyen d'un système très fortement nonlinéaire en favorisant les transitions entre ses états stables [55]. Ces réflexions justifient également des questionnements quant à l'importance d'utiliser des schémas de discréétisation numérique très précis dans les modèles océaniques [56]. Sans rentrer dans de telles considérations épistémiques, on peut constater que la réflexion sur la formulation stochastique des modèles de circulation permet en tout cas d'aborder de manière mieux posée l'intégration des modèles physiques dans les systèmes de prévision avec assimilation de données [57] parce qu'elle permet de formuler plus explicitement l'incertitude des modèles. Partie des besoins des systèmes de prévision, cette tendance vers une vision probabiliste de la modélisation océanique, qui s'appuie sur des simulations d'ensemble et des formulations stochastiques, s'étend aujourd'hui graduellement à l'étude des échelles de temps longues [50,58].

Une dernière inflexion récente, sur laquelle porte actuellement beaucoup d'efforts, concerne l'utilisation systématique de base de données et de *méthodes d'apprentissage automatique* dans le développement des modèles géoscientifiques ou de leur applications. Historiquement en effet, ce sont les sciences physiques et les mathématiques qui dominent le développement des modèles géoscientifiques. De la sorte, les approches basées-données, exploitant des algorithmes d'apprentissage automatique, sont durant longtemps restées confinées en géosciences aux domaines de la télédétection (comme par exemple les problèmes inverses liés aux traitements de bas niveaux [59] ou les problèmes d'interpolation [60]) ou de l'analyse de série temporelle [61]. Toutefois, on voit émerger depuis plusieurs années des démonstrations de plus en plus convaincantes de l'apport possible de l'apprentissage automatique dans le développement de composantes de modèles géoscientifiques. Ces approches pourraient par exemple nourrir le développement de solveurs numériques permettant de réduire le coût des modèles océaniques [62] ou aider à formuler des fermetures sous mailles [63,64]. Ces démonstrations récentes sont en partie le résultat d'avancées dans le domaine des réseaux de neurones artificiels (Artificial Neural Networks, ANN), tant du point de vue de la performance des algorithmes que de la facilité de leur mise en oeuvre pratique dans le

cadre de librairies standards (telles que PyTorch ou TensorFlow); ces avancées permettent désormais l'application des ANNs aux problèmes de très grande dimension issus de la mécanique des fluides [65]. Elles traduisent sans doute également une plus grande maturité scientifique de cette interface entre physique et apprentissage, avec de nombreux travaux visant à faire le pont entre ces disciplines. L'apprentissage automatique peut ainsi désormais être envisagé comme un outil de plus dans la boîte à outil du physicien (voir par exemple le domaine de la *recherche d'équations* [66] et ses applications en modélisation océanique [64]). Des avancées conceptuelles importantes permettent également aujourd'hui de rapprocher l'apprentissage automatique des méthodes numériques de résolution d'équations différentielles [67,68]. Toutes ces briques élémentaires en cours d'assemblage ouvrent en tout cas la possibilité réaliste d'envisager que la formulation des modèles de circulation océanique soient à l'avenir nourrie plus systématiquement de l'analyse de bases de données d'observations ou de modélisation haute résolution. Un premier enjeu sera sans doute de faire en sorte de baser ces développements sur les apports conjoints de l'apprentissage et de la physique, par exemple en réduisant l'espace des solutions accessibles aux algorithmes d'apprentissage sur la base de contraintes physiques *a priori*. Un deuxième enjeu pour nos disciplines sera sans doute d'aborder l'usage des algorithmes d'apprentissage dans le cadre *conjoint* de la modélisation et de l'assimilation de données, pour formuler les problèmes de prévision (voir par exemple à ce propos les travaux de [69]).

Un esprit un peu taquin pourrait sans doute noter qu'aucune des inflexions présentées ci-dessus n'est vraiment nouvelle en soi. Si cet esprit taquin disposait d'un peu de temps, il pourrait même étayer son avis sur la base de travaux scientifiques publiés au cours des dernières décennies (voir notamment les essais de synthèses [70,71] ou certains exemples d'applications [72,73]). Contredire un tel esprit taquin sur une base purement factuelle serait sans doute malaisé. Ma perception *subjective* est en tout cas que, dans leur ensemble, les inflexions présentées ci-dessus traduisent un mouvement en cours en ce qui concerne les paradigmes qui sous-tendent les approches numériques en géosciences (et par là, en océanographie). Historiquement, les approches numériques en géosciences procèdent de la physique qui permet de formuler des modèles continus, supposés parfaits, qui sont ensuite mis en œuvre au niveau discret grâce aux mathématiques appliquées. On obtient ainsi des modèles déterministes qui sont aujourd'hui considérés comme des sources de connaissances scientifiques acceptables (notons que cela n'a pas toujours été le cas au cours des décennies passées). La triste réalité nous obligeant parfois à essayer de répondre à des problèmes concrets, nos modèles de circulation, déterministes et parfait, sont parfois mis en œuvre pour produire des prévisions. On est alors bien obligé d'utiliser des observations réelles mais leur combinaison avec les modèles fait l'objet d'une *cuisine* généralement considérée comme de peu d'intérêt par les modélisateurs. Bon, bien évidemment ceci est une caricature, mais je vois dans les inflexions actuelles vers une prise en compte plus systématique des incertitudes (notamment de manière statistique) et vers l'utilisation de données dans la formulation des modèles, une opportunité pour renouveler graduellement le champ disciplinaire de la modélisation océanique. Cette évolution graduelle est aujourd'hui rendue possible pour partie par la quantité de données disponibles et par l'évolution des capacités de traitement systématique de ces données ainsi que des cadres logiciels qui le permettent. Elle est de mon point de vue également rendue possible par l'évolution (en partie générationnelle) de la communauté scientifique et de la maturité des idées qu'elle développe.

Le cadre général de mes activités de recherche

Après cette introduction générale sur la modélisation océanique, ses usages et ses limites, je présente brièvement dans ce qui suit le périmètre de mes activités, mon approche de travail et le contenu de ce mémoire.

Périmètre et domaine d'activité

Mon domaine d'activité scientifique a notablement évolué au fil du temps, s'étoffant au gré des collaborations, des opportunités et, plus généralement, de l'évolution de mes intérêts et de mes compétences scientifiques. Les catégories présentées ci-dessous ne sont qu'une proposition de relecture *a posteriori* de mon parcours de recherche. Elles ont toutefois l'avantage de répartir les travaux auxquels j'ai pu contribuer en trois sous-groupes à peu près équilibrés. Notons cependant que la nature de mes contributions peut notablement varier entre ces différents axes de travail. Notons également que si le premier axe est un fil conducteur de mon travail de recherche, j'ai graduellement fait évoluer mes activités du deuxième au troisième axe au fil du temps.

Science des modèles de circulation océanique en régime turbulent

Une première partie de mon travail porte sur la science des modèles de circulation océanique en régime turbulent. Mes travaux dans ce cadre ont porté sur quelques développements pour les modèles de circulation, mais ont surtout contribué au domaine scientifique lié à l'utilisation de ces modèles, et à l'analyse de leur fonctionnement. L'essentiel de ces travaux s'est concentré sur des régimes dynamiques turbulents dans lesquels les modèles résolvent pour partie la turbulence océanique équilibrée. Ils ont été menés pour une large part dans le cadre du consortium DRAKKAR et du CLIVAR-OMDP, ces deux efforts permettant notamment l'intercomparaison systématique des modèles. Cette dimension de la science de modèles de circulation est également une donnée transverse à la plupart des thèses à l'encadrement desquelles j'ai pu contribuer. Un dénominateur commun de ces travaux porte sur la description et la compréhension de la capacité des modèles de circulation océanique à représenter la variabilité tourbillonnaire (la *macro-turbulence* océanique). En chemin, ces travaux ont pu contribuer à l'étude de l'impact de la discréétisation numérique sur les solutions, au développement de fermetures sous-maille, à l'amélioration de la représentation du transport de traceurs ou à des développements spécifiques pour représenter les processus océaniques à hautes latitudes.

Processus physiques et variabilité saisonnière à décennale de l'océan austral

Une deuxième partie de mon travail porte sur l'étude des processus océaniques à l'œuvre dans l'océan austral et de la réponse de ce bassin océanique aux changements environnementaux planétaires. Ses activités, sur lesquelles porteront les deux prochains chapitres, s'inscrivent dans le cadre prévu par le projet de recherche pour lequel j'ai été recruté au CNRS en 2006. Mes travaux dans ce cadre ont porté dans une première phase sur la circulation au sein du courant circumpolaire antarctique, aux latitudes moyennes de l'océan austral. J'ai contribué à l'étude du rôle des tourbillons de mésos-échelle dans la réponse physique et biogéochimique au changement des vents zonaux induit par la tendance du mode annulaire austral. Dans une deuxième phase de travail, j'ai eu l'occasion de m'intéresser aux zones subpolaires de l'océan austral en collaboration avec mes collègues de l'IGE. Dans ce cadre, j'ai contribué à l'étude des interactions entre océan austral et calotte antarctique, avec un regard particulier sur les processus affectant la glace de mer et sa variabilité saisonnière à décennales.

Synergie entre modèle et observations en préparation à l'observation spatiale des océans

Une troisième partie de mon travail porte sur le développement de synergies entre modèles et observation en préparation de l'observation, notamment spatiale, des océans. Il s'agit là d'un volet plus émergeant de mon activité, qui s'est essentiellement développé depuis 2013 avec ma participation à l'équipe scientifique de la mission SWOT (*SWOT Science Definition Team* puis *SWOT Science Team*). Le terme *synergies* est ici un mot valise pour désigner l'usage des modèles de circulation dans le contexte de la préparation de l'observation des océans depuis l'espace et de l'exploitation des données spatiales. Les travaux auxquels j'ai eu l'occasion de contribuer dans ce cadre ont porté sur la simulation de système d'observation, l'étude de la variabilité océanique en vue

de son estimation à partir d'observations ainsi que le développement de méthodes de traitement des données d'observations. Mes premières contributions ont essentiellement pris la forme de collaborations pour lesquelles j'apportais simplement des données de modèles océaniques à haute résolution. Des collaborations plus structurées (notamment en interne à mon équipe de recherche) m'ont permis de m'investir de manière plus experte et plus autonome sur ces thématiques au fil du temps.

Approche de travail

J'aimerais également prendre le temps ici de décrire les principes qui guident plus moins consciemment mes choix en matière de recherche scientifique. J'espère de cette manière donner au lecteur quelques fils de lecture qui aider peut-être à comprendre certains des choix que j'ai pu faire au cours de cette première partie de ma carrière. Les principes que je détaille ci-dessous ne sont en aucun cas des propositions de principes que je souhaiterais voir appliqués par d'autres mais juste une observation *a posteriori* de ma manière de fonctionner et de mes parti-pris personnels.

1. Le choix de mes sujets de recherche est souvent le fruit d'évolutions récentes du *contexte technique ou scientifique*. En effet si la structuration internationale de la communauté des sciences du climat (notamment dans le cadre de CLIVAR) permet de partager une vision commune des grandes questions qui méritent d'être examinées, le choix de la question spécifique et de l'angle d'approche relève naturellement des équipes. J'observe que mes travaux portent souvent sur des problèmes spécifiques que l'évolution du contexte technologique rendent abordables. Cette évolution peut par exemple être liée au développement des capacités des calculateurs, à l'évolution des algorithmes (et de leur implémentation logicielle) ou à l'arrivée de nouvelles observations. La définition de mes questions de recherche est donc souvent autant la traduction de ce qu'on est capable d'étudier dans un contexte technique donné que de ce qu'il est intéressant d'étudier en soi.
2. J'essaye généralement de travailler en *cohérence avec mon environnement* institutionnel, scientifique et programmatique. Ceci recouvre deux aspects complémentaires. D'une part, je pense que notre communauté scientifique est trop petite au vu des enjeux et de la complexité des questions qu'elle doit traiter; dans ce contexte, j'estime que la collaboration est une stratégie plus efficace que la compétition. J'essaye donc de choisir mes questions de recherche de manière à ce qu'elles soient complémentaires et articulées avec celles de mes collègues. D'autre part, j'accorde de l'importance à la dimension des moyens humains et financiers dans le travail de recherche. Ayant pris conscience assez tôt que la recherche procède pour une large part d'une réalité politique et technologique et non de considérations purement abstraites et idéales, je prend le parti de privilégier les sujets qui permettent à mon équipe de disposer de moyens confortables pour travailler.
3. J'observe que je travaille essentiellement dans le cadre de *collaborations* avec des collègues. C'est évidemment le cas pour les travaux auxquels je suis associé et que je ne dirige pas directement mais c'est également l'approche de travail que je privilégie dans la direction de recherche et l'encadrement. En pratique, sur un sujet donné je participe à une équipe de pilotage qui rassemble des expertises complémentaires. Cette approche est bien évidemment un moyen d'élargir le champ des questions à l'étude desquelles je contribue. C'est aussi de mon point de vue la seule manière d'aborder les questions vraiment nouvelles en géosciences, domaines interdisciplinaires par nature. Si l'on applique le principe de James F. Watson², le travail en collaboration donne de nombreuses occasions d'apprendre, ce que je trouve être l'un des intérêts de mon métier. Enfin, et c'est une dimension essentielles à mes yeux, je trouve le travail en collaboration tout simplement plus agréable.

4. Une autre particularité de mon approche de travail tient à l'attention particulière que j'accorde à la *dimension technique* de la recherche. Dans mon champ scientifique, cette dimension technique recouvre essentiellement la question du développement des ressources logicielles nécessaire au travail de recherche. Je pense que les outils logiciels sont une dimension essentielle de la recherche, en ce qu'ils peuvent permettre d'aborder des questions nouvelles avec plus ou moins de facilité. Je pense donc que les contributions au développement de ces outils doivent être encouragées et reconnues dans la carrière des chercheurs. Je fais en sorte que mes travaux s'appuient sur des logiciels libres, construits en collaboration et sur des temps longs. J'essaye par ailleurs de contribuer à ces développements en les encourageant chez mes étudiants et en participant au processus de coordination et d'intégration de certains d'entre eux. C'est le cas notamment pour le code numérique NEMO.
5. Le dernier aspect de mon approche de travail que j'aimerais souligner est lié à la *dimension humaine* du travail de recherche. Au risque de verser dans la tarte à la crème bienveillante et naïve, je pense sincèrement avoir en tant que chercheur une chance inouïe, à savoir celle de choisir avec qui je travaille. J'ai également eu la chance d'être accompagné au fil du temps par un collectif très fort au sein de mon équipe de recherche. Avec cette chance vient évidemment des devoirs, le principal d'entre eux étant de prendre soin du groupe et de chacun de ces membres. J'essaye donc de contribuer à faire vivre une équipe cohérente et agréable au jour le jour et veille à accompagner le mieux possible les jeunes chercheurs avec qui j'ai l'occasion d'interagir. Evidemment, j'ai conscience qu'il peut exister une certaine distance entre les intentions, les actes, et la manière dont ils peuvent être perçus et interprétés...

Sur le contenu de ce mémoire

Il n'aura pas échappé au lecteur que ce manuscrit d'*habilitation à diriger des recherches* intervient relativement tard dans ma carrière. J'en ai entamé la rédaction dès 2012, mais ce n'est finalement qu'en 2020 que je finalise ce travail. Entre temps et à mesure que s'élargissait le périmètre de mes activités scientifiques, j'en ai repris le plan à de nombreuses reprises, prenant à chaque iteration un peu plus conscience du caractère lacunaire de ma couverture de mon champ de recherche. J'ai finalement accepté l'idée qu'il me serait sans doute impossible de retracer le fil de mes expériences d'encadrement de manière exhaustive, cohérente et digeste pour le lecteur.

Ce mémoire, concrétisé ici dans une forme que j'espère lisible, est la traduction d'un parti-pris de rédaction volontairement plus personnel. Il ne vise en aucun cas à décrire de manière exhaustive et objective mes expériences d'encadrement. Il ne vise pas non-plus à présenter une synthèse cohérente d'un ensemble de travaux sur un champ de recherche bien circonscrit. Je souhaite plutôt ici prendre acte de ma manière de travailler en tant que chercheur, dans son caractère intrinsèquement non-linéaire et forcément imparfait. Si ce parti-pris me permet de concrétiser enfin un mémoire d'*habilitation*, il traduit également une prise de conscience plus personnelle de l'importance de la subjectivité et de la dimension humaine dans le travail de recherche scientifique.

Le parti-pris de ce manuscrit est donc le suivant : je propose d'illustrer ici, en trois séquences successives, des situations concrètes de direction de recherche choisies au fil de mon parcours. Ces séquences ne couvrent pas l'ensemble des thèmes sur lesquels j'ai en l'occasion de travailler. Ils sont plutôt des exemples de moments que j'ai particulièrement appréciés et qui ont bien fonctionnés, en ce qu'ils ont ménés à des publications et permis la formation de jeunes chercheurs. Il s'agit en quelque sorte de trois situations de bon *alignement de planètes* où le contexte scientifique, le positionnement choisi, le contexte humain et les financements se sont révélés particulièrement propices à des interactions fructueuses.

Si j'espère que ce choix permettra d'illustrer mon aptitude à la direction de recherche scientifique, il a aussi ses limites. Il masquera de fait les situations qui ont été moins propices et productives au fil de

ma carrière. Il cachera également mes contributions en tant que collaborateur et non *directeur* de recherches. J'attire enfin l'attention du lecteur sur le fait que le contexte scientifique et bibliographique sera ici présenté tel qu'il apparaissait au moment où les séquences se sont déroulées. La bibliographie présentée ne sera donc pas à jour des développements plus récents sur chacun des thèmes.

En gardant bien ces limites en tête, le lecteur trouvera donc dans ce qui suit trois illustrations correspondant à trois séquences de travail de ma carrière au cours des 10 dernières années. Pour chacun d'entre eux, j'expliquerai le *contexte scientifique* dans lequel s'inscrit la séquence en question, je présenterai *le positionnement et l'approche de travail* que j'ai retenu, je présenterai certains *résultats obtenus* puis conclurai sur *les activités et les opportunités* qui se sont présentées à la suite de cette séquence. Après ces trois séquences, une dernière section présentera une synthèse plus large de mes contributions ainsi qu'une proposition de priorités scientifiques pour les années à venir.

Illustration n°1 : Etude de la réponse de l'océan austral aux changements des vents

Ce chapitre présente est une première illustration de mes activités de direction de recherche. Il est essentiellement basé sur des travaux menés entre 2009 et 2014, notamment dans le cadre du projet ANR Southern-Cross et de la thèse de Carolina Dufour [75].

Contexte scientifique

Le rôle central de l'océan austral dans le système climatique

Le terme *océan austral* désigne le bassin océanique qui s'étend autour du continent antarctique et, par convention, jusqu'à 30°S [76]. L'absence d'obstacle lié à la géométrie circumpolaire de ce bassin océanique y rend possible l'existence d'un fort courant zonal, appelé *courant circumpolaire antarctique* (voir la Figure [3]). Ce courant est entretenu par les forts vents zonaux qui induisent un puissant processus d'*upwelling* raidissant les pentes des isopycnes des couches profondes vers la surface [77]. En l'absence d'obstacle, un courant intense, très coherent sur la verticale, se met en place. La structure verticale de l'ACC est ainsi très particulière avec peu de déviation de l'orientation des courants entre la surface et le fond (on dit ce courant quasi-équivalent *barotrope* [78]) de sorte que les échanges mériadiens au travers de l'ACC sont relativement faibles.

L'océan austral, et notamment l'ACC, est un lieu privilégié dans le cycle de vie des masses d'eaux de l'océan global en tant que lieu d'échanges entre l'océan intérieur, l'océan de surface et les milieux environnants (atmosphère cryosphère). En effet, la résurgence des isopycnes au coeur de l'ACC ramène les eaux profondes de l'Atlantique Nord (NADW) auprès de la surface [79]. Une fraction de ces eaux y est alors transformée en eaux intermédiaires (AAIW) [79] et modales (SAMW)[80] (*upper branch*) tandis qu'une autre fraction migre à la surface vers le sud (ASW) pour participer *in-fine* à la formation des eaux de fond (AABW) près des côtes antarctiques [81] (*lower limb*). Ces échanges sont rendus possibles par l'intensité des transferts de quantité de mouvement et de flotabilité à l'interface air-mer dans ce bassin océanique. La force des vents, les températures extrêmes et la présence de glace de mer concourent à faire de ce bassin un lieu privilégié de formation de masses d'eaux.

La géométrie particulière de l'océan austral a également pour conséquence étonnante de donner un rôle essentiel aux fluctuations tourbillonnaires dans les équilibre de force qui maintiennent la circulation méridienne des masses d'eaux au travers de l'ACC. En effet, l'absence d'obstacle sur le cours de l'ACC ne permet pas l'existence de courants mériadiens permanents (ils seraient en effet nécessairement associés à des gradients de pression zonaux). Ainsi seules des circulations transitoires, en l'occurrence lié à la macroturbulence océanique peuvent maintenir les flux de masses équilibrant les branches de la circulation méridienne au travers de l'ACC. La prise de conscience de l'importance de la circulation tourbillonnaire dans l'ACC date des premiers travaux de modélisation réaliste de ce bassin menés à la fin des années 90 [??] et des rationalisations théoriques de [82] pour la branche de surface (*upper branch*) et de [83] pour la branche abyssale (*lower limb*), confirmé par des analyses dans des modèles à la fin des années 2000 [84].

C'est également au cours des années 2000, que s'est cristallisée la prise de conscience du rôle central joué par l'océan austral dans l'océan global en tant que composante de la machine climatique [85]. Si historiquement, l'océan atlantique nord a reçu beaucoup d'attention de la part des océanographes pour des raisons évidentes liées aux routes maritimes et aux enjeux géostratégiques, les observations collectées durant les campagnes WOCE ainsi que l'émergence des modèles de circulation a permis de mieux comprendre comment l'océan austral contrôle pour une large part la circulation meridienne et la stratification globale (voir par exemple sur ce point [??, 86]), comment également l'intensité des

processus de formation de masses d'eaux en fait un lieu clef en terme d'échange de carbone d'origine anthropique entre l'atmosphère et l'ocean [87]. Mieux comprendre les processus pilotant la variabilité de l'océan austral est ainsi une question de premiere importance pour anticiper et comprendre les changements environnementaux planétaires.





Figure 3: Circulation et bathymétrie de l'océan Austral autour de l'Antarctique. (haut) Représentation schématique des courants de l'océan Austral : le courant circumpolaire antarctique (ACC) circule d'ouest en est autour de l'Antarctique en deux grandes branches, le front polaire et le front subantarctique. Des recirculation cycloniques occupent les bassins profonds entre le continent antarctique et l'ACC (reproduit de [88]). (en bas) Données bathymétriques Etopo2 du NGDC de la NOAA (2008) et noms des principales caractéristiques bathymétriques de l'océan Austral (reproduit à partir de [76]).

Des changements rapides dans l'océan austral

L'intérêt pour l'étude de l'océan austral s'est également accru au tournant des années 2000 lorsque les réseaux d'observation et les campagnes en mer ont montré à quel point ce basin était sujet à des changements rapides de ces propriétés aux échelles décennales à multi-décennales (voir par exemple les synthèses de [89, 90]).

Ce sont en premier lieu les propriétés hydrographiques de l'océan austral qui ont attiré l'attention et en particulier le fort signal de réchauffement et d'adoucissement qu'on observe au coeur de l'ACC [91, 92, 93], signal dont on sait qu'une part importante est lié à des changements effectifs des propriétés des masses d'eaux intermédiaires et modales [94]. Plus en profondeur, un réchauffement et un adoucissement des eaux antarctiques de fond (AABW) a également été détecté [95, 96].

On observe aussi dans l'océan austral des changements de structure de circulation barotrope et d'activité tourbillonnaire avec notamment un décallage des fronts de l'ACC vers le sud. Ce décallage graduel des fronts vers le sud a pu être détecté grâce à l'altimétrie satellite depuis le début des années 1990 [97]. Ce sont également les altimètres qui nous ont permis de détecter une évolution significative de l'activité tourbillonnaire sur cette période [98]. En revanche, ni les altimètres ni les mesures *in-situ* n'ont pas permis de détecter de changements notables du transport de l'ACC (voir section 3.6.5.2 de [99, 100]).

Les changements dans les taux de formation de masses d'eau et dans la circulation méridienne au travers de l'ACC sont cependant plus difficile à détecter de manière directe. La faiblesse des changements de pentes des isopycnies observée par [91] suggèreraient que la circulation méridienne de l'océan austral n'a pas notablement évolué au cours de la deuxième moitié du XXI^e siècle, mais ce point a soulevé des débats. Il semblerait en revanche que les taux de formation des principales masses d'eaux montrent des tendances plus nettes, avec en particulier des changements dans la formation des AAIW [101] et dans le renouvellement des AABW [102].

Concernant la glace de mer, les observations montrent que des changements rapides sont ici aussi en cours dans l'océan austral, mais la tendance y est plus complexe que celle observée en Arctique. Les observations satellite en effet montrent une légère augmentation globale de l'étendue de la glace de mer au cours des dernières décennies dans l'océan austral [103, 104]. Cette légère augmentation globale de l'étendue de la glace de mer résulte en fait de la combinaison de très fortes tendances régionales (augmentations et diminution) de la concentration de glace de mer autour de l'Antarctique [105].

Ces changements des conditions physiques de l'océan austral induisent des changements de la biogéochimie marine et des écosystèmes qui eux aussi sont détectables. La principale source d'inquiétude est en particulier liée à la capacité de l'océan austral à capter du carbone atmosphérique, notamment du carbone d'origine anthropique. Il semblerait en effet que cette fonction de puits de carbone net ait tendance à saturer [106]. En parallèle, l'accumulation de carbone d'origine anthropique induit une acidification détectable des couches de surface [107, 108]. De nombreux autres changements, notamment dans la structure des écosystèmes, ont également pu être détectés dans l'océan austral. Notons ici par exemple les changements productivité induits par l'évolution de la

structures des écosystèmes phytoplanctoniques [109] (pour une revue récente, voir par exemple [110]).




Figure 4: Tendances décennales de la température (à gauche) et de la salinité (à droite) entre 35°S et 60°S (reproduit de [91]). Les tendances sont estimées en soustrayant les mesures in-situ récentes d'une climatologie moyenne à long terme (couleur). Les différences sont prises sur des surfaces de pression constante et le long des lignes de courants moyennes de l'ACC. Les lignes noires indiquent les surfaces d'anomalie de densité constante (en kg m⁻³ - 1000). Les isopycnnes se sont déplacées vers le sud avec le temps, mais avec peu de changement de pente, suggérant que le transport de l'ACC n'aurait pas changé sur la période considérée.

Un stress climatique dominant : la tendance positive du SAM

des changements oceaniques sont liés à des changements plus larges dans toutes les composantes du système climatique de l'hémisphère sud. Réponse au changement radiatif, changement interconnecté océan, atmosphère, glace et biogéochimie. [111]

Du point de vue du forcing océanique un changement clé: changement des vents, intensité et position. décrit généralement de manière simplifiée via le SAM. Lie au GHC, intensité de vent.

Corrélation haute fréquence SAM avec EKE, flux de flottabilité, MLD. Les changements des vents sont sans doute à l'origine d'une partie importante des changements observés dans l'océan austral.

Mais attention, aussi d'autre changement. flux radiatif, forcing lié à la glace de mer. et impact indirect pas que une route. mais un driver dominant.




Figure 5: Schéma de la réponse de l'océan austral aux phases positives du mode annuel austral (reproduit de [111]). Les flèches pleines indiquent les mouvements méridien et verticaux dans l'atmosphère et l'océan. Les couleurs chaudes correspondent à des augmentations de température ou de contenu thermique, et les couleurs froides à des diminutions.

Des questions sur le rôle joué par les processus de mesoéchelle

travail précurseur de [112]. On savait que l'état moyen était équilibré par mesoéchelle. On s'est rendu compte que la réponse dépend de la résolution.

Le concept de eddy compensation. Les tourbillons limitent la réponse. [91] pas de changement des pentes isopycnales, suggèrent compensation par les tourbillons. "Eddy compensation" of wind driven changes in overturning transient baroclinic eddies act to flatten isopycnals. (B' oning et al., 2008)

La notion de eddy saturation. à part d'un certain niveau : pas de changement du transport ? "Eddy saturated" state of the Southern Ocean (Hogg et al., 2008) limiting regime. idealized models.

Beaucoup de travail. mais aussi motivation pour représentation explicite de la mesoéchelle dans les modèles pour CMIP6.

Positionnement et approche générale

Cette première séquence de travail s'appuie directement sur la cacacité technique et scientifique liée au contexte du consortium DRAKKAR. Cet effort de collaboration pan-europeen, mise en oeuvre de simulations hindcast "réalistes". travail sur les forage et mise en oeuvre de simulations globales. compétence technique de l'équipe.

Dans ce contexte, l'approche retenue a été de mener un programme d'expériences de sensibilité, motivée par [112]. simulation regionale pour un cout maîtrisé. programme de travail dans le cadre du projet SouthernCross.

Une originalité de l'approche : faire le pont de la dynamique à la biogeochemie. Mise en oeuvre du modèle PISCES. collaboration avec le LSCE pour l'aspect biogeochemie. James Orr, Marion Gehlen.

Le travail mené durant cette séquence s'est inscrit dans le cadre du projet ANR Southern-Cross et d'une thèse co-financé par le CEA. Il a notamment impliqué Carolina Dufour, Jan Zika, Jean Marc Molines et Bernard Barnier. Une séquence de travail en équipe très agréable et stimulante.

Principaux résultats scientifiques obtenus

Réponse de la circulation méridienne aux changements des vents zonaux

Dans l'étude de [113], nous avons étudié la réponse de la circulation méridienne au changement de vents liés au SAM. Les résultats ont mis en lumière le rôle des méandres stationnaire de l'ACC dans cette réponse.

Expériences dans le cadre des configurations PERIANT, déployées dans le projet SouthernCross, extraction de modèle globaux, respectivement à 0.5 et 0.25°. forcés aux frontières. deux résolutions bien que marginalement eddy-resolving. permettent de regarder la sensibilité à la résolution.

Stratégie expérimentale de sensibilité au forçage. 2 structures : vent homogène, et vent avec structure spatiale typique du SAM. intensité croissante. Un total de 10 simulations.

faible sensibilité du transport de l'ACC, plus grande sensibilité de la circulation méridienne. cf eddy compensation.

Diagnostic en densité-latitude, MOC classique. en moyenne zonale : deux contributions liées aux déviations. meandre stationnaire versus tourbillons de mesoscale.

De manière surprenante, la contribution des tourbillons ne croît pas forcément avec la résolution. Les méandres stationnaires répondent de manière plus efficace à mesure que la résolution croît.

Résultat montre aussi une grande différence dans la réponse selon la structure de la perturbation des vents zonaux.

<image : Figure 5 de Dufour et al. ; éventuellement Fig 1 (les vents) ou Fig 4 (T, S) - on pourrait enlever...>




Figure 6: A sourcer [113].

Rôle des tourbillons de mésoéchelle dans la compensation des changement de vents

Dans [114], nous avons analysé plus en details les roles respectifs des tourbillons de mesoéchelles et des méandres stationnaire de l'ACC dans la compensation des changements de vents. même expérience PERIANT025 ainsi des expériences à plus haute resolution PERIANT8. plus haute resolution à cette époque.

cadre diagnostic : overturning en densité-latitude comme précédemment mais également en densité-profondeur. L'avantage de cette moyenne, elle suit naturellement les lignes de courant de la circulation horizontale de l'ACC. following [115,116]

Densité-latitude : le transport vers le nord d'eau légère poussé par le vent et le transport vers le sud d'eau dense sont compensés par des méandres stationnaires et, dans une moindre mesure, par des tourbillons transitoires. consistant avec [113].

Dans les coordonnées densité-profondeur, en revanche, la remontée d'eau dense due au vent et la plongée d'eau légère sont plus fortement compensées par des flux tourbillonnaires transitoires que par les méandres stationnaires.

En reponse au changement des vents (experience SAM+), densité-latitude : les flux méridionaux dus aux tourbillons transitoires peuvent augmenter pour contrer les changements de transport d'Ekman et diminuer en réponse aux changements des méandres stationnaire. Dans les coordonnées densité-profondeur, les flux verticaux dus aux tourbillons transitoires contrent directement les changements du pompage d'Ekman.

montre dans quelle mesure l'interpretation depend du cadre diagnostic utilisé, importance de construire un cadre adapté. aller-retour avec la théorie.

Les resultats de [113,114] suggèrent que la paramétrisation de ces processus est difficile. rend legitime l'approche de resolution explicite dans le cadre CMIP6. Developpement recent developpement GEOMETRIC.




Figure 7: A sourcer [[114](#)].

Réponse des flux air-mer de CO₂ au changement des vents

Dans [[117](#)], etude de la reponse des flux de CO₂. En particulier comment les changement de degasage de CO₂ naturel reduisent le puit de CO₂ total de l'ACC. motivé par [[118](#)].

La question : dans quelle mesure les modeles sans tourbillon ont surestimé la réponse du degasage de CO₂ naturel en reponse au SAM. la question de la compensation tourbillonnaire et de leur interaction avec les processus biogeochemique. Mais aussi role de la structure spatiale des changement de profondeur de couche de mélange lié et SAM [[119](#)].

Abordé avec experience de sensibilité au SAM, uniquement à 0.5°. idéalement 0.25° mais permet de comprendre quels paramètres physique clés pilotant la réponse des flux. les exp physique seules permettent d'inferer réponse à plus haute resolution.

Le flux air-mer de CO₂ de l'océan Austral est augmenté de 0,1 Pg C an⁻¹ par écart-type du SAM, principalement dans la zone Antarctique (AZ). Cette réponse des flux est piloté par les changement respectifs de concentration des DIC et d'alkalinité à la surface. Besoin de comprendre ce qui les contrôles.

Principal contrôle : approfondissement de la couche de mélange et changement de gradient de DIC et d'Alkalinité immédiatement sous la couche de mélange. En retour ces changement de gradient sont le résultats des changement d'apport en subsurface lié à la circulation méridienne.

Notre étude suggère qu'environ un tiers de l'augmentation de la résurgence de DIC induite par les changement des vents est compensé par le transport liés au tourbillons de mésoscales et aux méandres stationnaires.

Au final, prise de conscience du rôle clé des changement de profondeur de couche de mélange et de l'importance des méandres stationnaires de l'ACC dans l'organisation et la réponse des flux de CO₂. Développement similaire pour étude de la réponse de la composante anthropique des flux [120]




Figure 8: A sourcer [117].

Activités connexes, conséquence directes et indirectes

Mécanismes impliqués dans la réponse de la circulation au changement des vents. Etude du transport de l'ACC au changement de vent [121] + collaboration avec Paul Spence, plusieurs visites [122]

Une conséquence indirecte de long terme, développement d'une capacité d'intégration du transport des traceurs biogeoquimiques pour NEMO. Développement de la capacité de dégradation *online* de NEMO. En effet, changement qualitatif avec le passage en régime mesoscale-permitting (position des fronts, réponse de la couche de mélange) mais coût prohibitif d'un modèle de biogeoquimie complet avec quelques dizaines de traceur. Un travail que j'ai accompagné de près dans le cadre de plusieurs projets successifs, récemment concrétisé par [123].

Thèse de Gildas Mainsant [124], étude des changements de propriétés des masses d'eaux en réponses au modèle annulaire austral. Prise de conscience de l'importance des changements de flux liés à la réponse de la glace de mer, elle-même très dépendante des apports d'eaux douces continentales. Motivation pour la séquence du prochain chapitre.

Illustration n°2 : Etude des interactions entre océan sub-polaire austral et calotte antarctique

Ce chapitre présente une deuxième illustration de mes activités de direction de recherche. Il est essentiellement basé sur des travaux menés entre 2014 et 2018 dans le cadre de la thèse de Nacho Merino [125], et poursuivi en collaboration avec des collègues glaciologues de l'IGE.

Contexte scientifique

La zone subpolaire de l'ocean austral.

Le terme *ocean austral subpolaire designe...*

Caracterisé par interaction avec la cryosphère.

Avec la glace de mer d'une part. rôle important de modulation des flux de flottabilité.

Avec la calotte antarctique d'autre part, en particulier dans les zones d'*ice-shelves*. circulation sur les plateaux et dans les cavités.

contribution importante au niveau des mer. mais également cle pour l'ocean global.




Figure 9: A sourcer, cf 1.4 these de Nacho

Des changements rapides dans la zone antarctique

changement dans proriétés des masses d'eaux : Purkey et Jonhson 2013 [96] [10]. etc... Freshening and warming of Antarctic Bottom Water (AABW) (Johnson et al., 2008) (Purkey and Johnson, 2013) Volume, contraction : Contraction of AABW (Purkey and Johnson, 2012). (van Wijk and Rintoul, 2014).

Notable changes in hydrographic properties are also observed in the polar Southern Ocean, but these changes are generally more regionally contrasted. overall. freshening. Warming of antarctic coastal

waters , esp. western Antarctic Peninsula (Meredith, 2005) warming over shelves. changes in stratification. The observations show that surface freshening of the southern polar ocean since the 1950s has considerably enhanced the salinity stratification.

changement de la glace de mer. cf chapitre precedent. changement reflete en fait changement de saisonnalité : [126] The regional changes in SIC reflect changes in the duration of the sea-ice season (Stammerjohn et al., 2008). et aussi thickness : changes in sea ice thickness are weakly constrained because dataset are just emerging, short time series (Kurtz and Markus, 2012; Lindsay, R., 2013); on long time scale require model-based reconstruction (Massonnet et al., 2013; Holland et al., 2014) [127] still very uncertain.

changement dans la calotte

changement des vents.




Figure 10: Flux d'eau douce équivalent aux changements de salinité observé dans les eaux abyssales entre les années 1980 et les années 2000 (reproduit de [96])

Interactions et couplage dans la zone antarctique

Echange d'eau douce et de chaleur entre les différentes composantes : impact clés sur leur évolution.

Ex: flux eau douce et évolution des propriétés des masses d'eaux : Role des échanges d'eau douce dans la formation de masses d'eaux

Ex : Flux d'eau douce et tendance de glace de mer. via impact sur la stabilité des couches superficielles et résultats en situation de formation de glace de mer. Bintanja vers Swart and Fyfe cf slides de Nacho

Ex : flux de chaleur et fonte des calottes. hypothèse intrusion eau chaude.

Particulièrement important à cause de l'effet d'arc-boutant. mécanisme de marine ice-sheet instability. acceleration de la débâcle.

mais pas encore de modèle couplé au moment du démarrage de ce travail.




Figure 11: Tendance observée de concentration de glace de mer entre 1980 et 2008 (reproduit de [127])

Positionnement et approche générale

Cette phase de travail a été initiée suite aux sollicitations des collègues glaciologues du LGGE vers 2012 et en particulier de G. Durand. Un faisceau convergeant d'éléments indiquaient en effet qu'une part essentielle de l'incertitude quant à l'évolution future de la calotte antarctique était liée aux interactions avec l'océan et au processus de fonte dans les cavités d'ice-shelf. A leur yeux, meilleure compréhension physique des processus impliqués dans la fonte et vers une représentation explicite du couplage étaient donc le chemin naturel.

Conscient du fait qu'en retour une part importante de l'incertitude sur l'évolution de l'océan et de la glace venait des interactions avec la calotte. Un cycle de discussion pour positionner de manière optimale un travail à l'interface de nos équipes. Afin de définir une approche exploitant au mieux le potentiel spécifique de chacun de nos équipes et original par rapport à l'existant.

convergé sur une thèse comme étape préparatoire au couplage, regard sur chaque composante sans représentation explicite du couplage, appuyé sur outils existants, du point de vue océan, focus impact des flux d'eau douce sur glace de mer, estimation et représentation de flux, recent développement du module d'ICB dans NEMO.

C'est ainsi qu'a démarré la thèse de Nacho Merino [125]. Au fil du projet recrutement de N. Jourdain et de l'UKMO cavité iceshelves, basé sur des contributions techniques d'autres groupes. Démarrage ANR 3-AS, contexte très propice, et thématique porteuse bien que compétitive.

Principaux résultats scientifiques obtenus

Estimation du flux de fonte liés aux icebergs

Une première contribution [128]. Simulation océan / glace de mer avec modèle d'ICB, estimation du flux de fonte et qualification de l'impact de ce flux sur la glace de mer.

Une part importante du travail : choix des sources d'information pour different contribution flux d'eau douce et leu distribution. Pour une large part basé sur [129].

travail spécifique sur la prise en compte du cisaillement vertical dans la dynamique des iceberg. evaluer en comparaison aux estimation de trajctoire par altimétrie satellitaire.

fonte tres saisonniere, distribution tres organisé par basin. impact net sur la concentration et epaisseur de glace de mer tout autour de l'antarctique. augmentationde la production de glace enb automne et hiver. car augmentation de la stratification. sauf dans region Bellingshausen.

L'un des apports de cette étude. distribution d'unutile pour modele sans composante ICB. comme par exemple [130]. regulierement mise à jour par N. Jourdain depuis.




Figure 12: climatologie du flux d'eau douce lié au iceberg de l'ocean austral (reproduit de [128])

Impact des changements de flux d'eau douce sur la glace de mer

basé sur [131]

un scenario aux petits oignons.

importance relative des changement atmosphereique versus flux de fonte sur changementd de glace de mer.

un mecanisme de réponse spécifique dans la zone Admunsen.

Figure 13: Estimation dec changement de concentration de glace de mer associé aux... (reproduit de [131])

Activités connexes, conséquence directes et indirectes

Amelioration de la représentation des interaction icebergs ocean dans ICB : [132] clef dans d'autre secteur [133]

Poursuite des collaborations dans le secteur Admunsen : [134,135,136]

Illustration n°3 : Etude de interactions d'échelles dans l'Océan Atlantique Nord

Ce chapitre présente est une troisième illustration de mes activités de direction de recherche. Il est essentiellement basé sur des travaux menés entre 2016 et 2020, dans le cadre de la thèse d'Adekunle Ajayi [137] et du projet SWOT Science Team (2016-2019) de l'équipe MEOM que j'ai co-animé avec Emmanuel Cosme. Les travaux présentés ci-dessous portent sur l'étude des échanges d'énergie cinétique entre échelles aux latitudes moyennes; ils ont été menés sur la base de simulations numériques de la circulation de l'Océan Atlantique Nord menées en préparation à la mission SWOT.

Contexte scientifique

Circulation océanique, énergie cinétique et mélange irréversible

La dissipation et le mélange irréversible à micro-échelle (1mm-1m) sont des paramètres clés contrôlant la circulation océanique [138]. C'est pourquoi leur étude concentre l'attention d'une fraction importante des océanographes physiciens. Malgré de nombreuses avancées au cours des dernières décennies, la compréhension et la représentation des paramètres contrôlant la dissipation et le mélange irréversible dans l'océan n'en demeurent pas moins des problèmes encore largement ouverts aujourd'hui [139]. Du point de vue pratique, la représentation de la dissipation et du mélange irréversible est en tout cas l'une des principales sources d'incertitude irréductible des composantes océaniques des modèles de projection climatique [48].

A cause de la nature turbulente des écoulements océaniques (de 1m à 1000km), le mélange irréversible à micro-échelle est intrinsèquement lié à la circulation de plus grande échelle, au mélange turbulent et aux transferts de variance entre les échelles qu'elle induit. Ainsi, si, comme on l'a vu, la circulation à grande échelle (circulation globale et macroturbulence océanique) dépend du mélange irreversible, le mélange irréversible dépend lui-même de la circulation à plus grande échelle, des échanges d'énergie cinétique entre les échelles et de sa dissipation. Dans ce contexte, il est généralement admis que réduire l'incertitude liée à la représentation du mélange et de la dissipation dans les modèles océaniques requiert de mieux comprendre et de mieux contraindre l'énergétique de ces modèles [141, 142]. En pratique, il s'agit de s'assurer que les modèles représentent chacun des réservoirs d'énergie mécanique de l'océan ainsi que les processus d'échanges entre ces réservoirs (que ces processus soient représentés de manière explicite ou non dans le modèle).

Faire en sorte que les modèles de circulation imitent les échanges d'énergie mécanique de l'océan réel suppose évidemment tout d'abord d'avoir identifié les réservoirs, les sources et les puits d'énergie mécanique de l'océan réel. On sait sur ce point que la principale source d'énergie mécanique de la circulation océanique est liée au forçage par le vent [143] (le forçage de la marée est évidemment également important quantitativement). L'énergie mécanique injectée par les échanges de quantité de mouvement à l'interface air-mer est ensuite redistribuée dans l'océan, où elle alimente des mouvements de la micro-échelle à l'échelle globale. Environ 10% de cette énergie est *in fine* dissipée dans les couches de surface de l'océan, le reste serait dissipé auprès du fond [144], ou pour une faible fraction dans l'océan intérieur. Toutefois de grandes incertitudes subsistent quant au détail des processus impliqués dans ces échanges.

Le sort de l'énergie cinétique de méso-échelle

Parmi les réservoirs d'énergie mécanique de l'océan, la dynamique dite de méso-échelle fait quelque peu figure d'*éléphant dans la pièce*. Les mouvements océaniques de méso-échelle seraient

en effet le principal réservoir d'énergie cinétique aux échelles de temps superinertielles [145]. La dynamique de méso-échelle est une composante de la macro-turbulence océanique; elle est associée aux tourbillons et aux fronts d'échelle typique de l'ordre de quelques rayon de déformation de Rossby (~50km à 500km, voir par exemple [143]). En termes dynamiques, ces structures sont bien décrites par le régime asymptotique *quasi-géostrophique* (caractérisé par de faibles nombre de Rossby et nombre de Froude). Ces mouvements résultent essentiellement de l'instabilité barocline des grands systèmes de courants mis en mouvement par les vents de surface [146]. Ils sont aujourd'hui bien connus grâce à près de 30 années d'observation depuis l'espace par les altimètres conventionnels, comme l'illustre la Figure [14].




Figure 14: Estimation de l'énergie cinétique de surface [$(\text{cm} \cdot \text{s}^{-1})^2$] associée à la circulation géostrophique. L'énergie cinétique est ici multipliée par $\sin^2 \varphi$ où φ désigne la latitude (source: [147]).

Comprendre le sort de l'énergie cinétique de méso-échelle (comment elle circule, où et comment elle est dissipée ou échangée avec d'autres échelles) est donc une question importante pour les océanographes physiciens. Elle a été abordée en combinant des observations (in-situ et satellite), des modèles théoriques et des modèles réalistes. L'altimétrie satellite a permis de décrire la distribution de l'énergie de méso-échelle à l'échelle du globe [??] ainsi que la manière dont elle est redistribuée par les interactions non-linéaires [148, 149]. Ces travaux ont alors suscité des avancées théoriques pour expliquer les observations [??, 150, 151] et des analyses sur la base de modèles réalistes [152, 153, 154].

Le consensus actuel est que l'énergie cinétique de la méso-échelle est essentiellement injectée par l'instabilité barocline et que cette énergie subit pour une large part une cascade inverse depuis les échelles d'injection vers des plus grandes échelles [148, 155] et des plus basses fréquences [42] (voir la Figure [15]). La rationalisation théorique de cette cascade inverse est encore imparfaite, mais il s'agit d'un processus nonlinéaire dont on pense qu'il combinerait des composantes barotropes et baroclines [151]. On pense également que cette cascade inverse serait modulée par les fluctuations saisonnières de la stratification océanique et pourrait se combiner à une cascade directe vers les fines échelles dans certaines circonstances [156, 157].

Cascades turbulentes et dynamique de fine-échelle

Au cours des dernières années, l'intérêt pour ces questions d'échanges énergétique inter-échelle dans les régimes de macro-turbulence océanique s'est renouvelé, en particulier suite à plusieurs travaux qui ont identifié des mécanismes qui permettraient d'entretenir une cascade directe d'énergie

cinétique beaucoup plus efficace que l'on ne pensait jusqu'alors [155]. Ces mécanismes sont liés au fait que les écoulements océaniques ne sont pas rigoureusement décrits par le régime *quasi-geostrophique* mais dévient légèrement de ce régime asymptotique, notamment près de la surface [158, 159]. Il semblerait ainsi que deux types de mouvements seraient susceptibles de participer à l'établissement d'une cascade directe d'énergie cinétique : la *dynamique frontale de surface* (qu'on associe généralement au régime dit de *Charney*) ainsi que la dynamique hors équilibre liée aux *mouvements ondulatoires* (ondes internes, ondes inertielles).




Figure 15: Schéma illustrant les flux inter-échelle d'énergie cinétique aux latitudes moyennes. en bleu : cascade inverse vers les grande échelles; Ren rouge : cascade directe vers les fines échelles. Les échelles spatiales sont indicatives.

Une première route possible pour une cascade directe de l'énergie cinétique de méso-échelle vers les échelles dissipatives pourrait donc être liée à l'intense activité frontale à submesoéchelle dans les couches de surface de l'océan. Cette dynamique quasi-équilibrée et intensifiée en surface partage beaucoup de similarité avec la dynamique quasi-geostrophique observée à plus grande échelle ou à l'intérieur de l'océan. Il semblerait toutefois que ce régime de Charney puisse être de plus associé à une intense cascade directe [160, 161]. De nombreux travaux récents ayant par ailleurs montré la très forte saisonnalité de cette dynamique frontale, tant sur la base de modèles numériques [161, 162, 163] que d'observations [164, 165, 166], la question de la saisonnalité des échanges d'énergie cinétique apparaît donc assez centrale [157, 167, 168].

Une deuxième route possible pour une cascade directe de l'énergie cinétique de méso-échelle pourrait impliquer des interactions entre mouvements quasi-équilibrés et mouvements hors équilibres (ondes internes, oscillation inertielles). Plusieurs mécanismes impliquant des ondes proches inertielles (voir [169]) ont été identifiés au cours des dernières années [170, 171, 172, 173]. Il s'agit pour l'instant de mécanismes théoriques liés à des configurations d'écoulements particulières, dont certaines impliquent des forcages externes (vents, ondes internes), mais une image générale semble déjà émerger (voir par exemple le très bonne synthèse de [174]). Ces mécanismes posent évidemment la question de l'interaction avec les ondes internes de manière générale, en premier lieu desquelles les ondes de marée interne. Là encore, la forte saisonnalité de l'expression de surface de la marée interne laisse supposer que les échanges énergétiques qui l'impliqueraient pourraient eux aussi être modulés en fonction de la saison [175].

Au moment où nous avons commencé nos travaux sur ces thématiques, la question de l'existence d'une cascade directe était encore hypothétique ou tout au moins fondée sur des considerations relativement théoriques. La possibilité de déployer des modèles réalistes résolvant simultanément une fraction du spectre de la marée interne et une partie de la dynamique de submesoéchelle ouvrirait alors la possibilité d'aborder ces questions en termes quantitatifs et de confronter les différent

mécanismes identifiés dans un même contexte réaliste. L'analyse de ces modèles numériques permet en tout cas de préparer l'étude des échanges énergétiques inter-échelle qu'on espère pouvoir mener avec les données de la mission altimétrique SWOT [176].

Positionnement et approche générale

Le travail que nous avons engagé sur ces thématiques du "sort de l'énergie de méso-échelle" s'inscrit donc dans le contexte particulier de l'émergence entre 2010 et 2015 de modèles de circulation océanique capables de décrire de manière "réaliste" la dynamique de submésoscale à l'échelle des bassins océaniques. Ces développements étaient largement motivés par la perspective de l'altimétrie à large fauchée, notamment les études d'observabilité à mener en préparation à la mission SWOT. Ils étaient également simplement rendus possibles par l'évolution des calculateurs. Ce sont en tout cas ces simulations, comme par exemple les simulations du JAMSTEC (OFES) entre 2011 et 2014 ou la simulation LLC4320 du JPL (MITgcm) en 2015, qui ont permis de mettre en lumière l'importance de la saisonnalité de la dynamique de submésoscale. Pourtant, comme l'ont montré les discussions dans le cadre de la SWOT Science Team, ces modèles avaient alors relativement peu été confrontés à des observations et aucun exercice d'intercomparaison systématique de ces modèles entre eux n'avait encore été mené.

Dans le cadre des activités de notre équipe en préparation à la mission SWOT, nous avons fait l'analyse que disposer de nos propres modèles réalistes *submesoscale-permitting* était une condition nécessaire pour aborder dans de bonnes conditions la préparation des chaines de traitement et des algorithmes pour traiter les données de la mission. Un premier effort a donc été engagé en 2014-2015 avec le développement de la configuration NATL60 du code NEMO et la production d'une première simulation dans le cadre des "Grands Challenges GENCI 2014". Cette première simulation s'est avérée être affectée par une instabilité numérique [177], mais a toutefois pu être exploitée par [178] et [add Pietri 2020 here]. Une fois l'instabilité corrigée, nous avons pu engager une nouvelle campagne de simulation en 2016, simulation largement utilisée depuis dans le contexte de la préparation de la mission SWOT [179, 180, 181, 182].

Ces efforts ont été poursuivis en 2017-2018 en collaboration de la société Ocean Next avec l'objectif de rendre nos simulations encore plus réalistes en incluant une représentation explicite des courants de marée barotrope et des ondes de marée internes. Les travaux préparatoires à la mission SWOT ayant en effet souligné à quel point la dénivellation de surface de l'océan aux échelles <50Km risquait d'être affectée par la marée interne. La configuration eNATL60 du code NEMO a été développée dans ce contexte, en collaboration avec une équipe de collègues de la SWOT Science Team, et deux simulations, respectivement avec et sans marée, ont été produites [183]. Ces simulations font depuis l'objet d'analyses dont l'un d'entre elles est décrite plus bas.

Parmi les travaux menés sur la base des configurations NATL60 et eNATL60, j'ai pris le parti de ne présenter ici que les travaux portant sur les processus océaniques en tant que tels et de laisser de coté les études d'observabilité ou le développement d'algorithmes en préparation à la mission SWOT. Je décrirai donc dans ce qui suit trois études portant sur la variabilité et le sort de l'énergie de méso-échelle menées dans le cadre de la thèse d'Adekunle Ajayi [137]. Ces travaux ont été conduits dans le cadre de collaborations établies au sein de la SWOT Science Team et du CLIVAR Ocean Model Development Panel. Ils ont directement bénéficié des moyens et du contexte du projet CMEMS GLO-HR portant sur l'évolution du système de prévision opérationnelle de Mercator Ocean International. Ces travaux ont été rendus possible en pratique par l'utilisation des outils d'analyse de données massives de l'écosystème logiciel PANGEO.

Principaux résultats scientifiques obtenus

Variabilité spatiale et temporelle de l'échelle des tourbillons en Atlantique Nord.

Un premier travail a porté sur la description de l'échelle spatiale des tourbillons et de sa variabilité spatiale et temporelle [184]. Une information clé pour calibrer les algorithmes d'inversion mais également pour fermeture sous mailles basées sur hypothèse de longueur de mélange.

Une étude basée sur deux simulations numériques (HYCOM50, NATL60) pour plus de robustesse. variabilité spatiale et temporelle de l'échelle des tourbillons. échelles de mesure combinant échelle issue d'un algorithme de suivi de tourbillons et définition basées sur échelle intégrale de l'enstrophie.

Résultat montre grande variabilité spatio-temporelle, prédite de manière robuste par les deux modèles. variabilité spatiale expliquée par variabilité des échelles les plus instables et saturation non linéaire de la cascade. variabilité spatiale associée à l'émergence d'une population de petits tourbillons en hiver. L'émergence de la population de tourbillons submesoscales issus de l'instabilité de couche de mélange.

plus généralement étude a permis la confrontation des modèles. relativement peu de telles études. montrant importance de la durée du spin-up et différence dans taille des structures et structure verticale simulée. appelle des intercomparaisons plus poussées




Figure 16: Série temporelle de l'échelle intégrale basée sur l'enstrophie (enstrophy-containing scale) dans une région proche du Gulf stream dans la simulation NATL60 (reproduction de la Figure 6 de [184])

Cascade directes et indirectes d'énergie cinétique aux latitudes moyennes.

Un deuxième travail a porté sur l'étude des flux interéchelle d'énergie cinétique et leur signature à la surface dans la perspective de la mission SWOT. méthode assez standard de flux spectraux liée à la nonlinéarité advective et étude des spectres énergétiques. toujours dans ces deux simulations NATL60 et HYCOM pour plus de robustesse [185]. étude systématique dans tout l'Atlantique Nord

saisonalité des pentes de spectre et de la cascade. spectre suivant prévision QG en hiver, spectre plus plat en été. associé à une forte cascade directe en hiver. essentiellement confinée en surface dans la couche de mélange.

deuxième type de résultat les échelles sur les bornes. de manière générale ; cascade inverse est maximale près de l'échelle moyenne la plus énergétique (échelle intégrale de l'énergie cinétique). mais forte saisonnalité de la limite entre forward et backward. questionne les études basées sur des limites fixées a priori.

enfin, dans la perspective de la mission SWOT le rôle très important des composante ageostrophique et haute fréquence dans la cascade. questionne les résultats que l'on obtiendra avec hypothèse géostrophique.




Figure 17: Pente des spectres d'énergie cinétique de surface dans la simulation NATL60 (bleu : hiver; rouge : été). Les spectres sont calculés à partir des moyennes horaires, les pentes moyennes sont évaluées entre l'échelle intégrale de l'énergie cinétique et la résolution effective du modèle (reproduction de la Figure 11 de [185])

Modulation des échanges énergétiques inter-échelle par la marée interne

Une troisième étude a porté étude du rôle de la variabilité ondulatoire dans les échanges d'énergie cinétique interéchelle. basé sur article en préparation. sur l'analyse d'un couple de simulation en NATL60 avec sans marée réalisé en 2018. en phase avec plusieurs études récentes suggérant rôle important [170,171,172,173]

très forte cascade directe, tant en hiver qu'en été dans le run avec marée. alors que sans marée uniquement en hiver (cf supra). la encore cascade directe relativement confinée à la surface.

mécanisme très différent. en hiver essentiellement ce qu'on a vu avant mais analyse temps fréquence montre classe de mouvement superinertielle dynamiquement analogue à la dynamique balancée jour un rôle clé.

situation hivernale : cascade directe est lié à échange non linéaire avec les ondes. les bandes tidales perdent de l'énergie au bénéfice des autres. c'est en fait la construction du spectre de Garrett Munk. + k^{-2} spectra : [186]

Cette étude ouvre la voie à étude de processus ondulatoires dans contexte réaliste.




Figure 18: Distribution de l'énergie cinétique en fonction de la fréquence et du nombre d'onde dans une région de l'océan atlantique nord dans les simulations eNATL60 avec et sans marée (reproduction de [137]).

Activités connexes, conséquence directes et indirectes

papier Jamet et al. [187] sur méthode de diagnostic pour échanges interéchelle d'énergie. dans le même ordre d'idée collab T. Uchida [188] implémente le *Thickness Weighted Average* de [23] pour l'analyse des interaction entre tourbillons et écoulement moyen (*eddy mean flow interactions*).

en parallèle collab C. Buckingham établie pour evaluation des simulations NATL60 a également mené à une participation [189]. exemple de comment modèle réaliste peuvent être utilisé pour mettre en contexte et extrapolier les résultats de campagne de mesure en mer.

Plus généralement, cette phase de travail motive pour intercomparaison plus systématique des modèles (contexte AdAC), compréhension dynamique aérogéostrophique. et pour avancer vers couplage fine échelles dont on sait qu'il affecte les corrélations entre variables à fine échelle.

Synthèse et perspectives

J'ai tenté au fil des trois chapitres précédents de présenter quelques exemples illustrant ma pratique de la recherche scientifique. Ces exemples ne couvrent toutefois qu'une partie de mes activités depuis ma thèse de doctorat. Avant d'expliquer comment je souhaite orienter mes activités dans les années à venir, je prendrai donc tout d'abord ici le temps de présenter un rapide tour d'horizon plus exhaustif des travaux scientifiques auxquels j'ai pu contribuer. J'essaierai également d'expliciter certains enseignements que j'ai pu tirer de mes expériences d'encadrement.

Synthèse des principales contributions scientifiques :

Comme je l'ai décrit en introduction, mes activités de recherche se sont réparties autour de trois axes portant respectivement sur (1) la *science des modèles de circulation océanique*, la (2) *variabilité de l'océan austral* et (3) les *synergies entre modèles et observations*. Si le premier axe est un fil conducteur de mon travail de recherche, mes activités ont graduellement évolué du deuxième au troisième axe au fil du temps. Les paragraphes qui suivent tentent une rapide synthèse factuelle de mes contributions sur chacun de ces trois axes.

Contributions aux développement et à la compréhension des modèles de circulation océanique

Une première partie de mon travail a donc porté sur la science des modèles de circulation océanique, notamment en régime turbulent. Cette catégorie regroupe des travaux de nature très différentes, mais qui ont généralement pour objet de comprendre comment les modèles de circulation représentent les processus océaniques ou comment ils pourraient mieux les représenter. Plusieurs de ces travaux portent ainsi sur la description de la variabilité tourbillonnaire résolues par les modèles de circulation [184,185,190,191]. Une question importante est en particulier d'examiner comment les choix de formulation de ces modèles (discrétisation, paramètres,...) peuvent affecter les solutions obtenues [177,192,193,194]. J'ai également eu l'occasion de contribuer ponctuellement au développement de nouvelles fonctionnalités pour ces modèles [132,133,195] avec un intérêt particulier pour les fermetures sous-mailles, notamment sur la base de concepts issus de la *simulation des grandes échelles* (LES) [196,197]. Dans le cadre de collaborations, je me suis aussi intéressé aux mécanismes contrôlant la turbulence tridimensionnelle de surface et de fond [189,198,199] ainsi qu'à l'amélioration des fonctions de forcages des modèles de circulation [130,200,128]. Plus récemment, j'ai eu l'occasion de contribuer à des travaux de synthèse sur l'état de l'art des modèles de circulation océaniques [3,6]. Au bilan, mes travaux sur ce premier axe ont mené à 26 publications, dont 8 ont impliqué l'un des jeunes chercheurs que j'ai directement encadrés (à savoir, sur cette thématique : Adekunle Ajayi, Nicolas Ducouso, Nacho Merino, Xavier Meunier et Antoine Venaille).

Contributions à la compréhension de la variabilité saisonnière à décennale de l'océan austral

Une deuxième partie de mon travail a porté sur l'étude des processus océaniques impliqués dans la réponse de l'océan austral aux changements environnementaux en cours dans l'hémisphère sud. Ces travaux, qui sont plus homogènes dans leurs approches, mobilisent généralement des expériences de sensibilité afin d'étudier la réponse des propriétés océaniques à des changements de forcages externes. Mes travaux ont tout d'abord porté sur la réponse océanique à l'intensification des vents zonaux liée à la tendance du mode annulaire austral. Comme je l'ai décrit plus haut dans le chapitre 2, les analyses ont porté notamment sur la réponse de la circulation au cœur de l'ACC à ce changement

de forçage [121,122,201], sur la réponse des flux de CO₂ à l'interface air-mer [117,202] avec une attention particulière au rôle joué par la variabilité tourbillonnaire dans la réponse de la circulation méridienne [113,114,203]. Dans le cadre de collaborations, j'ai également pu contribuer à des études portant sur l'observabilité de la variabilité de l'océan austral [204,205] à ces latitudes. Une deuxième phase de travail, décrite dans le chapitre 3, a porté sur l'étude des interactions entre calotte glaciaire et océan, et de leur évolution. Ces travaux se sont notamment focalisés sur l'impact à grande échelle de ces interactions et de leur évolution, en particulier sur la glace de mer [128,131]. Dans le cadre de collaborations, j'ai pu également contribuer à l'étude de processus spécifiques à l'œuvre dans les zones côtières et sur les talus continentaux de l'Antarctique de l'ouest [134,135,136]. Au bilan, mes travaux sur ce deuxième axe ont mené à 22 publications, parmi lesquelles 11 ont impliqué l'un des jeunes chercheurs que j'ai directement encadrés (à savoir, sur cette thématique : Carolina Dufour, Pierre Labreuche, Nacho Merino et Jan Zika).

Contributions à la synergie entre modèles et observations

Une troisième partie de mon travail a porté sur le développement de synergies entre modèles et observation en préparation de l'observation de la circulation océanique, notamment depuis l'espace. Comme expliqué en introduction, ce terme de *synergies* désigne l'usage des modèles de circulation dans le contexte de la préparation de l'observation des océans ou de l'exploitation des données d'observations. Si on laisse à part les travaux spécifiques sur l'observabilité de la circulation de l'océan austral mentionnées au-dessus [204,205] ou sur l'estimation des flux de fonte des icebergs [128], l'essentiel de mes travaux sur ce thème des synergies s'inscrivent dans le contexte de la préparation à la future mission altimétrique SWOT et de la participation de l'équipe MEOM à la SWOT Science Team. Les travaux auxquels j'ai pu contribuer ont porté sur le développement de méthodes spécifiquement adaptées à la prise en compte des erreurs d'observations de la mission SWOT dans un contexte de reconstruction ou d'assimilation de données. Ces travaux ont porté sur le traitement des erreurs spatialement corrélées [180,206] ainsi que des erreurs instrumentales non-corrélées [182,207]. J'ai pu travailler sur les techniques de cartographies utilisées pour construire des produits grillés (type L4) à partir des données altimétriques brutes (type L2). Ces travaux ont permis d'établir les limites des méthodes actuelles [179] et de proposer des pistes d'amélioration des ces techniques [208,209]. Enfin, des collaborations m'ont permis de m'intéresser aux questions de reconstruction de la structure tridimensionnelles de la circulation [178] (+ Pietri). Au bilan, mes travaux sur ce troisième axe ont mené à 13 publications, dont 4 ont impliqués l'un des jeunes chercheurs que j'ai directement encadrés (à savoir, sur cette thématique : Laura Gomez-Navarro, Redouane Lguensat et Nacho Merino).

Quelques enseignements et réflexions personnelles

Les sous-sections qui suivent rassemblent quelques réflexions personnelles sur l'encadrement du travail de recherche et une brève analyse critique de mon approche de la direction de la recherche. Si ces éléments ne seront sans doute pas utiles au lecteur, les rassembler ici est important à mes yeux en ce qu'ils sont le résultat d'un apprentissage personnel au fil des expériences d'encadrement. Je remercie donc par avance le lecteur pour sa patience bienveillante dans la lecture des paragraphes qui suivent.

Réflexions sur le travail de recherche et sa direction

- ***On ne dirige pas un travail de recherche***, on en conçoit le cadre et les objectifs *a priori*, on organise et accompagne son développement, on oriente l'attention vers ce que l'on juge important, on aide à créer des liens avec d'autres travaux. Si j'ai approché mes premières expériences d'encadrement de manière très directive, avec plus de pratique, j'ai aujourd'hui plus de confiance dans le processus d'interaction qui permet d'inventer ensemble le développement d'un travail de

recherche. J'apprécie de plus en plus qu'un travail dévie de ma vision initiale et accepte plus naturellement que les productions de mes étudiant.e.s ne soient pas les miennes.

- **Chaque étudiant.e est différent**, chaque relation est différente. Un mode d'interaction qui fonctionne bien avec un.e étudiant.e ne fonctionnera pas forcément avec un.e autre. Pour des questions de traits comportementaux et de biais cognitifs certains cerveaux se connectent plus facilement que d'autres. Mais si l'on prend deux cerveaux au hasard, le plus probable est qu'il aborderont les problèmes de manières assez différentes. Il faudra alors inventer une manière de réfléchir ensemble, une *danse des cerveaux* dont les pas devront idéalement être les plus naturels possibles pour chacun des danseurs. La mission de l'encadrant est ainsi de créer les conditions de l'épanouissement de l'étudiant.e en cherchant les meilleures solutions pour l'amener à son rythme au mieux de ce qu'il ou elle peut donner.
- **Les ressorts de motivation individuels pour la recherche sont multiples** mais les plus durables sont sans doute la *curiosité* et le sentiment du *sens* de ce que l'on fait. Il revient donc à l'encadrant d'identifier le principal ressort de motivation de son étudiant.e et de susciter sa curiosité afin qu'il.elle garde une forte conviction dans le sens dans ces efforts. Ceci passe en pratique par l'exemplarité dans l'éthique de la recherche, la disponibilité pour la *sérendipité* et la discussion. C'est sans doute ici qu'un encadrant aura le plus d'influence sur la future carrière de son étudiant.e.
- **Transmettre le sens de l'exigence et de l'éthique scientifique** est également à mes yeux une dimension fondamentale de l'accompagnement des jeunes chercheurs. Il s'agit ici d'encourager et de valoriser les efforts pour rendre le travail le meilleur possible à chaque étape de sa production et de sa communication. Si aucune production scientifique n'est parfaite, ni même exempte d'erreur, le processus de sa création doit être l'objet de tous les efforts dans le respect des principes éthiques de la recherche. Il appartient donc à l'encadrant d'encourager les jeunes chercheur.se.s à ne pas se contenter d'*à peu près*, de susciter leur tenacité et de leur transmettre un certain goût de l'exigence scientifique. Ceci passe ici encore essentiellement par l'exemple.
- **Nos biais cognitifs sont des singularités à cultiver**. Si bien évidemment, nos connaissances et nos compétences peuvent évoluer au fil du temps, certains biais cognitifs profonds persistent. Ce peut être une attention pour les détails, ou au contraire un sens de la généralisation; une aversion pour les formalismes mathématiques, ou au contraire un goût très marqué pour ceux-ci; ou encore une démarche très orientée vers les solutions concrètes et leur implémentation pratiques. Toutes ces dimensions cognitives, dont certaines pourraient être qualifiées de faiblesses, sont en fait autant de chemins possibles pour rendre nos productions scientifiques originales. Il convient donc d'en prendre conscience pour bien les utiliser et éventuellement les compenser au travers de collaborations.
- **Le travail de recherche, des fois ça rate....** L'échec est une dimension intrinsèque et essentielle de la recherche scientifique. Les échecs peuvent être de nature scientifique, quand les résultats ne sont pas à la hauteur des espoirs, ou parfois dans les relations humaines elle-même, quand par exemple la relation de travail ne "prend" pas. J'observe que dans le deux cas, c'est souvent le *timing* qui est mauvais : une idée peut être trop précoce ou au contraire trop mûre, une relation de travail possible ou non à un certain moment donné. Prendre conscience du caractère intrinsèque de l'échec dans la recherche permet de mieux traverser les phases difficiles mais aussi de mieux profiter des succès. Cette prise de conscience permet aussi de prendre acte avec bienveillance et d'agir au mieux des intérêts de l'étudiant.e dans les situations critiques.
- **Le rôle de l'encadrant au delà de la collaboration scientifique**. Au cours de la période de collaboration étroite un.e jeune chercheur.se, l'encadrant transmet évidemment plus que son expérience scientifique elle-même. Il transmet notamment les codes comportementaux de sa

communauté scientifique et l'accès à un certain réseau de collaborations. Cette dimension d'accompagnement et de conseil (de *mentoring*) est particulièrement importante à l'issue de la thèse ou du contrat de travail quand le.a jeune chercheur.se est amené à faire des choix pour la suite de sa carrière. Elle peut également s'étendre parfois bien au delà et je trouve particulièrement gratifiant d'être sollicité pour des conseils ou des recommandations de la part d'anciens étudiants longtemps après leurs stages ou thèses.

Analyse critique de mon approche de direction scientifique :

La rédaction de ce manuscrit me donne également l'opportunité de me pencher de manière plus réfléxive et critique sur ma pratique de la direction de la recherche. Ici encore, les paragraphes qui suivent me seront sans doute plus utiles qu'au lecteur. J'aimerais toutefois essayer de présenter ci-dessous ce que je pense être mes forces et mes faiblesses en tant qu'encadrant de travaux scientifiques.

- L'expérience me rend pour apte à identifier un contexte scientifique que je pense intéressant et, dans ce contexte, à *formuler une bonne question de départ* ou à proposer une approche originale.
- Mes compétences organisationnelles et mon réseau de collaborations rendent assez naturelle *l'organisation d'un cadre de financement et de collaborations* pour mener à bien l'investigation de la question proposée.
- Je crois être capable de transmettre un certain enthousiasme dans la *dynamique de groupe*, ce qui permet de bien amorcer le travail et de mieux rebondir en cas de difficultés. Certains biais cognitifs (esprit de synthèse, psychorigidité...) me permettent également de bien structurer les réunions de travail des projets que je pilote.
- Au cours de la rédaction d'article ou de la préparation de communications scientifiques, mes biais cognitifs personnels me permettent de contribuer très activement à la *conception des messages*, à l'organisation et l'illustration du propos (plan, choix des expériences et des illustrations). Je suis en revanche moins efficace dans la correction de détail en phase de finalisation.
- J'observe en revanche que la largeur du spectre des mes intérêts scientifiques me rend *de fait peu spécialiste*, ce qui peut être problématique pour des travaux pointus sur des sujets ayant déjà été bien défrichés. C'est la raison pour laquelle je préfère encadrer dans le cadre de collaborations afin de compenser mes lacunes.
- Enfin, ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec moi savent que je suis *généralement bien trop occupés* et que ma gestion des priorités peut être parfois un peu flottante. Si je pense sincèrement que la procrastination est pour moi un chemin efficace vers la sérendipité, c'est objectivement un mauvais exemple à donner aux jeunes chercheurs.

Je remercie le lecteur pour sa bienveillance dans la lecture des paragraphes précédents et passe à présent à l'exposé des orientations que je souhaite donner à mes activités dans les années à venir.

Projet scientifique pour la période 2021-2025

Contexte général

Les processus océaniques de fine échelle spatiale (1km-200km) font l'objet d'un intérêt croissant de la part de la communauté des océanographes physiciens. Comme on l'a vu au fil de ce mémoire, à ces échelles on observe une combinaison de processus dynamiques de natures différentes avec en

particulier la manifestation d'une turbulence associée au mouvement équilibrés, la présence d'ondes internes, notamment lié au forçage de la marée, ainsi que des oscillations inertielles en large part forcées par le vent. Il est désormais évident que ces échelles dynamiques jouent un rôle important tant dans la redistribution de l'énergie et de la matière dans l'océan lui-même que dans les interactions de l'océan avec les milieux environnants (atmosphère, cryosphère, biosphère). Ce sont enfin des échelles importantes pour les activités humaines, ce qui justifie un besoin croissant d'observation et de capacité de prévision.

Notre capacité à comprendre les mécanismes physiques qui gouvernent ces échelles dynamiques, leur variabilité ainsi que leurs impacts est en train de changer aujourd'hui avec d'une part les évolutions récentes de la capacité des modèles de circulation mais également les évolutions en cours dans la capacité des réseaux d'observation. Citons notamment sur ce dernier plan, la future mission SWOT mais également la perspective de l'observation directe des courants de surface depuis l'espace par télédétection. Par ailleurs, l'émergence des applications de l'apprentissage automatique en océanographie semble ouvrir un champ de recherche spécifique dans l'étude, la compréhension, l'observation et la modélisation de la circulation océanique à fine échelle, notamment dans les couches de surface de l'océan pour lesquelles on dispose de plus nombreuses sources d'informations.

Objectifs scientifiques

Dans ce contexte, je souhaite concentrer mes activités autour des *processus océaniques de fine échelle*, dans la continuité des inflexions que j'ai données à mon activité au cours des dernières années et en cohérence avec le projet quinquennal de l'équipe MEOM de l'IGE. Je propose m'intéresser en parallèle à la *modélisation* de ces processus, à leur *observation* et à la *compréhension* de leur rôle au sein du système Terre. Les objectifs et l'ambition de ce projet de recherche sont détaillés dans ce qui suit.

A. Mieux modéliser les processus océaniques de fine échelle.

Il s'agit ici de poursuivre le développement des modèles océaniques (notamment le code NEMO) en visant une meilleure prise en compte des processus de fines échelles, tant dans les modèles à haute résolution spatiale que dans les modèles à plus basse résolution. Je propose plus spécifiquement de me concentrer sur les objectifs suivants.

- *Accompagner NEMO vers une résolution effective des processus océaniques d'échelle kilométrique.* L'objet de cet axe de recherche est de poursuivre l'amélioration graduelle de la capacité du modèle NEMO à représenter les processus océaniques de fines échelles (1-200km). En pratique, il s'agit de développer des méthodes robustes permettant d'évaluer la capacité des modèles à résoudre les échelles kilométrique et de poursuivre le développement du code NEMO tant sur les aspects liés aux schémas de discréétisation, de performance HPC que de physique représentée. Cette activité bénéficiera notamment de mon implication dans le CLIVAR-OMDP et des programmes d'observation in-situ de l'initiative SWOT-Adopt-a-crossover.
- *Utiliser les modèles océaniques à haute résolution pour formuler des paramétrisations sous-maille à plus basse résolution.* L'objet de cet axe de recherche est d'aborder de manière systématique la formulation de fermetures sous-maille pour représenter les effets de la dynamique de fine échelle dans les modèles à plus basse résolution. Je souhaite aborder cette question par apprentissage automatique avec des approches permettant de contraindre la physique capturée par les algorithmes d'apprentissage dans la continuité des travaux engagés durant la thèse d'Hugo Frezat.

B. Mieux comprendre l'impact des processus océaniques de fine échelle.

Il s'agit ici d'aborder de poursuivre l'étude des processus d'*upscaling* impliquant les fines échelles océaniques mais sans restreindre ces études aux seules non-linéarité hydrodynamiques. Je propose plus spécifiquement de me concentrer sur les objectifs décrits ci-dessous.

- *Etudier l'impact des fines échelles océaniques sur la circulation océanique de grande échelle.* L'objet de cet axe de recherche est de poursuivre l'étude des interactions d'échelles en se focalisant non seulement sur les échanges d'énergie au travers des échelles mais également sur les interactions entre écoulement ondulatoires et balancés ainsi que sur l'impact des fines échelles sur les processus océaniques d'intérêt climatique (ex : convection, ventilation)
- *Etudier l'impact des fines échelles océaniques sur les interactions de l'océan physique au sein de la machine climatique.* L'objet de cet axe de recherche est d'étudier comment les fines échelles affectent les interactions et les couplages avec les milieux environnant (notamment l'atmosphère, et la cryosphère). Je propose ici de me focaliser en particulier sur les interactions glace de mer-océan à fine échelle dans le contexte du recrutement de Pierre Rampal à l'IGE.

C. Mieux observer et estimer la circulation océanique de fine échelle.

Il s'agit ici de poursuivre mes travaux sur les synergies entre modèles et observations dans le contexte de l'observation spatiale des fines échelles, lors la mission SWOT d'une part mais également à terme en vue de l'observation des courants de surface depuis l'espace. Je propose plus spécifiquement de me concentrer sur les objectifs décrits ci-dessous.

- *Caractériser la dynamique des fines échelles océaniques en vue de leur inversion.* L'objet de cet axe de recherche est d'aborder la description des fines échelles océaniques spécifiquement du point de vue des propriétés qu'il sera clé de connaître et d'exploiter dans les méthodes d'inversion. Ceci recoupe la question de l'étude du lien surface/intérieur, les question de prédictibilité des fines échelles, notamment dans le contexte de la séparation ondes / tourbillons.
- *Développer des méthodes d'inversion en vue de l'observation spatiale des fines échelles océaniques.* L'objet de cet axe de recherche est de contribuer au développement de méthodes d'inversion adaptées aux caractères spécifiques des fines échelles océaniques et à la réalité instrumentale des capteurs considérés (ex : SWOT, STREAM). L'objet est ici en particulier de définir le bon niveau de complexité de ces méthodes et de les informer sur les propriétés dynamiques particulières à respecter ou à prendre en compte. Là encore, ces travaux mettront notamment en oeuvre de l'apprentissage automatique.

Implémentation du projet

L'implémentation du projet décrit ci-dessus s'appuiera sur la méthode de travail que j'ai développé au fil de ma carrière et présenté en introduction. Celle-ci combine la mise en cohérence des objectifs avec mon environnement scientifique immédiat, le développement de collaborations spécifiques, la construction et le pilotage de projet dédiés. Le projet que je propose de mener est ainsi aligné avec le programme scientifique de l'équipe MEOM pour le quinquennat en cours ainsi qu'avec les priorités scientifiques de la société Ocean-Next avec laquelle travaille l'équipe MEOM.

La réalisation de mon projet pour les années à venir bénéficiera notamment des éléments de contexte suivant :

- le contexte du lancement de la mission SWOT et de ma participation à l'équipe scientifique SWOT dans le cadre du projet SWOT Science Team MIDAS;
- le contexte du projet H2020 IMMERSE dont l'activité couvre un part substantielle du projet proposé ci-dessus;

- le réseau de collaborations établies sur le domaine de l'interface océanographie / apprentissage automatique et modélisation numérique / apprentissage automatique;
- l'existence d'Ocean Next dont la croissance probable devrait permettre de renforcer l'équipe grenobloise sur le traitement des données d'altimétrie spatiale;
- le contexte de ma participation au groupe CLIVAR-OMDP (en tant que co-chair auprès de B. Fox Kemper depuis 2020) et de son articulation avec le programme SWOT-Adopt-a-Crossover;
- ma participation à l'initiative PANGEA et mon implication dans le déploiement de ce cadre logiciel sur les machines HPC nationales GENCI.

Enfin il me semble pertinent de noter que plusieurs actions de recherche récemment engagées permettront de mettre en oeuvre ce projet de recherche pour les années à venir. C'est le cas notamment des thèses d'Hugo Frezat et de Quentin Febvre ainsi que des projets JPI MEDLEY (PI: A.M. Treguier), ANR MeLODy (PI: R. Fablet), VESRI M2LINES (PI : L. Zanna/A. Adcroft) qui ont démarré récemment.

Références

1. A numerical investigation of the oceanic general circulation

Kirk Bryan, Michael D. Cox

Tellus (1967-02) <https://doi.org/b4jzk2>

DOI: [10.1111/j.2153-3490.1967.tb01459.x](https://doi.org/j.2153-3490.1967.tb01459.x)

2. A numerical method for the study of the circulation of the world ocean

Kirk Bryan

Journal of Computational Physics (1969-10) <https://doi.org/bp2z7j>

DOI: [10.1016/0021-9991\(69\)90004-7](https://doi.org/10.1016/0021-9991(69)90004-7)

3. General Circulation Models

Eric P. Chassignet, Julien Le Sommer, Alan J. Wallcraft

Elsevier BV (2019) <https://doi.org/ggrm5g>

DOI: [10.1016/b978-0-12-409548-9.11410-1](https://doi.org/10.1016/b978-0-12-409548-9.11410-1)

4. Ocean Circulation Modeling for Operational Oceanography: Current Status and Future Challenges

Julien Le Sommer, Eric P. Chassignet, Alan J. Wallcraft

Florida State University College of Medicine (2018-08-11) <https://doi.org/ggrs49>

DOI: [10.17125/gov2018.ch12](https://doi.org/10.17125/gov2018.ch12)

5. Ocean Circulation Models and Modeling

Stephen M. Griffies, Anne Marie Treguier

International Geophysics (2013) <https://doi.org/gg3z3m>

DOI: [10.1016/b978-0-12-391851-2.00020-9](https://doi.org/10.1016/b978-0-12-391851-2.00020-9)

6. Challenges and Prospects in Ocean Circulation Models

Baylor Fox-Kemper, Alistair Adcroft, Claus W. Böning, Eric P. Chassignet, Enrique Curchitser, Gokhan Danabasoglu, Carsten Eden, Matthew H. England, Rüdiger Gerdes, Richard J. Greatbatch, ... Stephen G. Yeager

Frontiers in Marine Science (2019-02-26) <https://doi.org/gfxzgw>

DOI: [10.3389/fmars.2019.00065](https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00065)

7. Fundamentals of Ocean Climate Models

Stephen M. Griffies

JSTOR (2018-06-05) <https://doi.org/gg3z3t>

DOI: [10.2307/j.ctv301gzg](https://doi.org/10.2307/j.ctv301gzg)

8. Data assimilation in the geosciences: An overview of methods, issues, and perspectives

Alberto Carrassi, Marc Bocquet, Laurent Bertino, Geir Evensen

Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change (2018-09) <https://doi.org/ghnn4t>

DOI: [10.1002/wcc.535](https://doi.org/10.1002/wcc.535)

9. https://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/Final_WWRP_2017_3_27_July.pdf

10. Coupled Data Assimilation for Integrated Earth System Analysis and Prediction

Stephen G. Penny, Thomas M. Hamill

Bulletin of the American Meteorological Society (2017-07-01) <https://doi.org/gg8qxn>

DOI: [10.1175/bams-d-17-0036.1](https://doi.org/10.1175/bams-d-17-0036.1)

11. Toward Seamless Prediction: Calibration of Climate Change Projections Using Seasonal Forecasts

T. N. Palmer, F. J. Doblas-Reyes, A. Weisheimer, M. J. Rodwell

Bulletin of the American Meteorological Society (2008-04) <https://doi.org/b2qnx2>

DOI: [10.1175/bams-89-4-459](https://doi.org/10.1175/bams-89-4-459)

12. A Unified Modeling Approach to Climate System Prediction

James Hurrell, Gerald A. Meehl, David Bader, Thomas L. Delworth, Ben Kirtman, Bruce Wielicki

Bulletin of the American Meteorological Society (2009-12) <https://doi.org/cwxnw8>

DOI: [10.1175/2009bams2752.1](https://doi.org/10.1175/2009bams2752.1)

13. Observing System Evaluation Based on Ocean Data Assimilation and Prediction Systems: On-Going Challenges and a Future Vision for Designing and Supporting Ocean Observational Networks

Yosuke Fujii, Elisabeth Rémy, Hao Zuo, Peter Oke, George Halliwell, Florent Gasparin, Mounir Benkiran, Nora Loose, James Cummings, Jiping Xie, ... Norihisa Usui

Frontiers in Marine Science (2019-07-29) <https://doi.org/gg8s7t>

DOI: [10.3389/fmars.2019.00417](https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00417)

14. Tropical Pacific Observing System

Neville Smith, William S. Kessler, Sophie Cravatte, Janet Sprintall, Susan Wijffels, Meghan F. Cronin, Adrienne Sutton, Yolande L. Serra, Boris Dewitte, Peter G. Strutton, ... Shelby Brunner

Frontiers in Marine Science (2019-02-18) <https://doi.org/gf43qq>

DOI: [10.3389/fmars.2019.00031](https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00031)

15. An Integrated All-Atlantic Ocean Observing System in 2030

Brad deYoung, Martin Visbeck, Moacyr Cunha de Araujo Filho, Molly O'Neil Baringer, CarolAnne Black, Erik Buch, Gabrielle Canonic, Paulo Coelho, Janice T. Duha, Martin Edwards, ... Zdenka Willis

Frontiers in Marine Science (2019-07-26) <https://doi.org/gg8s7m>

DOI: [10.3389/fmars.2019.00428](https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00428)

16. Global Observations of Fine-Scale Ocean Surface Topography With the Surface Water and Ocean Topography (SWOT) Mission

Rosemary Morrow, Lee-Lueng Fu, Fabrice Arduuin, Mounir Benkiran, Bertrand Chapron, Emmanuel Cosme, Francesco d'Ovidio, J. Thomas Farrar, Sarah T. Gille, Guillaume Lapeyre, ... Edward D. Zaron

Frontiers in Marine Science (2019-05-15) <https://doi.org/gf7tps>

DOI: [10.3389/fmars.2019.00232](https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00232)

17. An Observing System Simulation Experiment for Ocean State Estimation to Assess the Performance of the SWOT Mission: Part 1—A Twin Experiment

Zhijin Li, Jinbo Wang, Lee-Lueng Fu

Journal of Geophysical Research: Oceans (2019-07-13) <https://doi.org/gg8s8q>

DOI: [10.1029/2018jc014869](https://doi.org/10.1029/2018jc014869)

18. Contribution of future wide-swath altimetry missions to ocean analysis and forecasting

Antonio Bonaduce, Mounir Benkiran, Elisabeth Remy, Pierre Yves Le Traon, Gilles Garric

Ocean Science (2018-11-16) <https://doi.org/gfp2vf>

DOI: [10.5194/os-14-1405-2018](https://doi.org/10.5194/os-14-1405-2018)

19. Turbulence Closure Models for Computational Fluid Dynamics

Paul A. Durbin

Wiley (2017-12-15) <https://doi.org/gg9c85>

DOI: [10.1002/9781119176817.ecm2061](https://doi.org/10.1002/9781119176817.ecm2061)

20. Large Eddy Simulation for Incompressible Flows: An Introduction

P. Sagaut

Springer-Verlag (2006) <https://www.springer.com/gp/book/9783540263449>

ISBN: [9783540263449](#)

21. Can large eddy simulation techniques improve mesoscale rich ocean models?

B. Fox-Kemper, D. Menemenlis

Geophysical Monograph Series (2008) <https://doi.org/c848cx>

DOI: [10.1029/177gm19](#)

22. Quantifying spatial distribution of spurious mixing in ocean models

Mehmet Ilcak

Ocean Modelling (2016-12) <https://doi.org/f9hc66>

DOI: [10.1016/j.ocemod.2016.11.002](#) · PMID: [28344508](#) · PMCID: [PMC5351820](#)

23. An Exact Thickness-Weighted Average Formulation of the Boussinesq Equations

William R. Young

Journal of Physical Oceanography (2012-05-01) <https://doi.org/dt9cj7>

DOI: [10.1175/jpo-d-11-0102.1](#)

24. A further study of numerical errors in large-eddy simulations

Fotini Katopodes Chow, Parviz Moin

Journal of Computational Physics (2003-01) <https://doi.org/czj94h>

DOI: [10.1016/s0021-9991\(02\)00020-7](#)

25. Comparing Ocean Surface Boundary Vertical Mixing Schemes Including Langmuir Turbulence

Qing Li, Brandon G. Reichl, Baylor Fox-Kemper, Alistair J. Adcroft, Stephen E. Belcher, Gokhan Danabasoglu, Alan L. M. Grant, Stephen M. Griffies, Robert Hallberg, Tetsu Hara, ... Zhihua Zheng

Journal of Advances in Modeling Earth Systems (2019-11-15) <https://doi.org/gg8gst>

DOI: [10.1029/2019ms001810](#)

26. Thermobaricity, cabbeling, and water-mass conversion

Trevor J. McDougall

Journal of Geophysical Research (1987) <https://doi.org/bf88vc>

DOI: [10.1029/jc092ic05p05448](#)

27. Oceanic Stochastic Parameterizations in a Seasonal Forecast System

M. Andrejczuk, F. C. Cooper, S. Juricke, T. N. Palmer, A. Weisheimer, L. Zanna

Monthly Weather Review (2016-05) <https://doi.org/gf3wjg>

DOI: [10.1175/mwr-d-15-0245.1](#)

28. Impact of uncertainties in the horizontal density gradient upon low resolution global ocean modelling

Jean-Michel Brankart

Ocean Modelling (2013-06) <https://doi.org/gg9fqn>

DOI: [10.1016/j.ocemod.2013.02.004](#)

29. Climatologically Significant Effects of Some Approximations in the Bulk Parameterizations of Turbulent Air-Sea Fluxes

Laurent Brodeau, Bernard Barnier, Sergey K. Gulev, Cian Woods

Journal of Physical Oceanography (2017-01-01) <https://doi.org/f3sctf>

DOI: [10.1175/jpo-d-16-0169.1](#)

30. Effects of fluctuating daily surface fluxes on the time-mean oceanic circulation

Balan Sarojini Beena, Jin-Song von Storch

Climate Dynamics (2009-04-23) <https://doi.org/fbr9js>

DOI: [10.1007/s00382-009-0575-y](https://doi.org/10.1007/s00382-009-0575-y)

31. Climatic impacts of stochastic fluctuations in air-sea fluxes

Paul D. Williams

Geophysical Research Letters (2012-05-28) <https://doi.org/gf3wjw>

DOI: [10.1029/2012gl051813](https://doi.org/10.1029/2012gl051813)

32. A framework for parameterization of heterogeneous ocean convection

Mehmet Ilicak, Alistair J. Adcroft, Sonya Legg

Ocean Modelling (2014-10) <https://doi.org/f6jtwv>

DOI: [10.1016/j.ocemod.2014.07.002](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2014.07.002)

33. Universal scaling laws in fully developed turbulence

Zhen-Su She, Emmanuel Leveque

Physical Review Letters (1994-01-17) <https://doi.org/cw9bm4>

DOI: [10.1103/physrevlett.72.336](https://doi.org/10.1103/physrevlett.72.336) · PMID: [10056405](#)

34. Scale-Invariance and Turbulence Models for Large-Eddy Simulation

Charles Meneveau, Joseph Katz

Annual Review of Fluid Mechanics (2000-01) <https://doi.org/d4mw42>

DOI: [10.1146/annurev.fluid.32.1.1](https://doi.org/10.1146/annurev.fluid.32.1.1)

35. North Atlantic simulations in Coordinated Ocean-ice Reference Experiments phase II (CORE-II). Part I: Mean states

Gokhan Danabasoglu, Steve G. Yeager, David Bailey, Erik Behrens, Mats Bentsen, Daohua Bi, Arne Biastoch, Claus Böning, Alexandra Bozec, Vittorio M. Canuto, ... Qiang Wang

Ocean Modelling (2014-01) <https://doi.org/f5m4f3>

DOI: [10.1016/j.ocemod.2013.10.005](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2013.10.005)

36. Spurious AMOC trends in global ocean sea-ice models related to subarctic freshwater forcing

Erik Behrens, Arne Biastoch, Claus W. Böning

Ocean Modelling (2013-09) <https://doi.org/f48hrd>

DOI: [10.1016/j.ocemod.2013.05.004](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2013.05.004)

37. Disentangling the Mesoscale Ocean-Atmosphere Interactions

L. Renault, S. Masson, V. Oerder, S. Jullien, F. Colas

Journal of Geophysical Research: Oceans (2019-03-28) <https://doi.org/gg9z8m>

DOI: [10.1029/2018jc014628](https://doi.org/10.1029/2018jc014628)

38. Impact of Ocean-Atmosphere Current Feedback on Ocean Mesoscale Activity: Regional Variations and Sensitivity to Model Resolution

Swen Jullien, Sébastien Masson, Véra Oerder, Guillaume Samson, François Colas, Lionel Renault

Journal of Climate (2020-04-01) <https://doi.org/gg9z8s>

DOI: [10.1175/jcli-d-19-0484.1](https://doi.org/10.1175/jcli-d-19-0484.1)

39. Remarkable Control of Western Boundary Currents by *Eddy Killing*, a Mechanical Air-Sea Coupling Process

L. Renault, P. Marchesiello, S. Masson, J. C. McWilliams

40. A review of ensemble forecasting techniques with a focus on tropical cyclone forecasting

Kevin KW Cheung

Meteorological Applications (2001-09) <https://doi.org/c34fnb>

DOI: [10.1017/s1350482701003073](https://doi.org/10.1017/s1350482701003073)

41. Roots of Ensemble Forecasting

John M. Lewis

Monthly Weather Review (2005-07-01) <https://doi.org/dxwg3j>

DOI: [10.1175/mwr2949.1](https://doi.org/10.1175/mwr2949.1)

42. Inverse Cascades of Kinetic Energy as a Source of Intrinsic Variability: A Global OGCM Study

Guillaume Sérazin, Thierry Penduff, Bernard Barnier, Jean-Marc Molines, Brian K. Arbic, Malte Müller, Laurent Terray

Journal of Physical Oceanography (2018-06-01) <https://doi.org/gdwm8b>

DOI: [10.1175/jpo-d-17-0136.1](https://doi.org/10.1175/jpo-d-17-0136.1)

43. Sea Level Expression of Intrinsic and Forced Ocean Variabilities at Interannual Time Scales

Thierry Penduff, Mélanie Juza, Bernard Barnier, Jan Zika, William K. Dewar, Anne-Marie Treguier, Jean-Marc Molines, Nicole Audiffren

Journal of Climate (2011-11-01) <https://doi.org/fd9dxf>

DOI: [10.1175/jcli-d-11-00077.1](https://doi.org/10.1175/jcli-d-11-00077.1)

44. Intrinsic Variability of the Atlantic Meridional Overturning Circulation at Interannual-to-Multidecadal Time Scales

Sandy Grégorio, Thierry Penduff, Guillaume Sérazin, Jean-Marc Molines, Bernard Barnier, Joël Hirschi

Journal of Physical Oceanography (2015-07-01) <https://doi.org/gf3wjv>

DOI: [10.1175/jpo-d-14-0163.1](https://doi.org/10.1175/jpo-d-14-0163.1)

45. Intrinsic and Atmospherically Forced Variability of the AMOC: Insights from a Large-Ensemble Ocean Hindcast

Stephanie Leroux, Thierry Penduff, Laurent Bessières, Jean-Marc Molines, Jean-Michel Brankart, Guillaume Sérazin, Bernard Barnier, Laurent Terray

Journal of Climate (2018-02-01) <https://doi.org/gc362w>

DOI: [10.1175/jcli-d-17-0168.1](https://doi.org/10.1175/jcli-d-17-0168.1)

46. A global probabilistic study of the ocean heat content low-frequency variability: Atmospheric forcing versus oceanic chaos

Guillaume Sérazin, Alexandre Jaymond, Stéphanie Leroux, Thierry Penduff, Laurent Bessières, William Llovel, Bernard Barnier, Jean-Marc Molines, Laurent Terray

Geophysical Research Letters (2017-06-16) <https://doi.org/gbnvns>

DOI: [10.1002/2017gl073026](https://doi.org/10.1002/2017gl073026)

47. Chaotic Variability of Ocean: Heat Content Climate-Relevant Features and Observational Implications

Thierry Penduff, Guillaume Sérazin, Stéphanie Leroux, Sally Close, Jean-Marc Molines, Bernard Barnier, Laurent Bessières, Laurent Terray, Guillaume Maze, CNRS

Oceanography (2018-06-01) <https://doi.org/gfzgnm>

DOI: [10.5670/oceanog.2018.210](https://doi.org/10.5670/oceanog.2018.210)

48. Uncertainty and scale interactions in ocean ensembles: From seasonal forecasts to multidecadal climate predictions

L. Zanna, J. M. Brankart, M. Huber, S. Leroux, T. Penduff, P. D. Williams

Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society (2018-11-08) <https://doi.org/gfrhtw>

DOI: [10.1002/qj.3397](https://doi.org/10.1002/qj.3397)

49. Development of a probabilistic ocean modelling system based on NEMO 3.5: application at eddying resolution

Laurent Bessières, Stéphanie Leroux, Jean-Michel Brankart, Jean-Marc Molines, Marie-Pierre Moine, Pierre-Antoine Bourtier, Thierry Penduff, Laurent Terray, Bernard Barnier, Guillaume Sérazin

Geoscientific Model Development (2017-03-10) <https://doi.org/f92ht6>

DOI: [10.5194/gmd-10-1091-2017](https://doi.org/10.5194/gmd-10-1091-2017)

50. Stochastic Parameterization: Toward a New View of Weather and Climate Models

Judith Berner, Ulrich Achatz, Lauriane Batté, Lisa Bengtsson, Alvaro de la Cámara, Hannah M. Christensen, Matteo Colangeli, Danielle R. B. Coleman, Daan Crommelin, Stamen I. Dolaptchiev, ... Jun-Ichi Yano

Bulletin of the American Meteorological Society (2017-03-01) <https://doi.org/gddmj4>

DOI: [10.1175/bams-d-15-00268.1](https://doi.org/10.1175/bams-d-15-00268.1)

51. Modelling climate change: the role of unresolved processes

Paul D Williams

Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences (2005-10-24) <https://doi.org/d45m9d>

DOI: [10.1098/rsta.2005.1676](https://doi.org/10.1098/rsta.2005.1676) · PMID: [16286298](#)

52. A nonlinear dynamical perspective on model error: A proposal for non-local stochastic-dynamic parametrization in weather and climate prediction models

T. N. Palmer

Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society (2001-01) <https://doi.org/dbcv9r>

DOI: [10.1002/qj.49712757202](https://doi.org/10.1002/qj.49712757202)

53. Toward a stochastic parameterization of ocean mesoscale eddies

PierGianLuca Porta Mana, Laure Zanna

Ocean Modelling (2014-07) <https://doi.org/f55czn>

DOI: [10.1016/j.ocemod.2014.04.002](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2014.04.002)

54. Parameterizing subgrid-scale eddy effects using energetically consistent backscatter

Malte F. Jansen, Isaac M. Held

Ocean Modelling (2014-08) <https://doi.org/f6cpn>

DOI: [10.1016/j.ocemod.2014.06.002](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2014.06.002)

55. Introduction. Stochastic physics and climate modelling

T. N Palmer, P. D Williams

Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences (2008-04-29) <https://doi.org/cc8xxw>

DOI: [10.1098/rsta.2008.0059](https://doi.org/10.1098/rsta.2008.0059) · PMID: [18445565](#)

56. A Stochastic Representation of Subgrid Uncertainty for Dynamical Core Development

Aneesh Subramanian, Stephan Juricke, Peter Dueben, Tim Palmer

Bulletin of the American Meteorological Society (2019-06) <https://doi.org/gftgjm>

DOI: [10.1175/bams-d-17-0040.1](https://doi.org/10.1175/bams-d-17-0040.1)

- 57. A generic approach to explicit simulation of uncertainty in the NEMO ocean model**
J.-M. Brankart, G. Candille, F. Garnier, C. Calone, A. Melet, P.-A. Boutrier, P. Brasseur, J. Verron
Geoscientific Model Development (2015-05-04) <https://doi.org/f7d85q>
DOI: [10.5194/gmd-8-1285-2015](https://doi.org/10.5194/gmd-8-1285-2015)
- 58. Stochastic Subgrid-Scale Ocean Mixing: Impacts on Low-Frequency Variability**
Stephan Juricke, Tim N. Palmer, Laure Zanna
Journal of Climate (2017-07) <https://doi.org/gbj9cc>
DOI: [10.1175/jcli-d-16-0539.1](https://doi.org/10.1175/jcli-d-16-0539.1)
- 59. Some neural network applications in environmental sciences. Part I: forward and inverse problems in geophysical remote measurements**
Vladimir M. Krasnopolksky, Helmut Schiller
Neural Networks (2003-04) <https://doi.org/cm4fhf>
DOI: [10.1016/s0893-6080\(03\)00027-3](https://doi.org/10.1016/s0893-6080(03)00027-3)
- 60. Neural network emulations for complex multidimensional geophysical mappings: Applications of neural network techniques to atmospheric and oceanic satellite retrievals and numerical modeling**
Vladimir M. Krasnopolksky
Reviews of Geophysics (2007-09) <https://doi.org/d29p2n>
DOI: [10.1029/2006rg000200](https://doi.org/10.1029/2006rg000200)
- 61. Statistical analysis in climate research**
H. v Storch, Francis W. Zwiers
Cambridge University Press (1999)
ISBN: [9780521450713](https://doi.org/9780521450713)
- 62. Accelerating Eulerian Fluid Simulation With Convolutional Networks**
Jonathan Tompson, Kristofer Schlachter, Pablo Sprechmann, Ken Perlin
arXiv (2017-06-23) <https://arxiv.org/abs/1607.03597>
- 63. Applications of Deep Learning to Ocean Data Inference and Subgrid Parameterization**
Thomas Bolton, Laure Zanna
Journal of Advances in Modeling Earth Systems (2019-01) <https://doi.org/gfsvqg>
DOI: [10.1029/2018ms001472](https://doi.org/10.1029/2018ms001472)
- 64. Data-Driven Equation Discovery of Ocean Mesoscale Closures**
Laure Zanna, Thomas Bolton
Geophysical Research Letters (2020-08-27) <https://doi.org/gg92dh>
DOI: [10.1029/2020gl088376](https://doi.org/10.1029/2020gl088376)
- 65. Deep learning in fluid dynamics**
J. Nathan Kutz
Journal of Fluid Mechanics (2017-01-31) <https://doi.org/gfxr5h>
DOI: [10.1017/jfm.2016.803](https://doi.org/10.1017/jfm.2016.803)
- 66. Data-driven discovery of partial differential equations**
Samuel H. Rudy, Steven L. Brunton, Joshua L. Proctor, J. Nathan Kutz
Science Advances (2017-04-26) <https://doi.org/f97qf9>
DOI: [10.1126/sciadv.1602614](https://doi.org/10.1126/sciadv.1602614) · PMID: [28508044](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28508044/) · PMCID: [PMC5406137](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC5406137/)

67. Neural Ordinary Differential Equations

Ricky T. Q. Chen, Yulia Rubanova, Jesse Bettencourt, David Duvenaud

arXiv(2019-12-17) <https://arxiv.org/abs/1806.07366>

68. Universal Differential Equations for Scientific Machine Learning

Christopher Rackauckas, Yingbo Ma, Julius Martensen, Collin Warner, Kirill Zubov, Rohit Supekar,

Dominic Skinner, Ali Ramadhan, Alan Edelman

arXiv(2020-08-10) <https://arxiv.org/abs/2001.04385>

69. Variational Deep Learning for the Identification and Reconstruction of Chaotic and Stochastic Dynamical Systems from Noisy and Partial Observations

Duong Nguyen, Said Ouala, Lucas Drumetz, Ronan Fablet

arXiv(2020-10-01) <https://arxiv.org/abs/2009.02296>

70. 70 years of machine learning in geoscience in review

Jesper Sören Dramsch

arXiv(2020-09-30) <https://arxiv.org/abs/2006.13311>

DOI: [10.1016/bs.agph.2020.08.002](https://doi.org/bs.agph.2020.08.002)

71. Computational intelligence in earth sciences and environmental applications: Issues and challenges

V. Cherkassky, V. Krasnopolksky, D. P. Solomatine, J. Valdes

Neural Networks(2006-03) <https://doi.org/fvjszk>

DOI: [10.1016/j.neunet.2006.01.001](https://doi.org/j.neunet.2006.01.001) · PMID: [16527457](#)

72. A neural network technique to improve computational efficiency of numerical oceanic models

Vladimir M. Krasnopolksky, Dmitry V. Chalikov, Hendrik L. Tolman

Ocean Modelling(2002-06) <https://doi.org/bcq5xk>

DOI: [10.1016/s1463-5003\(02\)00010-0](https://doi.org/s1463-5003(02)00010-0)

73. Complex hybrid models combining deterministic and machine learning components for numerical climate modeling and weather prediction

Vladimir M. Krasnopolksky, Michael S. Fox-Rabinovitz

Neural Networks(2006-03) <https://doi.org/b2cxfn>

DOI: [10.1016/j.neunet.2006.01.002](https://doi.org/j.neunet.2006.01.002) · PMID: [16527454](#)

74. Avoid boring people: lessons from a life in science

James D. Watson

Oxford University Press(2007)

ISBN: [9780192802736](#)

75. Rôle des tourbillons océaniques dans la variabilité récente des flux air-mer de CO₂ dans l'océan Austral

Carolina Dufour

Université de Grenoble(2011-12-06) <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00679918>

76. Southern Ocean

Lynne D. Talley, George L. Pickard, William J. Emery, James H. Swift

Elsevier BV(2011) <https://doi.org/ghqvns>

DOI: [10.1016/b978-0-7506-4552-2.10013-7](https://doi.org/b978-0-7506-4552-2.10013-7)

77. The dynamical balance, transport and circulation of the Antarctic Circumpolar Current

DIRK OLBERS, DANIEL BOROWSKI, CHRISTOPH VÖLKER, JORG-OLAF WÖLFF

Antarctic Science (2004-11-30) <https://doi.org/bzcnwm>

DOI: [10.1017/s0954102004002251](https://doi.org/10.1017/s0954102004002251)

78. The Antarctic Circumpolar Current as a free equivalent-barotropic jet

Peter D. Killworth, Chris W. Hughes

Journal of Marine Research (2002-01-01) <https://doi.org/cgt33r>

DOI: [10.1357/002224002762341230](https://doi.org/10.1357/002224002762341230)

79. Closure of the meridional overturning circulation through Southern Ocean upwelling

John Marshall, Kevin Speer

Nature Geoscience (2012-02-26) <https://doi.org/gf7sc5>

DOI: [10.1038/ngeo1391](https://doi.org/10.1038/ngeo1391)

80. Subantarctic Mode Water Formation, Destruction, and Export in the Eddy-Permitting Southern Ocean State Estimate

Ivana Cerovečki, Lynne D. Talley, Matthew R. Mazloff, Guillaume Maze

Journal of Physical Oceanography (2013-07-01) <https://doi.org/f5n65x>

DOI: [10.1175/jpo-d-12-0121.1](https://doi.org/10.1175/jpo-d-12-0121.1)

81. Bottom water production and its links with the thermohaline circulation

STANLEY S. JACOBS

Antarctic Science (2004-11-30) <https://doi.org/cf7hht>

DOI: [10.1017/s095410200400224x](https://doi.org/10.1017/s095410200400224x)

82. A model of the upper branch of the meridional overturning of the southern ocean

John Marshall, Timour Radko

Progress in Oceanography (2006-08) <https://doi.org/bnk743>

DOI: [10.1016/j.pocean.2006.07.004](https://doi.org/10.1016/j.pocean.2006.07.004)

83. Control of Lower-Limb Overturning Circulation in the Southern Ocean by Diapycnal Mixing and Mesoscale Eddy Transfer

Taka Ito, John Marshall

Journal of Physical Oceanography (2008-12-01) <https://doi.org/bhrz2p>

DOI: [10.1175/2008jpo3878.1](https://doi.org/10.1175/2008jpo3878.1)

84. Southern Ocean overturning across streamlines in an eddying simulation of the Antarctic Circumpolar Current

A. M. Treguier, M. H. England, S. R. Rintoul, G. Madec, J. Le Sommer, J.-M. Molines

Ocean Science (2007-12-19) <https://doi.org/bgj3vz>

DOI: [10.5194/os-3-491-2007](https://doi.org/10.5194/os-3-491-2007)

85. The Southern Ocean, carbon and climate

Andrew J. Watson, Michael P. Meredith, John Marshall

Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences (2014-07-13) <https://doi.org/ghq4w7>

DOI: [10.1098/rsta.2013.0057](https://doi.org/10.1098/rsta.2013.0057) · PMID: [24891393](#) · PMCID: [PMC4032511](#)

86. Role of the Southern Ocean in setting the Atlantic stratification and meridional overturning circulation

Igor Kamenkovich, Timour Radko

87. Oceanic sources, sinks, and transport of atmospheric CO₂

Nicolas Gruber, Manuel Gloor, Sara E. Mikaloff Fletcher, Scott C. Doney, Stephanie Dutkiewicz, Michael J. Follows, Markus Gerber, Andrew R. Jacobson, Fortunat Joos, Keith Lindsay, ... Taro Takahashi

Global Biogeochemical Cycles (2009-03) <https://doi.org/cf59hc>

DOI: [10.1029/2008gb003349](https://doi.org/10.1029/2008gb003349)

88. The Southern Ocean in the Earth System

Stephen R. Rintoul

Smithsonian Institution (2011) <https://doi.org/c4hdqr>

DOI: [10.5479/si.9781935623069.175](https://doi.org/10.5479/si.9781935623069.175)

89. Dynamics of the Southern Ocean Circulation

Stephen R. Rintoul, Alberto C. Naveira Garabato

International Geophysics (2013) <https://doi.org/ghrbmz>

DOI: [10.1016/b978-0-12-391851-2.00018-0](https://doi.org/10.1016/b978-0-12-391851-2.00018-0)

90. The Southern Ocean Observing System: initial science and implementation strategy

Stephen R. Rintoul, Scientific Committee on Antarctic Research, International Council of Scientific Unions (éditeurs)

Scientific Committee on Antarctic Research (2012)

ISBN: [9780948277276](https://doi.org/9780948277276)

91. The response of the Antarctic Circumpolar Current to recent climate change

C. W. Böning, A. Dispert, M. Visbeck, S. R. Rintoul, F. U. Schwarzkopf

Nature Geoscience (2008-11-23) <https://doi.org/d69xjt>

DOI: [10.1038/ngeo362](https://doi.org/10.1038/ngeo362)

92. Warming of the Southern Ocean Since the 1950s

S. T. Gille

Science (2002-02-15) <https://doi.org/d7zst8>

DOI: [10.1126/science.1065863](https://doi.org/10.1126/science.1065863) · PMID: [11847337](#)

93. Decadal-Scale Temperature Trends in the Southern Hemisphere Ocean

Sarah T. Gille

Journal of Climate (2008-09-15) <https://doi.org/bszvtb>

DOI: [10.1175/2008jcli2131.1](https://doi.org/10.1175/2008jcli2131.1)

94. Frontal movements and property fluxes: Contributions to heat and freshwater trends in the Southern Ocean

A. J. S. Meijers, N. L. Bindoff, S. R. Rintoul

Journal of Geophysical Research (2011-08-23) <https://doi.org/c9j6nv>

DOI: [10.1029/2010jc006832](https://doi.org/10.1029/2010jc006832)

95. Warming and Freshening in the Abyssal Southeastern Indian Ocean*

Gregory C. Johnson, Sarah G. Purkey, John L. Bullister

Journal of Climate (2008-10-15) <https://doi.org/fmr6dk>

DOI: [10.1175/2008jcli2384.1](https://doi.org/10.1175/2008jcli2384.1)

96. Antarctic Bottom Water Warming and Freshening: Contributions to Sea Level Rise, Ocean Freshwater Budgets, and Global Heat Gain*

Sarah G. Purkey, Gregory C. Johnson

Journal of Climate (2013-08-15) <https://doi.org/kr6>

DOI: [10.1175/jcli-d-12-00834.1](https://doi.org/10.1175/jcli-d-12-00834.1)

97. On the Variability of Antarctic Circumpolar Current Fronts Inferred from 1992–2011 Altimetry*

Yong Sun Kim, Alejandro H. Orsi

Journal of Physical Oceanography (2014-12-01) <https://doi.org/ghrfjg>

DOI: [10.1175/jpo-d-13-0217.1](https://doi.org/10.1175/jpo-d-13-0217.1)

98. Recent trends in the Southern Ocean eddy field

Andrew McC. Hogg, Michael P. Meredith, Don P. Chambers, E. Povl Abrahamsen, Chris W. Hughes, Adele K. Morrison

Journal of Geophysical Research: Oceans (2015-01) <https://doi.org/ghrfjj>

DOI: [10.1002/2014jc010470](https://doi.org/10.1002/2014jc010470)

99. Detection and Attribution of Climate Change: from Global to Regional

Cambridge University Press (CUP)

(2014-06-09) <https://doi.org/ghrfjd>

DOI: [10.1017/cbo9781107415324.022](https://doi.org/10.1017/cbo9781107415324.022)

100. Changes in the ocean transport through Drake Passage during the 1980s and 1990s, forced by changes in the Southern Annular Mode

Michael P. Meredith, Philip L. Woodworth, Chris W. Hughes, Vladimir Stepanov

Geophysical Research Letters (2004-11) <https://doi.org/d64dkr>

DOI: [10.1029/2004gl021169](https://doi.org/10.1029/2004gl021169)

101. Changes in the ventilation of the southern oceans

Darryn W. Waugh

Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences

(2014-07-13) <https://doi.org/f59ht3>

DOI: [10.1098/rsta.2013.0269](https://doi.org/10.1098/rsta.2013.0269) · PMID: [24891397](#)

102. Freshening drives contraction of Antarctic Bottom Water in the Australian Antarctic Basin

Esmee M. van Wijk, Stephen R. Rintoul

Geophysical Research Letters (2014-03-16) <https://doi.org/f5x9ff>

DOI: [10.1002/2013gl058921](https://doi.org/10.1002/2013gl058921)

103. Trends in the sea ice cover using enhanced and compatible AMSR-E, SSM/I, and SMMR data

Josefino C. Comiso, Fumihiko Nishio

Journal of Geophysical Research (2008-02-22) <https://doi.org/fwfrm3>

DOI: [10.1029/2007jc004257](https://doi.org/10.1029/2007jc004257)

104. Antarctic sea ice variability and trends, 1979–2010

C. L. Parkinson, D. J. Cavalieri

The Cryosphere (2012-08-15) <https://doi.org/gb9p2z>

DOI: [10.5194/tc-6-871-2012](https://doi.org/10.5194/tc-6-871-2012)

105. Non-annular atmospheric circulation change induced by stratospheric ozone depletion and its role in the recent increase of Antarctic sea ice extent

John Turner, Josefino C. Comiso, Gareth J. Marshall, Tom A. Lachlan-Cope, Tom Bracegirdle, Ted

Maksym, Michael P. Meredith, Zhaomin Wang, Andrew Orr
Geophysical Research Letters (2009-04-23) <https://doi.org/cx567g>
DOI: [10.1029/2009gl037524](https://doi.org/10.1029/2009gl037524)

106. The Changing Carbon Cycle in the Southern Ocean

Taro Takahashi, Colm Sweeney, Burke Hales, David Chipman, Timothy Newberger, John Goddard, Richard Iannuzzi, Stewart Sutherland
Oceanography (2012-09-01) <https://doi.org/f4bpqs>
DOI: [10.5670/oceanog.2012.71](https://doi.org/10.5670/oceanog.2012.71)

107. Decreasing pH trend estimated from 35-year time series of carbonate parameters in the Pacific sector of the Southern Ocean in summer

Takashi Midorikawa, Hisayuki Y. Inoue, Masao Ishii, Daisuke Sasano, Naohiro Kosugi, Gen Hashida, Shin-ichiro Nakaoka, Toru Suzuki
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers (2012-03) <https://doi.org/bgg3qt>
DOI: [10.1016/j.dsr.2011.12.003](https://doi.org/10.1016/j.dsr.2011.12.003)

108. Trends and drivers in global surface ocean pH over the past 3 decades

S. K. Lauvset, N. Gruber, P. Landschützer, A. Olsen, J. Tjiputra
Biogeosciences (2015-03-02) <https://doi.org/f65n48>
DOI: [10.5194/bg-12-1285-2015](https://doi.org/10.5194/bg-12-1285-2015)

109. Rapid climatic driven shifts of diatoms at high latitudes

Séverine Alvain, Corinne Le Quéré, Laurent Bopp, Marie-Fanny Racault, Grégory Beaugrand, David Dessailly, Eric T. Buitenhuis
Remote Sensing of Environment (2013-05) <https://doi.org/f4s542>
DOI: [10.1016/j.rse.2013.01.014](https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.01.014)

110. Antarctic Futures: An Assessment of Climate-Driven Changes in Ecosystem Structure, Function, and Service Provisioning in the Southern Ocean

A. D. Rogers, B. A. V. Frinault, D. K. A. Barnes, N. L. Bindoff, R. Downie, H. W. Ducklow, A. S. Friedlaender, T. Hart, S. L. Hill, E. E. Hofmann, ... R. M. Wright
Annual Review of Marine Science (2020-01-03) <https://doi.org/ghhk53>
DOI: [10.1146/annurev-marine-010419-011028](https://doi.org/10.1146/annurev-marine-010419-011028) · PMID: [31337252](#)

111. Signatures of the Antarctic ozone hole in Southern Hemisphere surface climate change

David W. J. Thompson, Susan Solomon, Paul J. Kushner, Matthew H. England, Kevin M. Grise, David J. Karoly
Nature Geoscience (2011-10-23) <https://doi.org/fqzqm8>
DOI: [10.1038/ngeo1296](https://doi.org/10.1038/ngeo1296)

112. The Role of Eddies in Determining the Structure and Response of the Wind-Driven Southern Hemisphere Overturning: Results from the Modeling Eddies in the Southern Ocean (MESO) Project

Robert Hallberg, Anand Gnanadesikan
Journal of Physical Oceanography (2006-12-01) <https://doi.org/fdpnrt>
DOI: [10.1175/jpo2980.1](https://doi.org/10.1175/jpo2980.1)

113. Standing and Transient Eddies in the Response of the Southern Ocean Meridional Overturning to the Southern Annular Mode

C. O. Dufour, J. Le Sommer, J. D. Zika, M. Gehlen, J. C. Orr, P. Mathiot, B. Barnier
Journal of Climate (2012-10-15) <https://doi.org/f4b9c2>
DOI: [10.1175/jcli-d-11-00309.1](https://doi.org/10.1175/jcli-d-11-00309.1)

114. Vertical Eddy Fluxes in the Southern Ocean

Jan D. Zika, Julien Le Sommer, Carolina O. Dufour, Jean-Marc Molines, Bernard Barnier, Pierre Brasseur, Raphaël Dussin, Thierry Penduff, Daniele ludicone, Andrew Lenton, ... Frederic Vivier
Journal of Physical Oceanography (2013-05-01) <https://doi.org/f4zhn4>
DOI: [10.1175/jpo-d-12-0178.1](https://doi.org/10.1175/jpo-d-12-0178.1)

115. Isopycnal Averaging at Constant Height. Part I: The Formulation and a Case Study

A. J. George Nurser, Mei-Man Lee
Journal of Physical Oceanography (2004-12-01) <https://doi.org/dz7f47>
DOI: [10.1175/jpo2649.1](https://doi.org/10.1175/jpo2649.1)

116. Thermodynamic Analysis of Ocean Circulation

J. Nylander, J. Nilsson, K. Döös, G. Broström
Journal of Physical Oceanography (2007-08-01) <https://doi.org/fwddxs>
DOI: [10.1175/jpo3113.1](https://doi.org/10.1175/jpo3113.1)

117. Eddy compensation and controls of the enhanced sea-to-air CO₂ flux during positive phases of the Southern Annular Mode

Carolina O. Dufour, Julien Le Sommer, Marion Gehlen, James C. Orr, Jean-Marc Molines, Jennifer Simeon, Bernard Barnier
Global Biogeochemical Cycles (2013-09-23) <https://doi.org/f5dqsm>
DOI: [10.1002/gbc.20090](https://doi.org/10.1002/gbc.20090)

118. Saturation of the Southern Ocean CO₂ Sink Due to Recent Climate Change

C. Le Quere, C. Rodenbeck, E. T. Buitenhuis, T. J. Conway, R. Langenfelds, A. Gomez, C. Labuschagne, M. Ramonet, T. Nakazawa, N. Metzl, ... M. Heimann
Science (2007-06-22) <https://doi.org/fctrq9>
DOI: [10.1126/science.1136188](https://doi.org/10.1126/science.1136188) · PMID: [17510327](#)

119. Zonally asymmetric response of the Southern Ocean mixed-layer depth to the Southern Annular Mode

J. B. Sallée, K. G. Speer, S. R. Rintoul
Nature Geoscience (2010-03-14) <https://doi.org/cfk27b>
DOI: [10.1038/ngeo812](https://doi.org/10.1038/ngeo812)

120. Stationary Rossby waves dominate subduction of anthropogenic carbon in the Southern Ocean

C. E. Langlais, A. Lenton, R. Matear, D. Monselesan, B. Legresy, E. Cougnon, S. Rintoul
Scientific Reports (2017-12-06) <https://doi.org/gg4mww>
DOI: [10.1038/s41598-017-17292-3](https://doi.org/10.1038/s41598-017-17292-3) · PMID: [29213120](#) · PMCID: [PMC5719014](#)

121. Acceleration of the Antarctic Circumpolar Current by Wind Stress along the Coast of Antarctica

Jan D. Zika, Julien Le Sommer, Carolina O. Dufour, Alberto Naveira-Garabato, Adam Blaker
Journal of Physical Oceanography (2013-12-01) <https://doi.org/f5jjds>
DOI: [10.1175/jpo-d-13-091.1](https://doi.org/10.1175/jpo-d-13-091.1)

122. Mechanisms Maintaining Southern Ocean Meridional Heat Transport under Projected Wind Forcing

Paul Spence, Oleg A. Saenko, Carolina O. Dufour, Julien Le Sommer, Matthew H. England
Journal of Physical Oceanography (2012-11-01) <https://doi.org/f4d42m>
DOI: [10.1175/jpo-d-12-03.1](https://doi.org/10.1175/jpo-d-12-03.1)

123. Multi-grid algorithm for passive tracer transport in the NEMO ocean circulation model: a case study with the NEMO OGCM (version 3.6)

Clément Bricaud, Julien Le Sommer, Gurvan Madec, Christophe Calone, Julie Deshayes, Christian Ethe, Jérôme Chanut, Marina Levy

Geoscientific Model Development (2020-11-10) <https://doi.org/ghnn4x>

DOI: [10.5194/gmd-13-5465-2020](https://doi.org/10.5194/gmd-13-5465-2020)

124. Réponse des masses d'eau intermédiaires et modales de l'océan Austral au mode annulaire austral : les processus en jeu et rôle de la glace de mer

Gildas Mainsant

Université Grenoble Alpes (2014-11-28) <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01551769>

125. Ocean / Ice sheet interactions : toward a coupled model system

Nacho Merino

Université Grenoble Alpes (2016-12-02) <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01760438>

126. Change and Variability in East Antarctic Sea Ice Seasonality, 1979/80–2009/10

Robert Massom, Philip Reid, Sharon Stammerjohn, Ben Raymond, Alexander Fraser, Shuki Ushio

PLoS ONE (2013-05-21) <https://doi.org/ghqn9c>

DOI: [10.1371/journal.pone.0064756](https://doi.org/journal.pone.0064756) · PMID: [23705008](#) · PMCID: [PMC3660359](#)

127. A model reconstruction of the Antarctic sea ice thickness and volume changes over 1980–2008 using data assimilation

François Massonnet, Pierre Mathiot, Thierry Fichefet, Hugues Goosse, Christof König Beatty, Martin Vancoppenolle, Thomas Lavergne

Ocean Modelling (2013-04) <https://doi.org/f4rjdh>

DOI: [10.1016/j.ocemod.2013.01.003](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2013.01.003)

128. Antarctic icebergs melt over the Southern Ocean: Climatology and impact on sea ice

Nacho Merino, Julien Le Sommer, Gael Durand, Nicolas C. Jourdain, Gurvan Madec, Pierre Mathiot, Jean Tournadre

Ocean Modelling (2016-08) <https://doi.org/f8xcj4>

DOI: [10.1016/j.ocemod.2016.05.001](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2016.05.001)

129. Calving fluxes and basal melt rates of Antarctic ice shelves

M. A. Depoorter, J. L. Bamber, J. A. Griggs, J. T. M. Lenaerts, S. R. M. Ligtenberg, M. R. van den Broeke, G. Moholdt

Nature (2013-09-15) <https://doi.org/gc6v48>

DOI: [10.1038/nature12567](https://doi.org/10.1038/nature12567) · PMID: [24037377](#)

130. JRA-55 based surface dataset for driving ocean-sea-ice models (JRA55-do)

Hiroyuki Tsujino, Shogo Urakawa, Hideyuki Nakano, R. Justin Small, Who M. Kim, Stephen G. Yeager, Gokhan Danabasoglu, Tatsuo Suzuki, Jonathan L. Bamber, Mats Bentsen, ... Dai Yamazaki
Ocean Modelling (2018-10) <https://doi.org/gfcvn6>

DOI: [10.1016/j.ocemod.2018.07.002](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2018.07.002)

131. Impact of increasing antarctic glacial freshwater release on regional sea-ice cover in the Southern Ocean

Nacho Merino, Nicolas C. Jourdain, Julien Le Sommer, Hugues Goosse, Pierre Mathiot, Gael Durand
Ocean Modelling (2018-01) <https://doi.org/gcq7hs>

DOI: [10.1016/j.ocemod.2017.11.009](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2017.11.009)

- 132. NEMO-ICB (v1.0): interactive icebergs in the NEMO ocean model globally configured at eddy-permitting resolution**
R. Marsh, V. O. Ivchenko, N. Skliris, S. Alderson, G. R. Bigg, G. Madec, A. T. Blaker, Y. Aksenov, B. Sinha, A. C. Coward, ... V. B. Zalesny
Geoscientific Model Development (2015-05-27) <https://doi.org/gb9m8n>
DOI: [10.5194/gmd-8-1547-2015](https://doi.org/10.5194/gmd-8-1547-2015)
- 133. Using Vertically Integrated Ocean Fields to Characterize Greenland Icebergs' Distribution and Lifetime**
Juliana M. Marson, Paul G. Myers, Xianmin Hu, Julien Le Sommer
Geophysical Research Letters (2018-05-16) <https://doi.org/gdjx8w>
DOI: [10.1029/2018gl077676](https://doi.org/10.1029/2018gl077676)
- 134. Ocean circulation and sea-ice thinning induced by melting ice shelves in the Amundsen Sea**
Nicolas C. Jourdain, Pierre Mathiot, Nacho Merino, Gaël Durand, Julien Le Sommer, Paul Spence, Pierre Dutrieux, Gurvan Madec
Journal of Geophysical Research: Oceans (2017-03) <https://doi.org/f97pkb>
DOI: [10.1002/2016jc012509](https://doi.org/10.1002/2016jc012509)
- 135. Ice-Shelf Melt Response to Changing Winds and Glacier Dynamics in the Amundsen Sea Sector, Antarctica**
Marion Donat-Magnin, Nicolas C. Jourdain, Paul Spence, Julien Le Sommer, Hubert Gallée, Gaël Durand
Journal of Geophysical Research: Oceans (2017-12-29) <https://doi.org/gcwz24>
DOI: [10.1002/2017jc013059](https://doi.org/10.1002/2017jc013059)
- 136. Simulating or prescribing the influence of tides on the Amundsen Sea ice shelves**
Nicolas C. Jourdain, Jean-Marc Molines, Julien Le Sommer, Pierre Mathiot, Jérôme Chanut, Casimir de Lavergne, Gurvan Madec
Ocean Modelling (2019-01) <https://doi.org/ggrw3c>
DOI: [10.1016/j.ocemod.2018.11.001](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2018.11.001)
- 137. Cross-scale interactions and turbulent cascades in the North Atlantic Ocean**
Adekunle Ajayi
Université Grenoble Alpes [2020-....] (2020-01-13) <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02861906>
- 138. An Introduction to Ocean Turbulence**
S. A. Thorpe
Cambridge University Press (CUP) (2007) <https://doi.org/ggm2ks>
DOI: [10.1017/cbo9780511801198](https://doi.org/10.1017/cbo9780511801198)
- 139. RECENT DEVELOPMENTS IN THE STUDY OF OCEAN TURBULENCE**
S. A. Thorpe
Annual Review of Earth and Planetary Sciences (2004-05-19) <https://doi.org/bnbcpp>
DOI: [10.1146/annurev.earth.32.071603.152635](https://doi.org/10.1146/annurev.earth.32.071603.152635)
- 140. Turning Ocean Mixing Upside Down**
Raffaele Ferrari, Ali Mashayek, Trevor J. McDougall, Maxim Nikurashin, Jean-Michael Campin
Journal of Physical Oceanography (2016-07-01) <https://doi.org/f8xsfr>
DOI: [10.1175/jpo-d-15-0244.1](https://doi.org/10.1175/jpo-d-15-0244.1)

141. Closing the energy cycle in an ocean model

Carsten Eden

Ocean Modelling (2016-05) <https://doi.org/f8k6nb>

DOI: [10.1016/j.ocemod.2016.02.005](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2016.02.005)

142. The Mechanical Energy Budget of a Regional Ocean Model

Parker MacCready, Sarah N. Giddings

Journal of Physical Oceanography (2016-09-01) <https://doi.org/f85nz2>

DOI: [10.1175/jpo-d-16-0086.1](https://doi.org/10.1175/jpo-d-16-0086.1)

143. Ocean Circulation Kinetic Energy: Reservoirs, Sources, and Sinks

Raffaele Ferrari, Carl Wunsch

Annual Review of Fluid Mechanics (2009-01) <https://doi.org/b5vj2s>

DOI: [10.1146/annurev.fluid.40.111406.102139](https://doi.org/10.1146/annurev.fluid.40.111406.102139)

144. Routes to energy dissipation for geostrophic flows in the Southern Ocean

Maxim Nikurashin, Geoffrey K. Vallis, Alistair Adcroft

Nature Geoscience (2012-12-21) <https://doi.org/gg4m4q>

DOI: [10.1038/ngeo1657](https://doi.org/10.1038/ngeo1657)

145. VERTICAL MIXING, ENERGY, AND THE GENERAL CIRCULATION OF THE OCEANS

Carl Wunsch, Raffaele Ferrari

Annual Review of Fluid Mechanics (2004-01) <https://doi.org/dwhkmj>

DOI: [10.1146/annurev.fluid.36.050802.122121](https://doi.org/10.1146/annurev.fluid.36.050802.122121)

146. Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics

Geoffrey K. Vallis

Cambridge University Press (CUP) (2017) <https://doi.org/gg4m38>

DOI: [10.1017/9781107588417](https://doi.org/10.1017/9781107588417)

147. SATELLITE ALTIMETRY, THE MARINE GEOID, AND THE OCEANIC GENERAL CIRCULATION

Carl Wunsch, Detlef Stammer

Annual Review of Earth and Planetary Sciences (1998-05) <https://doi.org/fkmn6c>

DOI: [10.1146/annurev.earth.26.1.219](https://doi.org/10.1146/annurev.earth.26.1.219)

148. Direct Evidence of an Oceanic Inverse Kinetic Energy Cascade from Satellite Altimetry

Robert B. Scott, Faming Wang

Journal of Physical Oceanography (2005-09-01) <https://doi.org/b9dpbk>

DOI: [10.1175/jpo2771.1](https://doi.org/10.1175/jpo2771.1)

149. Surface Ocean Enstrophy, Kinetic Energy Fluxes, and Spectra From Satellite Altimetry

Hemant Khatri, Jai Sukhatme, Abhishek Kumar, Mahendra K. Verma

Journal of Geophysical Research: Oceans (2018-05-26) <https://doi.org/gdvgqb>

DOI: [10.1029/2017jc013516](https://doi.org/10.1029/2017jc013516)

150. Spectral Energy Fluxes in Geostrophic Turbulence: Implications for Ocean Energetics

Robert B. Scott, Brian K. Arbic

Journal of Physical Oceanography (2007-03-01) <https://doi.org/bnv7xg>

DOI: [10.1175/jpo3027.1](https://doi.org/10.1175/jpo3027.1)

151. Scales, Growth Rates, and Spectral Fluxes of Baroclinic Instability in the Ocean

Ross Tulloch, John Marshall, Chris Hill, K. Shafer Smith

Journal of Physical Oceanography (2011-06-01) <https://doi.org/bk5926>
DOI: [10.1175/2011jpo4404.1](https://doi.org/10.1175/2011jpo4404.1)

152. Diagnosing the energy cascade in a model of the North Atlantic

F. Schlösser, C. Eden
Geophysical Research Letters (2007-01-18) <https://doi.org/bkj4z5>
DOI: [10.1029/2006gl027813](https://doi.org/10.1029/2006gl027813)

153. The Impact of Horizontal Resolution on Energy Transfers in Global Ocean Models

Joakim Kjellsson, Laure Zanna
Fluids (2017-08-28) <https://doi.org/gg4m4g>
DOI: [10.3390/fluids2030045](https://doi.org/10.3390/fluids2030045)

154. Ocean Eddy Energetics in the Spectral Space as Revealed by High-Resolution General Circulation Models

Shengpeng Wang, Zhao Jing, Qiuying Zhang, Ping Chang, Zhaohui Chen, Hailong Liu, Lixin Wu
Journal of Physical Oceanography (2019-11) <https://doi.org/gg4m4m>
DOI: [10.1175/jpo-d-19-0034.1](https://doi.org/10.1175/jpo-d-19-0034.1)

155. Ocean-Scale Interactions From Space

Patrice Klein, Guillaume Lapeyre, Lia Siegelman, Bo Qiu, Lee-Lueng Fu, Hector Torres, Zhan Su, Dimitris Menemenlis, Sylvie Le Gentil
Earth and Space Science (2019-05-22) <https://doi.org/ghqb3b>
DOI: [10.1029/2018ea000492](https://doi.org/10.1029/2018ea000492)

156. Seasonal Mesoscale and Submesoscale Eddy Variability along the North Pacific Subtropical Countercurrent

Bo Qiu, Shuiming Chen, Patrice Klein, Hideharu Sasaki, Yoshikazu Sasai
Journal of Physical Oceanography (2014-12-01) <https://doi.org/f6rxwh>
DOI: [10.1175/jpo-d-14-0071.1](https://doi.org/10.1175/jpo-d-14-0071.1)

157. Regionality and seasonality of submesoscale and mesoscale turbulence in the North Pacific Ocean

Hideharu Sasaki, Patrice Klein, Yoshikazu Sasai, Bo Qiu
Ocean Dynamics (2017-07-13) <https://doi.org/gbsw34>
DOI: [10.1007/s10236-017-1083-y](https://doi.org/10.1007/s10236-017-1083-y)

158. Stimulated Imbalance and the Enhancement of Eddy Kinetic Energy Dissipation by Internal Waves

Roy Barkan, Kraig B. Winters, James C. McWilliams
Journal of Physical Oceanography (2017-01-01) <https://doi.org/f9qsxn>
DOI: [10.1175/jpo-d-16-0117.1](https://doi.org/10.1175/jpo-d-16-0117.1)

159. Routes to Dissipation under Different Dynamical Conditions

Nils Brüggemann, Carsten Eden
Journal of Physical Oceanography (2015-08-01) <https://doi.org/f7nsbc>
DOI: [10.1175/jpo-d-14-0205.1](https://doi.org/10.1175/jpo-d-14-0205.1)

160. Mesoscale to Submesoscale Transition in the California Current System. Part III: Energy Balance and Flux

X. Capet, J. C. McWilliams, M. J. Molemaker, A. F. Shchepetkin
Journal of Physical Oceanography (2008-10-01) <https://doi.org/fvt3bq>
DOI: [10.1175/2008jpo3810.1](https://doi.org/10.1175/2008jpo3810.1)

161. Impact of oceanic-scale interactions on the seasonal modulation of ocean dynamics by the atmosphere

Hideharu Sasaki, Patrice Klein, Bo Qiu, Yoshikazu Sasai

Nature Communications (2014-12-15) <https://doi.org/f6vkpf>

DOI: [10.1038/ncomms6636](https://doi.org/10.1038/ncomms6636) · PMID: [25501039](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25501039/) · PMCID: [PMC4275589](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC4275589/)

162. Seasonality of submesoscale dynamics in the Kuroshio Extension

Cesar B. Rocha, Sarah T. Gille, Teresa K. Chereskin, Dimitris Menemenlis

Geophysical Research Letters (2016-11-16) <https://doi.org/f9frx3>

DOI: [10.1002/2016gl071349](https://doi.org/10.1002/2016gl071349)

163. The seasonal cycle of submesoscale flows

Liam Brannigan, David P. Marshall, Alberto Naveira-Garabato, A. J. George Nurser

Ocean Modelling (2015-08) <https://doi.org/ghqh9g>

DOI: [10.1016/j.ocemod.2015.05.002](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2015.05.002)

164. Seasonality in submesoscale turbulence

Jörn Callies, Raffaele Ferrari, Jody M. Klymak, Jonathan Gula

Nature Communications (2015-04-21) <https://doi.org/f696rj>

DOI: [10.1038/ncomms7862](https://doi.org/10.1038/ncomms7862) · PMID: [25897832](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25897832/) · PMCID: [PMC4410631](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC4410631/)

165. Open-Ocean Submesoscale Motions: A Full Seasonal Cycle of Mixed Layer Instabilities from Gliders

Andrew F. Thompson, Ayah Lazar, Christian Buckingham, Alberto C. Naveira Garabato, Gillian M. Damerell, Karen J. Heywood

Journal of Physical Oceanography (2016-04-01) <https://doi.org/ggc8nd>

DOI: [10.1175/jpo-d-15-0170.1](https://doi.org/10.1175/jpo-d-15-0170.1)

166. Seasonality of submesoscale flows in the ocean surface boundary layer

Christian E. Buckingham, Alberto C. Naveira Garabato, Andrew F. Thompson, Liam Brannigan, Ayah Lazar, David P. Marshall, A. J. George Nurser, Gillian Damerell, Karen J. Heywood, Stephen E. Belcher

Geophysical Research Letters (2016-03-11) <https://doi.org/f8ghzt>

DOI: [10.1002/2016gl068009](https://doi.org/10.1002/2016gl068009)

167. Submesoscale Impacts on Mesoscale Agulhas Dynamics

R. Schubert, F. U. Schwarzkopf, B. Baschek, A. Biastoch

Journal of Advances in Modeling Earth Systems (2019-08-22) <https://doi.org/gg4m4k>

DOI: [10.1029/2019ms001724](https://doi.org/10.1029/2019ms001724)

168. The Seasonality of Submesoscale Energy Production, Content, and Cascade

Jihai Dong, Baylor Fox-Kemper, Hong Zhang, Changming Dong

Geophysical Research Letters (2020-03-23) <https://doi.org/gg4m4j>

DOI: [10.1029/2020gl087388](https://doi.org/10.1029/2020gl087388)

169. Near-Inertial Internal Gravity Waves in the Ocean

Matthew H. Alford, Jennifer A. MacKinnon, Harper L. Simmons, Jonathan D. Nash

Annual Review of Marine Science (2016-01-03) <https://doi.org/gdvjst>

DOI: [10.1146/annurev-marine-010814-015746](https://doi.org/10.1146/annurev-marine-010814-015746) · PMID: [26331898](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26331898/)

170. Turbulent exchanges between near-inertial waves and balanced flows

Jim Thomas, Don Daniel

Journal of Fluid Mechanics (2020-09-04) <https://doi.org/ghqh9h>
DOI: [10.1017/jfm.2020.510](https://doi.org/10.1017/jfm.2020.510)

171. Geophysical turbulence dominated by inertia-gravity waves

Jim Thomas, Ray Yamada
Journal of Fluid Mechanics (2019-07-18) <https://doi.org/ghqh9k>
DOI: [10.1017/jfm.2019.465](https://doi.org/10.1017/jfm.2019.465)

172. Near-inertial waves and geostrophic turbulence

Jim Thomas, S. Arun
Physical Review Fluids (2020-01-06) <https://doi.org/ghqh9z>
DOI: [10.1103/physrevfluids.5.014801](https://doi.org/10.1103/physrevfluids.5.014801)

173. Stimulated generation: extraction of energy from balanced flow by near-inertial waves

Cesar B. Rocha, Gregory L. Wagner, William R. Young
Journal of Fluid Mechanics (2018-05-23) <https://doi.org/gdq6qc>
DOI: [10.1017/jfm.2018.308](https://doi.org/10.1017/jfm.2018.308)

174. On the modifications of near-inertial waves at fronts: implications for energy transfer across scales

Leif N. Thomas
Ocean Dynamics (2017-08-04) <https://doi.org/gbxrxw>
DOI: [10.1007/s10236-017-1088-6](https://doi.org/10.1007/s10236-017-1088-6)

175. Sea Surface Signature of Internal Tides

Noé Lahaye, Jonathan Gula, Guillaume Roullet
Geophysical Research Letters (2019-04-05) <https://doi.org/ghqh9w>
DOI: [10.1029/2018gl081848](https://doi.org/10.1029/2018gl081848)

176. Diagnosing Ocean-Wave-Turbulence Interactions From Space

H. S. Torres, P. Klein, L. Siegelman, B. Qiu, S. Chen, C. Ubelmann, J. Wang, D. Menemenlis, L.-L. Fu
Geophysical Research Letters (2019-08-11) <https://doi.org/gg4m4n>
DOI: [10.1029/2019gl083675](https://doi.org/10.1029/2019gl083675)

177. Impact of the « Symmetric Instability of the Computational Kind » at mesoscale- and submesoscale-permitting resolutions

Nicolas Ducousoo, J. Le Sommer, J.-M. Molines, M. Bell
Ocean Modelling (2017-12) <https://doi.org/gcq7f2>
DOI: [10.1016/j.ocemod.2017.10.006](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2017.10.006)

178. Reconstruction of the 3-D Dynamics From Surface Variables in a High-Resolution Simulation of North Atlantic

S. Fresnay, A. L. Ponte, S. Le Gentil, J. Le Sommer
Journal of Geophysical Research: Oceans (2018-03) <https://doi.org/gdh33h>
DOI: [10.1002/2017jc013400](https://doi.org/10.1002/2017jc013400)

179. Up to What Extent Can We Characterize Ocean Eddies Using Present-Day Gridded Altimetric Products?

Angel Amores, Gabriel Jordà, Thomas Arsouze, Julien Le Sommer
Journal of Geophysical Research: Oceans (2018-10-12) <https://doi.org/gd85mw>
DOI: [10.1029/2018jc014140](https://doi.org/10.1029/2018jc014140)

180. Reduction of Spatially Structured Errors in Wide-Swath Altimetric Satellite Data Using Data Assimilation

Sammy Metref, Emmanuel Cosme, Julien Le Sommer, Nora Poel, Jean-Michel Brankart, Jacques Verron, Laura Gómez Navarro

Remote Sensing (2019-06-03) <https://doi.org/gg3qn7>

DOI: [10.3390/rs11111336](https://doi.org/10.3390/rs11111336)

181. Wide-swath altimetric satellite data assimilation with structured-error detrending

Sammy Metref, Emmanuel Cosme, Florian Le Guillou, Julien Le Sommer, Jean-Michel Brankart, Jacques Verron

California Digital Library (CDL) (2019-09-17) <https://doi.org/gg3qn6>

DOI: [10.31223/osf.io/yzj9v](https://doi.org/10.31223/osf.io/yzj9v)

182. Development of an Image De-Noising Method in Preparation for the Surface Water and Ocean Topography Satellite Mission

Laura Gómez-Navarro, Emmanuel Cosme, Julien Le Sommer, Nicolas Papadakis, Ananda Pascual

Remote Sensing (2020-02-22) <https://doi.org/gg3qn8>

DOI: [10.3390/rs12040734](https://doi.org/10.3390/rs12040734)

183. ocean-next/eNATL60: Material describing the set-up and the assessment of NEMO-eNATL60 simulations

Laurent Brodeau, Julien Le Sommer, Aurélie Albert

Zenodo (2020-09-21) <https://doi.org/ghcwgb>

DOI: [10.5281/zenodo.4032732](https://doi.org/10.5281/zenodo.4032732)

184. Spatial and Temporal Variability of the North Atlantic Eddy Field From Two Kilometric-Resolution Ocean Models

Adekunle Ajayi, Julien Le Sommer, Eric Chassignet, Jean-Marc Molines, Xiaobiao Xu, Aurelie Albert, Emmanuel Cosme

Journal of Geophysical Research: Oceans (2020-05-14) <https://doi.org/gg3zs9>

DOI: [10.1029/2019jc015827](https://doi.org/10.1029/2019jc015827)

185. Diagnosing cross-scale kinetic energy exchanges from two submesoscale permitting ocean models.

Adekunle Ajayi, Julien Le Sommer, Eric Chassignet, Jean-Marc Molines, Xiaobiao Xu, Aurelie Albert, William Dewar

Wiley (2019-11-04) <https://doi.org/gg3zs8>

DOI: [10.1002/essoar.10501077.1](https://doi.org/10.1002/essoar.10501077.1)

186. Diffusion of inertia-gravity waves by geostrophic turbulence

Hossein A. Kafiabad, Miles A. C. Savva, Jacques Vanneste

Journal of Fluid Mechanics (2019-04-30) <https://doi.org/ggnm4z>

DOI: [10.1017/jfm.2019.300](https://doi.org/10.1017/jfm.2019.300)

187. On Energy Cascades in General Flows: A Lagrangian Application

Q. Jamet, A. Ajayi, J. Le Sommer, T. Penduff, A. Hogg, W. K. Dewar

Journal of Advances in Modeling Earth Systems (2020-12-21) <https://doi.org/ghcwf9>

DOI: [10.1029/2020ms002090](https://doi.org/10.1029/2020ms002090)

188. Diagnosing the thickness-weighted averaged eddy-mean flow interaction in an eddying North Atlantic ensemble

Takaya Uchida, Quentin Jamet, William K. Dewar, Dhruv Balwada, Julien Lesommer, Thierry Penduff

189. The Contribution of Surface and Submesoscale Processes to Turbulence in the Open Ocean Surface Boundary Layer

Christian E. Buckingham, Natasha S. Lucas, Stephen E. Belcher, Tom P. Rippeth, Alan L. M. Grant, Julien Le Sommer, Adekunle Opeoluwa Ajayi, Alberto C. Naveira Garabato

Journal of Advances in Modeling Earth Systems (2019-12-08) <https://doi.org/gg3qn5>

DOI: [10.1029/2019ms001801](https://doi.org/10.1029/2019ms001801)

190. Anisotropy of eddy variability in the global ocean

K. D. Stewart, P. Spence, S. Waterman, J. Le Sommer, J.-M. Molines, J. M. Lilly, M. H. England

Ocean Modelling (2015-11) <https://doi.org/f7xhzw>

DOI: [10.1016/j.ocemod.2015.09.005](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2015.09.005)

191. Stochastic variability of oceanic flows above topography anomalies

A. Venaille, J. Le Sommer, J.-M. Molines, B. Barnier

Geophysical Research Letters (2011-08) <https://doi.org/dtj2xz>

DOI: [10.1029/2011gl048401](https://doi.org/10.1029/2011gl048401)

192. How momentum advection schemes influence current-topography interactions at eddy permitting resolution

Julien Le Sommer, Thierry Penduff, Sébastien Theetten, Gurvan Madec, Bernard Barnier

Ocean Modelling (2009-01) <https://doi.org/d9dxdg>

DOI: [10.1016/j.ocemod.2008.11.007](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2008.11.007)

193. Influence of numerical schemes on current-topography interactions in 1/4° global ocean simulations

T. Penduff, J. Le Sommer, B. Barnier, A.-M. Treguier, J.-M. Molines, G. Madec

Ocean Science (2007-12-20) <https://doi.org/fn6ddc>

DOI: [10.5194/os-3-509-2007](https://doi.org/10.5194/os-3-509-2007)

194. Impact of partial steps and momentum advection schemes in a global ocean circulation model at eddy-permitting resolution

Barnier Bernard, Gurvan Madec, Thierry Penduff, Jean-Marc Molines, Anne-Marie Treguier, Julien Le Sommer, Aike Beckmann, Arne Biastoch, Claus Böning, Joachim Dengg, ... Beverly De Cuevas

Ocean Dynamics (2006-06-14) <https://doi.org/bxbtfn>

DOI: [10.1007/s10236-006-0082-1](https://doi.org/10.1007/s10236-006-0082-1)

195. Multi-grid algorithm for passive tracer transport in NEMO ocean circulation model: a case study with NEMO OGCM (version 3.6)

Clément Bricaud, Julien Le Sommer, Madec Gurvan, Christophe Calone, Julie Deshayes, Christian Ethe, Jérôme Chanut, Marina Levy

Copernicus GmbH (2020-01-28) <https://doi.org/ghcwm3>

DOI: [10.5194/gmd-2019-341](https://doi.org/10.5194/gmd-2019-341)

196. A dynamic regularized gradient model of the subgrid-scale scalar flux for large eddy simulations

G. Balarac, J. Le Sommer, X. Meunier, A. Vollant

Physics of Fluids (2013-07) <https://doi.org/gbdgtm>

DOI: [10.1063/1.4813812](https://doi.org/10.1063/1.4813812)

197. Parameterization of subgrid stirring in eddy resolving ocean models. Part 1: Theory and diagnostics

J. Le Sommer, F. d'Ovidio, G. Madec

Ocean Modelling (2011-01) <https://doi.org/cxx26m>

DOI: [10.1016/j.ocemod.2011.03.007](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2011.03.007)

198. The Impact of a Variable Mixing Efficiency on the Abyssal Overturning

Casimir de Lavergne, Gurvan Madec, Julien Le Sommer, A. J. George Nurser, Alberto C. Naveira Garabato

Journal of Physical Oceanography (2016-02-01) <https://doi.org/f8ggbk>

DOI: [10.1175/jpo-d-14-0259.1](https://doi.org/10.1175/jpo-d-14-0259.1)

199. On the Consumption of Antarctic Bottom Water in the Abyssal Ocean

Casimir de Lavergne, Gurvan Madec, Julien Le Sommer, A. J. George Nurser, Alberto C. Naveira Garabato

Journal of Physical Oceanography (2016-02-01) <https://doi.org/f8frjq>

DOI: [10.1175/jpo-d-14-0201.1](https://doi.org/10.1175/jpo-d-14-0201.1)

200. Sensitivity of coastal polynyas and high-salinity shelf water production in the Ross Sea, Antarctica, to the atmospheric forcing

Pierre Mathiot, Nicolas C. Jourdain, Bernard Barnier, Hubert Gallée, Jean Marc Molines, Julien Le Sommer, Thierry Penduff

Ocean Dynamics (2012-03-09) <https://doi.org/f3xrqj>

DOI: [10.1007/s10236-012-0531-y](https://doi.org/10.1007/s10236-012-0531-y)

201. Response of the Southern Ocean to the Southern Annular Mode: Interannual Variability and Multidecadal Trend

A. M. Treguier, J. Le Sommer, J. M. Molines, B. de Cuevas

Journal of Physical Oceanography (2010-07-01) <https://doi.org/csc6w7>

DOI: [10.1175/2010jpo4364.1](https://doi.org/10.1175/2010jpo4364.1)

202. Stratospheric ozone depletion reduces ocean carbon uptake and enhances ocean acidification

Andrew Lenton, Francis Codron, Laurent Bopp, Nicolas Metzl, Patricia Cadule, Alessandro Tagliabue, Julien Le Sommer

Geophysical Research Letters (2009-06-20) <https://doi.org/d5sxkd>

DOI: [10.1029/2009gl038227](https://doi.org/10.1029/2009gl038227)

203. Southern Ocean overturning across streamlines in an eddying simulation of the Antarctic Circumpolar Current

A. M. Treguier, M. England, S. R. Rintoul, G. Madec, J. Le Sommer, J.-M. Molines

Ocean Science Discussions (2007-07-17) <https://doi.org/dzhsqs>

DOI: [10.5194/osd-4-653-2007](https://doi.org/10.5194/osd-4-653-2007)

204. Variability of the Antarctic Circumpolar Current transport through the Fawn Trough, Kerguelen Plateau

Frédéric Vivier, Young-Hyang Park, Hela Sekma, Julien Le Sommer

Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography (2015-04) <https://doi.org/f7b6pb>

DOI: [10.1016/j.dsr2.2014.01.017](https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2014.01.017)

205. Can we map the interannual variability of the whole upper southern ocean with the current database of hydrographic observations?

C. Heuzé, F. Vivier, J. Le Sommer, J.-M. Molines, T. Penduff

Journal of Geophysical Research: Oceans (2015-12-17) <https://doi.org/f3ncfw>
DOI: [10.1002/2015jc011115](https://doi.org/10.1002/2015jc011115)

206. An Efficient Way to Account for Observation Error Correlations in the Assimilation of Data from the Future SWOT High-Resolution Altimeter Mission

Giovanni Abdelnur Ruggiero, Emmanuel Cosme, Jean-Michel Brankart, Julien Le Sommer, Clement Ubelmann

Journal of Atmospheric and Oceanic Technology (2016-12) <https://doi.org/f9gshq>
DOI: [10.1175/jtech-d-16-0048.1](https://doi.org/10.1175/jtech-d-16-0048.1)

207. SWOT Spatial Scales in the Western Mediterranean Sea Derived from Pseudo-Observations and an Ad Hoc Filtering

Laura Gómez-Navarro, Ronan Fablet, Evan Mason, Ananda Pascual, Baptiste Mourre, Emmanuel Cosme, Julien Le Sommer

Remote Sensing (2018-04-12) <https://doi.org/ghcxtv>
DOI: [10.3390/rs10040599](https://doi.org/10.3390/rs10040599)

208. An Adaptive Optimal Interpolation Based on Analog Forecasting: Application to SSH in the Gulf of Mexico

Yicun Zhen, Pierre Tandeo, Stéphanie Leroux, Sammy Metref, Thierry Penduff, Julien Le Sommer
Journal of Atmospheric and Oceanic Technology (2020-09-01) <https://doi.org/ghcxtr>

DOI: [10.1175/jtech-d-20-0001.1](https://doi.org/10.1175/jtech-d-20-0001.1)

209. Wide-Swath Altimetric Satellite Data Assimilation With Correlated-Error Reduction

Sammy Metref, Emmanuel Cosme, Florian Le Guillou, Julien Le Sommer, Jean-Michel Brankart, Jacques Verron

Frontiers in Marine Science (2020-01-14) <https://doi.org/ghcxt2>
DOI: [10.3389/fmars.2019.00822](https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00822)

Annexe A1 : Expérience d'encadrement

Thèses

- 2020 - ... Quentin Febvre mène actuellement ses travaux de thèse au LabSTICC sous ma co-direction depuis oct. 2019. Ces travaux, co-dirigés R. Fablet (LabSTICC) et C. Ubelmann (Ocean Next) portent sur l'inversion des futures données SWOT par apprentissage profond.
- 2019 - ... Hugo Frezat mène actuellement ses travaux de thèse au LEGI sous ma co-direction depuis oct. 2019. Ces travaux, co-dirigés G. Balarac (LEGI) et R. Fablet (LabSTICC), portent sur le développement de fermetures turbulentes par apprentissage automatique.
- 2016 - 2020 : Laura Gomez Navarro a mené sa thèse sous ma co-direction de décembre 2016 à septembre 2020. Ces travaux, principalement dirigés par E. Cosme (IGE, MEOM), ont porté sur le débruitage des données SWOT et l'observabilité de la dynamique par la mission SWOT.
- 2016 - 2020 : Adekunle Ajayi a mené sa thèse sous ma direction entre octobre 2016 et janvier 2020. Ses travaux ont porté sur l'étude des mécanismes d'interaction d'échelle aux moyennes latitudes en Atlantique Nord sur la base des simulations NATL60, eNATL60 et HYCOM50.
- 2013 - 2016 : Nacho Merino a mené sa thèse sous ma co-direction d'octobre 2013 à décembre 2016. Cette thèse co-dirigée par G. Durand a porté sur les mécanismes d'interaction entre cryosphère et océan austral.
- 2012 - 2015 : Pierre Labreuche a effectué sa thèse sous ma (co-)direction entre octobre 2012 et janvier 2015 (avec C. Staquet). Il s'est intéressé à la dissipation associée au déferlement des ondes de relief dans l'océan austral.
- 2012 - 2014 : Joan Llort a effectué sa thèse sous la direction de Marina Levy au LOCEAN avec ma participation comme co-directeur entre octobre 2012 et novembre 2014. Il s'est intéressé aux mécanismes pilotant la variabilité de la production primaire dans l'océan austral.
- 2011 - 2012 : Xavier Meunier a démarré une thèse sous ma (co-)direction en octobre 2011 (avec B. Barnier et L. Debreu). Son travail portait sur le développement de paramétrisation sous maille pour le transport de quantité de mouvement dans NEMO. Pour des raisons personnelles, Xavier a souhaité mettre un terme à sa thèse à l'automne 2012.
- 2010 - 2014 : Gildas Mainsant a effectué sa thèse sous ma (co-)direction entre octobre 2010 et novembre 2014 (avec B. Barnier et H. Gallée). Il s'est intéressé au rôle de la glace de mer dans la réponse de l'océan austral au mode annulaire austral.
- 2008 - 2011 : Carolina Dufour a effectué sa thèse sous ma (co-)direction entre octobre 2008 et décembre 2011 (avec B. Barnier, J. Orr et M. Gehlen). Elle s'est intéressée à la réponse de dynamique et biogéochimique de l'océan austral aux changements des vents zonaux.

Master 2

- 2020 : Erika Henell a effectué un stage de M2R de 6 mois sous ma direction au printemps 2020. Son travail a porté sur l'analyse des interactions entre ondes de marée interne et turbulence de submeso-échelle sur la base des simulation eNATL60
- 2016 : Sylvie Su a effectué un stage de M2R de 6 mois sous ma direction au printemps 2016. Son travail a porté sur l'analyse de la variabilité saisonnière de la dynamique de submeso-échelle dans l'Atlantique Nord sur la base des simulation NATL60.
- 2015 : Yaroslavna Martemyanycheva a effectué un stage de M2R de 6 mois sous ma co-direction au printemps 2015. Son stage, co-encadré par E. Cosme portait sur l'observabilité de la marée interne à partir des données de la mission SWOT.
- 2014 : Pedro Colombo a effectué un stage de M2R de 6 mois sous ma (co-)direction (avec E. Cosme). Il s'est intéressé à la question de l'observabilité du signal de surface de la marée interne par la mission altimétrique SWOT.
- 2013 : Olivier Andry a effectué un stage de M2R de 6 mois sous ma direction au printemps 2013. Il s'est intéressé au contrôle topographique de la position des fronts de l'ACC.

- 2012 : Pierre Labreuche a effectué son stage de M2R sous ma (co-)direction au printemps 2012. Il s'est intéressé à la propagation d'ondes internes dans un milieu aux propriétés variables en temps.
- 2008 : Carolina Dufour a effectué son stage de M2R sous ma (co-)direction au printemps 2008. Elle s'est intéressée à la variabilité thermohaline dans l'ACC au sud de la Tasmanie.

Master 1

- 2015 : Alexandre Jaymond a effectué un stage de M1 de 4 mois sous ma direction au printemps 2015. Ses travaux ont porté sur l'analyse préliminaire de la première simulation NATL60.
- 2015 : Pierre-Vincent Huot a effectué un stage de M1 de 4 mois sous ma co-direction au printemps 2015 en collaboration avec N. Jourdain. Son travail a porté sur la variabilité des propriétés hydrographiques sur les marges antarctiques.

Postdocs

- 2017 - 2019 : Redouane Lguensat a travaillé sous ma direction de décembre 2017 à décembre 2019 dans le cadre de son postdoc CNES à l'IGE. Il s'est intéressé à l'application de méthodes d'apprentissage profond pour le traitement des données SWOT (débruitage, interpolation)
- 2013 - 2015 : Nicolas Ducouso a travaillé 30 mois sous ma direction dans le cadre du projet ANR COMODO jusqu'en avril 2015. Il s'est intéressé à la discréétisation des équations de quantité de mouvement dans le code NEMO.
- 2012 - 2012 : Carolina Dufour a travaillé 7 mois en tant que postdoc sous ma direction suite à sa thèse. Ses travaux ont essentiellement porté sur la finalisation des publications de sa thèse.
- 2011 - 2012 : Jan Zika a travaillé sous ma direction 14 mois dans le cadre du projet ANR SouthernCross. Il s'est intéressé aux équilibres dynamiques du transport de l'ACC et de la circulation méridienne au travers de l'ACC
- 2009 - 2009 : Antoine Venaille a travaillé sous ma correction au LEGI durant quelques mois suite à sa thèse. Il s'est intéressé au forçage de circulation barotrope par la turbulence de méso-échelle.

Ingénieurs

- 2016 - 2019 : Aurélie Albert a travaillé depuis mars à septembre 2019 dans l'équipe MEOM sous ma direction. Aurélie s'est notamment occupée de l'analyse et de la diffusion des simulations NATL60 au sein de la SWOT Science Team dans le cadre d'un contrat CNES. Elle a par ailleurs mené les études de sensibilité en préparation à l'évolution du système opérationnel global Mercator-Ocean dans le cadre du contrat CMEMS GLO-HR.
- 2016 - 2017 : Gildas Mainsant a travaillé comme ingénieur de janvier 2015 à janvier 2016 dans l'équipe MEOM sous ma direction. Son travail portait sur la préparation de la configuration globale 1/4° du modèle de circulation NEMO pour les ESM nationaux.
- 2015 - 2015 : Christophe Calone a travaillé 11 mois sous ma direction dans le cadre du projet MyOcean II. Il s'est occupé de la mise en oeuvre de la capacité de dégradation à basse résolution du transport de traceurs dans le système NEMO.
- 2011 - 2014 : Aurélie Albert a travaillé sous ma direction entre octobre 2011 et aout 2014 à la mise en place et l'exploitation d'une plate-forme de modélisation réaliste couplée physico-biogéochimique de l'Océan Indien Sud.

Annexe A2 : Projets de recherche

Pilotage ou co-pilotage de projets

- 2020 - 2023 : SWOT ST MIDAS : Modelling, Inversion and Data Assimilation for SWOT (CNES-NASA, PIs : J. Le Sommer et E. Cosme). Le projet MIDAS est un project collectif de l'équipe MEOM qui encadre notre participation à la SWOT Science Team. Ce projet poursuite les activités engagées

dans le cadre du projet SWOT ST précédent, avec des objectifs précis sur l'exploitation des données de la mission SWOT en 2022, en lien avec les campagnes en mer.

- 2019 - 2022 : IMMERSE (H2020, coord. J. Le Sommer). Le projet IMMERSE "Improving Ocean Models for Copernicus Environmental Monitoring Service" est en projet en réponse au call H2020 LC-SPACE-03-EO-2018 dont j'ai pris en charge le montage et dont j'assure la coordination. Le projet rassemble 14 institutions à travers l'Europe et une équipe d'environ 60 participants. Le projet se déroule de Décembre 2018 à Décembre 2022. Il a pour objet de préparer une nouvelle version du modèle de circulation NEMO et d'en préparer la transition dans les centres de production opérationnels du CMEMS. La coordination de ce projet recoupe pour une large part mon rôle au sein du dispositif de pilotage NEMO. Environ 25% de mon temps est aujourd'hui occupé par cette coordination.
- 2017 - 2020 : SOBUMS : Southern Ocean Biogeochemistry Under Multiple Stressors (ANR PRCE, PI initial : J. Le Sommer). Le projet SOBUMS a rassemblé le LOCEAN, le LSCE, Mercator-Ocean et l'IGE autour de l'études de la réponse du cycle du carbone de l'océan austral aux différents facteurs de stress climatique dans l'hémisphère sud (dont par exemple les changements des vents, des flux radiatifs, de flux d'eaux douces). Il s'est appuyé sur un plan de simulations basé sur la composante océanique des futurs ESMs à haute résolution, eORCA025 développé par le consortium DRAKKAR. J'ai pris en 2017 la décision de me retirer de ce projet et d'en confier le portage à James Orr (LSCE). Cette décision était motivée par le poids croissant des activités en lien avec la préparation de la mission SWOT ainsi qu'au contexte du démarrage du projet H2020 IMMERSE que je coordonne.
- 2016 - 2019 : SWOT ST : Preparing the inversion of SWOT Ocean Data (CNES-NASA, PIs : J. Le Sommer et E. Cosme). Le projet "Ocean modelling and data-assimilation for SWOT mission : preparing the inversion of SWOT Ocean Data" est un projet collectif de l'équipe MEOM que j'ai porté avec E. Cosme et au titre duquel nous avons participé à la SWOT Science Team. Ce projet proposait de mener à développer des approches originales d'inversion des futures données SWOT sur la base d'observations virtuelles produites à l'aide du modèle de circulation NEMO. C'est dans ce cadre que nous avons porté l'effort de modélisation NATL60/eNATL60. Il se prolonge actuellement dans le cadre du projet MIDAS démarré en 2020.
- 2016 - 2019 : OSTOMA-SWOT (AGIR/UGA, PI : J. Le Sommer). Le projet « OSTOMA-SWOT : Préparer l'Observation Spatiale de la Turbulence Océanique par la Mission Altimétrique SWOT » a assuré le financement de la thèse d'Adekunle Ajayi. Ce projet sélectionné par l'UGA vise à documenter les mécanismes par lesquels la variabilité de fine-échelles affectent la circulation dans le bassin atlantique nord aux moyennes et hautes latitudes.
- 2014 - 2015 : ENGLOBE : An Eddying Numerical Global Green Ocean (projet LEFE-INSU, co-PI : J. Le Sommer). Ce projet de coordination impliquant le LOCEAN, le LEMAR, le LSCE et le LGGE porte sur des questions de modélisation physique- biogéochimie à l'échelle globale. Il a permis de mener des activités préparatoires au projet ANR SOBUMS.
- 2013 - 2015 : Ocean mesoscales and submesoscale : observability, modelling and data assimilation for SWOT (projet CNES-TOSCA 2013-2015, PI : J. Le Sommer). Ce projet a regroupé les activités de l'équipe MEOM du LGGE en lien avec la mission altimétrique SWOT sur cette période et assuré notre participation à la SWOT Science Definition Team.
- 2012 - 2014 : MOREWAVES (Labex OSUG@2020 and LEFE/INSU, PI: C. Staquet and J. Le Sommer). Ces deux projets portent sur l'étude du déferlement des ondes de relief dans l'océan austral. Il a servi à couvrir les activités de thèse de Pierre Labreuche au LEGI ainsi que des interactions avec le groupe d'Alberto Naveira-Garabato au NOC.
- 2011 - 2014 : TANGGO: Toward AN Eddying Global Green Ocean (INSU/LEFE, PI: M. Levy, L. Bopp and J. Le Sommer). Ce projet de coordination nationale financé par le programme LEFE visait à réunir la communauté des bio-géochimistes marins autour de questions liées à la modélisation océanique. Il a permis de mettre en place une stratégie menant à la soumission de l'ANR SOBUMS à l'appel à projet générique de l'ANR en octobre 2014. C'est également dans ce cadre qu'a été organisé le colloque de Liège en 2013
- 2011 - 2013 : BIOCOSM: Un laboratoire régional pour mieux observer, modéliser et comprendre les interactions physico-biogéochimiques multi-échelles dans l'océan austral (CNES, PI: J. Le Sommer

and M. Levy). Ce projet de modélisation en lien avec la campagne in-situ KEOPS2 a permis les activités de modélisation en support de la thèse de Joan Llort au LOCEAN.

- 2010-2013 : VARFLUX: Impact du Mode Annulaire Austral sur les flux air-mer dans l'océan austral (CIBLE, région Rhône-Alpes, PI: J. Le Sommer and H. Gallée). Ce projet portait sur l'étude du rôle de la glace de mer dans la réponse au mode annulaire austral. Il a permis le financement partiel de la thèse de Gildas Mainsant défendue en novembre 2014.
- 2010 - 2012 : CO2SUD : Variabilité des flux air-mer de CO₂ dans l'hémisphère austral : rôle des modes de variabilité atmosphérique et de la mésoéchelle océanique (INSU/LEFE, 2010-2012, PI: J. Le Sommer and M. Gehlen). Ce portait sur le rôle des processus de méso-échelle dans la réponse des flux air-mer de CO₂ au mode annulaire austral. Ce projet a permis de financer les frais de fonctionnement et de coordination autour de la thèse et du postdoc de Carolina Dufour au LGGE.
- 2009 - 2012 : SOUTHERN-CROSS : Southern Ocean variability and Cross-scale interactions (ANR-JCJC, PI: J. Le Sommer). Ce projet portait sur le rôle des interactions d'échelle dans la variabilité de l'océan austral et sa réponse aux modes de variabilité atmosphérique. Il a permis le financement du postdoc de Jan Zika et de Carolina Dufour au LGGE. A plusieurs égards, il a joué un rôle de levier pour accéder à plusieurs financements complémentaires dont celui de la thèse de Carolina Dufour financée par le CEA.
- 2009- 2011 : MEDSO: Quantifying lateral stirring in the Southern Ocean (EGIDE PHC, PI: J. Le Sommer and E. Shuckburgh). Ce projet d'échange entre le LEGI et le BAS (Cambridge, UK) portait sur le diagnostic et la paramétrisation du mélange latéral dans l'océan austral.

Participation à des projets

- 2021 - 2025 : M2LINES (VESRI, PI : Laure Zanna and A. Adcroft). Ce projet financé par la fondation Schmidt Futures vise à exploiter au moyen d'apprentissage automatique les bases de données de simulations haute résolution et les réanalyses couplées océan-atmosphère pour réduire les biais systématiques des composantes océaniques et atmosphériques des modèles de climat.
- 2020 - 2024 : MeLODy (ANR, PI. R. Fablet). Ce projet rassemble 5 laboratoires nationaux autour de la mise en oeuvre de méthodes d'apprentissage automatique pour l'estimation et la prédiction de la circulation océanique de surface. J'y assure la coordination du work-package de démonstration.
- 2010 - 2022 : MEDLEY (JPI Climate / JPI Oceans, PI : A.M. Treguier). Ce projet d'envergure européenne dans le montage duquel j'ai été très impliqué vise à étudier l'impact des hétérogénéités latérales des propriétés dans la couche de mélange océanique sur son évolution et sa représentation dans les modèles. Je pilote l'un des work-packages du projet.
- 2019 - 2022 : LEFE IA-OAC. Le projet LEFE IA-OAC (PI. R. Fablet) est un projet de coordination visant à accélérer les interactions entre les communautés "machine learning" et "océanographie". En pratique, il est articuler avec l'organisation d'un workshop annuel à l'organisation duquel je participe depuis 2 ans.
- 2019 - 2021 : MOPGA CONTACTS. Le projet Make Our Planet Great Again CONTACTS est un projet porté par Bill Dewar (FSU/IGE) et qui finance sa présence dans l'équipe à 50% sur la durée du projet. Il vise à exploiter les simulations NATL60 et eNATL60 pour mieux comprendre les interactions d'échelles dans l'océan afin de guider le développement de fermeture sous-maille. Ce projet finance également la présence de deux postdocs dans l'équipe MEOM durant la durée du projet (T. Uchida et Q. Jamet). Je suis impliqué dans le déroulement scientifique du projet, en collaboration avec T. Penduff et B. Dewar.
- 2018 - 2021 : ANR BOOST SWOT. Le projet ANR BOOST-SWOT est coordonné par E. Cosme et implique l'IGE et CLS. Il vise à préparer des méthodes de cartographie de hauteur dynamique de l'océan capable de tirer parti de la richesse d'information des futures données SWOT. Ce projet finance une thèse (F. Le Guillou) et un postdoc (Sammy Metref) dans l'équipe MEOM. Je suis impliqué de près dans l'accompagnement scientifique de ce projet dont les objectifs scientifiques recoupent ceux du projet SWOT ST de l'équipe MEOM.
- 2019 - 2021 : DEDALES. Le projet 80 PRIME DEDALES (PI: G. Balarac, LEGI) est un projet en collaboration avec le LEGI (G. Balarac) et le LabSTICC (R. Fablet) et visant à développer des approches de fermeture sous-mailles par apprentissage automatique pour des écoulements LES et

océaniques. Le projet finance depuis octobre 2019 la thèse de Hugo Frezat au LEGI que je co-encadre avec G. Balarac et R. Fablet.

- 2017 - 2020 : GLO-HR (CMEMS, PI. T. Penduff). Ce projet a été financé par Mercator Ocean International dans le cadre des services marins Copernicus (CMEMS). Il visait à préparer l'évolution du système de prévision global du CMEMS. J'ai été impliqué dans le pilotage de plusieurs actions dans ce cadre, en particulier concernant le développement de la fonctionnalité multi-grille de NEMO ainsi qu'une série d'expérience de sensibilité pour définir la grille verticale du système global. Ce projet nous a permis de disposer de ressources humaines pour l'analyse des simulations NATL60 au cours de la période 2015-2019.
- 2017 - 2020 : Data@UGA : Grenoble Data Institute. (CDP UGA, PI. M. Blum). Ce projet est un projet interdisciplinaire financé dans le cadre de l'IDEX UGA. Il a accompagné la création du Grenoble-Alpes Data Institute, un institut interdisciplinaire pour la promotion des sciences de la données (méthodes statistiques permettant le traitement et l'exploitation de données massives) et l'étude des implications sociétales des données massives. J'étais en charge des activités en lien avec les thématiques INSU. En pratique, il s'agissait de mettre en place des activités de formation et d'animation transverses, et d'attribuer des ressources dans le cadre d'appels à projets compétitifs. Ce projet est arrivé à son terme fin 2020. Il a permis d'établir un réseau de collaborations locales sur les questions d'apprentissage automatique et de financer un ingénieur ainsi qu'une demi bourse de thèse dans l'équipe MEOM.
- 2016 - 2019 : MOMOMS (OSTST CNES/NASA, PI : E. Cosme). Ce projet est l'un des projets de l'équipe MEOM dans le cadre de l'Ocean Surface Topography Science Team mise en place par le CNES et la NASA. Sur la période 2016-2019, ce projet a permis de développer des approches de traitement multi-capteurs en synergies avec les données de SSH.
- 2015 - 2019 : TROIS-AS (ANR JCJC, PI : N. Jourdain). Ce projet ANR a permis de mieux comprendre les processus impliqués dans le couplage entre circulation océanique et dynamique des calottes glaciaires en préparation au couplage des modèles NEMO et Elmer-ICE. C'est dans ce cadre que s'est déroulé la fin de la thèse de N. Merino.
- 2012 - 2015 : COMODO: Communauté de Modélisation Océanographique (ANR-MN, PI: L. Debreu). Ce projet ANR dont j'ai assuré le portage pour le partenaire CNRS visait à mieux articuler les efforts de modélisation océanographique en France. Il a permis de renforcer les échanges méthodologiques et scientifiques entre les différents modèles de circulation océanique utilisés en France. Le postdoc de Nicolas Ducoussou a été financé dans ce cadre.
- 2012 - 2015 : MERCATOR-VERT (projet GMMC). Ce projet financé par le GMMC est un projet préparatoire qui a permis d'affiner la stratégie de modélisation bio-géochimique de MERCATOR-OCEAN. Nous avons assuré dans ce cadre un transfert méthodologique concernant la physique verticale du modèle NEMO vers les autres partenaires du projet.
- 2012 - 2014 : MyOceanII (EU FP7, 2012-2014) et MyOceanFo (EU H2020, 2014). Ces deux projets européens portaient sur la construction du dispositif d'océanographie opérationnel européen. Le succès de ces projets a mené la mise en place pérenne d'une délégation de service de la commission européenne vers MERCATOR-OCEAN pour assurer l'opération du service à partir de 2015. Le volet R&D sur lequel je suis intervenu concernait le développement et le test de la capacité de dégradation du transport des traceurs passifs dans NEMO. Ce projet a financé l'activité de Christophe Calone au LGGE.
- 2012 - 2014 : BIGSOUTH (BELSPO, Belgique). Ce projet belge portait sur l'étude et la modélisation de la biogéochimie dans la glace de mer. Nous sommes intervenus comme partenaire étranger dans ce projet pour fournir la suite de configuration PERIANT afin de tester les approches proposées dans le cadre du projet.

Annexe A3 : Responsabilités collectives

- 2014 - ... Coordinateur national NEMO pour le CNRS et Mercator-Ocean-International
- 2014 - ... Membre du Comité des Développeurs de la plateforme NEMO (bureau et WGs)
- 2013 - ... Membre de l'équipe scientifique accompagnant la mission altimétrique SWOT

- 2016 - ... Responsable adjoint de l'équipe d'océanographie numérique de l'IGE (MEOM)
 - 2020 - ... Membre de la Mercator Expert Team on Ocean Predictions
 - 2020 - ... Co-chair du CLIVAR Ocean Model Development Panel
 - 2021 - ... Membre du comité C4 (Comité des Chercheurs qui Calculent au CINES)
 - 2017 - 2020 : Membre du comité exécutif du Grenoble Alpes Data institute (Data@UGA)
 - 2014 - 2020 : Membre du comité CT1 GENCI (évaluation des demande de ressources calcul)
 - 2014 - 2020 : Membre du CLIVAR Ocean Model Development Panel (2 mandats)
 - 2013 - 2015 : Membre de la Commission Observatoire de l'OSUG (éval. Service et Labex)
 - 2010 - 2013 : Membre du comité de pilotage de la MaiMoSiNE (Maison de la Modélisation)
-

1. Dans tout ce qui suit, je ne discuterai que des modèles de circulation océanique pouvant être déployés à l'échelle globale (modèles dits de *circulation générale*), laissant ainsi de coté les modèles de circulation océanique côtière.[←](#)

2. "Never be the brightest person in a room, then you can't learn anything" [74].[←](#)