МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Домашняя аптечка для собаки

Безопасная первая помощь до связи с ветеринарным врачом.

Главное

Аптечка помогает выиграть время, но не заменяет диагностику и лечение. При тяжёлых симптомах не откладывайте обращение в клинику.

Можно пользоваться независимо от прохождения курса «Щенок дома».

Перед использованием

Названия препаратов приведены как примеры. Индивидуальные лекарства, дозы, ситуации применения и противопоказания заранее согласуйте с ветеринарным врачом. Особенно важно это при хронических болезнях, аллергиях, беременности, эпилепсии и болезнях печени, почек, сердца или ЖКТ.

Общие правила

1. При травме, отравлении, выраженной боли, судорогах, одышке, многократной рвоте, крови в стуле или моче, невозможности помочиться, вздутии живота, слабости или обмороке – не лечим дома, а срочно связываемся с клиникой.

2. Не давайте собаке человеческие обезболивающие: ибупрофен, парацетамол, нимесулид, диклофенак, кеторолак, аспирин и похожие препараты. Для собак они опасны.

3. Не используйте антибиотики, гормональные мази, ушные и глазные капли «от воспаления» без назначения врача – они могут смазать картину болезни или ухудшить состояние.

4. Не вызывайте рвоту при подозрении на отравление без указания ветеринарного врача. При некоторых веществах это опаснее самого проглатывания.

5. Все индивидуальные препараты должны быть подписаны: кому, когда, при каких симптомах, в какой дозе и кто назначил.

6. Проверяйте аптечку раз в 3–6 месяцев: сроки годности, целостность упаковок, наличие стерильных материалов.

Что положить в аптечку

- ☐ Ветеринарный паспорт и контакты клиник
- ☐ Электронный термометр
- ☐ Вазелин или водный лубрикант
- ☐ Одноразовые перчатки
- ☐ Намордник или мягкая петля-фиксатор
- ☐ Физраствор (NaCl 0,9%)
- ☐ Хлоргексидин 0,05%
- ☐ Стерильные марлевые салфетки
- ☐ Неприлипающие салфетки
- ☐ Самофиксирующийся бинт
- ☐ Медицинский пластырь
- ☐ Ножницы с тупыми концами
- ☐ Крючок для клещей
- ☐ Кровоостанавливающий порошок для когтей
- ☐ Шприцы без иглы
- ☐ Защитный воротник
- ☐ Плед или полотенце
- ☐ Контейнер для мочи
- ☐ Оральный регидратационный раствор
- ☐ Энтеросорбент
- ☐ Перекись водорода
- ☐ Антигистаминное средство
- ☐ Пробиотик для собак
- ☐ Влажный гастроинтестинальный рацион

Лекарства — отдельно

Сорбенты, средства от аллергии, регидратационные растворы и другие препараты применяйте только в заранее согласованных ситуациях. Перекись — не средство для ран и не повод самостоятельно вызывать рвоту.

Контроль состояния и безопасность

Ветеринарный паспорт и карточка собаки

Когда применять: Всегда держать рядом с аптечкой и брать с собой в клинику.

Как применять: В карточке укажите кличку, возраст, вес, хронические болезни, аллергии, постоянные препараты, обработки от паразитов и контакты владельцев.

Когда особенно важно: При экстренном визите, отравлении, укусе, травме, необходимости наркоза, назначении препаратов.

Контакты клиники и круглосуточного стационара

Когда применять: При любой ситуации, где вы сомневаетесь, можно ли помогать дома.

Как применять: Запишите телефоны основной клиники, ближайшего круглосуточного стационара, лечащего врача и такси, куда можно с животными.

Когда особенно важно: При отравлении, судорогах, травме, одышке, невозможности помочиться, вздутии живота, сильной боли.

Электронный термометр с гибким наконечником

Примеры: обычный электронный медицинский термометр с гибким наконечником.

Как применять: Измерять температуру ректально: наконечник смазать вазелином или лубрикантом, ввести неглубоко и дождаться сигнала.

Норма: Обычно у взрослой собаки ректальная температура около 37,5–39,2 °C.

Когда к врачу: Если температура выше 39,5 °C или ниже 37,5 °C на фоне плохого самочувствия. Около 40 °C и выше – обращаться срочно.

Осмотр и безопасная помощь

Вазелин или водный лубрикант

Примеры: медицинский вазелин, водный лубрикант без раздражающих добавок.

Когда применять: Для измерения ректальной температуры.

Как применять: Нанести небольшое количество на наконечник термометра.

Когда не применять: Не использовать для обработки ран, глаз, ушей, ожогов.

Одноразовые перчатки

Примеры: нитриловые или латексные медицинские перчатки.

Когда применять: При обработке ран, контакте с кровью, рвотой, поносом, мочой, выделениями, подозрении на инфекцию.

Как применять: Надеть перед оказанием помощи, после использования выбросить, руки вымыть.

Когда особенно важно: Если у владельца есть повреждения кожи на руках, беременность, иммунодефицит или дома маленькие дети.

Намордник или мягкая петля-фиксатор

Когда применять: Если собаке больно или страшно и она может укусить при осмотре или транспортировке.

Как применять: Надевать спокойно, без борьбы, только если собака нормально дышит.

Когда не применять: Не надевать при рвоте, одышке, тепловом ударе, потере сознания, судорогах, сильной слабости.

Вес, кожа и поверхностные раны

Актуальная запись веса собаки

Когда применять: При любом звонке врачу, расчёте дозировки, выборе препарата, оценке риска отравления.

Как применять: Записывайте вес после плановых визитов или взвешивания дома.

Когда особенно важно: При отравлении, необходимости сорбента, противорвотного, обезболивающего или антигистаминного препарата.

Стерильный физиологический раствор 0,9%

Примеры: натрия хлорид 0,9% в ампулах, флаконах или буфусах.

Когда применять: Для промывания поверхностных ран, ссадин, кожи, лап, глаз при попадании пыли, песка, шампуня.

Как применять: Промывать обильно. Лучше смыть загрязнение струёй раствора, чем тереть салфеткой.

Когда не применять: Не считать полноценным лечением глубокой, гнойной, укушенной или сильно загрязнённой раны.

Когда к врачу: Если рана глубокая, края расходятся, есть укус, сильное кровотечение, хромота, отёк, гной, выраженная боль.

Антисептики

Хлоргексидин 0,05% водный

Примеры: готовый водный раствор хлоргексидина 0,05%.

Когда применять: Для обработки небольших поверхностных повреждений кожи после промывания физраствором.

Как применять: Нанести на марлевую салфетку или аккуратно промыть участок. Не заливать под давлением в глубокую рану.

Когда не применять: Не использовать в глаза, уши, глубокие раны, на большие площади ожогов. Не применять концентрат без разведения.

Когда к врачу: Если рана глубокая, укушенная, болезненная, загрязнённая землёй, появилась припухлость или выделения.

Повидон-йод

Примеры: Бетадин раствор.

Когда применять: Как альтернатива хлоргексидину для поверхностной обработки кожи.

Как применять: Использовать только в концентрации, которую указал ветеринарный врач или инструкция к средству. Не подбирать разведение на глаз.

Когда не применять: Не использовать в глаза, уши, глубокие раны, на большие площади. Осторожно при болезнях щитовидной железы – согласовать с врачом.

Салфетки и раневые покрытия

Стерильные марлевые салфетки

Когда применять: Для промакивания, закрытия раны, первого слоя повязки, остановки небольшого кровотечения давлением.

Как применять: Положить на рану, прижать рукой или зафиксировать бинтом. При кровотечении давить непрерывно несколько минут.

Когда не применять: Не использовать вату прямо на открытую рану – волокна могут прилипнуть.

Когда к врачу: Если кровь быстро пропитывает салфетки, кровотечение не останавливается, рана глубокая или собака сильно беспокоится.

Неприлипающие раневые салфетки

Примеры: Melolin, Atrauman, Grassolind neutral или аналогичные неприлипающие стерильные повязки.

Когда применять: Для закрытия поверхностных ссадин, порезов, повреждений под временную повязку.

Как применять: Положить неприлипающим слоем на рану, сверху зафиксировать марлей и самофиксирующимся бинтом.

Когда не применять: Не использовать как замену осмотра при укушенных, глубоких, гнойных ранах.

Бинт, пластырь и ножницы

Самофиксирующийся эластичный бинт

Примеры: Peha-haft, 3M Coban, Vetrap или аналоги.

Когда применять: Для фиксации повязки на лапе или корпусе.

Как применять: Накладывать поверх марли или салфетки, не растягивая до максимума. Повязка должна держаться, но не сдавливать.

Как проверить: Пальцы ниже повязки не должны отекать, холодеть, синеть. Собака не должна резко усиливать беспокойство.

Когда не применять: Не оставлять тугую повязку надолго. Не закрывать мокрую, грязную, гнойную рану без осмотра врача.

Медицинский пластырь на катушке

Когда применять: Для фиксации бинта и краёв повязки.

Как применять: Клеить преимущественно на бинт, а не на шерсть и кожу.

Когда не применять: Не заклеивать рану герметично. Не использовать вместо нормальной повязки на мокнущих и глубоких ранах.

Ножницы с тупыми концами

Когда применять: Для разрезания бинта, пластыря, аккуратного снятия повязки.

Как применять: Держать кончик ножниц от кожи. При снятии повязки не тянуть резко.

Когда особенно важно: Если повязка намокла, сползла, стала тугой или собака начала её активно грызть.

Когти, занозы и клещи

Кровоостанавливающий порошок для когтей

Примеры: специальный ветеринарный кровоостанавливающий порошок для когтей.

Когда применять: Если при стрижке когтя задет сосуд и идёт умеренное кровотечение из кончика когтя.

Как применять: Нанести порошок на кончик когтя и прижать на 1–2 минуты.

Когда не применять: Не засыпать порошок в глубокие раны, укусы, разрывы кожи.

Когда к врачу: Если коготь сорван, лапа сильно болит, собака не наступает на лапу или кровотечение не останавливается.

Пинцет

Когда применять: Для удаления поверхностной занозы, колючки, ости травы, если она видна и легко достаётся.

Как применять: Аккуратно захватить и вытащить по направлению входа.

Когда не применять: Не выковыривать глубоко сидящие предметы. Не доставать предмет из глаза, уха, глубокой раны.

Крючок для снятия клещей

Примеры: Tick Twister или аналогичный крючок.

Когда применять: Если на собаке обнаружен присосавшийся клещ.

Как применять: Подвести крючок под клеща у кожи и выкручивать плавным движением. Не заливать клеща маслом, спиртом, лаком.

После снятия: Место можно обработать хлоргексидином 0,05%.

Когда к врачу: Если появились вялость, отказ от еды, температура, потемнение мочи, слабость, бледные или желтоватые слизистые.

Защита лапы и воротник

Защитный носок или лёгкий ботинок

Когда применять: Для временной защиты лапы после ссадины, пореза, раздражения подушечки по дороге домой или в клинику.

Как применять: Надеть на сухую лапу поверх лёгкой повязки или без неё, если нужно только дойти до дома.

Когда не применять: Не оставлять надолго на мокрой коже. Не использовать как лечение глубокой травмы лапы.

Защитный воротник

Примеры: пластиковый елизаветинский, мягкий или надувной воротник подходящего размера.

Когда применять: Если собака лижет или грызёт рану, лапу, шов, раздражённую кожу, глаз или ухо.

Как применять: Подобрать размер так, чтобы собака не доставала до проблемного места.

Когда особенно важно: После обработки раны, при травме глаза, после снятия клеща, если собака разлизывает кожу до воспаления.

Глаза и уши

Стерильный физраствор 0,9%

Примеры: натрия хлорид 0,9% в ампулах или буфусах.

Когда применять: Если в глаз попали пыль, песок, шампунь, мелкий мусор.

Как применять: Промывать обильно, направляя струю так, чтобы смыть загрязнение наружу. Глаз не тереть.

Когда не применять: Не пытаться самостоятельно доставать застрявший предмет из глаза.

Когда к врачу: Если собака щурится, глаз болит, мутнеет, краснеет, есть гной, травма, разный размер зрачков, выпячивание глаза.

Глазные капли с антибиотиком, гормоном или обезболивающим

Когда применять: Только если назначил ветеринарный врач после осмотра глаза.

Почему осторожно: При повреждении роговицы гормональные капли могут резко ухудшить состояние.

Ушные капли «от отита»

Когда применять: Только после осмотра врача.

Почему осторожно: При повреждении барабанной перепонки некоторые препараты опасны. Отиты бывают бактериальные, грибковые, паразитарные, аллергические – лечение разное.

ЖКТ: вода и регидратация

Оральный регидратационный раствор

Примеры: Регидрон, Регидрон Био, Адиарин Регидро.

Когда применять: При лёгком однократном расстройстве стула или небольшой потере жидкости, если собака активна, не рвёт многократно и сама глотает.

Как применять: Развести строго по инструкции. Давать маленькими порциями – лучше часто и понемногу, чем сразу большой объём.

Когда не применять: Не вливать насильно при рвоте, слабости, нарушении сознания, одышке, судорогах.

Когда к врачу: При многократной рвоте, крови, чёрном стуле, сильной вялости, боли в животе, отказе от воды, подозрении на инородное тело.

Шприцы без иглы 5–20 мл

Когда применять: Для аккуратного введения небольшого количества воды или раствора, если собака в сознании и нормально глотает.

Как применять: Вводить сбоку за щёку, медленно, маленькими порциями.

Когда не применять: Не заливать жидкость насильно. При слабости, нарушении сознания или рвоте есть риск аспирации.

ЖКТ: дополнительные средства

Энтеросорбент

Примеры: Энтеросгель, диосмектит / Смекта, Полисорб.

Когда применять: Как временная мера при лёгком расстройстве стула, если собака активна, пьёт, нет крови, многократной рвоты и сильной боли.

Как применять: По инструкции или рекомендации врача. Разносить с другими препаратами минимум на 2–3 часа – сорбент снижает их всасывание.

Когда не применять: Не использовать, чтобы «переждать» тяжёлые симптомы. Не давать при нарушении сознания, многократной рвоте, подозрении на инородное тело.

Когда к врачу: При крови в стуле, чёрном стуле, многократной рвоте, сильной вялости, боли в животе, ухудшении у щенка или пожилой собаки.

Пробиотик для собак

Примеры: Purina Pro Plan FortiFlora Canine, Энтерол.

Когда применять: После лёгкого расстройства стула, смены корма, курса лечения по рекомендации врача, при склонности к нестабильному стулу.

Как применять: Давать по инструкции к препарату курсом несколько дней или по схеме врача.

Когда не применять: Не использовать как замену диагностике, если понос выраженный, длится больше суток, есть кровь, рвота, боль, вялость.

Питание и перегрев

Влажный гастроинтестинальный рацион

Примеры: Royal Canin Gastrointestinal, Hill’s Prescription Diet i/d, Pro Plan EN, Farmina Vet Life Gastrointestinal, Monge VetSolution.

Когда применять: Как временный легкоусвояемый рацион при лёгком расстройстве ЖКТ, если корм подходит собаке и нет противопоказаний.

Как применять: Давать небольшими порциями. Не смешивать сразу много новых продуктов.

Когда не применять: При хронических болезнях, аллергии, панкреатите, болезнях почек, печени или специальной диете – рацион согласовать с врачом.

Что не давать самостоятельно при проблемах ЖКТ

Лоперамид Антибиотики Противорвотные Слабительные Масла Обезболивающие Ферменты «на всякий случай» Препараты другой собаки

Мгновенный холодовый пакет

Примеры: аптечный гипотермический пакет.

Когда применять: При ушибе, локальном отёке, перегреве как временная мера.

Как применять: Только через ткань. Прикладывать кратковременно, контролируя кожу.

Когда не применять: Не прикладывать лёд напрямую к коже. Не использовать как единственную помощь при тепловом ударе.

Когда к врачу: При тепловом ударе, сильной слабости, нарушении координации, рвоте, судорогах, температуре около 40 °C и выше – срочно.

При ухудшении состояния щенка обращайтесь к врачу без ожидания суток.

Боль, травмы и транспортировка

Полотенце или плотный плед

Когда применять: При травме, слабости, невозможности идти, после судорог, для транспортировки маленькой или средней собаки.

Как применять: Использовать как мягкие носилки или подкладку в машину. Двигать собаку аккуратно, без скручивания тела.

Когда к врачу: Если собака не может встать, волочит лапы, кричит от боли, не наступает на конечность, была травма после падения, ДТП, драки.

Холодовый пакет

Когда применять: При свежем ушибе, локальном отёке, болезненности мягких тканей.

Как применять: Через ткань на 5–10 минут, если собака спокойно терпит.

Когда не применять: Не прикладывать к открытой ране. Не использовать вместо осмотра при сильной хромоте или подозрении на перелом.

Индивидуально назначенное обезболивающее

Примеры: только если назначены врачом.

Когда применять: Только по заранее записанной схеме врача именно для этой собаки.

Как применять: Строго в назначенной дозе, с учётом веса, возраста, диагноза и противопоказаний.

Когда не применять: Не давать препарат другой собаки. Не сочетать обезболивающие между собой и с гормонами без врача. Не давать при рвоте, поносе, подозрении на кровотечение, болезни почек/печени.

Важно: Человеческие обезболивающие собакам не давать: ибупрофен, парацетамол, нимесулид, диклофенак, кеторолак, аспирин и похожие.

Гигиена и сбор мочи

Стерильный контейнер для мочи

Примеры: обычный аптечный стерильный контейнер для анализов.

Когда применять: Если врач попросил собрать мочу на анализ.

Как применять: Собрать свежую мочу в чистый контейнер и доставить в клинику как можно быстрее. Условия хранения уточнить у клиники.

Когда не применять: Не начинать антибиотики, мочегонные, спазмолитики до сдачи анализа без назначения врача.

Одноразовые пелёнки

Когда применять: При транспортировке, течке, недержании, выделениях, послеоперационном периоде, слабости.

Как применять: Использовать как подстилку. Менять по мере загрязнения.

Когда к врачу: При крови в моче, частых безрезультатных попытках помочиться, боли, невозможности помочиться, гнойных выделениях, резкой жажде.

Гигиенические салфетки без спирта и отдушек

Когда применять: Для наружной гигиены шерсти вокруг петли, препуция, лап, кожи после загрязнения мочой или выделениями.

Как применять: Аккуратно протереть наружные загрязнения, не вводить внутрь.

Когда не применять: Не использовать как лечение выделений, воспаления или зуда.

Судороги и отравления

Часы или таймер

Когда применять: При судорогах, обмороке, подозрении на нарушение дыхания.

Как применять: Засечь время начала и окончания приступа. По возможности снять короткое видео для врача.

Почему важно: По ощущениям приступ кажется длиннее, чем на самом деле. Для врача длительность критически важна.

Контакты клиники и токсикологической линии

Когда применять: При любом подозрении, что собака съела лекарство, яд, бытовую химию, растение, шоколад, виноград/изюм, ксилит, крысиный яд, удобрения, инсектициды.

Как применять: Сразу позвонить и сообщить: вес собаки, что съела, сколько, когда, есть ли симптомы.

Важно: Не ждать появления симптомов. По многим ядам ранняя помощь значительно эффективнее.

Упаковка вещества или фото состава

Когда применять: При любом подозрении на отравление.

Как применять: Сохранить упаковку, инструкцию, блистер, этикетку или сделать фото состава. Взять с собой в клинику.

Почему важно: Так врач быстрее поймёт действующее вещество и риск.

Отравления: инструкции врача

Энтеросорбент при отравлении

Примеры: активированный уголь, Энтеросгель.

Когда применять: Только после инструкции ветеринарного врача, особенно если речь об отравлении.

Почему осторожно: При рвоте, слабости, судорогах, нарушении сознания есть риск аспирации. При некоторых веществах сорбент бесполезен или мешает другой помощи.

Перекись водорода 3%

Когда применять: Только если ветеринарный врач прямо сказал вызвать рвоту и дал инструкцию.

Когда не применять: Не использовать для обработки ран. Не вызывать рвоту самостоятельно.

Нельзя вызывать рвоту: При проглатывании кислот, щелочей, нефтепродуктов, острых предметов, батареек, при судорогах, слабости, нарушении сознания, одышке, если прошло много времени или врач не велел. Заполняется только после консультации с ветеринарным врачом. На каждой упаковке – наклейка: кличка собаки, дозировка, когда давать, максимальная кратность, дата назначения.

При судорогах

Уберите опасные предметы, приглушите свет, не удерживайте собаку и не помещайте пальцы или предметы ей в пасть. Засеките время и свяжитесь с клиникой.

Индивидуальные назначения

Препарат от укачивания

Примеры: Драмина.

Когда применять: Если собаку укачивает в машине и препарат назначен врачом.

Как применять: По схеме врача перед поездкой.

Когда не применять: Не давать впервые перед дальней дорогой без консультации. Не использовать при рвоте неизвестной причины как «просто противорвотное».

Антигистаминный препарат

Примеры: цетиризин, лоратадин, супрастин.

Когда применять: Только если врач заранее указал препарат и дозу – например, при лёгкой реакции на укус насекомого или известной склонности к аллергии.

Как применять: По индивидуальной схеме врача.

Когда не применять: Не использовать как единственную помощь при отёке морды, одышке, слабости, рвоте, коллапсе – это может быть анафилаксия, нужна срочная клиника.

Ветеринарное обезболивающее

Примеры: только по назначению врача.

Когда применять: При заранее оговорённых ситуациях: обострение ортопедической проблемы, послеоперационная схема, хроническая боль под контролем врача.

Как применять: Строго по назначению. Не менять дозу самостоятельно.

Когда не применять: Не давать при рвоте, поносе, чёрном стуле, подозрении на кровотечение, обезвоживании, болезни почек/печени без согласования.

Лекарства: важные ограничения

Противорвотный препарат

Примеры: Серения / маропитант, ондансетрон.

Когда применять: Только по назначению врача.

Как применять: По индивидуальной схеме.

Когда не применять: Не давать при подозрении на инородное тело, отравление, заворот, кишечную непроходимость без осмотра или консультации врача.

Препараты для хронических заболеваний

Когда применять: Если у собаки есть хронический диагноз и постоянные назначения.

Как хранить: Держать запас минимум на несколько дней. Рядом – письменная схема: дозы, время приёма, что делать при пропуске, когда срочно в клинику.

Примеры: препараты для сердца, эпилепсии, эндокринных заболеваний, хронической боли, ЖКТ – только назначенные этой собаке.

Что нельзя держать как «самопомощь»

Эти средства без назначения врача могут смазать картину болезни, ухудшить состояние или быть опасны для собаки. Человеческие обезболивающие Антибиотики Гормональные препараты

Ушные капли «от отита»

Глазные капли с антибиотиком, гормоном или обезболивающим

Противорвотные Лоперамид и другие препараты «от поноса» Слабительные и масла Мочегонные Сердечные препараты Седативные препараты Спирт, зелёнку, концентрированный йод для открытых ран Перекись водорода для обработки ран

Заполните заранее

Держите эту страницу рядом с аптечкой.

Кличка и возраст собаки

_____

Вес и дата взвешивания

_____

Хронические болезни и аллергии

_____

Постоянные препараты и схема врача

_____

Основная клиника и телефон

_____

Круглосуточный стационар и телефон

_____

Адрес стационара и способ добраться

_____

Дата следующей проверки аптечки

_____

Проверяйте сроки годности и стерильные материалы каждые 3–6 месяцев.

Как пользоваться памяткой

Это справочник по составу аптечки и ограничениям первой помощи, а не схема лечения. Если состояние собаки вызывает сомнения, свяжитесь с врачом и сообщите симптомы, вес, время начала и уже предпринятые действия.

Источники для проверки рекомендаций

VCA — первая помощь собакам

VCA — кровотечения

VCA — уход за ранами

Tufts — домашняя аптечка и первая помощь

Обновление оформления и уточнений по безопасности: ноябрь 2026.