

NEW
ПЕРВАЯ
ПОМОЩЬ
natali_vet

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступительное слово _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Раны _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Кровотечения: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Капиллярное кровотечение _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Венозное кровотечение _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Наложение давящей повязки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Артериальное кровотечение _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Правила наложения жгута _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Повреждение когтя _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Переломы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Автотравмы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Отравления: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Пищевое отравление _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Респираторное отравление _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35
Контактное отравление _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35
Питомец проглотил инородный предмет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36
Аллергии: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38
Укус пчелы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39
Анафилактическая реакция _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39
Укус змеи _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41

natali_vet

ОГЛАВЛЕНИЕ

Ожоги: — — — — — — — — — — — 44
Химический ожог — — — — — — — — — — — 44
Термический ожог — — — — — — — — — — — 44
Диарея — — — — — — — — — — — 46
Рвота — — — — — — — — — — — 47
Повышение температуры — — — — — — — — — — — 48
Тепловой удар — — — — — — — — — — — 50
Сердечный приступ — — — — — — — — — — — 52
Питомец подавился — — — — — — — — — — — 56
Утопление — — — — — — — — — — — 58
Переохлаждение — — — — — — — — — — — 59
Обморожение — — — — — — — — — — — 57
Отит — — — — — — — — — — — 60
Как правильно извлечь клеща — — — — — — — — — — — 61
Травмы глаз: — — — — — — — — — — — 62
Травмы, с которыми нельзя медлить — — — — — — — — — — — 63
Выпадение глаза — — — — — — — — — — — 64
Судороги — — — — — — — — — — — 65
Сердечно-легочная реанимация — — — — — — — — — — — 71
Падение гюкозы — — — — — — — — — — — 75
Правила подготовки к инъекциям — — — — — — — — — — — 78
Подкожные инъекции — — — — — — — — — — — 79
Внутримышечные инъекции — — — — — — — — — — — 80
Аптечка — — — — — — — — — — — 81

natali_vet





Вы держите в руках руководство по оказанию первой помощи питомцу.

Это доврачебная (экстренная помощь), которую вам надо оказать сиюминутно, когда в жизни вашего питомца произойдет экстренный случай. И чтобы вы смогли быстро среагировать и правильно оказать экстренную помощь, вам надо этому научиться.

Для этого вам надо изучить весь обучающий материал курса: «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ». И собрать экстренную аптечку.

И от меня вам рекомендация: «СОБЕРИТЕ АПТЕЧКУ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ СРАЗУ». Не завтра, не потом, а сейчас. Это ваш спасательный круг и он должен быть всегда рядом. В экстренных ситуациях вашему питомцу нужны вы и ваша помощь, и она нужна здесь и сейчас. А если не будет собранной аптечки, то вы будете судорожно бегать по аптекам в поисках лекарств, которых ваш хвостик может просто не дождаться с такими действиями.

От действий владельца в экстренных ситуациях зависит дальнейшая судьба и жизнь питомца!

Уточняю сразу, я не смогу сделать из вас ветеринаров и полностью избавить от походов в ветеринарные клиники. Но я точно смогу научить вас оказывать квалифицированную доврачебную помощь. Именно эта помощь позволяет выиграть время, избежать последствий и сохранить питомцу жизнь.



ТРАВМЫ

Наиболее часто встречающиеся травмы у кошек и собак:

- Раны
- Кровотечения
- Ушибы
- Переломы

Первая, доврачебная помощь при ранах и кровотечениях.

РАНЫ

Раны сопровождаются болью, кровотечением, зиянием (наличие повреждения на коже с разрушением тканей и сосудов).

Интенсивность боли зависит от количества и расположения нервных окончаний в области повреждения.

Кровотечения зависят от характера травмы и, естественно, от расположения и тяжести повреждения кровеносных сосудов.

Если вы заметили на теле животного рану:

Срочно необходимо обработать эту область. Это место является входом бактерий в организм животного.

Любое из нижеперечисленных средств подойдёт для промывания раны:

- Хлоргексидин
- Натрия хлорид
- Мирамистин
- Фурацилин



ВАЖНО

Если диаметр и глубина раны не превышает 2-2.5 см, ее можно не зашивать. Естественно, если это не котёнок или щенок с размером в 10 см.

После правильной обработки раны ее нужно перевязать, используя стерильные перевязочные материалы:

- Марлевые салфетки
- Бинты



Если рана маленькая, ее можно заклеить бактерицидным пластырем.

! Шерсть вокруг раны лучше сбривать (для этого подойдет обычный бритвенный станок), так вы сможете полноценно оценить размер раны и качественно ее обработать.

Надо помнить, что раны могут причинять животному сильную боль. Особенно кусаные раны крайне болезненны. У животного, как правило, возникает болевой синдром и питомец находится в шоковом состоянии.

Чтобы стабилизировать состояние животного и довезти его до клиники, рекомендуется сделать ему обезболивающий укол:

МЕЛОКСИКАМ 10мг/мл инъекционный

Дозы: 0.1 мл на 4 кг массы животного, то есть, если животное весит:

- 4 кг — 0.1мл.
- 8 кг — 0.2мл.
- 16 кг — 0.4мл.
- 32 кг — 0.8мл. и т.д.



Делать инъекцию Мелоксикама внутримышечно (в ногу).

! Если ранение сопровождается обильным кровотечением, то в первую очередь устраняем кровотечение и везем в клинику питомца без обезболивающих средств.

В зависимости от характера повреждений тканей, раны классифицируют на:

- Колотые
- Резаные
- Рубленые
- Укушенные
- Ушибленные
- Огнестрельные

ГНОЙНЫЕ РАНЫ



Это те раны, из которых течет гной.

План действий:

- Очистите рану от омертвевших участков, извлеките всю шерсть
- Забрейте шерсть вокруг раны
- Промойте рану. Можно использовать стерильные тампоны, смоченные в растворах и с их помощью убирать гной из раны

Растворы для промывания:

- Хлоргексидин
- Натрия хлорид
- Мирамистин
- Фурацилин

Любое из этих средств подойдёт.




- Необходимо ограничить доступ животного к ране — ЗАЩИТНЫЙ воротник лучше всего подходит в этих случаях
- Показать ветеринарному врачу (некоторые гнойные раны требуют применения системных антибиотиков)
- Если у животного рана незначительного размера, то можно справиться с ней самостоятельно. Наложите повязку, пропитанную препаратом, который оказывает антибактериальный эффект и заживляет рану. Мазь ЛЕВОМЕКОЛЬ отлично подойдёт для этого. Ежедневно повторять промывание и перевязки до полного заживления раны.

УШИБЛЕННЫЕ РАНЫ

При таких ранах у животного наблюдается сильный отек или гематома мягкий тканей. А вот кровотечение отсутствует.

Первая помощь при ушибах — ХОЛОД! Необходимо на место ушиба приложить холодный компресс, положив ткань, сложенную вчетверо на 10-15 минут.

КРОВОТЕЧЕНИЯ



Кровотечения подразделяют на:

- Артериальные
- Венозные
- Капиллярные

Самое страшное — это артериальное кровотечение. Оно возникает в результате травматизации крупных сосудов.


Прежде чем пытаться остановить кровотечение, нужно определить его тип. От этого будет зависеть способ остановки.

КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

Самое безопасное. Это незначительное вытекание крови.

План действий при капиллярном кровотечении:

- Очистите кожу:
  - при необходимости сбрейте шесть
- Промойте рану:
  - хлоргексидин
  - натрия хлорид
  - мирамистин
  - фурацилин



Любое из этих средств подойдёт.

- Промойте рану с кровоостанавливающим средством:
  - перекись водорода с капиллярным кровотечением справится «на ура»
- Закройте рану марлевой салфеткой/бинтом/пластырем

ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ


Кровь при венозном кровотечении вытекает из раны равномерно и постоянно. Чаще всего венозные кровотечения происходят вследствие глубоких ран или порезов. Такой вид кровотечения не вызывает обильной кровопотери.

План действий при венозном кровотечении:

- Очистите кожу

Промойте рану:

- хлоргексидин
- натрия хлорид
- мирамистин
- фурацилин



Любое из этих средств подойдёт.

Остановите кровотечение:

- перекись водорода

Наложите тугую стерильную ватно-марлевую повязку.

НАЛОЖЕНИЕ ДАВЯЩЕЙ ПОВЯЗКИ

Давящую повязку применяют при венозных и артериальных кровотечениях.

Как правильно ее наложить?

На рану наложить сложенную в несколько раз стерильную марлю или сложенный многослойно стерильный бинт

Марлю/бинт нужно предварительно смочить в растворе перекиси водорода

Сверху на эту повязку необходимо ещё наложить бинт и тщательно его зафиксировать

Если необходимо наложить повязку на конечности, запомните — всегда нужно бинтовать снизу вверх. Необходимо накладывать каждый последующий слой бинта так, чтобы он захватывал предыдущий слой.

С такой повязкой вы можете смело выезжать в ветеринарную клинику для оказания последующей помощи.

Теперь разговор пойдёт о самом опасном кровотечении.

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

Возникает в результате серьезных травм и глубоких повреждений. Артериальное кровотечение имеет четкие специфические признаки:

Кровь из раны бьет фонтаном, струя крови ярко-алого цвета и она пульсирует, лужи крови быстро увеличиваются вокруг пострадавшего питомца.

Происходит большая кровопотеря.
Артериальное кровотечение нужно как можно скорее устранить.

План действий при артериальном кровотечении:

- Необходимо наложить жгут выше места кровотечения
- После наложения жгута на рану нужно наложить давящую повязку (марлевую)
- Срочно доставить животное в ветеринарную клинику

ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА

Ещё раз уточню, что это необходимо делать только при сильных кровотечениях на конечностях или хвосте. Если кровотечение в другой части тела, то необходимо накладывать давящую повязку.

В качестве жгута можно использовать:

- резиновый бинт
- обычный бинт
- тонкую тесьму
- любой кусок ткани
- носовой платок

ВАЖНО

Жгут всегда накладывается выше места кровотечения! Сила наложения жгута должна быть достаточной для остановки кровотечения, но не должна вызывать сильную боль у питомца!

В теплый период года жгут можно оставлять на 1,5 часа.

В холодное время года не более, чем на один час, чтобы не спровоцировать некроз тканей.

Если нет возможности доставить животное в ветеринарную клинику в течение этого времени, то необходимо ослаблять жгут на 3 минуты каждые 30 минут. Но в момент ослабления жгута необходимо зажать пальцем кровоточащий сосуд.

Если произошло проникающее ранение грудной или брюшной полости, необходимо закрыть это отверстие давящей повязкой (насколько это возможно).

Давящая повязка поможет в случае кровотечения. И не позволит проходить воздуху в грудную и брюшную полость.

ПОВРЕЖДЕНИЕ КОГТЯ

Вырванные или сломанные когти не являются жизнеугрожающим состоянием, но это очень болезненно для животного и владельцу бывает сложно остановить кровь.

Без лечения травмированный коготь может периодически кровоточить, а иногда и инфицироваться.

План действий:

Остановить кровотечение

Подойдут следующие средства:

- кристаллы марганцовки
- капрамин



Ватную палочку окунуть в кровоостанавливающее средство и приложить к повреждённому когтю.

Удалить повреждённый коготь или его часть. Часть когтя можно удалить вручную или можно использовать когтерез, ножницы или щипчики. Необходимо отрезать коготь в месте повреждения.

- Наложить повязку. Если коготь повреждён сильно — у основания, то стоит наложить повязку на 12–24 часа (лёгкую, не перетягивать сильно, чтобы не нарушить циркуляцию крови)

ПЕРЕЛОМЫ

Перелом — это полное или частичное нарушение целостности кости.

Вот здесь оказать помощь самостоятельно трудно. Так как большинство переломов можно увидеть только на рентгене.

Чаще всего у животных происходят переломы конечностей.

Как самостоятельно определить перелом конечности у животного?

При переломе:

- Животное малоподвижно
- Форма лапы изменяется
- Наблюдается отёк
- Видны сгибы и утолщения там, где их не должно быть (где нет суставов)
- При попытке движения туловища конечность висит, как плеть

Оказание доврачебной помощи.

И самый главный принцип здесь — НЕ НАВРЕДИТЬ!

- Не пытайтесь восстановить правильное положение конечности
- Не трогайте конечность

  Любые ваши действия могут причинить сильную боль животному
- Постарайтесь успокоить животное и максимально обездвижить
- Уложите животное на твёрдую поверхность (сделать подобие носилок), чтобы можно было животное транспортировать
- Профилактика отёка. Для этого необходимо воздействие холода на место перелома. В домашних условиях подойдут продукты из морозилки или лёд, завёрнутые в полотенце

  Аккуратно приложить, но не давить на повреждённую конечность
- Остановка кровотечения.
  При открытых переломах вы можете столкнуться с кровотечением. И тогда применяйте способы остановки, которые мы разобрали выше
- Как можно скорее доставьте животное в ветеринарную клинику

АВТОТРАВМЫ

Как должен себя вести хозяин?

Надо помнить, что животное, если оно в сознании, может укусить, так как находится в состоянии шока и испытывает сильную боль. Поэтому подходить к пострадавшему питомцу надо с осторожностью.

Хорошо иметь наготове плед, куртку, чтобы можно было накрыть животное.

Необходимо оценить состояние:

- Наличие кровотечений
- Открытых переломов
- Сознание
- Дыхание



Пострадавшее животное надо срочно доставить в ветеринарную клинику.

Как это правильно сделать?

Питомца не стоит тянуть, поднимать. В случае, если повреждён позвоночник, это может привести к смещению позвонков и даже к разрыву спинного мозга.

Идеальный вариант — сделать носилки (подстелить покрывало, куртку, все, что может стать гамаком/носилками).

Насколько быстро надо доставить пострадавшего в клинику?

Торопиться надо в любом случае при автотравмах. Не важно, в сознании животное или нет. Случаются травмы, последствия которых развиваются по нарастающей.

При такой травме может развиваться:

- пневмоторакс (скопление воздуха в грудной полости)

- внутреннее кровотечение, которое, если его сразу не устранить, может привести к большой кровопотере и к гибели

Если кровотечение видимое, то действуем по плану:

- Определяем вид кровотечения
- Пытаемся его устранить

Даже если после удара машины питомец встал и побежал, это не означает, что все хорошо и можно не ехать в клинику. Животное может находиться в состоянии шока и не чувствовать повреждений и боли.

ОТРАВЛЕНИЯ

Существует несколько типов отравлений:

- Пищевое — это когда животное что-то проглотило и токсины попали в ЖКТ
- Респираторное — животное вдыхает токсины через нос
- Контактное — когда токсические вещества попадают на кожу



ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ

Причин может быть много:

- Запрещённая еда (шоколад, авокадо, виноград, орехи, грибы)
- Лекарственные препараты
- Остатки пищи из мусорного ведра
- Пропавшие мясные продукты
- Мертвые грызуны, тараканы



План действий :

- Вызвать рвоту. Простой способ, как это сделать в домашних условиях:
  - перекись водорода+вода в пропорции 1/3 и заливаем в рот пока не начнётся рвота
- Промыть желудок
  - заливаем большое количество воды опять до рвоты
- Дать адсорбенты: ПОЛИСОРБ



- Животное до 5 кг: 1 чайную ложку на 15-20 мл. воды
- Животное от 5 до 10 кг: 2 чайные ложки на 20-40 мл. воды
- Животное от 10 до 20 кг: 1 столовую ложку на 40-50 мл. воды
- Животное от 20 кг и выше: 1.5-2 столовые ложки на 50-70 мл. воды

Сейчас разберём с вами отравления, при которых требуется больше ваших действий, кроме, как вызвать рвоту, промыть желудок и дать сорбент.

И НАЧНЁМ С ОТРАВЛЕНИЯ РАСТЕНИЯМИ

Очень часто питомцы их поедают! А вы даже не знаете, что они опасны. И сразу не оказываете необходимую помощь.

И понимаете, что произошло отравление, когда питомцу явно становится очень плохо.





ОТРАВЛЕНИЯ РАСТЕНИЯМИ

ДОМАШНИЕ РАСТЕНИЯ ОПАСНЫ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК

Ниже смотрите фото, разновидности и названия цветов, которые опасны.

‼️ЕСЛИ ПИТОМЕЦ ПОЖЕВАЛ ИЛИ ПРОГЛОТИЛ растения из этого списка!

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ АРОИДНЫЕ РАСТЕНИЯ:

- **алоказия**
- **антуриум**
- **анубиас**
- **каладиум**
- **диффенбахия**
- **эпипремнум**
- **монстера**
- **филодендрон**
- **спатифиллум**
- **сингониум**



Сканируйте QR-код, чтобы посмотреть фото

Опасны и листья и стебли.

Все виды бегоний и диффенбахия.

Все эти растения содержат мозаичный рисунок. И если вы не нашли в этом списке ваш цветок, но у него тоже есть мозаичный рисунок, то вам тоже надо действовать по этой инструкции.

Эти растения опасны, так как они защищаются от нападений животных и поэтому содержат кристаллы оксалата кальция, которые выстреливают при повреждении растения.

А еще ароидные растения выделяют ферменты и это усиливает отек (ротовой полости, глотки, пищевода и желудка). Они сильно травмируют место, куда они попали и вызывают боль.

Симптомы отравления этими растениями:

- Слюнотечение
- Отек морды
- Нарушение глотания
- Питомец расчесывает/лезет лапами в рот, как-будто подавился
- Отек слизистой и покраснение слизистой ротовой полости
- Мяуканье/писк, изменение голоса
- Дрожь головы и всего тела
- Рвота/рвота с кровью
- Боль в животе
- Отказ от пищи

! ВАЖНО

Если питомец съел большое количество растения и у него наблюдается тремор (дрожь по телу), судороги, отек дыхательных путей, нарушение глотания, ТО НЕОБХОДИМО СРОЧНО ВЫЕЗЖАТЬ В ВЕТЕРИНАРНУЮ КЛИНИКУ. И оказать первую помощь у вас не получится, так как при судорогах и нарушении глотания и дыхания ничего нельзя заливать в ротовую полость.

ОСОБЕННО ДИФФЕНБАХИЯ вызывает серьезные нарушения.

Во всех остальных случаях действуйте сейчас!

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:

01 **Промыть пораженный участок ротовой полости холодной водой** из шприца (без иглы), промываем в течение 15 минут под напором сбоку, либо повернуть кран, голову на бок, чтобы не заливалась вся эта вода и питомец не захлебнулся.

02 **Выпоить молоком.** За счет жиров молока происходит обволакивание и защита пораженных слизистых. Если питомец самостоятельно не будет пить молоко, то выпоить насильно из шприца (без иглы).

- На маленького питомца (вес до 10кг) 10-30мл молока.
- На крупного питомца (вес от 10кг) 30-100мл молока.

03 **Дать антигистаминное средство:**

- ЦЕТРИН
- ЗОДАК
- ЗИРТЕК

Любой из этих препаратов.

СОБАКИ

- Вес от 1 до 3 кг — 1/3 табл.
- Вес от 3 до 5 кг — 1/2 табл.
- Вес 10 кг — 1 табл.
- Вес 20 кг — 2 табл.
- Вес 30 кг — 3 табл.
- Вес 40 кг-60кг — 4 табл.

КОШКИ

У них доза выше: от 2.5 до 5мг на килограмм!

- Вес от 1 до 3 кг — 1 табл.
- Вес 3 -5кг — 1,5 табл.
- Вес 6 -10кг — 3 табл.
- Вес более 10 кг — 4 табл.

04 Сделать инъекцию противорвотного средства (ЕСЛИ У ПИТОМЦА РВОТА):

Ондасетрон 2мг/мл. Раствор для инъекций.

- Вес от 1 до 3 кг — 0.25мл
- Вес от 3 до 5 кг — 0,5мл
- Вес 10 кг — 1.0мл
- Вес 20 кг — 2.0мл
- Вес 30 кг — 3.0мл
- Вес 40 кг-60кг — 5мл

Инъекцию делать внутримышечно (в ногу).

ПИТОМЕЦ ПРОГЛОТИЛ растения из этого списка:

- СВЕКЛА (БОТВА)
- ЩАВЕЛЬ
- РЕВЕНЬ
- ОПУНЦИИ
- АМАРАНТЫ
- КАКТУСЫ
- КИСЛИЦА



Как они выглядят, смотрите здесь

Эти растения содержат растворимые оксалаты. И они вызывают системную гипокальциемию (уровень кальция в крови падает).

Оксалаты кальция выводятся через почки и они вызывают повреждение почек. А еще оксалаты кальция могут отложиться камнями в любом участке выделительной системы (уретра, мочевой пузырь, почки).

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ ЭТИМИ РАСТЕНИЯМИ

- Рвота сразу после поедания.
- Через несколько часов развивается слабость (здесь уже начинается падение кальция в крови).
- Тремор (подергивание частей тела) и судороги.
- Дальше развивается острая почечная недостаточность (ЧЕРЕЗ 24-36 ЧАСОВ). Питомец начинает много пить, мочеиспускание становится обильным, может появиться кровь в моче, может быть уменьшение или отсутствие мочи.
- При длительном поедании может вызывать хроническую болезнь почек (если питомец постоянно ест по чуть-чуть, то у него может не быть этой яркой картины отравления, но в итоге это приведет к поражению почек).

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:

01 **Вызывать рвоту:**

Перекись водорода+вода в пропорции 1/3 и заливаем в рот, пока не начнётся рвота. ЧТОБЫ УСКОРИТЬ РВОТНЫЙ РЕФЛЕКС можно надавить пальцами на корень языка или подергать язык.

02 **Промыть желудок:**

Надо залить большое количество воды опять до рвоты.

03 **Выпоить молоком** (оно мешает усваиваться оксалатам).

Если питомец самостоятельно не будет пить молоко, то выпоить насильно из шприца (без иглы).

ДОЗА: 🥛 50мл на 1 килограмм веса.

04 **Далее в срочном порядке выезжать в ветеринарную клинику.**

Необходимо будет сдать минеральный обмен, биохимический анализ крови и общий анализ мочи, чтобы отследить состояние и понять, какая терапия необходима.

Даю план, чтобы вы понимали, что должны делать врачи в клинике при таких отравлениях и вы могли контролировать процесс.

- Питомцу может потребоваться введение глюконата кальция 0.5-1.5мг/кг при гипокальциемии.

- Питомцу может потребоваться инфузионная терапия при оксалурии или азотемии.

- ЕЩЕ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ противорвотные средства и постоянный мониторинг почек.



! ОМЕЗ, ОМЕПРАЗОЛ запрещены (так как они нефротоксичны). ОНИ будут усугублять поражение почек.

Такие отравления часто происходят у животных, которым в рацион добавляют много растительной пищи (щавель, свекла и т.д.) И у животных, которые свободно гуляют в огороде.

ЕСЛИ ПИТОМЕЦ ПРОГЛОТИЛ ИЛИ ПОЖЕВАЛ растения из этого списка

- Ландыши
- Наперстянка пурпурная
- Наперстянка шерстистая
- Каланхоэ (В каланхоэ больше всего яда в цветах, собаки к ним наиболее чувствительны.)
- Олеандр
- Роза пустыни (адениум)
- Азалия
- Тилекодон и другие суккуленты



Скопируйте QR-код

ВСЕ ЭТИ РАСТЕНИЯ НАРУШАЮТ РАБОТУ СЕРДЦА!

Острое отравление вызывает сердечную или дыхательную недостаточность, которая приводит к гибели питомца.

! Очень быстрая гибель при небольшом поедании этих растений.

ЧАЩЕ ВСЕГО РЕГИСТРИРУЮТСЯ ОТРАВЛЕНИЯ КАЛАНХОЭ И ЛАНДЫШАМИ В БУКЕТАХ.

Симптомы:

- **Нистагм** (это быстрые движения глаз, которые повторяются).
- **Подергивания частей тела.**
- **Судороги.**
- **Далее рвота.**
- **Летаргия (длительный сон).**
- **Депрессия.**
- **Диарея.**
- **Слабость.**
- **Одышка.**
- **Тахикардия.**

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:

01 **Вызвать рвоту:**

Перекись водорода+вода в пропорции 1/3 и заливаем в рот пока не начнётся рвота. ЧТОБЫ УСКОРИТЬ РВОТНЫЙ РЕФЛЕКС можно надавить пальцами на корень языка или подергать язык.

02 **Промыть желудок:**

Надо залить большое количество воды опять до рвоты.

03 **Дать адсорбенты:** Полисорб или Энтеросгель.

Дозы:

- **Животное до 5 кг:** 1 чайную ложку на 15-20 мл воды
- **Животное от 5 до 10 кг:** 2 чайные ложки на 20-40 мл воды
- **Животное от 10 до 20 кг:** 1 столовую ложку на 40-50 мл воды
- **Животное от 20 кг и выше:** 1.5-2 столовые ложки на 50-70 мл воды.

04 **ДАЛЕЕ СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ В КЛИНИКУ.**

ЕСЛИ уже есть симптомы, то потребуется инфузионная терапия (капельницы) для поддержания сердечного выброса.

Требуется ЭКГ мониторинг 24 часа, контроль АД (давления) и контроль электролитов.

ЕСЛИ ПИТОМЕЦ ПРОГЛОТИЛ ЛУКОВИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

Опасны не только сами луковичные растения (цветы, стебли и луковицы), но и вода, в которой они стояли.

НАРЦИССЫ , наиболее ядовиты луковицы.

Симптомы:

- Вызывают острый гастрит, сильную рвоту, боль в животе, обильное слюнотечение.
- Возможно нарушение со стороны ЦНС: угнетение, нарушение сердечного ритма и нарушение дыхания.
- А еще может развиться кишечная непроходимость съеденными цветами и луковицами.



ТЮЛЬПАНЫ. Цветы и листья не очень токсичны.

Симптомы:

- Рвота и диарея при поедании листьев и стеблей.
- При поедании луковиц поражение ЖКТ уже серьезнее: одышка, возможно поражение сердечно-сосудистой системы.

ГИАЦИНТЫ

Ядовиты полностью, особенно луковицы.



АМАРИЛЛИС

Содержат алкалоиды ликорин и тазетин.
Ликорин воздействует на рвотный центр.
После поедания такого растения очень сложно остановить рвоту.

Симптомы:

- Сильнейшая рвота, диарея, анорексия, обильное слюнотечение.
- Беспокойство, боль в животе, снижение давления, одышка, тремор, судороги. Токсический гепатит.

ИРИС

В луковице содержатся раздражающие смолы.

Симптомы:

- Рвота, боль в животе, тяжелый панкреатит, энтерит, поражение печени (токсический гепатит).



Как они выглядят, смотрите здесь

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:

01 **Вызвать рвоту:**

Перекись водорода+вода в пропорции 1/3 и заливаем в рот пока не начнётся рвота. ЧТОБЫ УСКОРИТЬ РВОТНЫЙ РЕФЛЕКС можно надавить пальцами на корень языка или подергать язык.

02 **Промыть желудок:**

Надо залить большое количество воды опять до рвоты.

03 **Дать адсорбенты:** Полисорб или Энтеросгель.

Дозы:

- Животное до 5 кг: 1 чайную ложку на 15-20 мл воды
- Животное от 5 до 10 кг: 2 чайные ложки на 20-40 мл воды
- Животное от 10 до 20 кг: 1 столовую ложку на 40-50 мл воды
- Животное от 20 кг и выше: 1.5-2 столовые ложки на 50-70 мл воды

04 **После необходимо обратиться в клинику, если уже начались симптомы.**

ВОТ ТАК В КЛИНИКЕ ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЛУКОВИЧНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

- Противорвотное средство Серения, а при отравлении аммариллисом еще и Ондасетрон.
- АЦЦ 140мг/кг внутривенно в течение часа, далее каждые 6 часов по 70мг/кг — всего 6 раз.



- Гептрал. Доза на собаку — 20мг на кг в рот каждые 24 часа. Доза на кошку-280мг при сильных токсических поражениях печени. Курс лечения гептралом обычно 5-7 дней.

  Здесь высокая вероятность повреждения печени.
  И чтобы печень смогла справиться и вывести яд, для этого и назначается здесь Гептрал.

Кошка и лилии

Токсичны только для кошек. Отравление вызывает даже очень маленькая порция лилий (менее 1 листа уже достаточно, чтобы котейка отравился).



- ! Опасны и листья,и стебель,и цветы. Опасна даже вода, в которой стоят лилии. И нюхать лилии кошкам тоже запрещено.
- ! И всегда отравление лилиями для кошек заканчивается острой почечной недостаточностью.

У собак при поедании лилий может быть только рвота и диарея с кровью (если много съедят).

Симптомы:

- 0-3 часа после отравления: рвота, слюнотечение, отказ от пищи, депрессия;
- 12-24 часа: начальная стадия почечной недостаточности;
- 1-5 дней после поедания: обезвоживание, гибель в результате острой почечной недостаточности.

ПРОГНОЗ

При своевременном лечении (на ранней стадии) прогноз благоприятный. Плохой, если нет лечения.


ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:

01 **Вызвать рвоту:**

Перекись водорода+вода в пропорции 1/3 и заливаем в рот пока не начнётся рвота. ЧТОБЫ УСКОРИТЬ РВОТНЫЙ РЕФЛЕКС можно надавить пальцами на корень языка или подергать язык.

02 **Промыть желудок:**

Надо залить большое количество воды опять до рвоты.



03 **Дать адсорбенты:** Полисорб или Энтеросгель.

Дозы:

- Животное до 5 кг: 1 чайную ложку на 15-20 мл воды
- Животное от 5 до 10 кг: 2 чайные ложки на 20-40 мл воды
- Животное от 10 до 20 кг: 1 столовую ложку на 40-50 мл воды
- Животное от 20 кг и выше: 1.5-2 столовые ложки на 50-70 мл воды

! ДАЛЕЕ СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ В КЛИНИКУ.

НЕОБХОДИМО ОТСЛЕДИТЬ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК:

- сдать биохимию крови (креатинин в первую очередь)
- минеральный обмен (фосфор в первую очередь)
- общий анализ мочи
- контроль артериального давления

ЕСЛИ отравление уже началось, то потребуется инфузионная терапия (капельницы) в течение 3 суток.

При анурии (вообще не образуется моча) необходим диализ. Но он доступен единицам в МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

ОТРАВЛЕНИЯ ДОГХАНТЕРАМИ

Отравление чаще всего происходит из-за поедания мясных продуктов, в которые догхантеры спрятали отраву.

Если ваш питомец застрял в кустах и что-то вынюхивает или уже начал жевать.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:

- Быстро осмотреть ПАСТЬ И ВЫТАЩИТЬ ВСЕ СОДЕРЖИМОЕ, КОТОРОЕ успело попасть.
- Осмотреть место, где происходила эта трапеза на предмет мясных приманок (куски колбасы/мяса, шарики из фарша).

  И если они найдены, срочно разламывайте их и смотрите, что там.
- Хорошо осмотрите местность, если там крысиный яд, то точно будут следы ярких гранул/зерен/порошка. Крысиный яд всегда ярких цветов.

! А если там изониазид, то будут белые таблетки или следы от белого порошка.

Как может выглядеть яд, смотрите здесь



Смотря что нашли, от этого будет зависеть выбор антидота.

! ЭТО ВСЕ НАДО СДЕЛАТЬ БЫСТРО, чтобы не терять драгоценное время!

ЕСЛИ БЫЛИ БЕЛЫЕ ТАБЛЕТКИ/ПОРОШОК

ОТРАВЛЕНИЕ ИЗОНИАЗИДОМ у собак! Кошки менее чувствительны к нему.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:

- Срочно вызвать рвоту:

  перекись водорода+вода в пропорции 1/3 и заливаем в рот пока не начнётся рвота. Чтобы ускорить рвотный рефлекс надо надавить пальцами на корень языка или подергать за язык.

- Далее промыть желудок: заливаем большое количество воды опять до рвоты.

  ВАЖНО! КОГДА ВЫ БУДЕТЕ ЗАЛИВАТЬ ПЕРЕКИСЬ/ ВОДУ, нельзя запрокидывать голову, чтобы питомцу вся эта жидкость не попала в дыхательные пути.

  Заливать лучше всего сбоку (между челюстями из шприца).

- Надо уколоть антидот — **ВИТАМИН В6 (ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИД)** в дозе 1.0мл на каждый килограмм веса животного.

Не бойтесь! Даже если отрава другая, хуже собаке не станет. И ДА — так много получается, я точно не перепутала.

Организм теряет из-за яда ПИРИДОКСИН И ИЗ-ЗА ЭТОГО ПИТОМЕЦ ПОГИБАЕТ. Его надо срочно восполнить.

Если питомец крупный, то и объем ПИРИДОКСИНА БОЛЬШОЙ, в этом случае надо ввести его в 2-3-4 точки. Вводить можно и подкожно и внутримышечно.



ЕСЛИ НА ПРОГУЛКЕ ИЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ НЕЕ НАЧИНАЮТСЯ ТАКИЕ СИМПТОМЫ:

- Подкашиваются ноги
- Заносит по сторонам
- Начинаются судороги

У ПИТОМЦА ОТРАВЛЕНИЕ ИЗОНИАЗИДОМ.

Вы просто не заметили, когда хвостик что-то прожевал.

У вас нет времени везти пушистого в клинику, живым питомца в большинстве случаев вы не довезете!

ВАШ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

! В ЭТОМ СЛУЧАЕ, когда У ПИТОМЦА УЖЕ СУДОРОГИ, ЗАПРЕЩЕНО ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ, риски развития аспирационной пневмонии.

Надо срочно вводить ПИРИДОКСИН (B6) 1.0 мл на каждый килограмм веса питомца.



Выезжать в ветеринарную клинику!

Теперь у вас есть время довезти питомца живым.

Почему так: при отравлении изониазидом в организме блокируется пиридоксин. А он нужен для работы ЦНС.

Когда вы ввели пиридоксин, вы дали организму возможность бороться с ядом.

Дальше в ветеринарной клинике должны поставить внутривенный катетер и уже внутривенно продолжить введение пиридоксина.

Рабочая доза антидота 71мг на кг — это 1,5мл на каждый килограмм веса питомца. Он РАЗВОДИТСЯ с NACL 0.9% 1/5 или 1/10 и вводится внутривенно ЗА 30-60мин.

ВАМ НАДО СООБЩИТЬ ДОКТОРУ сколько вы уже ввели **ПИРИДОКСИНА**, чтобы врач рассчитал, какое количество препарата еще надо добавить.

Я не даю вам сразу полную дозу, так как вы не сможете быстро ввести 1.5 мл на кг. И у вас нет возможности сделать ПИРИДОКСИН ВНУТРИВЕННО.

Я даю вам дозу препарата, которая сможет спасти питомца, прекратить мучения и довезти его живым для оказания уже врачебной помощи.

Далее в условиях клиники должны проводить:

- Промывание желудка, если в этом еще есть необходимость.
- Контроль судорог. Так как на фоне отравления может упасть еще и глюкоза и могут возникнуть вторичные судороги.

А еще сейчас догхантеры **начали добавлять в изониазид дополнительные препараты**, которые усиливают отравления и в условиях ветеринарной клиники при необходимости проведут дополнительную терапию, если такая понадобится.

Иногда кроме ПИРИДОКСИНА нужны:

- **противосудорожные препараты, антиконвульсанты:** (реланиум лучше) ИЛИ ДИАЗИПАМ, ФЕНОБАРБИТАЛ.
- **противорвотные, чтобы питомец не терял жидкость** — Серения (ветеринарный препарат) и с ней еще и ондасетрон (медицинский противорвотный препарат), если у питомца сильная рвота.

НА КОШЕК **ИЗОНИАЗИД НЕ ИМЕЕТ ТАКОГО СМЕРТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ** ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО У НИХ СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА НАМНОГО ВЫШЕ!

Но, если котик что-то съел на улице, то:

- вызвать рвоту
- промыть желудок
- дать полисорб

А если **начались судороги после прогулки**, то **вводите ПИРИДОКСИН (Витамин В6)** в дозе 1.0 мл на каждый килограмм веса и **выезжаете в клинику!**

Если на месте, где ваш питомец что-то жевал или жадно заглатывал **ВЫ НАШЛИ ЯРКИЕ ЦВЕТНЫЕ** гранулы/зерна/кубики/порошок, то это уже **ОТРАВЛЕНИЕ АНТИКОАГУЛЯНТНЫМИ РОДЕНТИЦИДАМИ (крысиный яд)**.

Опасен и кошкам и собакам!

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:

Срочно вызвать рвоту: перекись водорода+вода в пропорции 1/3 и заливаем в рот пока не начнётся рвота. Чтобы рвота произошла быстрее, вам стоит надавить пальцами на корень языка или подергать сам язык.

Далее промыть желудок: заливать большое количество воды опять до рвоты.

Дать адсорбент: Полисорб



Дозы:

- Животное до 5 кг: 1 чайную ложку на 15-20 мл воды
- Животное от 5 до 10 кг: 2 чайные ложки на 20-40 мл воды
- Животное от 10 до 20 кг: 1 столовую ложку на 40-50 мл воды
- Животное от 20 кг и выше: 1.5-2 столовые ложки на 50-70 мл воды

Выезжать в ветеринарную клинику.

Клинические признаки вы сразу не увидите.
Они появятся не сразу, а через 3-5 дней.

ЖДАТЬ НЕЛЬЗЯ ЭТИ ДНИ! ТАК КАК ПОТОМ ОСТАНОВИТЬ КРОВОТЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО.

В КЛИНИКЕ НЕОБХОДИМО СРАЗУ СДАТЬ **КОАГУЛОГРАММУ.**

- Если она в норме, пересдать через 36 часов и через 96 часов. Если все в норме, то выдыхать.
- Если вы сразу вызвали рвоту и весь яд вышел, то есть шанс вообще обойтись без антидота.

НО ЕСЛИ ВЫ СРАЗУ НЕ МОЖЕТЕ ПОЕХАТЬ В КЛИНИКУ (ночь, например) **ИЛИ В ВАШЕЙ КЛИНИКЕ НЕ ДЕЛАЮТ КОАГУЛОГРАММУ** и вам надо искать другую, или вы сдали один раз коагулограмму и не сможете повторить через 36 и 96 часов, тогда **надо начинать давать антидот К1 (конакион).**

Дозы:

- Стартовая доза 2.5 мг/кг веса питомца, в первые сутки дать 2 раза с интервалом 12 часов.
- Со вторых суток доза К1 будет ниже — 1мг на каждый килограмм веса — один раз в 24 часа и минимальный курс 7 -10 дней.

НО БЕЗ КОАГУЛОГРАММЫ это не самый лучший вариант лечения, так как эти яды разнообразны (они есть разных поколений) и некоторые из них могут циркулировать в крови до 4-6 недель.

И в этом случае прием витамина К1 надо продолжить все это время. **А понять это можно только по анализу (коагулограмме).**

Если она пришла в норме за 96 часов, то значит яд 1 поколения и курс может быть минимальный — 7-10 дней.
А если она не в норме, то продолжать прием К1 и каждую неделю отслеживать коагулограмму до нормализации.

Коагулограмма всегда покажет отклонения, если отравление было крысиным ядом.

Сейчас я **научу ВАС ЧИТАТЬ ЭТОТ АНАЛИЗ**, потому что многие врачи даже не смогут вам помочь ее расшифровать.


- Сначала идет увеличение ПТ (протромбиновое время).
- Позднее увеличится и АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время).

! И дальше отклонения будут по всем пунктам и они всегда не незначительные, а сильные!

К1 (конакион) — это витамин. Он есть в инъекциях, капсулах и в таблетках. Этот препарат очень сложно купить.
Но он жизненно необходим при этом отравлении. И надо искать!

Лучше всего работают капсулы/таблетки. Это тот редкий случай, когда инъекционный покупаем только в том случае, если не нашли в капсулах или таблетках.

- В инъекциях медицинский и ветеринарный К1 (конакион). Инъекции делать нужно только подкожно (в холку).
- В капсулах ветеринарный Солвестан.
- В таблетках ветеринарный КогаПет.



С КогаПетом есть нюансы. В нем не только К1, а еще и витамин С. Этот препарат может вызвать аллергические реакции намного чаще, чем чистый К1.

Но и чистый К1 тоже может у некоторых животных давать аллергию:

- покраснения на теле
- зуд
- отеки

В этом случае не отменяется К1, если по коагулограмме подтверждено отравление крысиным ядом.

А дополнительно необходимы инъекции стероидов: **ДЕКСАМЕТАЗОН или ПРЕДНИЗОЛОН.**

Дозы на собаку:

- на мелкое животное до 3 кг — 0.3 мл
- на среднее до 10-12 кг — 0.5 мл
- на крупное — 1.0 мл

Инъекция внутримышечная (в ногу).

Дозы на кошку:

- на мелкое животное до 3 кг — 0.5мл
- на среднее животное от 3 до 5 кг — 0.8мл
- на крупную кошку от 5 до 7кг — 1.0мл
- на гигантскую кошку от 7кг до 10кг — 1.5мл

К 1 начинает действовать только через сутки. А если у вас питомец уже с этими симптомами:

- КРОВОТЕЧЕНИЕ В ЛЮБОМ МЕСТЕ: может кровить и в грудной, и в брюшной полости, и в сердце. Простым языком, вся кровь из питомца будет просто утекать:
- Отхаркивание кровью, кровотечение из носа.
- Кровавая рвота, диарея (алая кровь просто вытекает).
- Синяки по всему телу.
- Кровоточивость дёсен.
- Повышение температуры тела до 40 и выше градусов.
- Анемия слизистых оболочек (они белые), то в этом случае **надо вводить К1,** но ждать пока он подействует, нет времени. **Необходимо переливание цельной донорской кровью прямо сейчас.**

ПИТОМЦА С КРОВОТЕЧЕНИЕМ после всех манипуляций **НЕОБХОДИМО ПОСАДИТЬ В КЛЕТКУ/БОКС** на 24 часа (надо ограничивать подвижность, так как любое движение у таких животных может провоцировать усиление кровотечения).

И после отравления еще 7 дней:

- нельзя бегать,
- нельзя давать твердую пищу (кости, лакомства, сухой корм, который только размачивать).

ВСЕ ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВТОРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ.

! ВАЖНО! Кто бы вам не говорил, что можно заменить К1 на ВИКАСОЛ (К3) — **ЭТО НЕ ТАК**.

Викасол это вообще другой витамин и он не поможет. Он токсичный, окисляет кровь, возникает повреждение печени.(он ядовит). И это просто добивает питомца.

Я рекомендую заранее покупать К1 в экстренную аптечку для питомца. Если он потребуется, вы не сможете его быстро найти. А это потеря времени. И далеко не в каждой клинике есть этот препарат на приеме. Поэтому лучше иметь свой!

Найти сложно, но возможно!



РЕСПИРАТОРНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ

Если питомец отравился газом:

- Срочно выведите животное на свежий воздух
- Обеспечьте обильно питье и покой

Если отравление газом сильное, то потребуется помощь ветеринара.

КОНТАКТНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ



Если на кожу питомца попала химия:

Срочно купаем питомца, соблюдая эти правила:

- В течение 15-20 минут льём воду на поражённый участок. Важно, чтобы стекающая вода не попадала на остальные части тела животного
- Затем тщательно вымываем эту область шампунем
- Даем адсорбенты: ПОЛИСОРБ или ЭНТЕРОСГЕЛЬ

Если животное ещё и наелось химикатов, то никогда не вызывайте рвоту. При рвоте химикаты могут повредить слизистую пищевода. Вот здесь без срочной ветеринарной помощи не обойтись!

ПИТОМЕЦ ПРОГЛОТИЛ ИНОРОДНЫЙ ПРЕДМЕТ

Здесь должен быть огромный список для проглатывания. Но все перечислить невозможно, так как наши питомцы очень непредсказуемы.

! Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЫ ПОНЯЛИ ПРИНЦИП, КОГДА ВЫ МОЖЕТЕ СРАЗУ ДЕЙСТВОВАТЬ.

Если питомец проглотил маленький и не острый предмет. Например:

- Пуговицы
- Беруши
- Спонжи
- Носки
- Куски игрушек и т.д.

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫ СРАЗУ МОЖЕТЕ ВЫЗВАТЬ РВОТУ, чтобы инородный предмет быстро и самостоятельно вышел:

- перекись водорода+вода в пропорции 1/3 и заливаем в рот пока не начнётся рвота. Чтобы рвота произошла быстрее, вам стоит надавить пальцами на корень языка или подергать сам язык.

Есть второй путь:

- **ЭТО ЭНДОСКОПИЯ.** Ехать надо сразу в клинику, чтобы инородный предмет не успел выйти из желудка. И там вам достанут гастроскопом его. Это отличный вариант, безоперационный. Но, АНЕСТЕЗИЯ, без нее никак не сделать это.

Я бы приберегла ГАСТРОСКОПИЮ НА БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ СЛУЧАИ, когда самостоятельно нельзя ничего делать.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ, если питомец проглотил **ОСТРОЕ/РЕЖУЩЕЕ/КОЛЮЩЕЕ:**

- Игла.
- Стекло.
- Лезвие.
- Гвоздь и т.д.

Вот в этом случае сразу бежим в клинику, где есть гастроскоп и уже кладем питомца под анестезию без лишних сомнений.

Ситуация серьёзная, и она требует быстрого вмешательства, пока эти предметы не повредили желудок и кишечник.

АЛЛЕРГИЯ

Аллергические реакции:

- Укус насекомого
- Аллергия на корм
- Аллергия на препарат для обработки от паразитов
- Аллергия на продукты питания

Одним словом — любая аллергия, которая проявляется так:

- Раздутая морда
- Отвисшая челюсть
- Слюнотечение
- Животное беспокоится и скулит
- Сильный зуд
- Покраснения на морде и на теле

При укусе насекомых, чаще всего страдает морда.

Какие препараты от аллергии должны быть всегда в вашей аптечке:

ЦЕТРИН — ЗОДАК — ЗИРТЕК

Любой из этого списка.

У животных хорошо работает только цетиризина дигидрохлорид (действующее вещество этих препаратов).

Дозы:

Собаки

- Вес от 1 до 3 кг. — 1/3 табл.
- Вес от 3 до 5 кг. — 1/2 табл.
- Вес 10 кг. — 1 табл.
- Вес 20 кг. — 2 табл.
- Вес 30 кг. — 3 табл.
- Вес 40-60 кг. — 4 табл.

Кошки

У них доза выше — от 2,5 до 5 мг на кг.

- Вес от 1 до 3 кг. — 1 табл.
- Вес от 3-5 кг. — 1,5 табл.
- Вес 6-10 кг. — 3 табл.
- Вес более 10 кг. — 4 табл.

Если животное укусила пчела, то нужно ещё кое-что сделать:

- Успокойте животное. Не давайте ему много двигаться, чтобы уменьшить кровоснабжение пораженной области и, следовательно, уменьшить боль и отек
- Нужно удалить жало, если оно есть (аккуратно выдавить его, но стараемся не повредить мешочек с пчелиным ядом). Для извлечения жала можно использовать пластиковую карту или ноготь
- Смочите область укуса прохладной водой, приложите холодный компресс на 10 минут

При тяжёлых проявлениях аллергии:

Если животное покусало несколько насекомых или любая другая аллергия проявляется:

- Обширным отеком морды и лап
- Есть признаки затруднённого дыхания

В этом случае рекомендую СРОЧНО обратиться к ветеринару.

Но если его нет рядом, здесь нужно делать инъекцию препарата:

ДЕКСАМЕТАЗОН или ПРЕДНИЗОЛОН.

Дозы:
- на мелкое животное до 3 кг — 0.3 мл.
- на среднее до 10-12 кг — 0.5 мл.
- на крупное 13-30 кг — 1.0 мл.
- на гигантских от 30 кг — 2.0 мл.



Инъекция внутримышечная (в ногу).

Укусы пчел могут быть опасными для жизни, если у вашего питомца есть серьезная аллергическая или анафилактическая реакция на их жало.
Если вы знаете, что у вашего питомца такая аллергия есть, всегда держите под рукой необходимые лекарства.

Аллергия на препарат для обработки от паразитов

И в 99.9% случаев она возникает на капли, спреи и ошейники.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

01 Дать:

ЦЕТРИН — ЗОДАК — ЗИРТЕК

Любой из этих препаратов.

Дозы:

СОБАКИ

- Вес от 1 до 3 кг — 1/3 табл.
- Вес от 3 до 5 кг — 1/2 табл.
- Вес 10 кг — 1 табл.
- Вес 20 кг — 2 табл.
- Вес 30 кг — 3 табл.
- Вес 40 кг-60кг — 4 табл.



КОШКИ

У них доза выше от 2.5 до 5мг на килограмм!

- Вес от 1 до 3 кг — 1 табл.
- Вес 3 -5кг — 1,5 табл.
- Вес 6 -10кг — 3 табл.
- Вес более 10 кг — 4 табл.

02 Срочно и тщательно искупать питомца.


УКУС ЗМЕИ

Симптомы укуса:

- Питомец неожиданно взвизгивает, отпрыгивает от места, где находился (чаще всего это густая трава, кустарник)
- Начинает скулить/мяукать
- Хрипеть
- Визжать
- Кататься по земле

Вскоре после укуса у животного появляется:

- Опухоль в месте укуса, из которого сочится сукровица
- Отёк всей морды, особенно губ и подчелюстного пространства
- Хромота
- Беспокойное поведение



Затем в течение часа развиваются:

- Нарушение координации движения
- Нарушение ориентации в пространстве
- Затруднённое глотание
- Одышка
- Наблюдается усиленное сердцебиение
- Ослабление или учащение пульса
- Вздрагивание

Реже:

- Рвота
- Кровоточивость дёсен
- Сонливость


Срочные меры

1. Самое главное, что требуется сделать незамедлительно — успокоить и обездвижить животное.
Активное поведение приведёт к учащению пульса и ускоренному кровообращению, что в значительной степени скажется на распространении яда в организме

2. Дать антигистаминный препарат



Цетрин Зодак Зиртек



Любой из них вам в помощь.

Дозы:

Собаки

- Вес от 1 до 3 кг. — 1/3 табл.
- Вес от 3 до 5 кг. — 1/2 табл.
- Вес 10 кг. — 1 табл.
- Вес 20 кг. — 2 табл.
- Вес 30 кг. — 3 табл.
- Вес 40-60 кг. — 4 табл.

Кошки

У них доза выше — от 2,5 до 5 мг на кг.

- Вес от 1 до 3 кг. — 1 табл.
- Вес от 3-5 кг. — 1,5 табл.
- Вес 6-10 кг. — 3 табл.
- Вес более 10 кг. — 4 табл.

При тяжёлых проявлениях аллергии (анафилактической реакции — животное хрипит, задыхается, отекает) дополнительно необходимо сделать стероидные препараты:
ДЕКСАМЕТАЗОН или ПРЕДНИЗОЛОН

Дозы:

- на мелкое животное до 3 кг — 0.3 мл.
- на среднее до 10-12 кг — 0.5 мл.
- на крупное 13-30 кг — 1.0 мл.
- на гигантских от 30 кг — 2.0 мл.

3. Затем постарайтесь определить место укуса. К сожалению, найти два маленьких отверстия от ядовитых зубов на теле животного довольно сложно из-за шерстяного покрова, но по истечении некоторого времени вокруг укуса начнёт развиваться отёк.
Это немного упростит задачу, хотя и связано с потерей времени.

Если при этом не прошло более 20 минут, выдавите из раны как можно больше крови с ядом.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТСАСЫВАТЬ ЯД, как советует народная «мудрость»! В полости рта могут быть ранки, через которые яд попадёт в вашу кровь, что приведёт к тяжёлым последствиям.

Не обрабатывайте укус спиртосодержащими растворами — это только ускорит процесс распространения яда.

Если есть возможность, к месту укуса следует приложить лёд для замедления кровотока

4. Наложите давящую повязку на место укуса так, чтобы между кожей и повязкой свободно проходил палец. Это немного снимет болевую реакцию у животного.

Не накладывайте повязку на конечность выше области укуса, это не замедлит распространение яда по организму, но может привести к более тяжёлым последствиям.

5. Дайте животному обильное питьё, в том числе принудительно (жидкость позволяет вывести часть яда из организма).

После оказания первой помощи

6. Незамедлительно доставить животное в ветеринарную клинику для введения антизмеиной сыворотки и оказания квалифицированной помощи.

Вводить сыворотку самостоятельно ЗАПРЕЩЕНО. Она должна вводиться дробно под контролем ветеринарного врача.

При самостоятельном введении сыворотки у кошек и собак риск умереть от аллергической реакции на сыворотку выше, чем от укуса самой змеи.

Транспортировать животное до машины лучше на руках, предварительно обездвижив любым доступным способом, например, накрыв одеялом.

ОЖОГИ

Распространённые бытовые травмы у питомцев.

ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ

Животное может получить ожог в результате контакта с химическим веществом.

План действий при химическом ожоге:

- Срочно купаем животное
- Затем тщательно вымываем эту область шампунем

В течение 15-20 минут льем воду на поражённый участок. Важно, чтобы стекающая вода не попадала на остальные части тела животного.

Если владелец точно знает, что послужило причиной химического ожога, то здесь нужно применять меры нейтрализации:

- При ожогах щёлочью промыть повреждённую область нужно проточной водой, а затем разбавленным раствором уксусной кислоты 1%
- При ожогах кислотой промыть большим количеством проточной воды, а после чего, 3%-ным раствором гидрокарбоната натрия (содой), затем — снова водой
- ✖ При химических ожогах в ЖКТ проводить нейтрализацию запрещено

Но чаще всего владелец не знает чем произошёл ожог и надо срочно смыть химическое вещество, а потом хорошо промыть эту область шампунем.



ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ

В результате воздействия высоких температур.

- Варочные поверхности
- Кипяток
- Открытое пламя огня
- Пар

Какие бывают ожоги?

Различают несколько степеней ожогов в зависимости от тяжести повреждения.

Ожоги первой степени — когда повреждается верхний слой кожи. Такие ожоги легко поддаются лечению и могут даже пройти самостоятельно за несколько дней.

При ожогах второй степени происходит повреждение более глубоких слоев кожи.

Ожоги третьей и четвертой степени — самые тяжелые ожоги. Они сопровождаются полным повреждением кожи, подкожной жировой клетчатки, мышц, а иногда и костей.
Такие ожоги требуют немедленной ветеринарной помощи.

Ожоги первой и второй степени проявляются:

- Покраснением
- Отёком
- Болезненностью кожи
- Местным повышением температуры
- Волдырями(пузырьками)



План действий:

- Приложить холодный компресс (необходимо срочно остудить обожженную область)
- Обработать место ожога Пантенолом (лучше пена). Если это сделать сразу, то можно избежать образования волдырей
- Наложить повязку. Необходимо сделать повязку, чтобы животное не имело доступ для вылизывания и травматизации обожженного участка

ДИАРЕЯ

Диарея — это симптом множества заболеваний:

- Отравление
- Кормовой срыв
- Глистная инвазия
- Инфекционные заболевания
- Бактериальные заболевания
- Системные заболевания (печёночная недостаточность, проблемы поджелудочной железы) и ещё многие другие причины



И просто остановить диарею мало, надо ехать в клинику и выяснять причину, чтобы лечить.

План действий:

1. Следить за потреблением жидкости (так как может наступить обезвоживание).
Если питомец мало пьёт, то насильно допаивать из шприца.

2. Дать адсорбенты.
Они показаны при диарейном синдроме.
2–4 кратно — в первые сутки.
Полисорб или Энтеросгель.



- Животное до 5 кг: 1/2 чайную ложку на 20 мл. воды
- Животное от 5 до 20 кг: 1 чайную ложку на 40-50 мл. воды
- Животное от 20 кг и выше: 1.5-2 столовые ложки на 50-75 мл. воды

3. При первой возможности выехать в клинику для определения диагноза.

РВОТА

Причин очень много, как и у диареи:

- Отравление
- Паразитарные заболевания
- Интоксикация
- Проблемы жёлчного пузыря
- Проблемы со стороны печени
- Почечные проблемы
- Воспаление поджелудочной железы
- Онкологические процессы
- Инородный предмет

И лучше сразу ехать в ветеринарную клинику на анализы и УЗИ брюшной полости. Но если такой возможности нет здесь и сейчас это сделать, а рвота мучает животное, тогда инъекция ОНДАСЕТРОНА сможет помочь.

Ондасетрон 2мг/мл раствор для инъекций.

- Вес от 1 до 3 кг — 0,25 мл.
- Вес от 3 до 5 кг — 0,5 мл.
- Вес 10 кг — 1,0 мл.
- Вес 20 кг — 2,0 мл.
- Вес 30 кг — 3,0 мл.
- Вес 40-60 кг — 5,0 мл.

Инъекцию делать внутримышечно (в ногу).

Если ваш питомец в списке пород, у которых обнаружена мутация MDR1

- австралийская овчарка
- австралийский келпи
- белая швейцарская овчарка
- бобтейл
- бордер-колли
- бородатый колли
- длинношерстный уиппет
- колли длинношерстный
- колли гладкошерстный
- макнаб
- миниатюрная австралийская овчарка
- шелковистый виндхунд
- шелти
- метисы с любой из этих пород

И ПРИ ЭТОМ ВЫ НЕ СДАЛИ АНАЛИЗ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К МЕДИКАМЕНТАМ, ТО ПРИМЕНЯТЬ ОНДАСЕТРОН ЗАПРЕЩЕНО!

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Сразу скажу, что она не поднимается сама по себе и нужно будет дальше обращаться за ветеринарной помощью и находить причину гипертермии. Но первое, что вам надо сделать — это сбить температуру.



Как заподозрить повышение температуры тела у животного:

- Питомец стал вялым
- Отсутствует аппетит
- Много спит
- Учащенное или тяжёлое дыхание

Если есть хоть один симптом, то сразу берите в руки термометр.

Холодный или горячий нос — не показатель, забудьте.

И для этого в Вашей аптечке должен быть электронный градусник. Ртутный — совсем плохой вариант для животных (сильный дискомфорт от длительного измерения).

Измеряем температуру РЕКТАЛЬНО.

Как правильно измерить температуру:

- Удобно положить животное или зафиксировать руками в стоячем положении
- Смазать кончик градусника любым гипоаллергенным кремом (детским, например)
- Взять хвост питомца в руку и поднять его
- Плавным движением ввести кончик градусника в анальное отверстие. Глубина 1.5-2 см
- Подождать звуковой сигнал и плавно извлечь градусник. НОРМА для кошек и собак 38-39 °C

Видеоинструкция «Как измерять температуру»



natali_vet

Владельцу надо знать:

Повышение температуры тела выше 40 °С приводит к потере жидкости из организма, к общему угнетению. Чаще всего такое повышение температуры сопровождается учащенным сердцебиением и дыханием

Температура тела выше 41.1 °С приводит к критической потере жидкости из организма, может случиться отек головного мозга. Такое повышение температуры может серьезно сказаться на работе внутренних органов. Чаще всего учащается сердцебиение и нарушается ритм сердечных сокращений. Иногда слышны хрипы у животных

Ваша задача, как можно быстрее сбить температуру.

Начинаем сбивать с отметки 39.7 °С:

- Поместить животное в прохладное место (открываем окна или включаем кондиционер)
- Срочно сделать укол жаропонижающего

Во всех случаях повышения температуры, кроме теплового удара, делать жаропонижающее сразу. А вот тепловой удар мы разберём отдельно, в некоторых случаях можно обойтись без жаропонижающего средства.

Препарат, которым сбиваем температуру МЕЛОКСИКАМ 10 мг/мл инъекционный. Продаётся в любой человеческой аптеке и его легко найти. Покупайте сразу себе в аптечку.

Дозы:

0.1 мл на 4 кг массы животного, то есть, если животное весит:

- 4кг — 0.1 мл
- 8кг — 0.2 мл
- 16кг — 0.4 мл
- 32кг — 0.8 мл и т.д.



Инъекция осуществляется внутримышечно (в ногу).

- Шерсть смочить прохладной водой.
  Дать животному пить прохладную воду маленькими порциями. Не холодную
- Через 20-30 минут повторно измерить температуру.
  Когда отметка будет 39.0-39.5 °С — ваше животное в безопасности.
- Выехать к ветеринару для выявления причины повышения температуры

ТЕПЛОВОЙ УДАР

Если вы находились с питомцем под открытым солнцем или прогулка была слишком длинной, а погода жаркой. Или вы оставили животное в закрытом душном помещении. В этих случаях может наступить перегрев.

! Некоторые питомцы наиболее чувствительны к жаре. Будьте к ним особенно внимательны. Постоянно следите за их состоянием, не допускайте перегревания и длительного нахождения на солнце.

К перегреванию предрасположены:

- Брахицефальные породы
- Пожилые питомцы
- Беременные
- Щенки и котята
- Животные с лишним весом
- Животные с густой шерстью
- Животные с сердечными проблемами



Признаки теплового удара:

- Животное часто дышит
- Усиливается сердцебиение
- Повышается температура тела, иногда до критической отметки в 42 °С
- Изменяется цвет слизистых оболочек и языка (может быть ярко-красный, но бывает и синюшный оттенок)
- Одышка
- Появляется общая слабость
- Сонливость
- Потеря сознания
- Судороги
- Может возникнуть рвота

Тепловой удар развивается очень быстро и его нельзя оставлять без внимания. Животное менее чем за полчаса может впасть в кому, которая приведёт к летальному исходу.

Что же делать?

Если ветеринарный врач близко, то завернуть животное в мокрое полотенце/простынь и бежать к врачу!

Если ветеринар далеко, то нужно действовать здесь и сейчас.

План действий:

- Поместите питомца в прохладное место
- Смочите шерсть прохладной водой. Можно поставить собаку/кошку в ванну, бассейн (в прохладный) или завернуть её в мокрое полотенце/простыню
  - охлаждаем не ледяной водой. Резкое изменение температуры — может быть опасно для жизни
  - если такой возможности нет, сделайте питомцу холодные компрессы на затылок, подмышки и внутреннюю поверхность бёдер
- Дайте питомцу прохладной воды. Поить нужно порционно, но часто. Насильно не заливаем
- Постоянно измеряйте температуру тела. Животное будет в безопасности только когда температура опустится до отметки 39.0-39.5 °C

Если все вышеперечисленные меры не сбили температуру в течение 20 минут, то нужно делать инъекцию МЕЛОКСИКАМ 10мг/мл.

0,1 мл на 4 кг массы животного, то есть если животное весит:

- 4 кг — 0,1 мл
- 8 кг — 0,2 мл
- 16 кг — 0,4 мл
- 32 кг — 0,8 мл и т.д.

Инъекция осуществляется внутримышечно (в ногу).

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП

Часто владельцы и не подозревают о сердечной патологии у питомца.

Причины сердечного приступа:

- У вас питомец с выявленными сердечными патологиями и своевременно не получилось отследить, когда ухудшилось состояние
- Брахицефалические породы кошек и собак

У вас кошка. Котейки в сердечных вопросах самые непредсказуемые животные. И на фоне стресса они резко могут стать пациентами кардиолога

Что может спровоцировать резкое ухудшение состояния сердца?

- Стресс и здесь все, что вызывает переживание у вашего питомца:
  - путешествие
  - переезд
  - посещение ветеринарной клиники: сдача анализов, УЗИ диагностика, даже инъекции
  - посещение грумера
  - купание
  - звуки фейерверка
  - новый питомец
  - новый член семьи
- Травмы. Могут сопровождаться и стрессом, и болевым шоком
- Перегрев (тепловой удар)
- Инфузионная терапия и ее нерациональное применение.
  Русским языком — это капельницы в больших объемах и которые вводятся с большой скоростью. Часто животные в них нуждаются при отравлениях, вирусных инфекциях и проблемах внутренних органов. Но объём и скорость вливаемой жидкости должен быть рассчитан по весу животного и вводиться с допустимой скоростью
- Анестезия (наркоз). Анестезия может стать запускным механизмом и после у питомца начинает прогрессировать сердечная недостаточность

Вот почему так важно всегда проводить предоперационный скрининг сердца (УЗИ сердца).

Как распознать сердечный приступ:

- Синий оттенок языка, кожи, дёсен
- Питомец очень часто дышит
- Дыхание неестественное (животом или грудью), затруднённое
- Дыхание с открытым ртом (у собак без явных на это причин) Например, после физической нагрузки это норма
- Обморок
- Хрипы при дыхании (которые появились резко)



Посмотреть, какое у питомца дыхание при сердечных проблемах

Хочу утонить про перегрев.

Животное, которое перегрелось тоже будет часто дышать, но после снижения температуры тела, дыхание должно сразу приходить в норму. Если оно не пришло в норму, то можно заподозрить осложнение со стороны сердца.

Что делать в такой ситуации?

- Обеспечить полный покой. Не допускать волнения, нагрузок (если вес животного позволяет — берём на руки)
- Создать приток свежего воздуха (окно, кондиционер)
- Сделать инъекции мочегонного препарата: ФУРОСЕМИД или ЛАЗИКС. Снижает риски кардиогенного отёка лёгких (отёк лёгких на фоне проблем сердца)

Дозы:

- Вес 1 кг. — 0.3 мл.
- Вес 2 кг. — 0.6 мл.
- Вес от 3 до 5 кг. — 1.0 мл.
- Вес 6-10 кг. — 1.5 мл.
- Вес 11-20 кг. — 2.0 мл.
- Вес 21-30 кг. — 3.0 мл.
- Вес 31-40 кг. — 4.0 мл.
- Вес более 40 кг. — 5.0 мл.

Вводить куда угодно (холка, задняя конечность). Можно даже выпаивать в рот, если животное в тяжелом состоянии и инъекция будет очередным стрессом.



Срочно выехать в ветеринарную клинику, которая оборудована для приема кардиологических пациентов (есть кислородная камера/подача кислорода).

Если у вашего питомца подтверждённые **кардиологические проблемы**, то в вашей аптечке должен быть **не только фуросемид, а еще и кислородный баллончик** (он продается в аптеках и в медтехниках).

Его рекомендовано использовать в случае сердечного приступа у питомца и пока вы будете транспортировать животное в клинику, вам надо подавать кислород порционно. В наборе к баллончику идет еще трубка и на нее одевается маска.

Многие питомцы ее боятся. А стресс категорически запрещен. Тогда снимайте маску и подавайте кислород просто через трубку (распылять около морды питомца-не в нос и не в рот).
А если питомец не боится маски, то оденьте на морду и подавайте кислород порционно через маску!

Смотрите видео, как пользоваться кислородным баллончиком



ПИТОМЕЦ ПОДАВИЛСЯ

Вы видите:

- Как ваш питомец не может что-то проглотить
- Чешет морду
- Пытается что-то выплюнуть

Если питомец играл или пил воду и поперхнулся, то не торопитесь хлопать его по спине и трясти вниз головой. Так вы можете только навредить. Подождите 5-7 секунд, обычно животное успешно справляется самостоятельно и выплёвывает слюну/воду или мельчайшие предметы, которыми подавилось.

Но если вы сразу увидели, что:

- Питомец задыхается
- Хрипит
- Синеет

Срочно оказывайте помощь:

- Откройте животному пасть, если предмет видно, попробуйте аккуратно достать его пинцетом. Не стоит пытаться достать застрявший предмет руками, так вы можете его сильнее протолкнуть.
- Если животное маленьких размеров, переверните его и попробуйте вытрясти посторонний предмет.
- Если питомец большой, поднимите его задние лапы вверх. Главное, чтобы дыхательный проход был направлен вниз, чтобы предмет выпал под действием силы тяжести.

Если вышеперечисленные действия не помогли, тогда используйте прием Геймлиха:

Наклоните голову животного вниз, обхватите питомца сзади, кулаком надавите на живот под самыми ребрами 3-4 раза.

Если вы оказываете помощь кошке или маленький собаке, надавливать нужно пальцами, чтобы не повредить ребра.

УТОПЛЕНИЕ

Часто причиной утопления становится:

- Несчастные случаи при катании на лодке
- Усталость в процессе плавания
- Стихийные бедствия (наводнения)
- Падение под лед
- Падение в водоем и отсутствие возможности выйти на сушу
- Маленькие собачки/кошки, оставленные без присмотра в ванной

Если произошло утопление, что делать?

- Срочно достать питомца из воды
- Если животное без сознания, надо поднять туловище за задние ноги. Это необходимо для того, чтобы слить всю воду из грудной полости
- Затем положите задние ноги на возвышенность (скрутите любые вещи валиком). Необходимо, чтобы туловище было выше головы. Таким образом выйдет оставшаяся часть жидкости
- Необходимо открыть животному рот и вытащить язык. Это надо делать до тех пор, пока не почувствуете легкое напряжение или сопротивление
- Если питомец не начал дышать, то потребуется искусственное дыхание.
- Срочно выехать за дальнейшей ветеринарной помощью

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ

Часто причиной переохлаждения становится:

- Длительное пребывание на улице в зимний период времени
- Длительное купание в ледяной воде

Клинические проявления:



- Озноб
- Потеря сознания
- Температура тела ниже 35 °С
- Состояние ступора или комы
- Ослабление частоты дыхательных движений
- Ослабление пульса

План действий, если вы заподозрили переохлаждение:

- Измерить температуру тела животного. Если она меньше 35 градусов, то ее надо срочно поднимать
- Проверить дыхание и пульс
- Перенести животное в тёплое помещение. Нельзя размещать питомца возле нагревательных приборов
- Сделать тёплую ванну. Не горячую (37 градусов, надо согревать животное постепенно, температуру ванны можно плавно повышать до 40 градусов)
- После ванны животное надо высушить
- После можно аккуратно растереть полотенцем
- Закутать животное в тёплое одеяло и обложить грелками или пластиковыми бутылками с тёплой водой
- Измеряйте температуру тела животного каждые 10 минут до тех пор, пока она не достигнет 37.5 °С

Как только вы оказали первую помощь и температура тела поднялась до стабильных цифр, вам стоит показать животное ветеринару.

- Необходимо убедиться, что животное стабильное
- Исключить обморожение

ОБМОРОЖЕНИЕ

Чаще всего обморожение затрагивает кончики ушей, подушечки лап, нижнюю часть конечностей, мочку носа, хвост, половые органы.

Основные признаки обморожения:

- Обмороженный участок тела становится холодным на ощупь
- Происходит потеря чувствительности
- Могут появиться волдыри, пузырьки
- Может измениться цвет кожи на этих участках (приобрести синюшно-черный оттенок)

Если вы заметили у животного участки обморожения, то:

- Не следует растирать пораженные участки
- Нельзя обрабатывать эти участки спиртосодержащими и дезинфицирующими жидкостями

Эти действия только травмируют ломкие ткани и сосуды.

Что надо сделать?

На обмороженные участки надо наложить ватно-марлевую повязку (она должна быть толстой, в 6-7 слоев) — это позволит предотвратить возникновение перепада температур между пострадавшими поверхностными и глубоколежащими тканями с нормальной температурой тела.

Повязки не должны быть тугими! Любое нарушение кровообращения в таком состоянии чревато развитием некротических процессов и отмиранием тканей.

Животное с обморожением необходимо показать врачу!

ОТИТ



Симптомы отита:

- Увеличенное количество выделений (могут быть как сухие, так и тягучие с примесью гноя и крови)
- Зуд (животное может трясти головой, прижимать ухо, пытаться чесать голову)
- Повышение температуры уха (будет горячее, чем второе)
- Неприятный запах
- Покраснение внутренней части уха

Любой отит требует консультации врача, для определения первопричины, так как «простыть» животные не могут.

Что можно и нельзя делать, если нет возможности отвезти питомца в клинику незамедлительно.

План действий:

1. Аккуратно прочистить уши!

Если питомец:

- Держит голову набок
- Отказывается от еды
- Имеет нарушение координации движений

2. Чистить уши можно только теплым ФИЗРАСТВОРОМ (NaCl 0,9%), так как это симптомы прободения барабанной перепонки (большинство лосьонов и капель потивопоказаны при перфорации барабанной перепонки)

3. Не капать капли до приёма врача, так как анализы будут не информативны.

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗВЛЕЧЬ КЛЕЩА?

1. Лучше всего подойдёт специальный зацеп «клещекрут» (это пластиковая палочка с отверстием, которая продаётся в зоомагазине).



Постарайтесь захватить тело клеща как можно ближе к коже животного. После того, как вы зафиксировали паразитов, начинайте извлекать вращательными движениями (выкручивать).
Достаточно повернуть 4–5 раз.





Не вытягивайте клеща.
Именно выкручивайте. Тело клеща очень легко оторвать от головы.
Клеща надо достать полностью, в противном случае в месте, где осталась часть клеща будет воспаление.





2. Нельзя давить на клеща.

3. После удаления клеща место укуса надо обработать антисептическим средством (подойдёт хлоргексидин).



Как снять клеща



ТРАВМЫ ГЛАЗ

Если животному что-то попало в глаз:


- Соринка
- Травинка
- Бытовая химия

Все из вышеперечисленного будет вызывать сильный дискомфорт у питомца.

- Животное постоянно трёт лапой глаз
- Трясёт головой
- Жмурится
- Сильно текут слёзы

В этом случае ваша задача извлечь инородный предмет, либо устранить остатки едких средств.

Вам нужно иметь дома Физраствор (NaCL 0,9% — это тоже его название).



Если это инородный предмет:

- Успокаиваем животное
- Раздвигаем веки
- Ватный диск обильно смачиваем физраствором
- С помощью этого диска извлекаем инородный предмет
- Обильно промываем глаз физраствором

Глаза ватным диском тереть нельзя, так как это может привести к вдавливанию инородного предмета во внутренние структуры глаза.

Если в глаза попала бытовая химия, то надо обильно промыть глаза (струёй воды или физраствора).

Ватным диском нельзя тереть, чтобы не разнести химию по всему глазу.

СЕРЬЁЗНЫЕ ТРАВМЫ ГЛАЗ, С КОТОРЫМИ НЕЛЬЗЯ МЕДЛИТЬ

Вам необходимо оказать экстренную помощь и выезжать к офтальмологу.

Какие бывают травмы глаз?

- Проникающие — это острые повреждения, грозящие полной потерей глаза


Причина таких травм:

- уколы когтями в результате игры или драки между животными.
- падения на острые предметы

- Непроникающие травмы, которые сопровождаются воспалительными процессами

Как распознать травму глаз?

- Изменение цвета глаза
- Разные глаза (увеличение или уменьшение глазного яблока)
- Кровь или мутная взвесь в глазу



Что делать в таких ситуациях?

1. Промыть глаз физраствором.

2. Срочно выезжать к врачу.

3. Если путь к ветеринару длинный, закапывайте в повреждённый глаз физраствор каждые 10–15 минут, чтобы не допустить высыхания глаза.

! Другие растворы лить в глаза НЕЛЬЗЯ, если это колотая проникающая травма, то можно только навредить.

ВЫПАДЕНИЕ ГЛАЗА

Бывает и такое.
К этим травмам больше всего подвержены брахицефалические породы, но и у других животных такая беда тоже может случиться.

От ваших действий в этой ситуации будет зависеть судьба глаза.

Что делать?

1. Срочно выезжать к ветеринару.

2. Выпавший глаз держать на стерильной марлевой салфетке, смоченной физраствором и необходимо постоянно поливать физраствором и глаз, и салфетку (каждые 2–3 минуты). Без этих действий глаз пересохнет и его уже нельзя будет спасти.

3. Если путь к ветеринару долгий, то необходимо закапывать глаз ФЛОКСАЛОМ (аналог Лафракс): 2–3 капли (медицинская аптека) и делать это нужно каждые 20–30 минут.

Но если вы все сделаете правильно, глаз можно будет спасти.

Какие капли нельзя капать животным в домашних услови

- Альбуцид (противопоказан животным, может вызывать очень сильное жжение и боль).

- Капли, содержащие гормоны в составе (Дексаметазоновые капли, Декта — 2, Тобрадекс, Макситрол и др.) имеют негативное влияние на роговицу и при тенденции глаза к пересыханию, либо при наличии дефектов роговицы, приведут к ухудшению ситуации и расплавлению роговицы.

СУДОРОГИ

Стоит отметить сразу, что судороги у животных — не определенная болезнь, это только клинический симптом, проявление. Как, например, кашель не является диагнозом.

Судороги - это непроизвольные сокращения мышц, происходящие бесконтрольно, иногда со слюнотечением, пеной изо рта, непроизвольным мочеиспусканием и дефекацией.

Судороги могут быть различными по длительности, распространенности, интенсивности.

Также можно услышать родственные термины, такие, как: припадки (частые судороги, во время которых питомец находится в бессознательном состоянии) и конвульсии (аналогичное сокращение мышц тела, но с сохранением сознания).

По локализации и распространению бывают:

- Локализованные (очаговые, фокальные) — задействуют одну сторону тела по причине возникновения активности в одном полушарии мозга.

- Генерализованные — симметричные, затрагивающие оба полушария и, следовательно, обе стороны тела.

Вторые более опасны, об этом нужно помнить, даже, если у питомца судорожная активность проявляется в виде подёргивания усов или брылей, но симметрично и с обеих сторон.

По типу мышечных сокращений бывают самые разнообразные **(клинические, тонические, смешанные)** в зависимости от типа сокращений (вытягивание, сокращение и т.д.).

Причин для возникновения судорог множество, но все они делятся на:

- относящиеся к головному мозгу,
- или не относящиеся.

Их могут давать:

- воспалительные и инфекционные заболевания,
- опухоли,
- пороки развития,
- эндокринные патологии,
- сердечные патологии,
- сосудистые аномалии,
- метаболические расстройства,
- интоксикации и отправления.

Так или иначе, ветеринарному врачу предстоит провести **тщательную диагностику** для выявления первопричины.

Но главное, **быть готовым оказать первую помощь**, если у питомца случились судороги.

План действий:

1. Первое и самое главное: как бы наивно не звучало, вам необходимо **успокоиться и взять себя в руки.** Сейчас вам нужно помочь своему любимцу и выиграть время до визита в клинику.

2. Максимально быстро обеспечьте безопасную окружающую среду: **снять с высоты** (если, например, питомец на кровати), **аккуратно положить в боковое естественное положение**, **убрать потенциально травмоопасные предметы** вокруг, попытаться **защитить голову** от непроизвольных ударов.

Если у вас или у кого-то из членов семьи есть возможность **зафиксировать судороги на видео**, сделайте это, информация очень поможет ветеринарному врачу на приёме.

! Не рекомендуется пытаться вытащить язык или раскрыть пасть, так как мышечные сокращения очень сильные, а движения бесконтрольные.

! Удаление пены и слюны возможны только в перерывах между приступами. Следите, чтобы у животного была возможность дышать, так как во время судорог происходит кислородное голодание и головной мозг потребляет огромное количество O_2.

! Если у вас есть кислородный баллон и маска, используйте их.

Следите, чтобы видимые слизистые оболочки не становились синюшными.

Чаще всего длительность приступа не превышает несколько минут.

По его окончанию может случиться постиктальный (постсудорожный период), когда животное постепенно начинает приходить в себя, может быть дезориентированным, иметь нарушение походки, натыкаться на предметы, вести себя странно.

Но также после приступа может начаться новый приступ.

К сожалению, череда приступов является более угрожающим состоянием, **требовать немедленной госпитализации и худших прогнозов.**

! При тяжёлых судорогах пациента госпитализируют и вводят в медикаментозную кому, параллельно проводя раннюю диагностику и вводя противосудорожные препараты.

! Если в данную минуту у вас нет возможности транспортировать питомца экстренно в клинику, можно попытаться помочь медикаментозно самостоятельно.

! Важно: первая помощь не исключает срочного визита в клинику и не заменяет лечения, информация несёт образовательный и вспомогательный характер.

3. Основными противосудорожными препаратами являются:

- Фенобарбитал (Паглюферал-таблетки)
- Леветирацетам (Кеппра-таблетки).

Терапевтические (длительные) дозы подбирает лечащий врач, но в период судорожного синдрома используются так называемые "загрузочные"-высокие дозы этих препаратов.

Дозы:

- Фенобарбитал 10-15 мг/кг
- Леветирацетам 100 мг/кг

В тяжёлых случаях можно применять оба препарата одновременно.

Фенобарбитал - рецептурный препарат, есть в таблетках под названием Паглюферал, выпускаются в форме Паглюферал-1 (25 мг в таблетке), Паглюферал-2 (35 мг в таблетке) и Паглюферал-3 (50 мг в таблетке), а также содержится в каплях Корвалол в дозе 18.26 мг в 1 мл (26 капель).

Как посчитать дозу? Учитесь, в аптеке может быть разная дозировка препарата и вам надо посчитать сколько надо дать питомцу лекарства.

- Например, собаке весом 5 кг необходимо 10мг/кг фенобарбитала (т.е.50 мг).
  Можно дать 2 таблетки Паглюферал-1 ИЛИ 1 таблетку Паглюферал-3 ИЛИ 2,7 мл корвалола (71 капля).
- Собаке 10 кг требуется 100мг фенобарбитала, а значит, 2 таблетки Паглюферал-3 ИЛИ 5,5 мл корвалола.
- Необходимое количество препарата можно рассчитать на любой вес зная дозу.

Аналогично с Леветирацетом (таблетки Кеппра 250мг или 500 мг).

- Собаке весом 5 кг необходимо 100мг/кг (500мг).
  Можно дать 1 таблетку 500 мг или 2 таблетки 250мг.

- Собаке весом 15кг требуется 1500мг.
  Можно дать 3 таблетки по 500мг.

ОЧЕНЬ ВАЖНО

Давать/выпаивать препараты перорально (в рот) можно лишь при сохранении глотательного рефлекса у питомца. Проверьте способность питомца глотать, попробовав выпоить немного воды из шприца.

! Необходимо помнить, что, если судороги случились у питомца на прогулке или сразу после прогулки, не исключено отравление ядами. И в качестве антидота к распространенной отраве для собак Изониазид, необходимо уколоть витамин В6 (пиридоксин) в дозе 1.0 мл на каждый килограмм веса.
Колоть можно внутримышечно в ногу или подкожно в область холки.

! Если судороги случились у собаки маленькой породы или раннего возраста, можно подозревать падение глюкозы и дополнительно выпоить сладкую воду или раствор 20% глюкозы в дозе 1мл/кг.

СЛР — СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ

(а, если быть точнее, сердечно-легочно-церебральная реанимация) - восстановление витальных функций организма (уже угасших или угасающих здесь и сейчас признаков жизнедеятельности).

Реанимационное состояние — это состояние, угрожающее жизни животного.

Из соображений гуманности считается, что **реанимация не показана питомцам, болеющим терминальными стадиями неизлечимых/ хронических заболеваний, а также животным с травмой головного мозга.**

Общепринятый протокол реанимации называется CAB протокол, где C — circulation (циркуляция — кровообращение, массаж сердца), A — airways (дыхательные пути, очистка дыхательных путей от выделений, затрудняющих вентиляцию), B — breathing (дыхание, искусственное дыхание).

Реализовать реанимацию по протоколу на практике в полной мере возможно силами нескольких участников (медицинский персонал). **Но когда приходит беда, быть вооруженными знаниями и умениями важно как никогда.**

! Реанимационные мероприятия необходимо начинать даже без оценки сердечной деятельности, для начала СЛР достаточно отсутствия дыхания и сознания.

ЗМС (закрытый массаж сердца) проводится в положении на боку у большинства животных.

Исключением являются:

- Собаки с широкой грудной клеткой (бульдоги, булли и др): проводите массаж сердца в положении на спине (как у людей).

- Маленькие животные (кошки, миниатюрные собаки): массаж сердца проводится с обхватом грудной клетки циркулярно (в круговой обхват).

Техника проведения.

Сложенные замком прямые руки (см.видео) располагаются:

А) непосредственно в области сердца у мелких и средних животных,

Б) в самой широкой части грудной клетки у крупных.

Техника проведения СЛР



- Сдавливание грудной клетки должно производиться на 1/3-1/2 ширины, также необходимо давать грудной клетке расправиться обратно после сдавливания.

- Частота массажа равна 100-120 компрессий в минуту, для удобства и понимания рекомендовано прослушать трек Bee Gees — Stayin alive или Queen — Another one bites the dust. Ритм этих композиций соответствует примерной скорости проведения массажа сердца.

Если участвует в реанимации **больше, чем один человек**, дыхание «рот в рот» / «рот в нос» осуществляется каждые 5-6 массажных движений (без прерывания компрессий).

Если вы один, то 30:1, где дыхательные движения производятся через каждые 30 компрессий (30 массажных движений, перерыв на вдох и снова 30 массажных движений, вдох и т.д.).

Выполняя наиболее подходящее для животных искусственное дыхание «рот в нос», вдувайте через салфетку свой воздух из лёгких, при этом закрыв пасть.

Каждые 2 минуты необходимо оценивать работу сердца (удалось ли его «завести»).

В домашних условиях это можно сделать следующими способами:

А) Положить руку на грудную клетку за локтем и почувствовать толчок.

Б) Приложить ухо к грудной клетке и услышать звук бьющегося сердца.

Самостоятельное дыхание можно оценить визуально.

Препараты для реанимации:

- Во время реанимационных мероприятий необходимо делать инъекции АДРЕНАЛИНА.
- Так как в домашних условиях обеспечить внутривенный доступ невозможно, вводить адреналин необходимо внутримышечно в ногу в дозе 0,1 мл/кг.
- Повторять введения каждые 3 минуты.

Обычно реанимационные мероприятия продолжаются в течение 10 минут. За это время адреналин вводится в среднем 3 раза.

Если реанимационные мероприятия увенчались успехом, немедленно направляйтесь в ближайшую клинику.

Подведем итоги

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕАНИМАЦИИ:

1. Начинайте реанимационные мероприятия при отсутствии дыхания и сознания (питомец не дышит и не реагирует).

2. Массажные движения совершайте ритмично, примерно 2 толчка в секунду (100-120 компрессий в минуту).

3. Делайте паузу на вдох («рот в рот» / «рот в нос») с использованием марлевой салфетки через каждые 30 массажных движений, если вы один ИЛИ вдыхайте через салфетку каждые 5-6 массажных движений, если у вас есть помощник.

4. Вводите адреналин внутримышечно в ногу в дозе 0,1 мл/кг каждые 3 минуты.

5. Проверяйте признаки работы сердца каждые 2 минуты.

6. Если реанимация увенчалась успехом и вы регистрируете признаки сердечной деятельности (пульс) и дыхание, срочно доставьте питомца в ветеринарную клинику.

ПАДЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ

Гипогликемия — состояние организма, вызванное критически низким уровнем глюкозы.

Причин такого состояния множество:

- нарушение обменных процессов
- патологии печени
- эндокринные заболевания
- инфекции

Но глобально вызывают его два фактора — снижение выработки глюкозы или слишком быстрое ее усвоение.

Помимо заболеваний, падение глюкозы может быть спровоцировано:

- несбалансированным питанием
- резкими изменениями в рационе
- низкой температурой тела
- стрессом.

Так или иначе, важно уметь заподозрить это состояние и уметь оказать первую помощь.

Наиболее предрасположены к гипогликемии:

- животные с низкой массой тела (собаки миниатюрных пород)
- щенки и котята
- болеющие, ослабленные животные
- а также пациенты с сахарным диабетом, получающие инсулин

Настораживающими симптомами могут стать:

- вялость
- апатия
- сонливость
- потеря аппетита
- слюнотечение
- жкт-расстройства
- нарушение координации
- В более тяжёлых случаях отмечается подёргивание мышц, тремор, судороги, паралич конечностей и гипогликемическая кома.

Подтвердить факт падения глюкозы **можно применением обычного медицинского глюкометра.** Для этого нужно добыть каплю крови (удобнее всего это сделать, сделав прокол иголочкой краешка уха или подушечки лапы) и провести измерение.

Если провести измерение нет возможности, но вы подозреваете падение глюкозы, **необходимо оказать питомцу первую помощь.**

План действий:

- Иметь в аптечке ампулы с 20% или 40% глюкозой из аптеки.
  Выпаивать 20% глюкозу в дозе 1мл/ на 1 кг веса.
  40% глюкозу необходимо разбавлять с водой 1:1.

- Выпаивать сладкую воду, разводя сахар в небольшом количестве воды. 1 чайная ложка на 5 кг веса.

Важно:

аккуратно принудительно из шприца заливать в рот сладкую воду или глюкозу можно **ТОЛЬКО питомцам в сознании и с присутствующим глотательным рефлексом.**

! После оказания первой помощи незамедлительно обратитесь в ветеринарную клинику для оценки уровня глюкозы крови и проведения диагностики.

Теперь мы добрались до уколов.

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ИНЪЕКЦИЯМ



1. Перед уколом вымойте руки.

2. Нет необходимости обрабатывать место укола антисептиком.

3. Применять для инъекций только стерильные новые шприцы.

4. Кожа в месте укола должна быть здоровой (без покраснений и ран)

5. Размер шприца выбирать с учетом размера животного и объёма препарата, который необходимо ввести

6. Если лекарство хранилось в холодильнике, то перед инъекцией его необходимо нагреть до комнатной температуры (подержать в руке).

7. Никогда не смешивайте несколько препаратов в одном шприце.

8. Глубина проникновения иглы зависит от размера животного (Иглу вводить на 1-3 см.)


9. Все ваши движения должны быть быстрыми и точными. Не растягивайте процедуру инъекции.

10. Отбросьте сомнения и жалость к четвероногому другу. Вы это делаете для его здоровья и жизни.

ПОДКОЖНЫЕ ИНЪЕКЦИИ

Это инъекция в область холки. Необходимо:


- Оттянуть кожу в области холки
- Аккуратно ввести иглу параллельно позвоночнику



ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИЯ

Это инъекция в задние конечности в область бедра.
На ощупь это самое мягкое место. Необходимо:

- Выбрать место для укола: заднюю часть бедра животного
- Расслабить конечность. Чтобы этого добиться, надо помассировать ножку или потрясти
- Зафиксировать конечность
- Аккуратно ввести иглу под углом примерно 45 градусов



Видеоинструкция «Как делать уколы»

Аптечка

Как же быть вооруженным и не паниковать в непредвиденной ситуации?

Иметь список необходимых препаратов для оказания первой помощи питомцу!

РАСТВОРЫ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ РАН*

Хлоргексидин 0.05% | Мирамистин | Фурацилин | Натрия хлорид (NACL 0.9%)

*один из препаратов

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Бинты стерильные | Марлевые салфетки | Ватные диски

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА (при кровотечениях)

Перикись водорода 3% | Жгут (при сильном кровотечении)

АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА* (при аллергии)

Цетрин | Зодак | Зиртек

*любой из этих препаратов

Дозы:

СОБАКИ

- Вес от 1 до 3 кг — 1/3 таблетки
- Вес от 3 до 5 кг — 1/2 таблетки
- Вес 10 кг — 1 таблетка
- Вес 20 кг — 2 таблетки
- Вес 30 кг — 3 таблетки
- Вес 40-60 кг — 4 таблетки

КОШКИ

У них доза выше от 2.5 до 5мг на килограмм!

- Вес от 1 до 3 кг — 1 табл.
- Вес 3-5кг — 1,5 табл.
- Вес 6-10кг — 3 табл.
- Вес более 10 кг — 4 табл.

СТЕРОИДЫ* (при сильных аллергических реакциях, инъекционные)

Дексаметазон | Преднизолон

*один из препаратов

ДОЗЫ

- Мелкое животное до 3 кг — 0.3 мл
- Среднее животное до 10-12 кг — 0.5 мл
- Крупное животное 13-30 кг — 1.0 мл
- На гигантских от 30 кг — 2.0 мл.

Инъекцию делать внутримышечно (в ногу)

СОРБЕНТЫ* (при отравлениях)

Полисорб | Энтеросгель

*один из препаратов

Дозы:

- Животное до 5 кг : 1 чайная ложка на 15- 20 мл воды
- Животное от 5 до 10 кг: 2 чайные ложки на 20-40 мл воды
- Животное от 10 до 20 кг: 1 столовая ложка на 40-50 мл воды
- Животное от 20 кг и выше: 1.5-2 столовые ложки на 50-70 мл воды

ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЕ СРЕДСТВО (при повышении тепературы)

Мелоксикам (инъекционный, 10 мг/мл)

Инъекцию делать внутримышечно (в ногу)

Доза: • 0.1 мл на 4 кг массы животного

ПРОТИВООЖОГОВОЕ СРЕДСТВО

Пантенол спрей или пенка

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР

Им проще измерять температуру тела животных

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

При трамвах глаз можно промывать и закапывать только

Физраствором | Флоксалом (аналог Лафракс)

МОЧЕГОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (инъекционные)

Фуросемид | Лазикс

*один из препаратов

Дозы:

- вес 1кг — 0.3 мл
- вес 2кг — 0.6 мл
- вес 3-5кг — 1.0мл
- вес 6-10кг — 1.5мл
- вес 11-20кг — 2.0мл
- вес 21-30кг — 3.0 мл
- вес 31-40 кг — 4.0 мл
- вес более 40 кг — 5.0 мл.

Вводить куда угодно (холка, задняя конечность).
Можно даже выпаивать в рот.

12

ШПРИЦЫ № 1, 2, 5 И ШПРИЦ 10, 20, 50 мл для промывания желудка.

Чем крупнее животное, тем больше должен быть шприц и игла

13

У вас в аптечке должны быть **ПРОТИВОЯДИЯ** (антидоты)

К **ИЗОНИАЗИДУ** ВИТАМИН B6 (ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИД)

Доза: • 1 мл на каждый килограмм веса животного

Инъекцию делать можно и подкожно (в холку) и внутримышечно (в ногу).

Если вес животного большой, то и доза пиридоксина будет значительной.

В таком случае необходимо разделить дозу и сделать несколько инъекций:

подкожно (в холку) и внутримышечно (в две ноги).

К АНТИКОАГУЛЯНТНЫМ РОДЕНТИЦИДАМ/крысиному яду

ВИТАМИН K1 (конакион)

Выпускается в таблетках, капсулах и растворах для инъекций.

Доза: • стартовая доза 2,5 мг на 1 кг веса животного

Далее вводят дробно в условиях ветеринарной клиники.

Вводить можно п/к в холку (инъекционная форма препарата)

и в рот (таблетированная форма препарата).

14

ПРОТИВОРВОТНОЕ СРЕДСТВО

ОНДАСЕТРОН (инъекционный)

Ондасетрон 2мг/мл раствор для инъекций.

Доза:
- Вес от 1 до 3 кг — 0.25мл
- Вес от 3 до 5 кг — 0,5мл
- Вес 10 кг — 1.0мл
- Вес 20 кг — 2.0мл
- Вес 30 кг — 3.0мл
- Вес 40 кг-60кг — 5мл.

Инъекцию делать внутримышечно (в ногу)

Если ваш питомец в списке пород, у которых обнаружена мутация MDR1

- австралийская овчарка
- австралийский келпи
- белая швейцарская овчарка
- бобтейл
- бордер-колли
- бородатый колли
- длинношерстный уиппет
- колли длинношерстный
- колли гладкошерстный
- макнаб
- миниатюрная австралийская овчарка
- шелковистый виндхунд
- шелти
- метисы с любой из этих пород

И ПРИ ЭТОМ ВЫ НЕ СДАЛИ АНАЛИЗ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К МЕДИКАМЕНТАМ, ТО ПРИМЕНЯТЬ ОНДАСЕТРОН ЗАПРЕЩЕНО!

15

РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ЛЕВОМЕКОЛЬ

16

ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ:

Фенобарбитал (Паглюферал — таблетки)

Леветирацетам (Кеппра — таблетки)

Корвалол

Дозы:

- Фенобарбитал 10-15 мг/кг
- Леветирацетам 100 мг/кг.

Фенобарбитал — рецептурный препарат, есть в таблетках под названием Паглюферал, выпускаются в форме Паглюферал-1 (25 мг в таблетке), Паглюферал- 2 (35 мг в таблетке) и Паглюферал-3 (50 мг в таблетке), а также содержится в каплях Корвалол в дозе 18.26 мг в 1 мл (26 капель).

Как посчитать дозу?

- Например, собаке весом 5 кг необходимо 10мг/кг фенобарбитала (т.е.50 мг).
  Можно дать 2 таблетки Паглюферал-1 ИЛИ 1 таблетку Паглюферал-3 ИЛИ 2,7 мл корвалола (71 капля).

- Собаке 10 кг требуется 100мг фенобарбитала, а значит, 2 таблетки Паглюферал-3 ИЛИ 5,5 мл корвалола.

Аналогично с Леветирацетом (таблетки Кеппра 250мг или 500 мг).

- Собаке весом 5 кг необходимо 100мг/кг (500мг).
  Можно дать 1 таблетку 500 мг или 2 таблетки 250мг.

- Собаке весом 15кг требуется 1500мг.
  Можно дать 3 таблетки по 500мг.

17

ПРЕПАРАТ ДЛЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ:

Адреналин

Доза: • 0,1 мл/кг.

Вводить внутримышечно в ногу.

Повторять введения каждые 3 минуты.

18

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ САХАРА В КРОВИ:

Глюкоза 20% или 40%

Выпаивать 20% глюкозу в дозе 1мл/ на 1 кг веса.

40% глюкозу необходимо разбавлять с водой 1:1 и доза разбавленной глюкозы тоже 1мл/на килограмм веса.

19

КИСЛОРОДНЫЙ БАЛЛОНЧИК.

Должен быть в аптечке, если у вашего питомца подтверждённые сердечные патологии.

20

КЛЕЩЕКРУТ.

Чтобы легко и быстро выкрутить клеща.

21

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Капрамин

Жидкость д/остановки капиллярного кровотечения при повреждении когтей.





АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА
(при аллергии)

Цетрин | Зодак | Зиртек

*один из препаратов

ДОЗА

СТЕРОИДЫ (при сильных аллергических реакциях)

Дексаметазон | Преднизолон

*один из препаратов



ДОЗА

Инъекции внутримышечно в ногу

СОРБЕНТЫ (при отравлениях)



Полисорб | Энтеросгель

*один из препаратов

ДОЗА

ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
(при повышении температуры)



Мелоксикам
(инъекционный, 10 мг/мл)

ДОЗА

Инъекции внутримышечно в ногу

МОЧЕГОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
(инъекционные)



Фуросемид | Лазикс

*один из препаратов

ДОЗА

Можно делать иъекции внутримышечно (в ногу), подкожно (в холку) и выпаивать в рот

ПРОТИВОЯДИЕ К ИЗОНИАЗИДУ

Витамин B6
(пиридоксина гидрохлорид)



ДОЗА

Можно делать иъекции внутримышечно (в ногу), подкожно (в холку) и выпаивать в рот

ПРОТИВОЯДИЕ К КРЫСИНОМУ ЯДУ

Витамин K1 (конакион)

ДОЗА

Инъекции подкожно (в холку) либо таблетки, капсулы в рот

ПРОТИВОРВОТНОЕ СРЕДСТВО
(инъекционное)



Ондасетрон 2мг/мл

ДОЗА

Инъекции внутримышечно в ногу

ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ СРЕДСТВА

Фенобарбитал (Паглюферал — таблетки)

Леветирацетам (Кеппра — таблетки)

Корвалол

*один из препаратов

ДОЗА

СЛР
(для сердечно-легочной реанимации)

Адреналин



ДОЗА

Инъекции внутримышечно в ногу

ДОПОЛНЕНИЕ — СТИКЕРЫ

Они созданы для вашего удобства.

Вам сразу надо написать дозу на вес вашего питомца и приклеить эти стикеры на каждый препарат в аптечке, чтобы в экстренной ситуации у вас все дозы были сразу перед глазами.

Вот теперь вы знаете, как помочь своему четверолапому в экстренных ситуациях. Самое главное не паниковать и действовать четко по плану.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ПИТОМЦЕВ





