

Parturient behaviour:

a) **Pre-Parturient**:- (occur is about 4 h) قبل الولادة

- 1) Isolation from herd. بتزل نفسها عن القطيع.
 - 2) Shelter Seeking where Mares seek sheltered area in which to foal. يختار مكان مناسب للولادة.
 - 3) Pre-Parturient maternal interest (stealing of other foal) الملوك الأمومة مبكر فبشره ابنت Mare غير هاوتريبه.
 - 4) Progressive ↑ in restlessness. بسبب الألم الذي ليس فيه.
 - 5) Frequent urination. تبول كثير.
 - 6) Sniffing amniotic fluid that is expelled.
 - 7) Profuse sweating (elbows, breast, flanks) عرق كثير.
 - 8) Contraction of uterine muscle leading to contraction of abdominal muscle. انقباض من العضلات بيجليها تنمرغ في الارض.
- عندئذ حالته لو بتاكل كومين بيجر هي بتولد والحاله التانيه لو كانت قدامها
الاكل فدي بيجر حاله Colic.

B) BIRTH PROCESS

(Expulsive stage):- وقت الولادة

1) birth process is rapid (5-47 min)

98% of mares birth in (lying position / sternal recumbancy)

5% of mares birth in (standing position)

2) contractions ended by appearance of water bladder

Vulva ↑ in size due to uterine contraction

Appear forelimb & nose after 10 min of rupture.

الانقباضات دي بتقف اول ما الكيس الجنيني يطلع وال Vulva تزيد في الحجم
ومن اول عشر دقائق الازل الأمويه والنفث بطلع برا وتظهر.

3) Most Mares give birth at night / in morning in order to foal in solitude of the pasture.

المار يتجنب تولد بعيد عن الاطعام ويبعد عن القطيع.

c) Post-Parturient (Maternal) :- بعد الولادة

After Parturition Placenta usually expelled within 0.5-1 h.

Placenta delivered while mare in sternal recumbence.

الحبل متى سقطت في البقرة خال mare مش بتاكل المشيمة.

Internal Factors

heredity, experience & hormones.

External Factors

smell, appearance & sound of foal.

بلوك الام ودرجة على حسب الجينات والهرمونات والخبرة هل ولدت قبل كدة
و (٨ / ٨ / ٨)

Cleaning & attraction :-

Mare start licking newborn

She will lick its foal continuously for up to 0.5 h.

Then intermittently for short periods throughout the foal's first day.
الام بتبدأ تلحس ابنها والفترة هي اول نصف ساعة من اول يوم بيتر اللبن مكثف وبعد منها السلوك ده بيقبل.

a) Maternal bond or Mutual recognition:-

↳ Hearing / Appearance / smell

لو الام حواسها كلها موجودة فتقدر تتعرف على ابنها سريع فليب لو عند هاش حاسة النظر بتتفرخ على ابنها بس بتأخذ وقت اطول من العادي فليب لو عندنا حاسة الشم بتتفرخ على ابنها برفو بس بتأخذ وقت اطول متعارفة بالي عند هاش حاسة النظر فليب لو الحاسية مش موجودة بتقدر تتعرف على ابنها من صوت برفو لازم متأكد منه عن طريق الشم أو البصر.

B) dryness of Foal بتأخر إبتداء علشان تنشف مائل Fluid الـ علشان

c) Stimulation of Subcutaneous blood & lymph

تعمل تحفيز للدورة الدموية والليمفاوية.

d) Removal of The fetal membranes & fetal fluids from The nostrils.

e) Licks The Perineum Region To Stimulate urination & defecation To get rid of meconium or fetal fecal matter → causes in Toxicity if stayed for long time.

و لازم تتعصب من منطقة الـ Perineum علشان ده بيحفظ خروج البول والبراز
فما يتسبب الـ Meconium لوجوده علشان لو فقلت موجوده لتعمل تسبب

Initiation of suckling or nursing:-

a) Teat Seeking activity

Mare help The foal by flexing The hind leg furthest from The foal & contracting The abdominal muscles.

الفرس يبدأ يدور على الثدي و هي بتساعد عن طريق انما تقربها من منطقة الثدي
حيث وهو بيور عازاي؟ بيقل يعض من الاماكن البارز عند الثدي لما يوصل.

b) Foal Must have colostrum

Unless it Suffers from neonatal iso erythrolysis.

لوما خشي الـ colostrum ماله لازم لازم ابدا اكلها و ابتداء انما اللي بيده

Care of Mare after foaling:-

1) Placenta, ideally shed within 3h & checked for missing parts because retention of a piece in size of a hand can cause founder or septic Metritis infection in Mare (Not shed within 6-8h Veterinary interference should be admitted).

بعد ايف يادكتو الكلام ده بترى؟
المشقة لو متزلت في ضال ٣ ساعات وعملت في الرحم ممكن تمنع الحمل مرة أخرى
وتخلي الإشت عقيده غالا زوم اتأكد انها نزلت كلها طبيب لو لقيتها مش راغية
قزل في ضال من 6 - 8 ساعات لازم يوصل تدخل بيطري.

2) Washing udder & external genitalia & hind quarter

3) Mare should be offered chilled water (2-3 Pails)

4) Bolled grains & bran mash should be offered.

على ما رمش بتقدر تاكل في الأول غديا مليك وحاجات يلاي الرحم.

5) Moderate exercise is important in stimulating The Mare's uterus To tone up. ترجع جصولا طبيعي

6) Feeding should start after 24 h لازم تبدأ تاكل بعد 24 ساعة

ويسا ازور الاكل تر ريجي كد ما ترجع تاكل طبيعي.

7) Foaling heat comes often at ninth day of foaling (Nine-day heat).

Problems associated with Mare & Foal after birth

1) Foal Rejection:- الأم بترفض ابنها

↳ Causes

a) young Primiparous, Nervous Mares. اول مرة تولد.

b) Too Many human Visitors.

c) If The foal changes in appearance.

d) injury in Teat or udder.

↳ Treatment.

a) Tranquillization Securing كويس

b) Mare can be restrained with a twitch or hobbles until The foal has nursed well.

c) Mare will accept The foal once The Painfull Tension in udder has relieved.

ElSalami

2. Foals may sometimes be observed to either strain or bite at its own anus. This may indicate retained Meconium.

↳ Treated by giving colostrum or abous or oil.

3. Foals are often coprophagic.

↳ prevented by removal of feces & give mineral in ration.

Postnatal (Neonatal) behaviour:-

a) Co-ordinating recumbence

اول ما الجنيه بيتول جسمه بيكون مفرد على الارض بعد ما يبدا يلم جسمه واسه واحدة ويلتزم جسمه.

b) Elevation → anti gravity function of The vestibular system

خلع ما لم يقف يبدا يقف بتة.

c) Ambulation → able to nurse (1 h).

↳ able to locomote (4 h).

d) Udder searching & nursing.

↳ 4 Times Per 1h of first week (about 80 sec)

↳ Suckle for 14 ~ 6 months النظام

بيرفع اربع مرات من اليوم وده من اول اسبوع والرعاية بتقل تدريجيا كما يولد في الشهر الخامس يتقوى مرتبه بدن.

Care of foal after foaling:-

1) Umbilical cord is striped from blood & cut 1.5 inches from the abdominal wall blusted with antibiotic powder or injected with Tincture iodine.

2) dry The foal

3) Removal of Mucous from nostrils.

Elshahin

- 4) Foal can stand on the feet within an 1 h $\rightarrow$ if delayed help should be offered.
- 5) Trimming of the hoof.
- 6) An enema should be administered within 12 h after birth if the meconium is not passed.
- 7) After 12-3 weeks $\rightarrow$ foal able to eat some green food or hay.
- 8) Common practice to administer Tetanus (lock jaw) antitoxin and a Penicillin-Streptomycin.

Management of orphan foal:

1. Mare died / not giving sufficient milk.

Poster Mother ~ مادر بديل

a) Mare which has lost her own foal early at the same age & color as the orphan foal.

heavy milking mare which has own foal of similar age and is able to feed two.

لؤلؤم البيلع ديه فهد ابنا او عندنا لب كتابه لا تسب

b) Poster Mother should be secured by service hobbles or give Tranquilizer.

~~At~~ Rub the Mare's muzzle with the same solution or Pint (0.5 l) or two of the Mare's milk sprinkled over foal's body & rub with some of milk around the Mare's nostrils.

c) Feed the foal every 3-4 h but gives no feeds overnight for the first week or 10 days.

ElSalam

أبداً أدخل الـ Foal بالتدريج للـ Mare علشان يرفع ويسهل وقت عفا
والجيك بيت الوحيك بين لوال Mare عايزة بسبع مداها وابتداءً أقل
الكل ده بالتدريج حسب 6-8 أسابيع أخيراً يرفع مرتين بس لحمايته

Artificial Feeding :-

→ Cow's Milk → Recently Calved Tuberculin Tested

→ heavy milking

لبت البقرة مختلف عن لبت الخيل بحيث إنه عادة Fat أقل وسكر أقل
من لبت البقرة.

* Warm This Mixture To body Temp. & give a quarter
of a Pint every hour for the first day or Two.

* At Three To four weeks of age The Sugar may be left
out, but The limewater continued.

At 5 → 6 Weeks Skim Milk may be gradually substituted
for Whole Milk.

after 3 month The clot may be given all it can drink 3
Times a day, Then Twice daily until weaning.

من اصناف زودنا حاجات على لبت البقرة علشان يرفع زي لبت الحمار هيعجب بقر
أول ما الـ Foal يتقر الـ 3-4 أسابيع ليشل السكر الزوده وابتداءً أقل من
الحاجات اللي زودنا واحدة واحدة ويديت ابتداءً أقل من كمية اللب
اللي الـ Foal بيتربها.

* At 4 weeks Foal can Put out To nibble grass & at 2
month Foal can eat Solid food

Gallon → 4.5 l

Quart → 0.25 Gallon (1.25 l)

Pint → 0.5 Quart

Weaning of Foal: النظام

Physiological & Psychological Shock To Foal.

4 to 6 months.

→ Suddenly →

لوعائز افلامك سريع

→ Gradually →

افلامك واحد واحد

With highly nervous & excitable Mares & Foals.

Shut The Foal in a darkened loose box for an 1.h only on The first day. on The second day separate for 3-4.h on The third day for 6.h and so on until in a week's time The mare is removed altogether.

Drying off a mare.

a) The dam if in foal again ceases lactating at about 8 month

مستغاث من لبن لوسي طلت حاملتاني اطيبلو

b) She must be carefully dried off.

She should be kept short of grain & water for a day or two or more hay being substituted.

The udder shouldn't be completely stripped, only small quantities of milk should be stripped from The udder each day milk will be secreted.

اطل الالم بعد عن الاكل والعياء اتوبه خيالتي انتاج اللبن هقل ولما امر

اطلها محلبت لبن كثير علساه اخله اللبن الراجوا يجهف خيالتي انتاج

اللبن يبل لحد ما يقف خال.

Management of foal after weaning (Foal hood).

1) Housing

→

مكانه يتوبه نظيف و مريح و واطل شمس و بعيد عن الرياح

Elbalm

2) Feeding

- * given small amount of cod liver oil. فوق الشا
- * should be creep fed with high quality grains.
- * avoid feeding of foals with high-grain diets as it leads to accumulation of glycogen.

This lactic acid resulted in damage of muscle fiber & condition known as **Tying up** & if large area of the muscle is damaged it cause **Azoturia**.

- * بالى بيحل تشجات اللحم ودا لى جى ودا لى جى ودا لى جى
led to drinking large amount of water.

ingestion of large amount of pasture & severe exercise on hard surfaces resulted in inflammation of all sensitive laminae & cause **Founder**.

3) Training:-

- * should be haltered & led from both near & off side.

بجدة السرج وابتدأ بالتأهل مع الناحية اليمنى واليسرى
* have their feet frequently lifted.

* Working horses (light work on farms) ~ 3 years.

* Riding horses ~ 4-5 years.

* Race horses ~ 2.5-3 years.

تجنب عقابه خلوص ووقت على القامح

4) Shoeing:- تركيب الحذاء

→ Pare & Trim The feet so that no further damage caused to the horn of the wall, leave them for a month & then shoe them.
 → use glass-tips (half shoe) for three or four months before the proper shoeing to protect the toes from breaking.

لواول مرة الخيل يتخذ صوة ببر الاول رجله واربعا وبعدها يركب نفس صوة
 كلما يتعود عليها على ما ذكر في الحاشية.

Care & Management of working horses:-

- 1) housing تنظيف ودرج ورافعة الشمس وبعيد عن الازوا
- 2) feeding → good quality food rich in carbohydrate. غذاء الطاقة
- 3) Watering → depend on ambient Temp. & nature of food. كمية المياه التي يشربها متغيرة على طبيعة الكمية ودرجة الحرارة وحواليه
- 4) harness → cleaned regularly. 5) Care of body & feet → regular grooming.

Watering of horses:-

- Should not be watered heavily before & after heavy work
- Should be given water after finishing its rightly allowance of roughage.
- Protein rich ration require much water than carbohydrate feeds.
- frequently in small quantities.
- Soft water (older) hard water (younger)
- Medium horse used 8-10 gallon in hot weather up to 15 gallon.
- Individual horse 10-12 gallons daily.

Management of Stallions:-

- 1) Housing

مستقرات الذكور على ما ذكر في الحاشية.

- 2) Feeding $\rightarrow$ before & during breeding season (supplied with slowly $\uparrow$ amount of concentrates) according with exercise given. كل يوم حسب القارعة التي يبعثها
- 3) Exercise $\rightarrow$ 3 months before covering season gradually $\uparrow$ amount of walking exercise.
- 4) Training $\rightarrow$ Managed, fed, groom, exercised & bedded by one man.
- 5) examination of stallion $\rightarrow$ semen samples should be examined before breeding season. لا يفحص الحيوانك الجديد قبل موسم التزاوج
- 6) serving Management $\rightarrow$ young stallion serve young Mare (light weight serve today & rest the other).

عمر الحصان	عدد الحيات التي يقدر بحملها
1 st Season 2-5 Year $\rightarrow$	12-15
2 nd Season 3 Year $\rightarrow$	30-40
3 rd Season 4 Year $\rightarrow$	50-60
4 th 5 Year & upwards $\rightarrow$	80-90 or more
old stallion at 18-20 $\rightarrow$	20

فترته $\rightarrow$ jannet (ass) 12 month
عمره $\rightarrow$ Mare (horse) 11 month

lec 7 ✓ done

by: jana gaber

✓ 50 ~~✗~~