

Lea

Precautions to be taken before serving. الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل التزاوج.

for Ram

1. Selection of breeding males. اختيار الذكور التي تتخطى مع القطيع. We choose the males that used for the breeding season, according to:
- Their fitness strength. قوتهم.
- Seminal quality. جودة الحيوانات المنوية (الفحص تحت الميكروسكوب).
- Freedom from venereal diseases. خالية من الأمراض التناسلية.
"3 rams are left with 100 ewes"
ال Ram لو عشت نسبة الأخذك تقل ولو زادو يتعاركوا.

2. Shearing: before the breeding season to increase their activities. قبل موسم التزاوج بنحلق الصوف على شان تنزود النشاط (لو درجته الحراري زادت الحيوانات المنوية تقوت).

3. Trimming of ram claws. قص الأظفار.

4. Plushing: increase of 500 gm of concentrate mixture. بنزود خليط مدمرك (الذرة/القول) اسبوعيه قبل التزاوج واسبوعيه في وقت التزاوج على شان تتركب sperm وال ova بروتيينات.

5. Exercise: walking for 4-6 kilometer.

6. Marking and identification علامة على رأسه ليعرف من يتزاوج

7. Parasitic control: Ram should be treated with suitable anthelmintic for internal and external parasites.

معالجته الطفيليات به مادة دوائية مناسبة للطفيليات الداخلية والخارجية
وذلك يجعل طول السنة من موسم التزاوج فقط عن طريق الحقن أو التغطيس

For Ewe

1. Culling: only high-producing ewes should be retained with considering of age, soundness. The owner should save each year from $\frac{1}{5}$ to $\frac{1}{6}$ ewe lambs from purebred and select them from heavy-shearing good milking dams.

الاستبعاد: بشمل female التي كبرت في السن وإنتاجها قليل وأصلها
ال female الجيدة الصغيرة في السن التي يكون إنتاجها أكبر للأطفال

2. Shearing قص الصوف

3. Dipping: Treat external parasites. التغطيس ببخيليني اخضر
من الامراض ويكون علاج للطفيليات الخارجية

4. care of foot (trimming of claws).

5. Plushing تغني التي يجعل له Male من هنا يزود بنسبة
الحمل في توأم

Pregnancy diagnosis

1. By ultrasound or Radiography

Used to see the fetus skeleton and heartbeats (The 43rd day)

2. By abdominal Palpation

during late stage of pregnancy.

بضغط البطن لجوانبها ناحية الظهر وأيدي مركة واحدة فالجنته يخط في أيدي
وجنس البطن قد يكون في آخر مراحل الحمل

3. Vaginal examination

by speculum الفحص بالمنظار

4. Service examination

by putting serviced ewes with Teaser Rams for 35 days
The pregnant ones don't show any signs of estrus.

طريقة بلدي ربط ال ewe مع ال Ram لو قبلت التزويج متجوزة
قبل كده ولو رفضت يبقى متجوزة خلاص

5. By signs of Pregnancy Such as:

- cessation of estrus. لا حركة كيرا. Permon
- Increase of abdominal size.
- development of udder.
- Pulling in flank region. الجوانب ينزل لتحت شوية
- slackening of pelvic ligaments. اربطت الحوض تترخي
- Mucous discharges from vulva just before parturition.

افرازات مخاطية قبل الولادة
خاص لادي مكتبة الفتح

Management during pregnancy ثابتة في كل الحيوان

Feeding: should be feed an easily digestible ration by grazing and avoid starchy or watery food.

بما ان الحمل فمضغ فتعرف تاكل الوجبة مرة واحدة في تاكل على (7/5) مرات في اليوم وبعيد ان الحمل على شان مضغ فتعرف تاكل من الجبنه

Exercising: Not more than 2 Kilometers. مش في كل حيوانك

Housing: lambing pen is permanent which is made in the form of small box about 1.5 square meters, suitable to hold one ewe and her lambs. Wheat straw or rice straw is preferred for parturition. بعزل الحمل قرب الولد.

Shearing: الوقت before lambing by 3-4 weeks.

This helps lamb to find teats.

تقبل الوقت على انه يعرف يرفع من ال udder (الوقت موفى) فيبدأ يتجمع في امعاء ويصوت

Vaccination: against enterotoxaemia at 6-8 and 2-4 weeks prior to lambing. (مريض التسمم المعوي) (مريض يتقبل من الام الجبنه)

Signs of approaching lambing قرب الولد.

Lamb Stealing: Before Parturition 20% of ewes shows early maternal behavior. "Ewe steal a lamb of other ewe"

"دساولك مميز" (مريض الاموات والبنا لما يلقى يخليه لا تفرق ابنه من غيره) ثابتة وتأكله

2. Shelter Seeking

تدور على مأوى

3. Ewe ceases grazing and rumination توقف الأكل وتقلع

4. Penned sheep shows restlessness, circles, vocalizes, and paws at the ground 60-90 min before parturition.

5. She will sniff and lick bedding contaminated with amniotic fluid. قبل ما تول تبدأ تظهر عليها حالة من القلق والتوتر وتضرب مكالمات وتنفث بولها
تبدأ تشم السائل يتساقط وتناوله جنباً على شئان تول (الوحمل) انظر للسائل كدس متناهما
ان الحبيبت مش بيتنفس.

Lambing or Parturition:

- The onset of parturition is signal by the protrusion of the amniotic sac and restlessness of the ewe.

احدى إشارات الولاد هي بروز الكيس وحالة من القلق والتوتر.

- The older ewe spent shorter time between onset of restlessness and labor, usually 30 to 60 min.

بتولد بقى ومحدش واقف وزمن هبوب والولاد بتكون 1/2 ساعة او طولت
عن كدة الدكتور بيتدخل ويولدها ومواعيد الولاد من 3 to 6 PM to 12 AM.

Factors Prolong the duration of The birth process.

ايه بقى اللى يطول عمل الولاد وده زي البقرة/الجمانا.

1. When The lamb is relatively large for The birth canal.

لما يكون الحبيبت (lamb) كبير نسبياً عن قناة الولاد.

INK MASTERS

(5)

خاص لادي مكتبة الفتح

2. Ewes lambing for the first time and those are older than the usual. النعجة بول لأول مرة وكان أكبر سن من المعتاد.

3. When The fetus takes upon abnormal posture during delivery. لما الجنين يأخذ وضع غير طبيعي وقت الولادة.

4. Exhaustion of the ewe. لما النعجة تكون مرهقة.

Expulsion of fetal membranes and placenta occurs within 2h. طرد الأغشية الجنينية والمشيمة بيأخذ ساعتين.

Licking or maternal care:

Most lamb mortality occurs within the first week of life in range-reared sheep. أكثر فترة في حياة الحمل هي الأسبوع الأول.

Mortality rates are from 5 to 15% rising to as 50% in huge flock in bad weather. في الظروف الطبيعية نسبة موت الحملان من 5% إلى 15% ولكن في قطع كبير بعض الجوارح قد تصل إلى 50%.

a-after lambing

ewe begins to lick her lamb and emit a special Parturition call. النعجة تقوم بلعق حملها وإصدار صوت معين.

Licking is important in cold or windy weather because it

1. Serves to dry the neonate. يساعد في تجفيف الحمل الجديد.
2. Stimulates blood and lymph circulation. ينشط الدورة الدموية والليمف.
3. Stimulation of muscular tone and help him to stand. يحفز العضلات ويساعد في الوقوف.

INK MASTERS

(6)

خاص لدي مكتبة الفتح

4. Stimulates lamb respiration

يحفز تنفس الحمل.

b. during Suckling:-

The critical period during which ewe will accept the lamb is the first 5 min after parturition. Normally ewe stay within 2 meters. بعد الولادة لا تأخذ الرضاعة الحمل بيقف من 3-5 د. 1-2 م. 8-12 م. تبقى راحة ابنتها وتطيع في حنكها على شان لو معرفت حوش واتصال من عند ما اول ما اتولد على طول من غير ملاتعة في الحاله دي هتقبل ان على الحايتر لو لقيت من 20 - 30 د. يقدر امتحاله تقبل غير. ولو عسى وقت طول من غير ما يقدر متاعا حل بعد الولادة خاصه ممكن ترفضه.

Management of ewe after lambing:-

1. If expulsion of placenta is delayed, veterinary help should be called. لو المشيمه منزلتش بدفع واشيها.
2. Wash the udder and hindquarters. رطخ المنطقة كلفه بتر.
3. Don't start feeding grain to ewe too soon after lambing. متنبأ كلها حبوب بعد الولادة وفي الاول الاكل بيكون قليل في اول زحف ساعة و اكلت بعد 4-5 ساعة بقدر اديها الاكل براحتي.

4. After 24 h have passes, the ewe can be offered some grains.

Neonatal behavior:- a. Suckling or Nursing

1. Although lambs are able to stand within one hour of birth. It may take 2 to 3 h before they find the udder.
2. Once suckling has begun, it occurs with great frequency (Twin lambs suck 22 times during 16 h of daylight, and single lambs 6 to 14 times) 3 min الحمل بيقدر يقف تقامًا بعد الولادة بساعت في وقت الرضاعة 3min لو توأمان فيرفع 22 مرة في اليوم اتما لو واحد واحد فيرفع 6-14 مرة و مسد الرضاعة بتكون 3 د. ولو الا 14 خلتا فيت يكون المدة اقل.

3. during the first 2 weeks ewe will allow one to suckle without the other. اول اسبوع بتوافق انوا ترفع واحد من غير الثاني بس بعد كده بترفض

b-Imprinting:-

b-Imprinting:-
فمن فترة بعد الولادة يتبدل الأستقرض على الحمل بتاعه ويتغير من كذا ويمكن تولد لساعة وأيام الفترة في Critical Period.

critical period in sheep normally take place a few hour

critical period in sheep normally take place ~~after~~ following Parturition. الفترة الحرجية بعد الولادة.

Management of lamb after birth:-

1. Cut The Umbilical cord: disinfect with Iodine after tying it tightly.

2. drying of lamb: mucous by a piece of cloth or some straw.

3. Helping lamb to stand: If the lamb is weak, strip the teats in your hand train the lamb to lick it. والاعانف الحمل بجلب اللبن من

4. Feeding of lamb: At about 2 weeks, lambs should be trained to eat roughage by placing some hay and after 4-5 weeks they can feed whole grains. The weaning (1 month)

مع اكتمال اسبوعين يبدأ افطام ال lamb يأكل حبوب مسلوقة / أخضر مع ان كمية اللبن
كفاية ويبدأ من 5-10 ابريق بأكله كل اربع احووب الفطام يكون بعد شهر.

Feeding of orphan lamb:- الرضاعة المستعارة او الرضاعة المقتبضة

1. Persuading ewe To accept lamb:-

Rubbing her nostrils and his rump with Milk Saliva aerosol deodorant or vanilla before reintroducing as follows:
 نغسل فتحة الأنف ورجلها بـ جوار:
 باللب سباجا أو لب بفانيليا ونغسل الجسم فو بس (الأول لأرض) بسبب الرقعة.

* Sharp teeth: Filing teeth can correct The Problem.

لو سنان حاد يبقى نبردها.

* Cracked or lacerated teats Treatment with lead acetate or lanolin and using of bag balm. الوالام فرمضت الرضاعة ننسها يبقى نعالجها بعض خلية كوند في كيس مايد دافيه ونعملها كمالهات على شان نعالج الام.

* Yearling or PrimiParous ewe, using Tranquillizers.

* If ewe refuse him and struggle either tie her hind legs in a corner of box or use ewe stanchion for 2 days. لو است رافقت برفو فنربف رجلها الخلفيه من يده لمد يومين لحد ما تنعود على الرضاعة الحاضنة فخير واوقفها في الزناقة واقفها ومفتحة عينها بس مش تقدر تعمل حاجه غا الحمل يرفع بسلام.

2- Grafting lamb on a different ewe (Foster Lamb)

a. Ewe has single lamb: After dunk lamb in warm water and rubbing him with The water bag or fetal fluids of The newly born.

لو عنينا ائتنى تانيه ولدت من نفس الابوع ممكن نربها الحمل اللامامته رفاة بس الاول مش يبقى ونحط عليه ماء جملع او الالفه الجنيه بتاعت الام اللامامته نخطه عندها.

b. Ewe has lost her lamb: dunking lamb in warm water containing Salt and Molasses and rubbing his head or by rubbing a damp Towel on body of dead one. لو ولدت وفقدت ابنها غا بقى اخطاها الحمل اللامامته رفاة بس الاول افبع ريحته عن طريق اننا غطيه بماء وملح وعسل اسود او اوطه عليه فوطه كنت حافها على الحمل الصيحه وبعدها اديت لامامته على شان تبتا تعلقه.

3- Artificial Feeding or bottle-feeding: بد ايل اللبت

a. Cow's Milk: After addition of one Part of lime water (لتميع الانتفاخ) to each four Parts of tuberculin free Cow's Milk and to each Pint of Milk one desert spoonful of Sugar (البن Sheep دهون اقل غا سكر اعلى على) عكس لبت ال (Cow دهون اعلى سكر اقل غا يضيف سكر).

b. Milk Replacer لبن بودرة زى بيتاغ الاطفال وكل شى كى ليا مكوّنات. خاص لادي مكتبة الفتح

Feeding / housing → horse / cow

Pre-weaning Management:-

1. Castration → lamb will be slaughtered after 6 to 8 months.

قصة (الشيء) فقط. (الشيء) في وقت مبكر من وقت مبكر (الشيء) (الشيء).

a. Buldizzo emusculator

b. Surgically

c. by using rubber rings.

2. Docking or Tailing of lamb

a. Hot chisel

b. Buldizzo clamp and knife.

c. Rubber ring.

3. Identification

4. Dehorning or disbudding:- by an electric hot iron which
is fixed on the horn bud for one min or by using caustic Potash
smear to reduce the fighting between males at maturity and to
make handling of old males easier.

5. Removal of supplementary teats.

6. Trimming of long claws.

7. Deodorization: This carried out by removal of The Musk gland, which secrete This odor and found 9-15 mm behind horn. The removal of This gland carried out by an electrical hot iron or by using caustic Potash.

لوعاين انتحجب لهم اللب الغريب بيش الغدة اللب ورا القرون عن طريق انكافه حودا
كلوت او اقراص مقصه واكوي مكانها.

lec 9 ☒ done

by jana gaber

V50=#