

Behavior "Lec 2"

Cattle are essential Source of : تستخدم بالحياتة مصدر

① food ② work ③ milk products of great Value

Domestic cattle : الماشية المنزلية

Reached Egypt before 4000 years B.C ظهرت في مصر من ... ع سنة قبل الميلاد

used for ① beef production ② milk production انتاج الابلان واللحم

System of mangement : نظام الإدارة

The mangement of dairy herd differs marked by from يختلف بين الماشية التي تستخدم في إنتاج الحليب

The mangement of beef producing animals الانتاج الابلان واللحم تستخدم في إنتاج اللحم

3 types of mangement systems 3 أنواع من نظم الإدارة

① Subsistence or "Peasant producer" : الفلاح المنتج

• only for milk production • feeding is haphazard تغذية عشوائية

• Mangement is poor إدارته متواضعة

• not consider as milk production لا يعتبر من أنظمة إنتاج الحليب

② Specialized dairy farmers : مزارع إنتاج الحليب المتخصصة

• many Peasant producers who could rapidly become small specialized producers فلاحين متواضعين قد يصبحون مزارعين متخصصين بسرعة

• animals kept for milk production • Type of mangment & breeding is important الإدارة مهمة

• the breeding stock is increasing الكتل بزيادة

③ Large scale producer :

small number of large scale private or government-owned

few number of large scale private or government-owned عدد قليل من مزارع الابلان الكبيرة الخاصة أو الحكومية (في مزارع أيضا مثلا)

• management, feeding and breeding are usually superior on these large farms than the smaller ones bec. of superior knowledge الإدارة والتغذية والتكاثر في المزارع الكبيرة عادة ما تكون أفضل من المزارع الصغيرة بسبب المعرفة

Mennatullah Mahmoud

1- خاص لدي مكتبة الفتح

Types of used Cattles

- ① the utilization of indigenous cattle, already adapted to the environment with selection of high productivity
لانتاشة الصليقة الى الاملا بتكن مع البيئة وانتاجها عالي
- ② the importation of highly reproductive, Temperate type cattle with selection for adaptability to a Tropical environment
استيراد ماشية طاردة التكاثر ووعها مختل "تقريباً مع البيئة الاستوائية"
- ③ the importation of highly productive, Temperate type cattle and mangement of them so that adverse effect of the Tropical environment
استيراد ماشية انتاجية عالية من النوع المعتدل ونبأ تحسين الانتاج الضارة للبيئة الى فيها
- ④ the importation of highly productive Temperate type cattle "Bulls" or semen to use in upgrading less productive indigenous cattle
استيراد ذكور من النوع الى انتاجية عالية أو استيراد السائل المنوي بنبأ لتحسين الانتاج المحلي

Breeding Definitions

• Puberty : stage of animals life in which 2ndry sexual characters become remarked for the 1st time or "Estrous" cycle begins in females

مرحلة ظهور الصفات الجنسية (ثانوية) لأول مرة وتبدأ (Estrous) في الإناث

• Estrous Cycle : the interval between 2 periods of this cycle divided into 4 periods

① Proestrus : Phase of estrous cycle when corpus luteum regresses

Progesterone concentration declines and final maturation of the dominant follicle occurs & Estrogen increases ↑ During this phase some 2ndry symptoms of Estrus begin to be exhibited
المرحلة التي يكون فيها الجسم الكامن متراجعاً و يبدأ تركيز البروجيستيرون في الانخفاض ويزيد الاوسترجين و يبدأ تظهر اعراض ثانوية لا Estrus

② Estrus : Period of time when female is receptive to mounting &

will stand to be mounted
مرحلة يتكون الانثى جاهزة للتزاوج و يقبل أي ذكر كلو رضا

③ Metestrus : Beginning of it is immediately after estrus ovulation & early development of corpus luteum occurs

مرحلة التبويض و التطور المبكر للجسم الكامن
خاص لدي مكتبة الفتح

⑥ Feeding: in byre, feeding is poured into a trough form which the animal eats by gathering up the feed with its tongue into the mouth, the feed is in form of moderately small particles, no biting action is necessary, although chewing movement is evident
 من جهة الحلق كحوض كبير يأكل منه عن طريق تجميع اللسان ويخلطه فمقا والعلف يكون جزئيات متفرقة من ذرة عذيقا لكن حركة الفم تكون واحدة

• Rumination

1. act of regurgitating remasticating and re-swallowing previously ingested food
 2. Cattle prefer to lie down although they may stand or walk slowly
 3. occurs in young calves but only take up a proportion of daily time compared to adults
 يحدث في العجول الطرية بين يومين وقت الأخير من الليل، الخن
 4. rumination takes place in periods may last only 2 min or up to 1h or more
 5. the peak period for rumination after night fall & may differ according to diet
 أفضل وقت عادتاً بعد ما الليل تغلم ويختلف الوقت حسب النظام الغذائي
- * during estrous ruminating nearly falls away but it doesn't stop
 يقول لهن صيفش تمام
 - * any incident rise up pain, hunger, maternal anxiety or illness affects rumination
 أي وجع، جوع العلق، ألم، أثر عليها

* pre and post-parturition periods are not conducive to rumination, decline to low level
 اوقات قبل الولادة لا تتوقف

• Drinking behaviour - Controlled by:

- ① interoceptive receptors (thirst) (داخلية) (عطش)
 - ② Extracceptive stimuli (Sight of water) (خارجية) (بشوف المياه فادسحب حنوا ومن عطاشا)
- Cattle drink by dipping their muzzle in water
 اللسان يلعب دور سليلج في الشرب
 - Tongues plays a passive role in drinking
 - nostrils are never under the water
 - the head didn't need to be raised
 - Cattle pastured on grass drink from 1-4 times daily
 التي يتاكل العشب تشرب من 1-4 مرات
 - grazing cattle usually drink in late afternoon and evening
 - dairy cattle tend to drink after milking
 الإبقار التي تشرب لانهاح اللبن تشرب بعد خاص لدي مكتبة الفتح خلية السلي

للماشية بتلعب وتنظيف أي جزء من جسمها تقريباً

- Body Care:** • Cattle lick & thereby clean every part can reach
→ to groom inaccessible parts, they often use trees and fences stables as scratching posts
→ Tail switching is part of grooming behavior used to keep off flies
→ Footing

«function of grooming»

- ① Removing of harmful Contaminants as feces, urine, mud and some external parasites
- ② Culling good social groomers may result in decreased milk yield & higher mortality

Elimination

- * Tail is flexed away from the posterior region the back arched & the hind Limbs placed forward and apart calves take more to expel the feces away
- * Bulls Can walk during urinating but cows cant

Resting & Sleeping

- * Standing idle: cattle rest at Standing without rumination
- * Sternal Recumbancy: Alert wake fullness & Drowsiness & Sleeping

Drowsiness: Short period before Sleeping

- Sleeping:**
- ① body Sleeping → rapid eye movement Sleeping
 - ② Brain Sleeping → Slow wave Sleeping

* Lateral recumbancy

(Social behavior)

Domination depend on: Age, highest girth, total weight, strength, height of withers
hereditary characteristics

Types of Social hierarchy

- ① Linear hierarchy → usually only exists within small herds
- ② Linear-Tending → hierarchy occurs more frequently
- ③ Complex H → seen in large herds

Communications:

- ① Visual Communication
- ② Vocal Communication
- ③ Olfactory

Investigatory behavior: to explore their environment
exploratory behavior subsides but it reappears when there is an environmental novelty

when environment is less curious, behavior is a character of young animals

Reproduction behavior

- ① Puberty at (6-8) months
- ② breeding Season mostly in June & July
- ③ estrous cycle every (18 to 24) day for (12 to 14) hours
- ④ gestation period: (9-10) months

Signs of estrus

- ① Physical Signs: temporary drop in milk production
 - ② Swelling & reddening in the vulva
 - ③ mucous discharges from vulva in form of long viscous clear strands
 - ④ dirty flanks when cow have mounted by cattle with dirty hoof
- ② Behavioral Signs: decrease feed intake, bellow a great deal
frequent galloping with raising the tail or deviate it to side
unirates frequently, stand out to be mounted "most accurate Signs"

Ink Markers

Mennatullah Mahmoud