

# 1 Avant-propos

Voici la correction de la feuille d'exercices disponible ici : <https://leturcq.d.github.io/ressources/3e/R%C3%A9visions3e/R%C3%A9visions3e.pdf> Elle est disponible à tout instant au lien suivant, qui sera mis à jour : <https://leturcq.d.github.io/ressources/3e/R%C3%A9visions3e/R%C3%A9visions3ec.pdf>

Corrigés rédigés dans cette version :

- Partie 2 : complet
- Partie 3 de a). à k). et q). à w).

## Table des matières

|          |                           |          |
|----------|---------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Avant-propos</b>       | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Révision de calcul</b> | <b>4</b> |
| 2.1      | Calcul <b>1</b> .         | 4        |
| 2.2      | Calcul <b>2</b> .         | 5        |
| 2.3      | Calcul <b>3</b> .         | 5        |
| 2.4      | Calcul <b>4</b> .         | 6        |
| 2.5      | Calcul <b>5</b> .         | 6        |
| 2.6      | Calcul <b>6</b> .         | 6        |
| 2.7      | Calcul <b>7</b> .         | 7        |
| 2.8      | Calcul <b>8</b> .         | 7        |
| 2.9      | Calcul <b>9</b> .         | 7        |
| 2.10     | Calcul <b>10</b> .        | 7        |
| 2.11     | Calcul <b>11</b> .        | 8        |
| 2.12     | Calcul <b>12</b> .        | 8        |
| 2.13     | Calcul <b>13</b> .        | 8        |
| 2.14     | Calcul <b>14</b> .        | 9        |
| 2.15     | Calcul <b>15</b> .        | 9        |
| 2.16     | Calcul <b>16</b> .        | 9        |
| 2.17     | Calcul <b>17</b> .        | 9        |
| 2.18     | Calcul <b>18</b> .        | 10       |
| 2.19     | Calcul <b>19</b> .        | 10       |
| 2.20     | Calcul <b>20</b> .        | 10       |
| 2.21     | Calcul <b>21</b> .        | 11       |
| 2.22     | Calcul <b>22</b> .        | 11       |
| 2.23     | Calcul <b>23</b> .        | 11       |
| 2.24     | Calcul <b>24</b> .        | 12       |
| 2.25     | Calcul <b>25</b> .        | 12       |
| 2.26     | Calcul <b>26</b> .        | 12       |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 2.27 Calcul <b>27</b> . | 12 |
| 2.28 Calcul <b>28</b> . | 12 |
| 2.29 Calcul <b>29</b> . | 13 |
| 2.30 Calcul <b>30</b> . | 13 |
| 2.31 Calcul <b>31</b> . | 13 |
| 2.32 Calcul <b>32</b> . | 13 |
| 2.33 Calcul <b>33</b> . | 14 |
| 2.34 Calcul <b>34</b> . | 14 |
| 2.35 Calcul <b>35</b> . | 14 |
| 2.36 Calcul <b>36</b> . | 14 |
| 2.37 Calcul <b>37</b> . | 14 |
| 2.38 Calcul <b>38</b> . | 15 |
| 2.39 Calcul <b>39</b> . | 15 |
| 2.40 Calcul <b>40</b> . | 15 |
| 2.41 Calcul <b>41</b> . | 16 |
| 2.42 Calcul <b>42</b> . | 16 |
| 2.43 Calcul <b>43</b> . | 17 |
| 2.44 Calcul <b>44</b> . | 17 |
| 2.45 Calcul <b>45</b> . | 18 |
| 2.46 Calcul <b>46</b> . | 18 |
| 2.47 Calcul <b>47</b> . | 19 |
| 2.48 Calcul <b>48</b> . | 19 |
| 2.49 Calcul <b>49</b> . | 19 |
| 2.50 Calcul <b>50</b> . | 20 |
| 2.51 Calcul <b>51</b> . | 20 |
| 2.52 Calcul <b>52</b> . | 20 |
| 2.53 Calcul <b>53</b> . | 20 |
| 2.54 Calcul <b>54</b> . | 21 |
| 2.55 Calcul <b>55</b> . | 21 |
| 2.56 Calcul <b>56</b> . | 21 |
| 2.57 Calcul <b>57</b> . | 22 |
| 2.58 Calcul <b>58</b> . | 22 |
| 2.59 Calcul <b>59</b> . | 22 |
| 2.60 Calcul <b>60</b> . | 23 |
| 2.61 Calcul <b>61</b> . | 23 |
| 2.62 Calcul <b>62</b> . | 23 |
| 2.63 Calcul <b>63</b> . | 23 |
| 2.64 Calcul <b>64</b> . | 24 |
| 2.65 Calcul <b>65</b> . | 24 |
| 2.66 Calcul <b>66</b> . | 25 |
| 2.67 Calcul <b>67</b> . | 25 |
| 2.68 Calcul <b>68</b> . | 25 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 2.69 Calcul <b>69.</b>   | 26 |
| 2.70 Calcul <b>70.</b>   | 26 |
| 2.71 Calcul <b>71.</b>   | 27 |
| 2.72 Calcul <b>72.</b>   | 27 |
| 2.73 Calcul <b>73.</b>   | 27 |
| 2.74 Calcul <b>74.</b>   | 28 |
| 2.75 Calcul <b>75.</b>   | 28 |
| 2.76 Calcul <b>76.</b>   | 29 |
| 2.77 Calcul <b>77.</b>   | 29 |
| 2.78 Calcul <b>78.</b>   | 30 |
| 2.79 Calcul <b>79.</b>   | 30 |
| 2.80 Calcul <b>80.</b>   | 31 |
| 2.81 Calcul <b>81.</b>   | 32 |
| 2.82 Calcul <b>82.</b>   | 33 |
| 2.83 Calcul <b>83.</b>   | 34 |
| 2.84 Calcul <b>84.</b>   | 35 |
| 2.85 Calcul <b>85.</b>   | 36 |
| 2.86 Calcul <b>86.</b>   | 37 |
| 2.87 Calcul <b>87.</b>   | 38 |
| 2.88 Calcul <b>88.</b>   | 39 |
| 2.89 Calcul <b>89.</b>   | 40 |
| 2.90 Calcul <b>90.</b>   | 41 |
| 2.91 Calcul <b>91.</b>   | 42 |
| 2.92 Calcul <b>92.</b>   | 44 |
| 2.93 Calcul <b>93.</b>   | 45 |
| 2.94 Calcul <b>94.</b>   | 46 |
| 2.95 Calcul <b>95.</b>   | 47 |
| 2.96 Calcul <b>96.</b>   | 49 |
| 2.97 Calcul <b>97.</b>   | 50 |
| 2.98 Calcul <b>98.</b>   | 51 |
| 2.99 Calcul <b>99.</b>   | 53 |
| 2.100 Calcul <b>100.</b> | 54 |
| 2.101 Calcul <b>101.</b> | 54 |
| 2.102 Calcul <b>102.</b> | 55 |
| 2.103 Calcul <b>103.</b> | 55 |
| 2.104 Calcul <b>104.</b> | 56 |
| 2.105 Calcul <b>105.</b> | 57 |
| 2.106 Calcul <b>106.</b> | 57 |
| 2.107 Calcul <b>107.</b> | 58 |
| 2.108 Calcul <b>108.</b> | 58 |

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Problèmes de réflexion plus avancés</b> | <b>59</b> |
| 3.1      | Problème <b>a</b>                          | 59        |
| 3.2      | Problème <b>b</b>                          | 60        |
| 3.3      | Problème <b>c</b>                          | 61        |
| 3.4      | Problème <b>d</b>                          | 62        |
| 3.5      | Problème <b>e</b>                          | 63        |
| 3.6      | Problème <b>f</b>                          | 64        |
| 3.7      | Problème <b>g</b>                          | 65        |
| 3.8      | Problème <b>h</b>                          | 67        |
| 3.9      | Problème <b>i</b>                          | 68        |
| 3.10     | Problème <b>j</b>                          | 69        |
| 3.11     | Problème <b>k</b>                          | 70        |
| 3.12     | Problème <b>l</b>                          | 70        |
| 3.13     | Problème <b>m</b>                          | 70        |
| 3.14     | Problème <b>n</b>                          | 71        |
| 3.15     | Problème <b>o</b>                          | 71        |
| 3.16     | Problème <b>p</b>                          | 71        |
| 3.17     | Problème <b>q</b>                          | 71        |
| 3.18     | Problème <b>r</b>                          | 72        |
| 3.19     | Problème <b>s</b>                          | 72        |
| 3.20     | Problème <b>t</b>                          | 73        |
| 3.21     | Problème <b>u</b>                          | 74        |
| 3.22     | Problème <b>v</b>                          | 75        |
| 3.23     | Problème <b>w</b>                          | 76        |
| 3.24     | Problème <b>x</b>                          | 77        |
| 3.25     | Problème <b>y</b>                          | 77        |
| 3.26     | Problème <b>z</b>                          | 77        |

## 2 Révision de calcul

### 2.1 Calcul 1.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{1}{4}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) + \left(+\frac{5}{2}\right) &= \frac{-1}{4} + \frac{-3 \times 2}{2 \times 2} + \frac{5 \times 2}{2 \times 2} \\
 &= \frac{-1}{4} + \frac{-6}{4} + \frac{10}{4} \\
 &= \frac{-1 - 6 + 10}{4} \\
 &= \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

ou, plus malin :

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{1}{4}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) + \left(+\frac{5}{2}\right) &= -\frac{1}{4} + \frac{-3+5}{2} \\
 &= -\frac{1}{4} + \frac{2}{2} \\
 &= -\frac{1}{4} + 1 \\
 &= -\frac{1}{4} + \frac{4}{4} \\
 &= \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.2 Calcul 2.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{5}{6}\right) + \left(+\frac{4}{9}\right) + \left(-\frac{7}{3}\right) &= \frac{-5 \times 3}{6 \times 3} + \frac{4 \times 2}{9 \times 2} + \frac{-7 \times 6}{3 \times 6} \\
 &= \frac{-15}{18} + \frac{8}{18} + \frac{-42}{18} \\
 &= \frac{-15 + 8 - 42}{18} \\
 &= \frac{-49}{18}
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.3 Calcul 3.

$$\begin{aligned}
 (-0,75) + (+4) + \left(-\frac{4}{5}\right) &= -0,75 + 4 - 0,8 \\
 &= 3,25 - 0,8 \\
 &= 2,45
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.4 Calcul 4.

$$\begin{aligned}
 \left(+\frac{4}{7}\right) + \left(-\frac{13}{21}\right) + \left(+\frac{5}{6}\right) &= \frac{4 \times 6}{7 \times 6} + \frac{-13 \times 2}{21 \times 2} + \frac{5 \times 7}{6 \times 7} \\
 &= \frac{24}{42} + \frac{-26}{42} + \frac{35}{42} \\
 &= \frac{24 - 26 + 35}{42} \\
 &= \frac{33}{42} \\
 &= \frac{3 \times 11}{3 \times 14} \\
 &= \frac{11}{14}
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.5 Calcul 5.

$$\begin{aligned}
 (-12) + (-11,57) + (+9,87) &= -23,57 + 9,87 \\
 &= -13,7
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.6 Calcul 6.

$$\begin{aligned}
 (-4,51) + \left(-\frac{4}{5}\right) + \left(+\frac{7}{20}\right) &= -4,51 - \frac{4 \times 2}{5 \times 2} + \frac{7 \times 5}{20 \times 5} \\
 &= -4,51 - \frac{8}{10} + \frac{35}{100} \\
 &= -4,51 - 0,8 + 0,35 \\
 &= -5,31 + 0,35 \\
 &= -4,96
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.7 Calcul 7.

$$\begin{aligned}(-10) + (-15) - (-30) + (+7) - (+12) &= -10 - 15 + 30 + 7 - 12 \\&= 30 + 7 - 10 - 15 - 12 \\&= 37 - 37 \\&= 0\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.8 Calcul 8.

$$\begin{aligned}(-7) - (-9) - (+17) + (-41) + (+1) &= -7 + 9 - 17 - 41 + 1 \\&= 9 + 1 - 7 - 17 - 41 \\&= 10 - 65 \\&= -55\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.9 Calcul 9.

$$\begin{aligned}(+49) - (-63) + (-3) - (+4) &= 49 + 63 - 3 - 4 \\&= 112 - 7 \\&= 105\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.10 Calcul 10.

$$\begin{aligned}(-0,7) - (-0,9) + (-13,5) - (+4) &= -0,7 + 0,9 - 13,5 - 5 \\&= 0,9 - 0,7 - 13,5 - 4 \\&= 0,9 - 18,2 \\&= -17,3\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.11 Calcul 11.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{3}{4}\right) - \left(+\frac{2}{5}\right) - (-1) &= -\frac{1 \times 10}{2 \times 10} + \frac{-3 \times 5}{4 \times 5} + \frac{-2 \times 4}{5 \times 4} + 1 \\
 &= \frac{-10}{20} + \frac{-15}{20} + \frac{-8}{20} + \frac{20}{20} \\
 &= \frac{-10 - 15 - 8 + 20}{20} \\
 &= \frac{-13}{20}
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

## 2.12 Calcul 12.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{5}{11}\right) + \left(-\frac{7}{22}\right) - \left(-\frac{4}{33}\right) + (-1) - (+0,5) \\
 &= -\frac{5}{11} - \frac{7}{22} + \frac{4}{33} - 1 - 0,5 \\
 &= \frac{-5 \times 6}{11 \times 6} - \frac{7 \times 3}{22 \times 3} + \frac{4 \times 2}{33 \times 2} - \frac{66}{66} - \frac{0,5 \times 66}{66} \\
 &= \frac{-30}{66} - \frac{21}{66} + \frac{8}{66} - \frac{66}{66} - \frac{33}{66} \\
 &= \frac{-30 - 21 + 8 - 66 - 33}{66} \\
 &= \frac{-142}{66} \\
 &= \frac{-71}{33}
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

## 2.13 Calcul 13.

$$\begin{aligned}
 7 - 10 + 14 - 13 - 21 + 3 &= 7 + 14 + 3 - 10 - 13 - 21 \\
 &= 24 - 44 \\
 &= -20
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1



## 2.14 Calcul 14.

$$\begin{aligned} 0,75 + 4,7 - 0,7 - 0,5 - 1 &= 5,45 - 2,2 \\ &= 3,25 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.15 Calcul 15.

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{5}{12} - \frac{5}{6} - 3 &= \frac{2 \times 4}{3 \times 4} - \frac{3 \times 3}{4 \times 3} + \frac{5}{12} - \frac{5 \times 2}{6 \times 2} - \frac{3 \times 12}{12} \\ &= \frac{8}{12} - \frac{9}{12} + \frac{5}{12} - \frac{10}{12} - \frac{36}{12} \\ &= \frac{8 - 9 + 5 - 10 - 36}{12} \\ &= \frac{-42}{12} \\ &= \frac{12}{-7 \times 6} \\ &= \frac{2 \times 6}{-7} \\ &= -\frac{7}{2} \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.16 Calcul 16.

$$\begin{aligned} [(5 - 9) + (3 - 5)] - [(7 + 3 - 5) - (7 - 10)] &= [-4 + -2] - [5 - (-3)] \\ &= -6 - [5 + 3] \\ &= -6 - 8 \\ &= -14 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.17 Calcul 17.

$$\begin{aligned} [12 - (14 - 5 + 0,75)] + [-15 + (3,25 - 2)] &= [12 - 9,75] + [-15 + 1,25] \\ &= 2,25 + (-13,75) \\ &= -11,5 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.18 Calcul 18.

$$\begin{aligned}
 \left[1 - \left(\frac{2}{5} - \frac{4}{3}\right)\right] &= \left[\left(\frac{4}{5} - 1\right) - \left(\frac{7}{5} + 2\right)\right] \\
 &= \left[1 - \left(\frac{2 \times 3}{5 \times 3} - \frac{4 \times 5}{3 \times 5}\right)\right] - \left[\left(\frac{4}{5} - \frac{5}{5}\right) - \left(\frac{7}{5} + \frac{2 \times 5}{5}\right)\right] \\
 &= \left[1 - \left(\frac{6}{15} - \frac{20}{15}\right)\right] - \left[\frac{-1}{5} - \left(\frac{7}{5} + \frac{10}{5}\right)\right] \\
 &= \left[\frac{15}{15} - \frac{-14}{15}\right] - \left[\frac{-1}{5} - \frac{17}{5}\right] \\
 &= \left[\frac{15}{15} + \frac{14}{15}\right] - \left[\frac{-18}{5}\right] \\
 &= \frac{29}{15} + \frac{18}{15} \\
 &= \frac{47}{15}
 \end{aligned}$$

Supprimer les parenthèses et les crochets dans les expressions suivantes :

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.19 Calcul 19.

$$\begin{aligned}
 (a - b + c) - (d - e - f) + (b - a) &= a - b + c - d + e + f + b - a \\
 &= a - a - b + b + c - d + e + f \\
 &= c - d + e + f
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.20 Calcul 20.

$$\begin{aligned}
 [(a - b) - (a - 5)] + [b - 7 - (a - 3)] &= (a - b) - (a - 5) + b - 7 - (a - 3) \\
 &= a - b - a + 5 + b - 7 - a + 3 \\
 &= a - a - a - b + b + 5 - 7 + 3 \\
 &= -a + 1
 \end{aligned}$$

ou :

$$\begin{aligned}
 [(a-b) - (a-5)] + [b-7 - (a-3)] &= [a-b-a+5] + [b-7-a+3] \\
 &= [-b+5] + [-a+b-4] \\
 &= -b+5-a+b-4 \\
 &= -a+b-b+5-4 \\
 &= -a+1
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

## 2.21 Calcul 21.

$$\begin{aligned}
 [12 - (a-b) + 6] - [15 + (b-a-13)] \\
 &= 12 - (a-b) + 6 - 15 - (b-a-13) \\
 &= 12 - a + b + 6 - 15 - b + a + 13 \\
 &= -a + a + b - b + 12 + 6 - 15 + 13 \\
 &= 16
 \end{aligned}$$

ou :

$$\begin{aligned}
 [12 - (a-b) + 6] - [15 + (b-a-13)] \\
 &= [12 - a + b + 6] - [15 + b - a - 13] \\
 &= [18 - a + b] - [2 + b - a] \\
 &= 18 - a + b - 2 - b + a \\
 &= 18 - 2 - a + a + b - b \\
 &= 16
 \end{aligned}$$

Effectuer les produits suivants :

Retour au sommaire : page 1

## 2.22 Calcul 22.

$$(-3)(+7)(-5)(-4) = (-21) \times (+20) = -420$$

Retour au sommaire : page 1

## 2.23 Calcul 23.

$$(+1, 7)(-2, 5)(-3)(-1, 9) = (-4, 25) \times (+5, 7) = -24, 225$$

Retour au sommaire : page 1

**2.24 Calcul 24.**

$$(-1)(+1)(-1)(+1)(-1)(-1) = (-1)^4 = +1$$

Retour au sommaire : page 1

**2.25 Calcul 25.**

$$\left(-\frac{3}{5}\right)(+3)\left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{-3 \times 3 \times -5}{5 \times 3} = \frac{+3 \times (3 \times 5)}{3 \times 5} = 3$$

Retour au sommaire : page 1

**2.26 Calcul 26.**

$$\left(+\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{4}\right)\left(-\frac{4}{8}\right) = \frac{1 \times -1 \times -4}{2 \times 4 \times 8} = \frac{4}{2 \times 4 \times 8} = \frac{1}{2 \times 8} = \frac{1}{16}$$

Retour au sommaire : page 1

**2.27 Calcul 27.**

$$\begin{aligned} \left(+\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{6}{11}\right)\left(-\frac{7}{8}\right)\left(-\frac{11}{15}\right) &= \frac{1 \times -6 \times -7 \times -11}{2 \times 11 \times 8 \times 15} \\ &= \frac{-2 \times 3 \times 7 \times 11}{2 \times 11 \times 2^3 \times 3 \times 5} \\ &= -\frac{7}{2^3 \times 5} \\ &= -\frac{7}{40} \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

**2.28 Calcul 28.**

$$(+15) : \left(-\frac{2}{3}\right) = 15 \times \frac{-3}{2} = \frac{15 \times -3}{2} = -\frac{45}{2}$$

Retour au sommaire : page 1

**2.29 Calcul 29.**

$$(-7,5) : \left(-\frac{4}{5}\right) = +7,5 \times \frac{5}{4} = \frac{7,5 \times 5}{4} = \frac{37,5}{4} = \frac{37,5 \times 2}{4 \times 2} = \frac{75}{8}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

**2.30 Calcul 30.**

$$(-1) : \left(+\frac{3}{4}\right) = -1 \times \frac{4}{3} = -\frac{4}{3}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

**2.31 Calcul 31.**

$$\begin{aligned} \left(-\frac{4}{5}\right) : (+1,4) &= -\frac{4}{5} : \frac{14}{10} \\ &= -\frac{4}{5} \times \frac{10}{14} \\ &= -\frac{4 \times 10}{5 \times 14} \\ &= -\frac{2 \times 2 \times 2 \times 5}{5 \times 2 \times 7} \\ &= -\frac{2 \times 2}{7} \\ &= -\frac{4}{7} \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

**2.32 Calcul 32.**

$$\left(+\frac{3}{4}\right) : \left(-\frac{15}{8}\right) = -\frac{3}{4} \times 815 = -\frac{3 \times 8}{4 \times 15} = -\frac{3 \times 2^3}{2^2 \times 3 \times 5} = -\frac{2}{5}.$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

**2.33 Calcul 33.**

$$\left(-\frac{7}{3}\right) : \left(+\frac{5}{3}\right) = -\frac{7}{3} \frac{3}{5} = -\frac{7 \times 3}{3 \times 5} = -\frac{7}{5}.$$

Retour au sommaire : page 1

**2.34 Calcul 34.**

$$(+1) : \left(+\frac{2}{3}\right) = 1 \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

Retour au sommaire : page 1

**2.35 Calcul 35.**

$$\left(-\frac{8}{25}\right) : \left(-\frac{14}{5}\right) = +\frac{8}{25} \times 514 = \frac{8 \times 5}{25 \times 14} = \frac{2^3 \times 5}{5^2 \times 2 \times 7} = \frac{2^2}{5 \times 7} = \frac{4}{35}$$

Retour au sommaire : page 1

**2.36 Calcul 36.**

$$\left(+\frac{1}{3}\right) : \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{3} \frac{4}{1} = -\frac{1 \times 4}{3 \times 1} = -\frac{4}{3}$$

Retour au sommaire : page 1

**2.37 Calcul 37.**

$$\begin{aligned} \frac{-3+5-6}{2+7-1} \times \frac{4-3+1}{2-3-1} \times \frac{-5-7}{10} &= \frac{-4}{8} \times \frac{2}{-2} \times \frac{-12}{10} \\ &= \frac{-4 \times 2 \times -12}{8 \times -2 \times 10} \\ &= \frac{2^2 \times 2 \times 2^2 \times 3}{-2^3 \times 2 \times 2 \times 5} \\ &= -\frac{2^5 \times 3}{2^5 \times 5} \\ &= -\frac{3}{5} \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

## 2.38 Calcul 38.

$$\begin{aligned}
 \frac{\frac{1}{2} - \frac{2}{3}}{\frac{3}{4} - 1} \times \frac{\frac{5}{6} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{4}{5}} \times \frac{-\frac{7}{8} + 1}{\frac{3}{2}} &= \frac{\frac{1 \times 3}{2 \times 3} - \frac{2 \times 2}{3 \times 2}}{\frac{3}{4} - \frac{4}{4}} \times \frac{\frac{5}{6} + \frac{1 \times 2}{3 \times 2}}{\frac{5}{5} - \frac{4}{5}} \times \frac{-\frac{7}{8} + \frac{8}{8}}{\frac{3}{2}} \\
 &= \frac{\frac{3}{6} - \frac{4}{6}}{-\frac{1}{4}} \times \frac{\frac{5}{6} + \frac{2}{6}}{-\frac{1}{5}} \times \frac{\frac{1}{8}}{\frac{3}{2}} \\
 &= \frac{-\frac{1}{6}}{-\frac{1}{4}} \times \frac{\frac{7}{6}}{-\frac{1}{5}} \times \frac{\frac{1}{8}}{\frac{3}{2}} \\
 &= \left(-\frac{1}{6}\right) \times (-4) \times \frac{7}{6} \times (-5) \times \frac{1}{8} \times \frac{2}{3} \\
 &= -\frac{4 \times 7 \times 5 \times 2}{6 \times 6 \times 8 \times 3} \\
 &= -\frac{2^2 \times 7 \times 5 \times 2}{2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2^3 \times 3} \\
 &= -\frac{2^3 \times 5 \times 7}{2^5 \times 3^3} \\
 &= -\frac{5 \times 7}{2^2 \times 3^3} \\
 &= -\frac{35}{108}
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

## 2.39 Calcul 39.

Calculer :

$$(-11)^3 = 1331; \quad (+9)^2 = 81; \quad (-10)^5 = -100\,000;$$

$$(+7)^4 = 2401; \quad (-13)^4 = 28\,561.$$

Retour au sommaire : page 1

## 2.40 Calcul 40.

Calculer :

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{(-1)^5}{2^5} = \frac{-1}{32}; \quad \left(+\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2} = +\frac{4}{9}; \quad \left(-\frac{3}{4}\right)^3 = (-1)^3 \frac{3^3}{4^3} = -\frac{27}{64}$$

$$(+1, 4)^2 = +1, 96; \quad (-0, 25)^2 = +0, 0625.$$

Retour au sommaire : page 1

## 2.41 Calcul 41.

Calculer :

$$5^3 \times 5^2 = 5^5 = 5^5 (= 3\,125); \quad (-7) \times (-7)^2 = (-7)^3 = -343;$$

$$\left(\frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81};$$

$$\left[\left(-\frac{1}{4}\right)^2\right]^2 [(-2)^2]^3 = \left(\frac{+1}{4^2}\right)^2 [4]^3 = \frac{1}{4^4} 4^3 = 4^{-4} 4^3 = 4^{-4+3} = 4^{-1} = \frac{1}{4}$$

Réduire les expressions suivantes : [Retour au sommaire](#) : page 1

## 2.42 Calcul 42.

$$\begin{aligned} -\frac{3}{2}x + \frac{5}{4}x - 3x^2 + \frac{x}{6} &= -\frac{5}{2}x^2 + 5 + 4x^2 \\ &= -3x^2 - \frac{5}{2}x^2 + 4x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{5}{4}x + \frac{1}{6}x + 5 \\ &= \left(-3 - \frac{5}{2} + 4\right)x^2 + \left(-\frac{3}{2} + \frac{5}{4} + \frac{1}{6}\right)x + 5 \\ &= \left(1 - \frac{5}{2}\right)x^2 + \left(-\frac{3 \times 6}{2 \times 6} + \frac{5 \times 3}{4 \times 3} + \frac{1 \times 2}{6 \times 2}\right)x + 5 \\ &= \left(\frac{2}{2} - \frac{5}{2}\right)x^2 + \left(-\frac{18}{12} + \frac{15}{12} + \frac{2}{12}\right)x + 5 \\ &= \frac{2-5}{2}x^2 + \frac{-18+15+2}{12}x + 5 \\ &= -\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{12}x + 5 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire](#) : page 1



## 2.43 Calcul 43.

$$\begin{aligned}
 \frac{3}{2}x^2 + xy + y^2 - 2xy &+ \frac{x^2}{3} - \frac{3}{2}x^2 \\
 &= \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^2 - \frac{3}{2}x^2 + y^2 + xy - 2xy \\
 &= \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{3} - \frac{3}{2}\right)x^2 + y^2 + (1 - 2)xy \\
 &= \frac{1}{3}x^2 + y^2 + (-1)xy \\
 &= \frac{1}{3}x^2 + y^2 - xy
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.44 Calcul 44.

$$\begin{aligned}
 4a^2 - \frac{2}{3}a - \frac{3}{5}a^2 &+ \frac{1}{3}a - 5a - \frac{2}{15}a^2 \\
 &= 4a^2 - \frac{3}{5}a^2 - \frac{2}{15}a^2 - \frac{2}{3}a + \frac{1}{3}a - 5a \\
 &= \left(4 - \frac{3}{5} - \frac{2}{15}\right)a^2 + \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{3} - 5\right)a \\
 &= \left(\frac{4 \times 15}{15} - \frac{3 \times 3}{5 \times 3} - \frac{2}{15}\right)a^2 + \left(\frac{-2 + 1}{3} - \frac{5 \times 3}{3}\right)a \\
 &= \left(\frac{60}{15} - \frac{9}{15} - \frac{2}{15}\right)a^2 + \left(\frac{-1}{3} - \frac{15}{3}\right)a \\
 &= \frac{60 - 9 - 2}{15}a^2 + \frac{-1 - 15}{3}a \\
 &= \frac{49}{15}a^2 - \frac{16}{3}a
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.45 Calcul 45.

$$\begin{aligned}
 3x^2 + \frac{4}{5} - \frac{5}{3}x - 2x^2 &= \frac{3}{5}x^3 + 4 - 2x^2 + 7x \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 + 3x^2 - 2x^2 - 2x^2 - \frac{5}{3}x + 7x + \frac{4}{5} + 4 \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 + (3 - 2 - 2)x^2 + \left(-\frac{5}{3} + 7\right)x + \frac{4}{5} + \frac{4 \times 5}{5} \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 + (-1)x^2 + \left(-\frac{5}{3} + \frac{7 \times 3}{3}\right)x + \frac{4}{5} + \frac{20}{5} \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 - x^2 + \left(-\frac{5}{3} + \frac{21}{3}\right)x + \frac{4 + 20}{5} \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 - x^2 + \frac{-5 + 21}{3}x + \frac{24}{5} \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 - x^2 + \frac{16}{3}x + \frac{24}{5}
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

## 2.46 Calcul 46.

$$\begin{aligned}
 4x^2 &= \frac{7}{2} + \frac{3}{5}x - \frac{5}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 - 5 + \frac{3}{2}x^3 + 7 - 2x \\
 &= \frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^3 + 4x^2 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{3}{5}x - 2x - \frac{7}{2} - 5 + 7 \\
 &= \left(\frac{4}{3} + \frac{3}{2}\right)x^3 + \left(4 - \frac{5}{2}\right)x^2 + \left(\frac{3}{5} - 2\right)x - \frac{7}{2} + 2 \\
 &= \left(\frac{4 \times 2}{3 \times 2} + \frac{3 \times 3}{2 \times 3}\right)x^3 + \left(\frac{4 \times 2}{2} - \frac{5}{2}\right)x^2 + \left(\frac{3}{5} - \frac{2 \times 5}{5}\right)x - \frac{7}{2} + \frac{2 \times 2}{2} \\
 &= \left(\frac{8}{6} + \frac{9}{6}\right)x^3 + \left(\frac{8}{2} - \frac{5}{2}\right)x^2 + \left(\frac{3}{5} - \frac{10}{5}\right)x - \frac{7}{2} + \frac{4}{2} \\
 &= \left(\frac{8 + 9}{6}\right)x^3 + \left(\frac{8 - 5}{2}\right)x^2 + \left(\frac{3 - 10}{5}\right)x + \frac{-7 + 4}{2} \\
 &= \frac{17}{6}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{-7}{5}x + \frac{-3}{2} \\
 &= \frac{17}{6}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{7}{5}x - \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

## 2.47 Calcul 47.

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{5}a^2b + 3a^3 &- 4ab^2 + \frac{5}{2}a^2b + \frac{7}{2}b^3 - b^3 + 2ab^2 \\
 &= 3a^3 + \frac{2}{5}a^2b + \frac{5}{2}a^2b - 4ab^2 + 2ab^2 + \frac{7}{2}b^3 - b^3 \\
 &= 3a^3 + \left(\frac{2}{5} + \frac{5}{2}\right)a^2b + (-4 + 2)ab^2 + \left(\frac{7}{2} - 1\right)b^3 \\
 &= 3a^3 + \left(\frac{2 \times 2}{5 \times 2} + \frac{5 \times 5}{2 \times 5}\right)a^2b + (-2)ab^2 + \left(\frac{7}{2} - \frac{2}{2}\right)b^3 \\
 &= 3a^3 + \left(\frac{4}{10} + \frac{25}{10}\right)a^2b - 2ab^2 + \frac{7-2}{2}b^3 \\
 &= 3a^3 + \frac{29}{10}a^2b - 2ab^2 + \frac{5}{2}b^3
 \end{aligned}$$

Réduire : Retour au sommaire : page 1

## 2.48 Calcul 48.

$$\begin{aligned}
 (3x - 5) &+ [2x - 5 - (3x - 2y + 4) - (4x - 3y - 9)] \\
 &= 3x - 5 + [2x - 5 - 3x + 2y - 4 - 4x + 3y + 9] \\
 &= 3x - 5 + 2x - 5 - 3x + 2y - 4 - 4x + 3y + 9 \\
 &= 3x + 2x - 3x - 4x + 2y + 3y - 5 - 5 - 4 + 9 \\
 &= (3 + 2 - 3 - 4)x + (2 + 3)y + (-5 - 5 - 4 + 9) \\
 &= -2x + 5y - 5
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

## 2.49 Calcul 49.

$$\begin{aligned}
 (2x - 5y + 7) &- [(3x + 2y - 3) - (4x + 4y - 2)] - [2x - (3y + 4)] \\
 &= 2x - 5y + 7 - [3x + 2y - 3 - 4x - 4y + 2] - [2x - 3y - 4] \\
 &= 2x - 5y + 7 - 3x - 2y + 3 + 4x + 4y - 2 - 2x + 3y + 4 \\
 &= 2x - 3x + 4x - 2x - 5y - 2y + 4y + 3y + 7 + 3 - 2 + 4 \\
 &= (2 - 3 + 4 - 2)x + (-5 - 2 + 4 + 3)y + 12 \\
 &= 1x + 0y + 12 \\
 &= x + 12
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

## 2.50 Calcul 50.

$$\begin{aligned}
 [(x - 2y + 5) - (3x + 2y + 7)] - [(2x + 3) - (4y - 2)] \\
 &= [x - 2y + 5 - 3x - 2y - 7] - [2x + 3 - 4y + 2] \\
 &= x - 3x - 2y - 2y + 5 - 7 - 2x - 3 + 4y - 2 \\
 &= x - 3x - 2x - 2y - 2y + 4y + 5 - 7 - 3 - 2 \\
 &= (1 - 3 - 2)x + (-2 - 2 + 4)y - 7 \\
 &= -4x - 7
 \end{aligned}$$

Effectuer les produits suivants : [Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.51 Calcul 51.

$$\begin{aligned}
 (3a^2b^3) \left( \frac{2}{3}ab^5 \right) &= 3 \times \frac{2}{3} \times a^2a \times b^3b^5 \\
 &= 2a^3b^8
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.52 Calcul 52.

$$\begin{aligned}
 \left( \frac{4}{5}a^3b^2c \right) \left( -\frac{3}{4}abc^4 \right) &= \frac{4}{5} \times \frac{-3}{4} \times a^3ab^2bcc^4 \\
 &= \frac{-4 \times 3}{5 \times 4} a^{3+1} b^{2+1} c^{1+4} \\
 &= -\frac{3}{5} a^4 b^3 c^5
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.53 Calcul 53.

$$\begin{aligned}
 \left( \frac{4}{7}a^2xy^3 \right) \left( -\frac{5}{2}a^3y^4 \right) &= \frac{4}{7} \times \frac{-5}{2} a^2a^3xy^3y^4 \\
 &= -\frac{2 \times 2 \times 5}{7 \times 2} a^{2+3} xy^{3+4} \\
 &= -\frac{10}{7} a^5 xy^7
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

**2.54 Calcul 54.**

$$\begin{aligned}\left(-\frac{3}{4}x^2y\right)\left(+\frac{3}{5}a^3y^5\right) &= -\frac{3}{4} \times \frac{3}{5}a^3x^2yy^5 \\ &= -\frac{3 \times 3}{4 \times 5}a^3x^2y^{1+5} \\ &= -\frac{9}{20}a^3x^2y^6\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

**2.55 Calcul 55.**

$$\begin{aligned}\left(\frac{9}{4}a^4x^2y^3\right)\left(-\frac{4}{3}ax^2\right) &= -\frac{9}{4} \times \frac{4}{3}a^4ax^2x^2y^3 \\ &= -\frac{4 \times 9}{4 \times 3}a^{4+1}x^{2+2}y^3 \\ &= -3a^5x^4y^3\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

**2.56 Calcul 56.**

$$\begin{aligned}\left(\frac{14}{3}a^2b^3x\right)\left(-\frac{6}{7}a^2b^5\right) &= \frac{14}{3} \times \frac{-6}{7} \times a^2a^2b^3b^5x \\ &= \frac{-14 \times 6}{3 \times 7} \times a^{2+2}b^{3+5}x \\ &= -\frac{2 \times 7 \times 2 \times 3}{3 \times 7} \times a^4b^8x \\ &= -4a^4b^8x\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.57 Calcul 57.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{7}{2}ax^2y\right)\left(-\frac{8}{15}b^3xy^2\right)\left(\frac{5}{21}abx^3\right) &= \left(\frac{-7}{2} \times \frac{-8}{15} \times \frac{5}{21}\right) aab^3bxx^3yy^2 \\
 &= +\frac{7 \times 8 \times 5}{2 \times 15 \times 21} a^{1+1}b^{3+1}x^{1+3}y^{1+2} \\
 &= +\frac{7 \times 2^3 \times 5}{2 \times 3 \times 5 \times 3 \times 7} a^4b^4x^4y^3 \\
 &= +\frac{2^2}{3^2} a^4b^4x^4y^3 \\
 &= +\frac{4}{9} a^4b^4x^4y^3
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.58 Calcul 58.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{2}{3}xy^2\right)^2(-4x^2y) &= \left(-\frac{2}{3}xy^2\right)\left(-\frac{2}{3}xy^2\right)(-4x^2y) \\
 &= \left(\frac{-2}{3} \times \frac{-2}{3} \times \frac{-4}{1}\right) xx^2y^2y^2y \\
 &= \frac{-2 \times -2 \times -4}{3 \times 3} x^{1+1+2}y^{2+2+1} \\
 &= -\frac{16}{9}x^4y^5
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.59 Calcul 59.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{5}{12}a^4b^2x\right)\left(-\frac{2}{7}ax^2y^3\right)\left(-\frac{14}{5}b^2xy^4\right) &= \left(\frac{5}{12} \times \frac{-2}{7} \times \frac{-14}{5}\right) a^4ab^2b^2xx^2xy^3y^4 \\
 &= \frac{+5 \times 2 \times 2 \times 7}{2^2 \times 3 \times 7 \times 5} a^{4+1}b^{2+2}x^{1+2+1}y^{3+4} \\
 &= \frac{1}{3}a^5b^4x^4y^7
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.60 Calcul 60.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{3}{5}x^2y\right)^3 \left(-\frac{5}{4}xy\right) &= \frac{3^3}{5^3} (x^2)^3 y^3 \times \left(\frac{-5}{2^2}xy\right) \\
 &= \frac{3^3 \times -5}{5^3 \times 2^2} x^{2 \times 3} y^3 xy \\
 &= \frac{-3^3}{5^2 \times 2^2} x^{6+1} y^{3+1} \\
 &= -\frac{27}{100} x^7 y^4
 \end{aligned}$$

Effectuer les produits suivants. Retour au sommaire : page 1

## 2.61 Calcul 61.

$$\begin{aligned}
 (2x - 7)(-3x + 2) &= 2x \times (-3x) + 2x \times 2 + (-7) \times (-3x) + (-7) \times 2 \\
 &= -6x^2 + 4x + 21x - 14 \\
 &= -6x^2 + 25x - 14
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

## 2.62 Calcul 62.

$$\begin{aligned}
 &(4x^5 + 7 - 2x^3)(x^3 - 2x) \\
 &= 4x^5x^3 + 4x^5(-2x) + 7x^3 + 7(-2x) + (-2x^3)x^3 + (-2x^3)(-2x) \\
 &= 4x^8 - 8x^6 + 7x^3 - 14x - 2x^6 + 4x^4 \\
 &= 4x^8 - 8x^6 - 2x^6 + 4x^4 + 7x^3 - 14x \\
 &= 4x^8 - 10x^6 + 4x^4 + 7x^3 - 14x
 \end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

## 2.63 Calcul 63.

$$\begin{aligned}
 (5x^3 - 2x)(3x - 4x^2) &= 5x^33x + 5x^3(-4x^2) + (-2x)3x + (-2x)(-4x^2) \\
 &= 15x^4 - 20x^5 - 6x^2 + 8x^3 \\
 &= -20x^5 + 15x^4 + 8x^3 - 6x^2
 \end{aligned}$$

(Il est courant d'ordonner des grandes aux petites puissances.)

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.64 Calcul 64.

$$\begin{aligned} & (2x - 7x^2 + 5x^3)(3x - 5x^2 + 8) \\ = & 2x3x + 2x(-5x^2) + 2x8 + (-7x^2)3x + (-7x^2)(-5x^2) \\ & + (-7x^2)8 + 5x^33x + 5x^3(-5x^2) + 5x^38 \\ = & 6x^2 - 10x^3 + 16x - 21x^3 + 35x^4 - 56x^2 + 15x^3 - 25x^5 + 40x^3 \\ = & -25x^5 + 35x^4 - 10x^3 - 21x^3 + 15x^3 + 40x^3 + 6x^2 - 56x^2 + 16x \\ = & -25x^5 + 35x^4 + 24x^3 - 50x^2 + 16x \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.65 Calcul 65.

$$\begin{aligned} \left(-2x + \frac{3}{2}\right)(4x + 3) &= -2x4x + (-2x)3 + \frac{3}{2} \times 4x + \frac{3}{2}3 \\ &= -8x^2 - 6x + \frac{12}{2}x + \frac{3 \times 3}{2} \\ &= -8x^2 - 6x + 6x + \frac{9}{2} \\ &= -8x^2 + \frac{9}{2} \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)



## 2.66 Calcul 66.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{8}{3}x - \frac{3}{2}x^2 + 5\right)(4x^3 - 5x^2 + 7) &= \frac{8}{3}x \times 4x^3 - \frac{8}{3}x \times 5x^2 + \frac{8}{3}x \times 7 \\
 &\quad - \frac{3}{2}x^2 \times 4x^3 + \frac{3}{2}x^2 \times 5x^2 - \frac{3}{2}x^2 \times 7 \\
 &\quad + 5 \times 4x^3 - 5 \times 5x^2 + 5 \times 7 \\
 &= \frac{32}{3}x^4 - \frac{40}{3}x^3 + \frac{56}{3}x \\
 &\quad - 6x^5 + \frac{15}{2}x^4 - \frac{21}{2}x^2 \\
 &\quad + 20x^3 - 25x^2 + 35 \\
 &= -6x^5 + \left(\frac{32}{3} + \frac{15}{2}\right)x^4 + \left(-\frac{40}{3} + 20\right)x^3 \\
 &\quad + \left(-\frac{21}{2} - 25\right)x^2 + \frac{56}{3}x + 35 \\
 &= -6x^5 + \frac{109}{6}x^4 + \frac{20}{3}x^3 - \frac{71}{2}x^2 + \frac{56}{3}x + 35
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.67 Calcul 67.

$$\begin{aligned}
 (7x^4 - 2x^3 + 4x^2)(3x^2 - 5) &= 7x^4 \times 3x^2 - 7x^4 \times 5 \\
 &\quad - 2x^3 \times 3x^2 + 2x^3 \times 5 \\
 &\quad + 4x^2 \times 3x^2 - 4x^2 \times 5 \\
 &= 21x^6 - 35x^4 - 6x^5 + 10x^3 + 12x^4 - 20x^2 \\
 &= 21x^6 - 6x^5 - 23x^4 + 10x^3 - 20x^2
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.68 Calcul 68.

$$\begin{aligned}
 (2x^2 - 4x^3)(x^3 - 2x) &= 2x^2 \times x^3 - 2x^2 \times 2x - 4x^3 \times x^3 + 4x^3 \times 2x \\
 &= 2x^5 - 4x^3 - 4x^6 + 8x^4 \\
 &= -4x^6 + 2x^5 + 8x^4 - 4x^3
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.69 Calcul 69.

$$\begin{aligned}
 (2x^2 - 4 + 2x)(x^2 + 5 - 2x) &= 2x^2x^2 + 2x^2 \times 5 - 2x^2 \times 2x \\
 &\quad - 4x^2 - 4 \times 5 + 4 \times 2x \\
 &\quad + 2xx^2 + 2x \times 5 - 2x \times 2x \\
 &= 2x^4 + 10x^2 - 4x^3 - 4x^2 - 20 \\
 &\quad + 8x + 2x^3 + 10x - 4x^2 \\
 &= 2x^4 - 4x^3 + 2x^3 + 10x^2 \\
 &\quad - 4x^2 - 4x^2 + 8x + 10x - 20 \\
 &= 2x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 18x - 20
 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.70 Calcul 70.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{5}{4}x^3 - 2x + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{7}{2}x^3 - \frac{2}{3}x + x^2\right) &= \frac{5}{4}x^3 \times \frac{7}{2}x^3 - \frac{5}{4}x^3 \times \frac{2}{3}x + \frac{5}{4}x^3x^2 \\
 &\quad - 2x \frac{7}{2}x^3 + 2x \times \frac{2}{3}x - 2xx^2 \\
 &\quad + \frac{1}{2} \times \frac{7}{2}x^3 - \frac{1}{2} \times \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}x^2 \\
 &= \frac{35}{8}x^6 - \frac{5}{6}x^4 + \frac{5}{4}x^5 \\
 &\quad - 7x^4 + \frac{4}{3}x^2 - 2x^3 \\
 &\quad + \frac{7}{4}x^3 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}x^2 \\
 &= \frac{35}{8}x^6 + \frac{5}{4}x^5 - \left(\frac{5}{6} + 7\right)x^4 \\
 &\quad + \left(\frac{7}{4} - 2\right)x^3 + \left(\frac{4}{3} + \frac{1}{2}\right)x^2 - \frac{1}{3}x \\
 &= \frac{35}{8}x^6 + \frac{5}{4}x^5 - \frac{47}{6}x^4 - \frac{1}{4}x^3 + \frac{11}{6}x^2 - \frac{1}{3}x
 \end{aligned}$$

Calculer les produits suivants :

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.71 Calcul 71.

$$\begin{aligned}(2x + 3)(3x + 2)(x - 4) &= (2x \times 3x + 2x \times 2 + 3 \times 3x + 3 \times 2)(x - 4) \\&= (6x^2 + 4x + 9x + 6)(x - 4) \\&= (6x^2 + 13x + 6)(x - 4) \\&= 6x^2x - 6x^2 \times 4 + 13xx - 13x \times 4 + 6x - 6 \times 4 \\&= 6x^3 - 24x^2 + 13x^2 - 52x + 6x - 24 \\&= 6x^3 - 11x^2 - 46x - 24\end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

## 2.72 Calcul 72.

$$\begin{aligned}(5x - 1)(2x + 3)(7 + 4x) &= (5x \times 2x + 5x \times 3 - 1 \times 2x - 1 \times 3)(7 + 4x) \\&= (10x^2 + 15x - 2x - 3)(7 + 4x) \\&= (10x^2 + 13x - 3)(7 + 4x) \\&= (10x^2 \times 7 + 10x^2 \times 4x + 13x \times 7 + 13x \times 4x \\&\quad - 3 \times 7 - 3 \times 4x) \\&= (70x^2 + 40x^3 + 91x + 52x^2 - 21 - 12x) \\&= (40x^3 + 122x^2 + 79x - 21)\end{aligned}$$

Retour au sommaire : page 1

## 2.73 Calcul 73.

$$\begin{aligned}(3x^2 - 1)(x + 1)(x - 1) &= (3x^2 - 1)(x^2 - 1^2) \\&= (3x^2 - 1)(x^2 - 1) \\&= (3x^2 \times x^2 - 3x^2 \times 1 - 1 \times x^2 + 1 \times 1) \\&= (3x^4 - 3x^2 - x^2 + 1) \\&= (3x^4 - 4x^2 + 1)\end{aligned}$$

Développer et réduire :

Retour au sommaire : page 1

**2.74 Calcul 74.**

$$\begin{aligned} & 5(3a^2 - 4b^3) - [9(2a^2 - b^3) - 2(a^2 - 5b^3)] \\ &= 5 \times 3a^2 - 5 \times 4b^3 - [9 \times 2a^2 - 9b^3 - 2a^2 + -2 \times (-5b^3)] \\ &= 15a^2 - 20b^3 - [18a^2 - 9b^3 - 2a^2 + 10b^3] \\ &= 15a^2 - 20b^3 - [16a^2 + b^3] \\ &= 15a^2 - 20b^3 - 16a^2 - b^3 \\ &= -a^2 - 21b^3 \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

**2.75 Calcul 75.**

$$\begin{aligned} & 3a^2(2b - 1) - [2a^2(5b - 3) - 2b(3a^2 + 1)] \\ &= 3a^2 \times 2b + 3a^2 \times (-1) - [2a^2 \times 5b - 2a^2 \times 3 - 2b \times 3a^2 - 2b \times 1] \\ &= 6a^2b - 3a^2 - [10a^2b - 6a^2 - 6a^2b - 2b] \\ &= 6a^2b - 3a^2 - 10a^2b + 6a^2 + 6a^2b + 2b \\ &= 6a^2b - 10a^2b + 6a^2b - 3a^2 + 6a^2 + 2b \\ &= 2a^2b + 3a^2 + 2b \end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.76 Calcul 76.

$$\begin{aligned}(2a + 5b)(3a - 2b) - (2a - 1)(3a + 2b) - (a - 2b)(5b - 1) \\&= 2a \times 3a - 2a \times 2b + 5b \times 3a - 5b \times 2b \\&\quad - (2a \times 3a + 2a \times 2b - 3a - 2b) \\&\quad - (a \times 5b - a \times 1 - 2b \times 5b + 2b) \\&= 6a^2 - 4ab + 15ab - 10b^2 - (6a^2 + 4ab - 3a - 2b) \\&\quad - (5ab - a - 10b^2 + 2b) \\&= 6a^2 + 11ab - 10b^2 - 6a^2 - 4ab + 3a + 2b \\&\quad - 5ab + a + 10b^2 - 2b \\&= 6a^2 - 6a^2 + 11ab - 4ab - 5ab - 10b^2 + 10b^2 \\&\quad + 3a + a + 2b - 2b \\&= 2ab + 4a\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.77 Calcul 77.

$$\begin{aligned}(2x - 3y)(5x - 2y) - (3x - 2y)(2x + 1) - (5x - y)(3y + 1) \\&= 2x \times 5x - 2x \times 2y - 3y \times 5x + 3y \times 2y \\&\quad - (3x \times 2x + 3x \times 1 - 2y \times 2x - 2y \times 1) \\&\quad - (5x \times 3y + 5x \times 1 - y \times 3y - y \times 1) \\&= 10x^2 - 4xy - 15xy + 6y^2 \\&\quad - (6x^2 + 3x - 4xy - 2y) \\&\quad - (15xy + 5x - 3y^2 - y) \\&= 10x^2 - 19xy + 6y^2 - 6x^2 - 3x + 4xy + 2y \\&\quad - 15xy - 5x + 3y^2 + y \\&= 10x^2 - 6x^2 - 19xy + 4xy - 15xy + 6y^2 + 3y^2 \\&\quad - 3x - 5x + 2y + y \\&= 4x^2 - 30xy + 9y^2 - 8x + 3y\end{aligned}$$

[Retour au sommaire : page 1](#)

## 2.78 Calcul 78.

$$\begin{aligned}
 (ax^2 - b)(ax^2 - 2b) + 3b(ax^2 - b) + b(b - 1) \\
 &= ax^2ax^2 - ax^2 \times 2b - bax^2 + b \times 2b \\
 &+ 3ba x^2 - 3bb + bb - b \times 1 \\
 &= a^2x^4 - 2abx^2 - abx^2 + 2b^2 + 3abx^2 - 3b^2 + b^2 - b \\
 &= a^2x^4 - 2abx^2 - abx^2 + 3abx^2 + 2b^2 - 3b^2 + b^2 - b \\
 &= a^2x^4 - 0abx^2 + 0b^2 - b \\
 &= a^2x^4 - b
 \end{aligned}$$

Résoudre les équations suivantes :

Retour au sommaire : page 1

## 2.79 Calcul 79.

$$5(2x - 3) - 4(5x - 7) = 19 - 2(x + 11).$$

*Solution. Résolution :* On réduit :

$$\begin{aligned}
 5 \times 2x - 5 \times 3 - 4 \times 5x - 4 \times (-7) &= 19 - 2x - 2 \times 11 \\
 10x - 15 - 20x + 28 &= 19 - 2x - 22 \\
 (10 - 20)x + 28 - 15 &= -2x + 19 - 22 \\
 -10x + 13 &= -2x - 3
 \end{aligned}$$

Puis on applique les opérations habituelles deux deux côtés de l'égalité pour isoler  $x$  :

$$\begin{aligned}
 -10x + 13 + 2x &= -2x - 3 + 2x \\
 -8x + 13 &= -3 \\
 -8x + 13 - 13 &= -3 - 13 \\
 -8x &= -16 \\
 x &= \frac{-16}{-8}
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = +2$  après simplification de la fraction.

**Vérification :** On vérifie que cette valeur est bien solution en calculant

les deux termes de l'égalité initiale pour  $x = +2$ . Le terme de gauche devient

$$\begin{aligned}
 5(2x - 3) - 4(5x - 7) &= 5(2 \times 2 - 3) - 4(5 \times 2 - 7) \\
 &= 5(4 - 3) - 4(10 - 7) \\
 &= 5 \times 1 - 4 \times 3 \\
 &= 5 - 12 \\
 &= -7.
 \end{aligned}$$

Le terme de droite devient

$$\begin{aligned}
 19 - 2(x + 11) &= 19 - 2(2 + 11) \\
 &= 19 - 2 \times 13 \\
 &= 19 - 26 \\
 &= -7.
 \end{aligned}$$

Ceci confirme que  $x = 2$  est solution de l'équation de départ.

Retour au sommaire : page 1

## 2.80 Calcul 80.

$$4(x + 3) - 7x + 17 = 8(5x - 1) + 166.$$

*Solution. Résolution :* On réduit :

$$\begin{aligned}
 4x + 4 \times 3 - 7x + 17 &= 8 \times 5x - 8 \times 1 + 166 \\
 4x + 12 - 7x + 17 &= 40x - 8 + 166 \\
 (4 - 7)x + 12 + 17 &= 40x + 158 \\
 -3x + 29 &= 40x + 158
 \end{aligned}$$

Puis on applique les opérations habituelles deux deux côtés de l'égalité pour isoler  $x$  :

$$\begin{aligned}
 -3x + 29 - 40x &= 40x + 158 - 40x \\
 -43x + 29 &= 158 \\
 -43x + 29 - 29 &= 158 - 29 \\
 -43x &= 129 \\
 x &= \frac{129}{-43}
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = -3$  après simplification de la fraction (car  $129 = 43 \times 3$ ).

**Vérification :** On vérifie que cette valeur est bien solution en calculant les deux termes de l'égalité initiale pour  $x = -3$ . Le terme de gauche devient

$$\begin{aligned}4(x + 3) - 7x + 17 &= 4(-3 + 3) - 7 \times (-3) + 17 \\&= 4 \times 0 + 21 + 17 \\&= 0 + 38 \\&= 38.\end{aligned}$$

Le terme de droite devient

$$\begin{aligned}8(5x - 1) + 166 &= 8(5 \times (-3) - 1) + 166 \\&= 8(-15 - 1) + 166 \\&= 8 \times (-16) + 166 \\&= -128 + 166 \\&= 38.\end{aligned}$$

Ceci confirme que  $x = -3$  est solution de l'équation de départ.

Retour au sommaire : page 1

## 2.81 Calcul 81.

$$17 - 14(x + 1) = 13 - 4(x + 1) - 5(x - 3).$$

*Solution. Résolution :* On réduit :

$$\begin{aligned}17 - 14x - 14 \times 1 &= 13 - 4x - 4 \times 1 - 5x + 5 \times (-3) \\17 - 14x - 14 &= 13 - 4x - 4 - 5x + 15 \\-14x + 3 &= -9x + 24\end{aligned}$$

Puis on applique les opérations habituelles deux deux côtés de l'égalité pour isoler  $x$  :

$$\begin{aligned}-14x + 3 + 9x &= -9x + 24 + 9x \\-5x + 3 &= 24 \\-5x + 3 - 3 &= 24 - 3 \\-5x &= 21 \\x &= -\frac{21}{5}\end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = -\frac{21}{5}$  (ou  $x = -4,2$ ).



**Vérification :** On vérifie que cette valeur est bien solution en calculant les deux termes de l'égalité initiale pour  $x = -\frac{21}{5}$ . Le terme de gauche devient

$$\begin{aligned} 17 - 14(x + 1) &= 17 - 14\left(-\frac{21}{5} + 1\right) \\ &= 17 - 14 \times \frac{-16}{5} \\ &= \frac{85}{5} + \frac{224}{5} \\ &= \frac{309}{5}. \end{aligned}$$

Le terme de droite devient

$$\begin{aligned} 13 - 4(x + 1) - 5(x - 3) &= 13 - 4\left(-\frac{21}{5} + 1\right) - 5\left(-\frac{21}{5} - 3\right) \\ &= 13 - 4 \times \frac{-16}{5} - 5 \times \frac{-36}{5} \\ &= \frac{65}{5} + \frac{64}{5} + \frac{180}{5} \\ &= \frac{309}{5}. \end{aligned}$$

Ceci confirme que  $x = -\frac{21}{5}$  est solution de l'équation de départ.

Retour au sommaire : page 1

## 2.82 Calcul 82.

$$5x + 3,5 + (3x - 4) = 7x - 3(x - 0,5).$$

*Solution. Résolution :* On commence par développer :

$$\begin{aligned} 5x + 3,5 + 3x - 4 &= 7x - 3x + 3 \times 0,5 \\ 8x - 0,5 &= 4x + 1,5 \end{aligned}$$

On isole alors  $x$  avec les opérations habituelles :

$$\begin{aligned} 8x - 0,5 + 0,5 &= 4x + 1,5 + 0,5 \\ 8x &= 4x + 2 \\ 8x - 4x &= 4x + 2 - 4x \\ 4x &= 2 \\ x &= \frac{2}{4} \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ .

**Vérification :** On vérifie que cette valeur est bien solution en calculant les deux termes de l'égalité initiale pour  $x = \frac{1}{2}$ . Le premier membre devient

$$\begin{aligned} 5x + 3,5 + (3x - 4) &= 5 \times 0,5 + 3,5 + (3 \times 0,5 - 4) \\ &= 2,5 + 3,5 + (1,5 - 4) \\ &= 6 - 2,5 \\ &= 3,5 \end{aligned}$$

et le second membre devient

$$\begin{aligned} 7x - 3(x - 0,5) &= 7 \times \frac{1}{2} - 3 \times \left(\frac{1}{2} - 0,5\right) \\ &= 7 \times 0,5 - 3 \times 0 \\ &= 3,5 - 0 \\ &= 3,5. \end{aligned}$$

Ce qui donne le même résultat, donc  $\frac{1}{2}$  est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

## 2.83 Calcul 83.

$$7(4x + 3) - 4(x - 1) = 15(x + 0,75) + 7.$$

*Solution. Résolution :* On développe :

$$\begin{aligned} 7 \times 4x + 7 \times 3 - 4x - 4 \times (-1) &= 15x + 15 \times 0,75 + 7 \\ 28x + 21 - 4x + 4 &= 15x + 11,25 + 7 \\ 24x + 25 &= 15x + 18,25 \end{aligned}$$

puis on isole  $x$  :

$$\begin{aligned} 24x + 25 - 15x &= 15x + 18,25 - 15x \\ 9x + 25 &= 18,25 \\ 9x + 25 - 25 &= 18,25 - 25 \\ 9x &= -6,75 \\ x &= -6,75 \div 9 \\ x &= -0,75 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $-0,75$ .

**Vérification :** Vérifions que  $x = -0,75$  est solution en calculant les deux termes. Le premier terme donne

$$\begin{aligned} 7(4 \times (-0,75) + 3) - 4(-0,75 - 1) &= 7(-3 + 3) - 4 \times (-1,75) \\ &= 7 \times 0 + 7 \\ &= 7, \end{aligned}$$

et le second terme donne

$$\begin{aligned} 15(-0,75 + 0,75) + 7 &= 15 \times 0 + 7 \\ &= 7, \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc  $x = -0,75$  est bien solution de l'équation.

Retour au sommaire : page 1

## 2.84 Calcul 84.

$$17x + 15(x - 1) = -1 - 14(3x + 1).$$

*Solution.* On développe

$$\begin{aligned} 17x + 15x - 15 &= -1 - 14 \times 3x - 14 \\ 32x - 15 &= -1 - 42x - 14 \\ 32x - 15 &= -42x - 15 \end{aligned}$$

et on isole  $x$

$$\begin{aligned} 32x - 15 + 15 &= -42x - 15 + 15 \\ 32x &= -42x \\ 32x + 42x &= -42x + 42x \\ 74x &= 0 \\ x &= \frac{0}{74} \\ x &= 0, \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = 0$ .

**Vérification :** Pour  $x = 0$ , le premier terme vaut

$$\begin{aligned} 17x + 15(x - 1) &= 17 \times 0 + 15(0 - 1) \\ &= 0 + 15 \times (-1) \\ &= -15, \end{aligned}$$

et le second terme

$$\begin{aligned} -1 - 14(3x + 1) &= -1 - 14(3 \times 0 + 1) \\ &= -1 - 14(0 + 1) \\ &= -1 - 14 \times 1 \\ &= -1 - 14 \\ &= -15, \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc  $x = 0$  est bien solution de l'équation.

Résoudre les équations suivantes (après développement, les termes en  $x^2$  ou  $x^3$  se simplifient) :

Retour au sommaire : page 1

## 2.85 Calcul 85.

$$(x-1)^2 + (x+3)^2 = 2(x-2)(x+1) + 38.$$

*Solution. Résolution :* On commence par développer :

$$\begin{aligned} x^2 - 2 \times x \times 1 + 1^2 + x^2 + 2 \times 3x + 3^2 &= 2(xx + x \times 1 - 2x - 2 \times 1) + 38 \\ x^2 - 2x + 1 + x^2 + 6x + 9 &= 2(x^2 + x - 2x - 2) + 38 \\ x^2 + x^2 - 2x + 6x + 1 + 9 &= 2(x^2 - x - 2) + 38 \\ 2x^2 + 4x + 10 &= 2x^2 - 2x - 4 + 38 \\ 2x^2 + 4x + 10 &= 2x^2 - 2x + 34 \end{aligned}$$

On isole alors  $x$  :

$$\begin{aligned} 2x^2 + 4x + 10 - 2x^2 &= 2x^2 - 2x + 34 - 2x^2 \\ 4x + 10 &= -2x + 34 \\ 4x + 10 + 2x &= -2x + 34 + 2x \\ 6x + 10 &= 34 \\ 6x + 10 - 10 &= 34 - 10 \\ 6x &= 24 \\ x &= \frac{24}{6} \\ x &= 4, \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = 4$ .

**Vérification :** Calculons alors les deux membres de l'équation pour  $x = 4$ .  
Le premier membre donne

$$\begin{aligned} (x-1)^2 + (x+3)^2 &= (4-1)^2 + (4+3)^2 \\ &= 3^2 + 7^2 \\ &= 9 + 49 \\ &= 58, \end{aligned}$$

et le second membre donne

$$\begin{aligned} 2(x-2)(x+1) + 38 &= 2(4-2)(4+1) + 38 \\ &= 2 \times 2 \times 5 + 38 \\ &= 2 \times 10 + 38 \\ &= 20 + 38 \\ &= 58, \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc  $x = 4$  est bien solution de l'équation.

Retour au sommaire : page 1

## 2.86 Calcul 86.

$$5(x^2 - 2x - 1) + 2(3x - 2) = 5(x + 1)^2.$$

*Solution. Résolution :* On développe

$$\begin{aligned} 5x^2 - 5 \times 2x - 5 \times 1 + 2 \times 3x - 2 \times 2 &= 5(x^2 + 2 \times 1 \times x + 1^2) \\ 5x^2 - 10x - 5 + 6x - 4 &= 5(x^2 + 2x + 1) \\ 5x^2 - 4x - 9 &= 5x^2 + 5 \times 2x + 5 \times 1 \\ 5x^2 - 4x - 9 &= 5x^2 + 10x + 5 \end{aligned}$$

puis on isole  $x$

$$\begin{aligned} 5x^2 - 4x - 9 - 5x^2 &= 5x^2 + 10x + 5 - 5x^2 \\ -4x - 9 &= 10x + 5 \\ -4x - 9 - 10x &= 10x + 5 - 10x \\ -14x - 9 &= 5 \\ -14x - 9 + 9 &= 5 + 9 \\ -14x &= 14 \\ x &= \frac{14}{-14} \\ x &= -1, \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = -1$ .

**Vérification :** On calcule alors les deux membres pour  $x = -1$ . Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} 5(x^2 - 2x - 1) + 2(3x - 2) &= 5((-1)^2 - 2(-1) - 1) + 2(3 \times (-1) - 2) \\ &= 5(1 + 2 - 1) + 2(-3 - 2) \\ &= 5 \times 2 + 2 \times -5 \\ &= 10 - 10 \\ &= 0 \end{aligned}$$

et le second membre

$$\begin{aligned} 5(x + 1)^2 &= 5(-1 + 1)^2 \\ &= 5 \times (0)^2 \\ &= 5 \times 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc  $x = -1$  est bien solution de l'équation.

Retour au sommaire : page 1

## 2.87 Calcul 87.

$$(9x + 1)(x - 2) = (3x + 4)(3x - 5).$$

*Solution. Résolution :* On développe

$$\begin{aligned} 9x \times x + 9x \times (-2) + 1 \times x + 1 \times (-2) &= 3x \times 3x + 3x \times (-5) + 4 \times 3x + 4 \times (-5) \\ 9x^2 - 18x + x - 2 &= 9x^2 - 15x + 12x - 20 \\ 9x^2 - 17x - 2 &= 9x^2 - 3x - 20, \end{aligned}$$

puis on isole  $x$

$$\begin{aligned} 9x^2 - 17x - 2 - 9x^2 &= 9x^2 - 3x - 20 - 9x^2 \\ -17x - 2 &= -3x - 20 \\ -17x - 2 + 3x &= -3x - 20 + 3x \\ -14x - 2 &= -20 \\ -14x - 2 + 2 &= -20 + 2 \\ -14x &= -18 \\ x &= \frac{-18}{-14} \\ x &= \frac{9}{7} \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = \frac{9}{7}$ .

**Vérification :** On calcule alors les deux membres pour  $x = \frac{9}{7}$  : le premier membre donne

$$\begin{aligned} (9x + 1)(x - 2) &= \left(9 \times \frac{9}{7} + 1\right) \left(\frac{9}{7} - 2\right) \\ &= \left(\frac{81}{7} + \frac{7}{7}\right) \left(\frac{9}{7} - \frac{14}{7}\right) \\ &= \frac{88}{7} \times \frac{-5}{7} \\ &= \frac{-88 \times 5}{7 \times 7} \\ &= -\frac{440}{49}, \end{aligned}$$

et le second membre

$$\begin{aligned}
 (3x + 4)(3x - 5) &= \left(3 \times \frac{9}{7} + 4\right) \left(3 \times \frac{9}{7} - 5\right) \\
 &= \left(\frac{27}{7} + \frac{28}{7}\right) \left(\frac{27}{7} - \frac{35}{7}\right) \\
 &= \frac{55}{7} \times \frac{-8}{7} \\
 &= -\frac{55 \times 8}{7 \times 7} \\
 &= -\frac{440}{49},
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc  $x = \frac{9}{7}$  est bien solution de l'équation.

Résoudre les équations suivantes (on se ramènera au cas entier en multipliant par un nombre opportun).

Retour au sommaire : page 1

## 2.88 Calcul 88.

$$\frac{x+5}{4} - \frac{x-3}{6} = \frac{x}{3}.$$

*Solution. Résolution :* On commence par éliminer les dénominateurs 4, 6 et 3 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 12 :

$$\begin{aligned}
 12 \left( \frac{x+5}{4} - \frac{x-3}{6} \right) &= 12 \times \frac{x}{3} \\
 \frac{12(x+5)}{4} - \frac{12(x-3)}{6} &= \frac{12x}{3} \\
 \frac{12}{4}(x+5) - \frac{12}{6}(x-3) &= \frac{12}{3}x \\
 3(x+5) - 2(x-3) &= 4x
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 3x + 3 \times 5 - 2x - 2 \times (-3) &= 4x \\
 3x + 15 - 2x + 6 &= 4x \\
 x + 21 &= 4x
 \end{aligned}$$

et on isole  $x$

$$\begin{aligned}
 x + 21 - 4x &= 4x - 4x \\
 -3x + 21 &= 0 \\
 -3x + 21 - 21 &= 0 - 21 \\
 -3x &= -21 \\
 x &= \frac{-21}{-3} \\
 x &= +7
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = +7$ .

**Vérification :** On calcule alors les deux membres pour  $x = 7$ . Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{x+5}{4} - \frac{x-3}{6} &= \frac{7+5}{4} - \frac{7-3}{6} \\
 &= \frac{12}{4} - \frac{4}{6} \\
 &= 3 - \frac{2}{3} \\
 &= \frac{9}{3} - \frac{2}{3} \\
 &= \frac{7}{3}
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\frac{x}{3} = \frac{7}{3},$$

ce qui est identique, donc  $x = 7$  est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

## 2.89 Calcul 89.

$$\frac{3x-7}{2} + \frac{x+1}{3} = -16.$$

*Solution. Résolution :* On commence par éliminer les dénominateurs 2 et 3 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 6 :

$$\begin{aligned}
 6\left(\frac{3x-7}{2} + \frac{x+1}{3}\right) &= 6 \times (-16) \\
 \frac{6(3x-7)}{2} + \frac{6(x+1)}{3} &= -96 \\
 \frac{6}{2}(3x-7) + \frac{6}{3}(x+1) &= -96 \\
 3(3x-7) + 2(x+1) &= -96,
 \end{aligned}$$



puis on développe

$$\begin{aligned} 3 \times 3x - 3 \times 7 + 2 \times x + 2 \times 1 &= -96 \\ 9x - 21 + 2x + 2 &= -96 \\ 11x - 19 &= -96 \end{aligned}$$

et on isole  $x$

$$\begin{aligned} 11x - 19 + 19 &= -96 + 19 \\ 11x &= -77 \\ x &= -\frac{77}{11} \\ x &= -7 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = -7$ .

**Vérification** : On calcule alors les deux membres pour  $x = -7$ . Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{3x-7}{2} + \frac{x+1}{3} &= 3 \times (-7) - 72 + \frac{-7+1}{3} \\ &= -21 - 72 + \frac{-6}{3} \\ &= \frac{-28}{2} - 2 \\ &= -14 - 2 \\ &= -16 \end{aligned}$$

et le second membre vaut toujours  $-16$  ce qui est identique, donc  $x = -7$  est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

## 2.90 Calcul 90.

$$x - \frac{x+1}{3} = \frac{2x+1}{5}.$$

*Solution. Résolution* : On commence par éliminer les dénominateurs 3 et 5 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 15 :

$$\begin{aligned} 15 \left( x - \frac{x+1}{3} \right) &= 15 \times \frac{2x+1}{5} \\ 15x - \frac{15(x+1)}{3} &= \frac{15(2x+1)}{5} \\ 15x - \frac{15}{3}(x+1) &= \frac{15}{5}(2x+1) \\ 15x - 5(x+1) &= 3(2x+1) \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned} 15x - 5x - 5 \times 1 &= 3 \times 2x + 3 \times 1 \\ 10x - 5 &= 6x + 3 \end{aligned}$$

et on isole  $x$

$$\begin{aligned} 10x - 5 - 6x &= 6x + 3 - 6x \\ 4x - 5 &= 3 \\ 4x - 5 + 5 &= 3 + 5 \\ 4x &= 8 \\ x &= \frac{8}{4} \\ x &= 2 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = 2$ .

**Vérification** : On calcule alors les deux membres pour  $x = 2$ . Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} x - \frac{x+1}{3} &= 2 - \frac{2+1}{3} \\ &= 2 - \frac{3}{3} \\ &= 2 - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{2x+1}{5} &= \frac{2 \times 2 + 1}{5} \\ &= \frac{4+1}{5} \\ &= \frac{5}{5} \\ &= 1 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc  $x = 2$  est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

## 2.91 Calcul 91.

$$\frac{7-3x}{12} + \frac{3}{4} = 2(x-2) + \frac{5(5-2x)}{6}.$$

*Solution. Résolution :* On commence par éliminer les dénominateurs 12, 4 et 6 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 12 :

$$\begin{aligned}
 12 \left( \frac{7-3x}{12} + \frac{3}{4} \right) &= 12 \left( 2(x-2) + \frac{5(5-2x)}{6} \right) \\
 \frac{12(7-3x)}{12} + \frac{12 \times 3}{4} &= 12 \times 2(x-2) + \frac{12 \times 5(5-2x)}{6} \\
 7-3x+9 &= 24(x-2) + \frac{60}{6}(5-2x) \\
 -3x+16 &= 24(x-2) + 10(5-2x)
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 -3x+16 &= 24x-24 \times 2 + 10 \times 5 - 10 \times 2x \\
 -3x+16 &= 24x-48+50-20x \\
 -3x+16 &= 4x+2
 \end{aligned}$$

et on isole  $x$

$$\begin{aligned}
 -3x+16-4x &= 4x+2-4x \\
 -7x+16 &= 2 \\
 -7x+16-16 &= 2-16 \\
 -7x &= -14 \\
 x &= \frac{-14}{-7} \\
 x &= 2
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = 2$ .

**Vérification :** On calcule alors les deux membres pour  $x = 2$ . Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{7-3x}{12} + \frac{3}{4} &= \frac{7-3 \times 2}{12} + \frac{3 \times 3}{4 \times 3} \\
 &= \frac{7-6}{12} + \frac{9}{12} \\
 &= \frac{1}{12} + \frac{9}{12} \\
 &= \frac{10}{12} \\
 &= \frac{5}{6}
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}
 2(x-2) + \frac{5(5-2x)}{6} &= 2(2-2) + \frac{5(5-2 \times 2)}{6} \\
 &= 2 \times 0 + \frac{5(5-4)}{6} \\
 &= 0 + \frac{5 \times 1}{6} \\
 &= \frac{5}{6}
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc  $x = 2$  est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

## 2.92 Calcul 92.

$$\frac{x}{5} - \frac{3x-1}{6} + \frac{3-x}{4} = 0.$$

*Solution. Résolution :* On commence par éliminer les dénominateurs 5, 6 et 4 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 60 :

$$\begin{aligned}
 60 \left( \frac{x}{5} - \frac{3x-1}{6} + \frac{3-x}{4} \right) &= 60 \times 0 \\
 \frac{60x}{5} - \frac{60(3x-1)}{6} + \frac{60(3-x)}{4} &= 0 \\
 \frac{60}{5}x - \frac{60}{6}(3x-1) + \frac{60}{4}(3-x) &= 0 \\
 12x - 10(3x-1) + 15(3-x) &= 0
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 12x - 10 \times 3x - 10 \times (-1) + 15 \times 3 - 15x &= 0 \\
 12x - 30x + 10 + 45 - 15x &= 0 \\
 (12 - 30 - 15)x + 55 &= 0 \\
 -33x + 55 &= 0
 \end{aligned}$$

et on isole  $x$

$$\begin{aligned}
 -33x + 55 - 55 &= 0 - 55 \\
 -33x &= -55 \\
 x &= \frac{-55}{-33} \\
 x &= \frac{5}{3}
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = \frac{5}{3}$ .

**Vérification :** On calcule alors les deux membres pour  $x = \frac{5}{3}$ . Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{x}{5} - \frac{3x-1}{6} + \frac{3-x}{4} &= \frac{\frac{5}{3}}{5} - \frac{3 \times \frac{5}{3} - 1}{6} + \frac{3 - \frac{5}{3}}{4} \\
 &= \frac{1}{3} - \frac{5-1}{6} + \frac{\frac{9}{3} - \frac{5}{3}}{4} \\
 &= \frac{1}{3} - \frac{4}{6} + \frac{\frac{4}{3}}{4} \\
 &= \frac{1}{3} - \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \\
 &= \frac{1-2+1}{3} \\
 &= \frac{0}{3} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut toujours 0 ce qui est identique, donc  $x = \frac{5}{3}$  est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

## 2.93 Calcul 93.

$$\frac{3(x+3)}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5x+9}{3} - \frac{7x-9}{4}.$$

*Solution. Résolution :* On commence par éliminer les dénominateurs 4, 2 et 3 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 12 :

$$\begin{aligned}
 12 \left( \frac{3(x+3)}{4} + \frac{1}{2} \right) &= 12 \left( \frac{5x+9}{3} - \frac{7x-9}{4} \right) \\
 \frac{12 \times 3(x+3)}{4} + \frac{12}{2} &= \frac{12(5x+9)}{3} - \frac{12(7x-9)}{4} \\
 \frac{36}{4}(x+3) + 6 &= \frac{12}{3}(5x+9) - \frac{12}{4}(7x-9) \\
 9(x+3) + 6 &= 4(5x+9) - 3(7x-9)
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 9x + 9 \times 3 + 6 &= 4 \times 5x + 4 \times 9 - 3 \times 7x - 3 \times (-9) \\
 9x + 27 + 6 &= 20x + 36 - 21x + 27 \\
 9x + 33 &= -x + 63
 \end{aligned}$$

et on isole  $x$

$$\begin{aligned}
 9x + 33 + x &= -x + 63 + x \\
 10x + 33 &= 63 \\
 10x + 33 - 33 &= 63 - 33 \\
 10x &= 30 \\
 x &= \frac{30}{10} \\
 x &= 3
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = 3$ .

**Vérification :** On calcule alors les deux membres pour  $x = 3$ . Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{3(x+3)}{4} + \frac{1}{2} &= \frac{3(3+3)}{4} + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{3 \times 6}{4} + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{18}{4} + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{9}{2} + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{10}{2} \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{5x+9}{3} - \frac{7x-9}{4} &= \frac{5 \times 3 + 9}{3} - \frac{7 \times 3 - 9}{4} \\
 &= \frac{15 + 9}{3} - \frac{21 - 9}{4} \\
 &= \frac{24}{3} - \frac{12}{4} \\
 &= 8 - 3 \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc  $x = 3$  est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

## 2.94 Calcul 94.

$$\frac{2x-7}{5} + \frac{x+11}{2} = -4.$$

**Solution. Résolution :** On commence par éliminer les dénominateurs 5 et 2 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 10 :

$$\begin{aligned} 10 \left( \frac{2x-7}{5} + \frac{x+11}{2} \right) &= -4 \times 10 \\ \frac{10(2x-7)}{5} + \frac{10(x+11)}{2} &= -40 \\ 2(2x-7) + 5(x+11) &= -40 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned} 2 \times 2x - 2 \times 7 + 5x + 5 \times 11 &= -40 \\ 4x - 14 + 5x + 55 &= -40 \\ 9x + 41 &= -40 \end{aligned}$$

et on isole  $x$

$$\begin{aligned} 9x + 41 - 41 &= -40 - 41 \\ 9x &= -81 \\ x &= -\frac{81}{9} \\ x &= -9 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = -9$ .

**Vérification :** On calcule alors les deux membres pour  $x = -9$ . Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{2x-7}{5} + \frac{x+11}{2} &= \frac{2 \times (-9) - 7}{5} + \frac{-9 + 11}{2} \\ &= \frac{-18 - 7}{5} + \frac{2}{2} \\ &= \frac{-25}{5} + 1 \\ &= -5 + 1 \\ &= -4 \end{aligned}$$

et le second membre vaut toujours  $-4$  ce qui est identique, donc  $x = -9$  est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

## 2.95 Calcul 95.

$$\frac{2x-3}{3} - \frac{x-3}{6} = \frac{4x+3}{4} - 17.$$

*Solution. Résolution :* On commence par éliminer les dénominateurs 3, 6 et 4 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 12 :

$$\begin{aligned} 12 \left( \frac{2x-3}{3} - \frac{x-3}{6} \right) &= 12 \left( \frac{4x+3}{4} - 17 \right) \\ \frac{12(2x-3)}{3} - \frac{12(x-3)}{6} &= \frac{12(4x+3)}{4} - 12 \times 17 \\ 4(2x-3) - 2(x-3) &= 3(4x+3) - 204 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned} 4 \times 2x - 4 \times 3 - 2x - 2 \times (-3) &= 3 \times 4x + 3 \times 3 - 204 \\ 8x - 12 - 2x + 6 &= 12x + 9 - 204 \\ 6x - 6 &= 12x - 195 \end{aligned}$$

et on isole  $x$

$$\begin{aligned} 6x - 6 - 12x &= 12x - 195 - 12x \\ -6x - 6 &= -195 \\ -6x - 6 + 6 &= -195 + 6 \\ -6x &= -189 \\ x &= \frac{-189}{-6} \\ x &= \frac{63}{2} \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = \frac{63}{2}$ .

**Vérification :** On calcule alors les deux membres pour  $x = \frac{63}{2}$ . Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{2x-3}{3} - \frac{x-3}{6} &= \frac{2 \times \frac{63}{2} - 3}{3} - \frac{\frac{63}{2} - 3}{6} \\ &= \frac{63-3}{3} - \frac{\frac{63}{2} - \frac{6}{2}}{6} \\ &= \frac{60}{3} - \frac{\frac{57}{2}}{6} \\ &= 20 - \frac{57}{12} \\ &= 20 - \frac{19 \times 4}{3 \times 4} \\ &= 20 - \frac{19}{4} \\ &= \frac{80}{4} - \frac{19}{4} \\ &= \frac{61}{4} \end{aligned}$$



et le second membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{4x+3}{4} - 17 &= \frac{4 \times \frac{63}{2} + 3}{4} - 17 \\
 &= \frac{126 + 3}{4} - \frac{68}{4} \\
 &= \frac{129 - 68}{4} \\
 &= \frac{61}{4}
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc  $x = \frac{63}{2}$  est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

## 2.96 Calcul 96.

$$\frac{5x-3}{4} - \frac{7x-5}{9} = \frac{x+19}{6}.$$

*Solution. Résolution :* On commence par éliminer les dénominateurs 4, 6 et 9 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 36 :

$$\begin{aligned}
 36 \left( \frac{5x-3}{4} - \frac{7x-5}{9} \right) &= 36 \times \frac{x+19}{6} \\
 \frac{36(5x-3)}{4} - \frac{36(7x-5)}{9} &= \frac{36(x+19)}{6} \\
 9(5x-3) - 4(7x-5) &= 6(x+19)
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 9 \times 5x - 9 \times 3 - 4 \times 7x - 4 \times (-5) &= 6x + 6 \times 19 \\
 45x - 27 - 28x + 20 &= 6x + 114 \\
 17x - 7 &= 6x + 114
 \end{aligned}$$

et on isole  $x$

$$\begin{aligned}
 17x - 7 - 6x &= 6x + 114 - 6x \\
 11x - 7 &= 114 \\
 11x - 7 + 7 &= 114 + 7 \\
 11x &= 121 \\
 x &= \frac{121}{11} \\
 x &= 11
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = 11$ .

**Vérification** : On calcule alors les deux membres pour  $x =$ . Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}\frac{5x-3}{4} - \frac{7x-5}{9} &= \frac{5 \times 11 - 3}{4} - \frac{7 \times 11 - 5}{9} \\ &= \frac{55-3}{4} - \frac{77-5}{9} \\ &= \frac{52}{4} - \frac{72}{9} \\ &= 13 - 8 \\ &= 5\end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}\frac{x+19}{6} &= \frac{11+19}{6} \\ &= \frac{30}{6} \\ &= 5\end{aligned}$$

ce qui est identique, donc  $x =$  est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

## 2.97 Calcul 97.

$$\frac{5x+1}{8} - \frac{x-1}{3} = \frac{4(2x-3)}{9}.$$

*Solution. Résolution* : On commence par éliminer les dénominateurs 3, 8 et 9 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 72 :

$$\begin{aligned}72 \left( \frac{5x+1}{8} - \frac{x-1}{3} \right) &= 72 \times \frac{4(2x-3)}{9} \\ \frac{72(5x+1)}{8} - \frac{72(x-1)}{3} &= \frac{72 \times 4(2x-3)}{9} \\ 9(5x+1) - 24(x-1) &= 8 \times 4(2x-3) \\ 9(5x+1) - 24(x-1) &= 32(2x-3)\end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}9 \times 5x + 9 \times 1 - 24x - 24 \times (-1) &= 32 \times 2x - 32 \times 3 \\ 45x + 9 - 24x + 24 &= 64x - 96 \\ 21x + 33 &= 64x - 96\end{aligned}$$

et on isole  $x$

$$\begin{aligned}
 21x + 33 - 64x &= 64x - 96 - 64x \\
 -43x + 33 &= -96 \\
 -43x + 33 - 33 &= -96 - 33 \\
 -43x &= -129 \\
 x &= \frac{-129}{-43} \\
 x &= +3
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = 3$ .

**Vérification** : On calcule alors les deux membres pour  $x = 3$ . Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{5x+1}{8} - \frac{x-1}{3} &= \frac{5 \times 3 + 1}{8} - \frac{3-1}{3} \\
 &= \frac{15+1}{8} - \frac{2}{3} \\
 &= \frac{16}{8} - \frac{2}{3} \\
 &= 2 - \frac{2}{3} \\
 &= \frac{6}{3} - \frac{2}{3} \\
 &= \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{4(2x-3)}{9} &= \frac{4(2 \times 3 - 3)}{9} \\
 &= \frac{4(6-3)}{9} \\
 &= \frac{4 \times 3}{3 \times 3} \\
 &= \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc  $x = 3$  est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

## 2.98 Calcul 98.

$$\frac{2x-1}{3} - \frac{5x+2}{7} = x + 13.$$

*Solution. Résolution :* On commence par éliminer les dénominateurs 3 et 7 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 21 :

$$\begin{aligned} 21 \left( \frac{2x-1}{3} - \frac{5x+2}{7} \right) &= 21(x+13) \\ \frac{21(2x-1)}{3} - \frac{21(5x+2)}{7} &= 21(x+13) \\ 7(2x-1) - 3(5x+2) &= 21(x+13) \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned} 7 \times 2x - 7 \times 1 - 3 \times 5x - 3 \times 2 &= 21x + 21 \times 13 \\ 14x - 7 - 15x - 6 &= 21x + 273 \\ -x - 13 &= 21x + 273 \end{aligned}$$

et on isole  $x$

$$\begin{aligned} -x - 13 - 21x &= 21x + 273 - 21x \\ -22x - 13 &= 273 \\ -22x - 13 + 13 &= 273 + 13 \\ -22x &= 286 \\ x &= \frac{286}{-22} \\ x &= -13 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = -13$ .

**Vérification :** On calcule alors les deux membres pour  $x = -13$ . Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{2x-1}{3} - \frac{5x+2}{7} &= \frac{2 \times (-13) - 1}{3} - \frac{5 \times (-13) + 2}{7} \\ &= \frac{-26 - 1}{3} - \frac{-65 + 2}{7} \\ &= \frac{-27}{3} - \frac{-63}{7} \\ &= -9 + 9 \\ &= 0 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned} x + 13 &= -13 + 13 \\ &= 0 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc  $x = -13$  est bien solution.

Retour au sommaire : page 1

## 2.99 Calcul 99.

$$\frac{8x+2}{5} - \frac{x-11}{7} = \frac{5x-3}{2} - \frac{3x-1}{4}.$$

*Solution. Résolution :* On commence par éliminer les dénominateurs 5, 7, 2 et 4 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 140 :

$$\begin{aligned} 140 \left( \frac{8x+2}{5} - \frac{x-11}{7} \right) &= 140 \left( \frac{5x-3}{2} - \frac{3x-1}{4} \right) \\ \frac{140(8x+2)}{5} - \frac{140(x-11)}{7} &= \frac{140(5x-3)}{2} - \frac{140(3x-1)}{4} \\ 28(8x+2) - 20(x-11) &= 70(5x-3) - 35(3x-1) \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned} 28 \times 8x + 28 \times 2 - 20x - 20 \times (-11) &= 70 \times 5x - 70 \times 3 \\ &\quad - 35 \times 3x - 35 \times (-1) \\ 224x + 56 - 20x + 220 &= 350x - 210 - 105x + 35 \\ 204x + 276 &= 245x - 175 \end{aligned}$$

et on isole  $x$

$$\begin{aligned} 204x + 276 - 245x &= 245x - 175 - 245x \\ -41x + 276 &= -175 \\ -41x + 276 - 276 &= -175 - 276 \\ -41x &= -451 \\ x &= \frac{-451}{-41} \\ x &= 11 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est  $x = 11$ .

**Vérification :** On calcule alors les deux membres pour  $x = 11$ . Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{8x+2}{5} - \frac{x-11}{7} &= \frac{8 \times 11 + 2}{5} - \frac{11 - 11}{7} \\ &= \frac{88 + 2}{5} - \frac{0}{7} \\ &= \frac{90}{5} - 0 \\ &= 18 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{5x-3}{2} - \frac{3x-1}{4} &= \frac{5 \times 11 - 3}{2} - \frac{3 \times 11 - 1}{4} \\
 &= \frac{55-3}{2} - \frac{33-1}{4} \\
 &= \frac{52}{2} - \frac{32}{4} \\
 &= 26 - 8 \\
 &= 18
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc  $x = 11$  est bien solution.

Résoudre les équations :

Retour au sommaire : page 1

## 2.100 Calcul 100.

$$(x-1)(x+2)(x-3) = 0.$$

*Solution. Résolution :* On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des trois équations  $x-1=0$ ,  $x+2=0$ , et  $x-3=0$ .

D'une part,  $x-1=0$  revient à  $x-1+1=0+1$ , c'est-à-dire  $x=1$ .

D'autre part,  $x+2=0$  revient à  $x=-2$ .

Enfin,  $x-3=0$  revient à  $x=3$ .

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont  $x=1$ ,  $x=-2$  et  $x=3$ .

**Vérification :** Pour  $x=1$ ,  $(x-1)(x+2)(x-3) = (1-1)(1+2)(1-3) = 0(1+2)(1-3) = 0$ .

Pour  $x=-2$ ,  $(x-1)(x+2)(x-3) = (-2-1)(-2+2)(-2-3) = (-2-1)0(-2-3) = 0$ .

Pour  $x=3$ ,  $(x-1)(x+2)(x-3) = (3-1)(3+2)(3-3) = (3-1)(3+2)0 = 0$ .

Retour au sommaire : page 1

## 2.101 Calcul 101.

$$(x-3)(x-4)(x-5) = 0.$$

*Solution. Résolution :* On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des trois équations  $x-3=0$ ,  $x-4=0$ , et  $x-5=0$ .

D'une part,  $x-3=0$  revient à  $x=3$

D'autre part,  $x-4=0$  revient à  $x=4$ .

Enfin,  $x-5=0$  revient à  $x=5$ .

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont  $x = 3$ ,  $x = 4$  et  $x = 5$ .

**Vérification :** Pour  $x = 3$ ,  $(x-3)(x-4)(x-5) = (3-3)(3-4)(3-5) = 0(3-4)(3-5) = 0$ .

Pour  $x = 4$ ,  $(x-3)(x-4)(x-5) = (4-3)(4-4)(4-5) = (4-3)0(4-5) = 0$ .

Pour  $x = 5$ ,  $(x-3)(x-4)(x-5) = (5-3)(5-4)(5-5) = (5-3)(5-4)0 = 0$ .

Retour au sommaire : page 1

## 2.102 Calcul 102.

$$(2x + 1)(x + 1)(4x - 3) = 0.$$

*Solution. Résolution :* On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des trois équations  $2x + 1 = 0$ ,  $x + 1 = 0$ , et  $4x - 3 = 0$ .

D'une part, la première se résout en

$$\begin{aligned} 2x + 1 - 1 &= 0 - 1 \\ 2x &= -1 \\ x &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

D'autre part, la seconde se résout en

$$\begin{aligned} x + 1 - 1 &= 0 - 1 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

Enfin, la dernière se résout en

$$\begin{aligned} 4x - 3 + 3 &= 0 + 3 \\ 4x &= 3 \\ x &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont  $x = -\frac{1}{2}$ ,  $x = -1$  et  $x = \frac{3}{4}$ .

**Vérification :** En exercice.

Retour au sommaire : page 1

## 2.103 Calcul 103.

$$(2x + 1)(x + 4)(3x + 1) = 0.$$

*Solution. Résolution :* On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des trois équations  $2x + 1 = 0$ ,  $x + 4 = 0$ , et  $3x + 1 = 0$ .

D'une part, la première se résout en

$$\begin{aligned}2x + 1 - 1 &= 0 - 1 \\2x &= -1 \\x &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

D'autre part, la seconde se résout en

$$\begin{aligned}x + 4 - 4 &= 0 - 4 \\x &= -4\end{aligned}$$

Enfin, la dernière se résout en

$$\begin{aligned}3x + 1 - 1 &= 0 - 1 \\3x &= -1 \\x &= -\frac{1}{3}\end{aligned}$$

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont  $x = -\frac{1}{2}$ ,  $x = -4$  et  $x = -\frac{1}{3}$ .

**Vérification :** En exercice.

Retour au sommaire : page 1

## 2.104 Calcul 104.

$$x(5x + 1)(4x - 3)(3x - 4) = 0.$$

*Solution. Résolution :* On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des quatre équations  $x = 0$ ,  $5x + 1 = 0$ ,  $4x - 3 = 0$ , et  $3x - 4 = 0$ .

D'une part, la première a immédiatement comme seule solution  $x = 0$ .

D'autre part, la seconde se résout en

$$\begin{aligned}5x + 1 - 1 &= 0 - 1 \\5x &= -1 \\x &= -\frac{1}{5}\end{aligned}$$

La troisième se résout en

$$\begin{aligned}4x - 3 + 3 &= 0 + 3 \\4x &= 3 \\x &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$



Enfin, la dernière se résout en

$$\begin{aligned} 3x - 4 + 4 &= 0 + 4 \\ 3x &= 4 \\ x &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont  $x = 0$ ,  $x = -\frac{1}{5}$ ,  $x = \frac{3}{4}$  et  $x = \frac{4}{3}$ .

**Vérification :** En exercice.

Retour au sommaire : page 1

## 2.105 Calcul 105.

$$5x(3x - 7) = 0.$$

*Solution. Résolution :* On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des deux équations  $5x = 0$  et  $3x - 7 = 0$

D'une part, la première se résout en

$$\begin{aligned} 5x &= 0 \\ \frac{5x}{5} &= \frac{0}{5} \\ x &= 0 \end{aligned}$$

D'autre part, la seconde se résout en

$$\begin{aligned} 3x - 7 + 7 &= 0 + 7 \\ 3x &= 7 \\ x &= \frac{7}{3} \end{aligned}$$

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont  $x = 0$  et  $x = \frac{7}{3}$ .

**Vérification :** En exercice.

Retour au sommaire : page 1

## 2.106 Calcul 106.

$$x^2 - 3x = 0.$$

*Solution. Résolution :* On factorise par  $x$  pour trouver

$$x(x - 3) = 0,$$

qui est une équation produit. Toute solution est solution de l'équation  $x = 0$  ou de l'équation  $x - 3 = 0$ . Cette dernière équation admet comme solution  $x = 3$ .

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont  $x = 0$  et  $x = 3$ .

**Vérification :** Pour  $x = 0$ ,  $x^2 - 3x = 0^2 - 3 \times 0 = 0 - 0 = 0$ .

Pour  $x = 3$ ,  $x^2 - 3x = 3^2 - 3 \times 3 = 9 - 9 = 0$ .

Retour au sommaire : page 1

## 2.107 Calcul 107.

$$5x^2 + 8x = 0.$$

*Solution. Résolution :* On factorise par  $x$  pour trouver

$$x(5x + 8) = 0,$$

qui est une équation produit. Toute solution est solution de l'équation  $x = 0$ , ou de l'équation  $5x + 8 = 0$ . Cette dernière équation revient à  $5x = -8$ , donc à  $x = -\frac{8}{5}$ .

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont  $x = 0$  et  $x = -\frac{8}{5}$ .

**Vérification :** Pour  $x = 0$ ,  $5x^2 + 8x = 5 \times 0^2 + 8 \times 0 = 5 \times 0 + 0 = 0 + 0 = 0$ .

Pour  $x = -\frac{8}{5}$ ,

$$\begin{aligned} 5x^2 + 8x &= 5 \left( -\frac{8}{5} \right)^2 + 8 \times \frac{-8}{5} \\ &= 5 \frac{64}{25} - \frac{64}{5} \\ &= \frac{64 \times 5}{5 \times 5} - \frac{64}{5} \\ &= \frac{64}{5} - \frac{64}{5} = 0. \end{aligned}$$

Les deux nombres 0 et  $-\frac{8}{5}$  sont donc bien solution de l'équation.

Retour au sommaire : page 1

## 2.108 Calcul 108.

$$4x^2 - \frac{7x}{3} = 0.$$

*Solution. Résolution :* On factorise par  $x$  pour trouver

$$x(4x - \frac{7}{3}) = 0,$$

qui est une équation produit. Toute solution est solution de l'équation  $x = 0$ , ou de l'équation  $4x - \frac{7}{3} = 0$ . Cette dernière équation se résout ainsi :

$$\begin{aligned} 4x - \frac{7}{3} &= 0 \\ 4x - \frac{7}{3} + \frac{7}{3} &= 0 + \frac{7}{3} \\ 4x &= \frac{7}{3} \\ x &= \frac{7}{3} \div 4 \\ x &= \frac{7}{12} \end{aligned}$$

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont  $x = 0$  et  $x = \frac{7}{12}$ .

**Vérification :** Pour  $x = 0$ ,  $4x^2 - \frac{7x}{3} = 4 \times 0^2 - \frac{7 \times 0}{3} = 4 \times 0 - \frac{0}{3} = 0 - 0 = 0$ .

Pour  $x = \frac{7}{12}$ ,

$$\begin{aligned} 4x^2 - \frac{7x}{3} &= 4 \left( \frac{7}{12} \right)^2 - \frac{7 \times \frac{7}{12}}{3} \\ &= 4 \times \frac{49}{144} - \frac{\frac{49}{12}}{3} \\ &= \frac{4 \times 49}{4 \times 36} - \frac{49}{12 \times 3} \\ &= \frac{49}{36} - \frac{49}{36} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Les deux nombres 0 et  $\frac{7}{12}$  sont donc bien solution de l'équation.

### 3 Problèmes de réflexion plus avancés

Retour au sommaire : page 1

#### 3.1 Problème a

Quel nombre faut-il ajouter aux deux termes de la fraction  $\frac{7}{13}$  pour qu'elle devienne égale à  $\frac{2}{3}$  ?

*Solution. Mise en équation :* Notons  $x$  le nombre cherché. L'énoncé devient

$$\frac{7+x}{13+x} = \frac{2}{3}.$$

**Résolution de l'équation :** Par égalité des produits en croix, cela équivaut à

$$(7 + x)3 = (13 + x)2$$

Par distributivité, on trouve

$$7 \times 3 + x \times 3 = 13 \times 2 + x \times 2,$$

c'est-à-dire

$$21 + 3x = 26 + 2x.$$

On retranche  $2x$  aux deux termes :

$$21 + x = 26$$

Et on trouve, en retranchant 21 aux deux termes :

$$x = 26 - 21 = 5.$$

**Vérification :** On peut alors vérifier que  $\frac{7+5}{13+5} = \frac{12}{18} = \frac{2 \times 6}{3 \times 6} = \frac{2}{3}$ .

Retour au sommaire : page 1

## 3.2 Problème b

Quel nombre faut-il retrancher aux deux termes de la fraction  $\frac{17}{23}$  pour obtenir une fraction égale à  $\frac{5}{8}$  ?

*Solution.* **Mise en équation :** Notons  $x$  le nombre cherché. L'énoncé devient

$$\frac{17 - x}{23 - x} = \frac{5}{8}.$$

**Résolution de l'équation :** Par égalité des produits en croix, cela équivaut à

$$(17 - x)8 = (23 - x)5$$

Par distributivité, on trouve

$$17 \times 8 - x \times 8 = 23 \times 5 - x \times 5,$$

c'est-à-dire

$$136 - 8x = 115 - 5x.$$

On ajoute  $8x$  aux deux termes :

$$\begin{aligned} 136 &= 115 - 5x + 8x \\ &= 115 + 3x \end{aligned}$$

Et on trouve, en retranchant 115 aux deux termes :

$$\begin{aligned}136 - 115 &= 3x \\21 &= 3x \\ \frac{21}{3} &= x \\ x &= 7\end{aligned}$$

**Vérification :** On peut alors vérifier que  $\frac{17-7}{23-7} = \frac{10}{16} = \frac{2 \times 5}{2 \times 8} = \frac{5}{8}$ .

Retour au sommaire : page 1

### 3.3 Problème c

Quel nombre faut-il ajouter aux deux termes de la fraction  $\frac{5}{8}$  et retrancher aux deux termes de la fraction  $\frac{3}{4}$  pour obtenir deux fractions égales ?

*Solution. Mise en équation :* Notons  $x$  le nombre cherché. L'énoncé devient

$$\frac{5+x}{8+x} = \frac{3-x}{4-x}.$$

**Résolution de l'équation :** Par égalité des produits en croix, cela équivaut à

$$(5+x)(4-x) = (8+x)(3-x).$$

Par distributivité, on trouve

$$5 \times 4 - 5x + 4x - x^2 = 8 \times 3 - 8x + 3x - x^2$$

c'est-à-dire

$$20 - x - x^2 = 24 - 5x - x^2.$$

On ajoute  $x^2$  aux deux termes pour trouver

$$20 - x = 24 - 5x,$$

puis on ajoute  $5x$  pour trouver

$$20 - x + 5x = 24,$$

c'est-à-dire

$$20 + 4x = 24$$

Et on trouve, en retranchant 20 aux deux termes,

$$4x = 24 - 20,$$

puis

$$4x = 4$$

et donc

$$x = \frac{4}{4} = 1.$$

**Vérification :** On peut alors vérifier que  $\frac{5+1}{8+1} = \frac{6}{9} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{2}{3}$  et  $\frac{3-1}{4-1} = \frac{2}{3}$ , donc on a bien

$$\frac{5+1}{8+1} = \frac{3-1}{4-1}.$$

Retour au sommaire : page 1

### 3.4 Problème d

Une personne dispose de deux heures pour effectuer une promenade. Elle part en tramway à la vitesse moyenne de 12 km à l'heure et revient à pied, à la vitesse moyenne de 4 km à l'heure. À quelle distance du point de départ devra-t-elle quitter le tramway ?

*Solution. Mise en équation :* Notons  $x$  la distance recherchée en kilomètres. On parcourt donc une fois la distance  $x$  à  $v_1 = 12$  km/h, puis une seconde fois la même distance à  $v_2 = 4$  km/h.

À l'aller, le temps requis est  $t_1 = \frac{d}{v_1} = \frac{x}{12}$ .

Au retour, le temps requis est  $t_2 = \frac{d}{v_2} = \frac{x}{4}$ .

On cherche donc à avoir  $t_1 + t_2 = 2$  heures, c'est-à-dire :

$$\frac{x}{12} + \frac{x}{4} = 2.$$

**Résolution de l'équation :** On multiplie cette équation par 12 pour se débarrasser des dénominateurs :

$$\begin{aligned} 12 \left( \frac{x}{12} + \frac{x}{4} \right) &= 12 \times 2 \\ 12 \times \frac{x}{12} + 12 \times \frac{x}{4} &= 24 \\ \frac{12}{12}x + \frac{12}{4}x &= 24 \\ x + 3x &= 24 \\ 4x &= 24 \end{aligned}$$

On divise alors par 4 pour trouver

$$x = 24 \div 4 = 6.$$

On doit donc descendre après 6 kilomètres.

**Vérification :** Si on descend après 6 kilomètres, le trajet aller prendra

$\frac{6 \text{ km}}{12 \text{ km/h}} = 0,5 \text{ h}$  et le trajet retour prendra  $\frac{6 \text{ km}}{4 \text{ km/h}} = 1,5 \text{ h}$ . Le temps total sera donc  $0,5 \text{ h} + 1,5 \text{ h} = 2 \text{ h}$ , comme requis.

Retour au sommaire : page 1

### 3.5 Problème e

Un épicier achète un certain nombre de bouteilles de vin pour 225 euros. En vendant la bouteille 1,65 euros, il gagnerait autant que ce qu'il perdrait s'il la vendait 1,35 euros. Quel est le nombre des bouteilles de vins ?

*Solution. Mise en équation :* On note  $N$  le nombre de bouteilles de vin. S'il vendait les bouteilles à 1,65 euros, il toucherait  $N \times 1,65 = 1,65N$  euros. S'il vendait les bouteilles à 1,35 euros, il toucherait  $N \times 1,35 = 1,35N$  euros. L'énoncé nous dit donc que les différences  $1,65N - 225$  et  $225 - 1,35N$  sont identiques, d'où

$$1,65N - 225 = 225 - 1,35N.$$

**Résolution de l'équation :** On ajoute  $1,35N$  aux deux termes :

$$\begin{aligned} 1,65N + 1,35N - 225 &= 225 - 1,35N + 1,35N \\ 3N - 225 &= 225 \end{aligned}$$

On ajoute alors 225 aux deux termes :

$$\begin{aligned} 3N - 225 + 225 &= 225 + 225 \\ 3N &= 450 \end{aligned}$$

Et on divise par 3 :

$$\begin{aligned} \frac{3N}{3} &= \frac{450}{3} \\ N &= 150 \end{aligned}$$

Il a donc acheté 150 bouteilles de vin.

**Vérification :** S'il achète 150 bouteilles de vin, on peut vérifier que le montant total touché s'il vend à 1,65 euros est de  $150 \times 1,65 = 247,50$  euros. On réalise alors un bénéfice de  $247,50 - 225 = 22,50$  euros.

S'il vendait à 1,35 euros, il toucherait alors  $150 \times 1,35 = 202,50$ , ce qui représente une perte de  $225 - 202,50 = 22,50$  euros.

Le bénéfice dans le premier cas est égal à la perte dans le second ce qui était la condition voulue.


Retour au sommaire : page 1

### 3.6 Problème f

On considère un polygone régulier à 6 côtés.

- Réaliser une figure.
- Relier tous les sommets au centre  $O$ .
- Montrer que tous les triangles ainsi formés ont leurs angles tous égaux à  $60^\circ$ .
- En déduire que les angles d'un hexagone régulier mesurent  $120$  degrés.

*Solution.* (a) & (b) Voici la figure demandée aux deux premières questions :



(c) Par construction, les six triangles  $AOB$ ,  $BOC$ ,  $COD$ ,  $DOE$ ,  $EOF$  et  $FOA$  sont égaux, et on a  $OA = OB = OC = OD = OE = OF$ , donc ces six triangles sont isocèles en  $O$ . Il suffit donc de montrer que  $OAB$  a trois angles de  $60$  degrés. Les six angles  $\widehat{AOB}$ ,  $\widehat{BOC}$ ,  $\widehat{COD}$ ,  $\widehat{DOE}$ ,  $\widehat{EOF}$  et  $\widehat{FOA}$  sont de même mesure et consécutivement adjacents. Leur réunion est l'angle complet de  $360^\circ$ . On en déduit que

$$\begin{aligned}
 \widehat{AOB} + \widehat{BOC} + \widehat{COD} + \widehat{DOE} + \widehat{EOF} + \widehat{FOA} &= 360^\circ \\
 6 \times \widehat{AOB} &= 360^\circ \\
 \widehat{AOB} &= 360^\circ \div 6 \\
 \widehat{AOB} &= 60^\circ
 \end{aligned}$$

Enfin, le triangle  $AOB$  est isocèle en  $O$ , donc ses angles de base  $\widehat{ABO}$  et  $\widehat{BAO}$  sont de même mesure. Écrivant alors la somme des trois angles de ce



triangle, il vient

$$\begin{aligned}
 180^\circ &= \widehat{AOB} + \widehat{ABO} + \widehat{BAO} \\
 180^\circ &= 60^\circ + \widehat{ABO} + \widehat{ABO} \\
 180^\circ - 60^\circ &= 2 \times \widehat{ABO} \\
 120^\circ &= 2 \times \widehat{ABO} \\
 120^\circ \div 2 &= \widehat{ABO} \\
 60^\circ &= \widehat{ABO}
 \end{aligned}$$

et donc  $\widehat{ABO} = \widehat{BAO} = 60^\circ$ .

Le triangle  $AOB$  (et donc les cinq autres triangles qui lui sont égaux) a donc trois angles de  $60^\circ$ . Ils sont donc d'ailleurs équilatéraux.

(d) Les six angles de l'hexagone régulier sont égaux, donc il suffit de calculer par exemple  $\widehat{ABC}$ . Comme  $\widehat{ABC}$  est la réunion des angles adjacents  $\widehat{ABO}$  et  $\widehat{OBC}$ , on a

$$\begin{aligned}
 \widehat{ABC} &= \widehat{ABO} + \widehat{OBC} \\
 &= 60^\circ + 60^\circ \\
 &= 120^\circ.
 \end{aligned}$$

L'angle  $\widehat{ABC}$  ainsi que les cinq autres angles de l'hexagone régulier  $ABCDEF$  mesure donc 120 degrés.


[Retour au sommaire : page 1](#)

### 3.7 Problème g

On considère un polygone régulier à 5 côtés.

- Réaliser une figure.
- Relier tous les sommets au centre  $O$ .
- Montrer que tous les triangles isocèles ainsi formés ont leurs angles à la base tous égaux à  $54^\circ$ .
- En déduire que les angles d'un pentagone régulier mesurent  $108^\circ$  degrés.

*Solution.* Voici la figure demandée aux deux premières questions :



(c) Par construction, les cinq triangles  $AOB$ ,  $BOC$ ,  $COD$ ,  $DOE$  et  $EOA$  sont égaux, et on a  $OA = OB = OC = OD = OE$ , donc ces cinq triangles sont isocèles en  $O$ . Il suffit donc de calculer les angles de  $OAB$ . Les cinq angles  $\widehat{AOB}$ ,  $\widehat{BOC}$ ,  $\widehat{COD}$ ,  $\widehat{DOE}$   $\widehat{EOA}$  sont de même mesure et consécutivement adjacents. Leur réunion est l'angle complet de  $360^\circ$ . On en déduit que

$$\begin{aligned}\widehat{AOB} + \widehat{BOC} + \widehat{COD} + \widehat{DOE} + \widehat{EOA} &= 360^\circ \\ 5 \times \widehat{AOB} &= 360^\circ \\ \widehat{AOB} &= 360^\circ \div 5 \\ \widehat{AOB} &= 72^\circ\end{aligned}$$

Enfin, le triangle  $AOB$  est isocèle en  $O$ , donc ses angles de base  $\widehat{ABO}$  et  $\widehat{BAO}$  sont de même mesure. Écrivant alors la somme des trois angles de ce triangle, il vient

$$\begin{aligned}180^\circ &= \widehat{AOB} + \widehat{ABO} + \widehat{BAO} \\ 180^\circ &= 72^\circ + \widehat{ABO} + \widehat{ABO} \\ 180^\circ - 72^\circ &= 2 \times \widehat{ABO} \\ 108^\circ &= 2 \times \widehat{ABO} \\ 108^\circ \div 2 &= \widehat{ABO} \\ 54^\circ &= \widehat{ABO}\end{aligned}$$

et donc  $\widehat{ABO} = \widehat{BAO} = 54^\circ$ .

Le triangle  $AOB$  (et donc les quatre autres triangles qui lui sont égaux) a donc un angle au sommet de  $72^\circ$  et deux angles de base de  $54^\circ$ .

(d) Les cinq angles du pentagone régulier sont égaux, donc il suffit de calculer par exemple  $\widehat{ABC}$ . Comme  $\widehat{ABC}$  est la réunion des angles adjacents

$\widehat{ABO}$  et  $\widehat{OBC}$ , on a

$$\begin{aligned}\widehat{ABC} &= \widehat{ABO} + \widehat{OBC} \\ &= 54^\circ + 64^\circ \\ &= 108^\circ.\end{aligned}$$

L'angle  $\widehat{ABC}$  ainsi que les quatre autres angles de l'hexagone régulier  $ABCDEF$  mesure donc 108 degrés.

Retour au sommaire : page 1

### 3.8 Problème h

Utiliser les deux exercices précédents pour généraliser à un polygone régulier avec un nombre quelconque  $N$  de côtés. On montrera ainsi que les angles d'une telle figure valent tous  $\frac{N-2}{N} \times 180^\circ$ .

*Solution.* En adaptant les deux exercices précédents, notons  $AOB$  le triangle obtenu en joignant un côté  $[AB]$  du polygone régulier à  $N$  côtés à son centre. Le triangle  $AOB$  est isocèle en  $O$ .

L'angle  $\widehat{AOB}$  mesure un  $N$ -ème de tour complet, donc  $\frac{360^\circ}{N}$ .

Enfin, le triangle  $AOB$  est isocèle en  $O$ , donc ses angles de base  $\widehat{ABO}$  et  $\widehat{BAO}$  sont de même mesure. Écrivant alors la somme des trois angles de ce triangle, il vient

$$\begin{aligned}180^\circ &= \widehat{AOB} + \widehat{ABO} + \widehat{BAO} \\ 180^\circ &= \frac{360^\circ}{N} + \widehat{ABO} + \widehat{ABO} \\ 180^\circ - \frac{360^\circ}{N} &= 2 \times \widehat{ABO} \\ 180^\circ - \frac{360^\circ}{N} &= 2 \times \widehat{ABO} \\ \left(180^\circ - \frac{360^\circ}{N}\right) \div 2 &= \widehat{ABO} \\ 90^\circ - \frac{180^\circ}{N} &= \widehat{ABO} \\ \frac{N}{N} \times 90^\circ - \frac{2}{N} \times 90^\circ &= \widehat{ABO} \\ \left(\frac{N}{N} - \frac{2}{N}\right) \times 90^\circ &= \widehat{ABO} \\ \frac{N-2}{N} \times 90^\circ &= \widehat{ABO}\end{aligned}$$

donc le triangle  $AOB$  (ainsi que les  $N - 1$  autres triangles qui forment ce polygone) a des angles de base de  $\frac{N-2}{N} \times 90^\circ$ .

Enfin, les angles du polygone mesurent tous comme l'angle  $\widehat{ABC}$  qui est la réunion des angles adjacents  $\widehat{ABO}$  et  $\widehat{OBC}$  qui mesurent donc chacun  $\frac{N-2}{N} \times 90^\circ$ . On en déduit que

$$\begin{aligned}\widehat{ABC} &= \widehat{ABO} + \widehat{OBC} \\ &= \frac{N-2}{N} \times 90^\circ + \frac{N-2}{N} \times 90^\circ \\ &= \frac{N-2}{N} \times (90^\circ + 90^\circ) \\ &= \frac{N-2}{N} \times 180^\circ\end{aligned}$$

ce qui était le résultat attendu : les angles d'un polygone régulier à  $N$  côtés mesurent tous  $\frac{N-2}{N} \times 180^\circ$ .

En particulier, on se rassure avec les quatre cas particuliers connus :

- pour  $N = 3$ , on trouve  $\frac{3-2}{3} \times 180^\circ = \frac{1}{3} \times 180^\circ = 60^\circ$ , ce qui correspond aux angles d'un triangle équilatéral ;
- pour  $N = 4$ , on trouve  $\frac{4-2}{4} \times 180^\circ = \frac{2}{4} \times 180^\circ = 90^\circ$ , ce qui correspond aux angles d'un carré ;
- pour  $N = 5$ , on trouve  $\frac{5-2}{5} \times 180^\circ = \frac{3}{5} \times 180^\circ = 108^\circ$ , ce qui correspond aux angles d'un pentagone régulier ;
- pour  $N = 6$ , on trouve  $\frac{6-2}{6} \times 180^\circ = \frac{4}{6} \times 180^\circ = 120^\circ$ , ce qui correspond aux angles d'un hexagone régulier.

Notons qu'on en tirerait donc après calcul que :

- l'octogone régulier a des angles de  $\frac{8-2}{8} \times 180^\circ = 135^\circ$ ,
- l'enneagone régulier a des angles de  $\frac{9-2}{9} \times 180^\circ = 140^\circ$ ,
- le décagone régulier a des angles de  $\frac{10-2}{10} \times 180^\circ = 144^\circ$

Attention, certaines valeurs peuvent tomber moins juste :

- pour l'heptagone régulier ( $N = 7$ ), on trouverait des angles de  $\frac{7-2}{7} \times 180^\circ = \frac{5}{7} \times 180^\circ$ , qui n'est pas un nombre décimal (son développement décimal est 128,571428 571428 571428 571428... degrés).
- pour l'hendécagone régulier ( $N = 11$ ), on trouverait des angles de  $\frac{11-2}{11} \times 180^\circ = \frac{9}{11} \times 180^\circ$ , qui n'est pas un nombre décimal (son développement décimal est 147,272727... degrés).

Retour au sommaire : page 1

### 3.9 Problème i

On trace deux points  $A$  et  $B$  et une droite ( $d$ ) sur une feuille. Expliquer comment construire le cercle passant par  $A$  et  $B$  dont le centre appartient à ( $d$ ). Existe-t-il toujours ? Y en a-t-il toujours un seul ?

*Solution.* Ce problème revient à trouver le centre  $O$  d'un tel cercle, le rayon étant alors simplement  $OA$ . Le centre doit vérifier les deux conditions  $OA = OB$  et  $O \in (d)$ .

La première de ces conditions revient à dire que  $O$  appartient à la médiatrice du segment  $[AB]$ . On cherche donc un point qui appartienne à la fois à  $(d)$  et à cette médiatrice. Trois cas de figure se présentent alors :

- Premier cas :  $(d)$  est la médiatrice du segment  $[AB]$ . À ce moment, tout point de  $(d)$  convient et permet de tracer un cercle passant par  $A$  et  $B$ . Il y a donc une infinité de tels cercles.
- Deuxième cas :  $(d)$  est parallèle à la médiatrice du segment  $[AB]$ , il n'y a alors aucun point d'intersection et donc aucun cercle solution du problème.
- Troisième et dernier cas : sinon,  $(d)$  coupe la médiatrice de  $[AB]$  en un unique point  $O$ , qui est le centre du seul cercle possible. Dans ce cas, on peut alors construire effectivement le point  $O$  en traçant la médiatrice de  $[AB]$  à la règle et au compas et en regardant où elle rencontre  $(d)$ .

Retour au sommaire : page 1

### 3.10 Problème j

On place trois points  $A, B, C$  sur une feuille. À quelle condition passe-t-il un cercle par ces trois points ? Comment le construire ?

*Solution.* Pour qu'un tel cercle existe, si on note  $O$  son centre et  $R$  son rayon, il faut et il suffit que  $OA = OB = OC = R$ . Le point  $O$  doit donc être à la même distance des trois sommets.

Considérons les médiatrices de  $[AB]$  et  $[AC]$ .

- Si  $A, B$  et  $C$  sont alignés, ces deux droites sont perpendiculaires à la droite passant par ces trois points, donc elles sont parallèles entre elles. Mais alors, comme  $OA = OB$ , et  $OA = OC$ ,  $O$  devrait être sur les deux médiatrices, ce qui est impossible. Aucun cercle ne passe donc par trois points alignés.
- Sinon, elles se coupent en un point  $O$ . Ce point est sur la médiatrice de  $[AB]$  donc  $OA = OB$ , et il est sur la médiatrice de  $[AC]$  donc  $OA = OC$ . On a donc  $OA = OB = OC$ . En prenant cette distance commune comme rayon, on obtient le cercle voulu.

On conclut donc qu'un tel cercle existe si et seulement si les trois points ne sont pas alignés. Il est alors unique, et on peut le construire en traçant deux des médiatrices de segments entre nos points et en prenant comme centre leur intersection.

Retour au sommaire : page 1

### 3.11 Problème k

On considère un quadrilatère convexe  $ABCD$  dans lequel la médiatrice de  $[AB]$  est également la médiatrice de  $[CD]$ . Soit  $O$  le point où cette médiatrice coupe la médiatrice de  $[BC]$ .

- a). Montrer que les quatre points  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$  sont situés sur un même cercle de centre  $O$ .
- b). Démontrer que les médiatrices de  $[AD]$ ,  $[AC]$  et  $[BD]$  passent également par  $O$ .

*Solution.* a). On sait que  $O$  appartient à la médiatrice de  $[AB]$ . Or, cette médiatrice est l'ensemble des points équidistants de  $A$  et  $B$ , donc  $OA = OB$ .

De même, comme  $O$  appartient à la médiatrice de  $[CD]$  (qui est la même droite que la précédente),  $OC = OD$ .

De plus, comme  $O$  appartient à la médiatrice de  $[BC]$ ,  $OB = OC$ .

On a donc bien  $OA = OB = OC = OD$ , ce qui garantit que  $O$  est à la même distance des quatre sommets. Le cercle de centre  $O$  et de rayon  $OA$  passe donc par  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$ .

- b). Étant donné que  $OA = OD$ ,  $O$  est à la même distance des deux extrémités de  $[AD]$ . Or, un point équidistant des extrémités d'un segment est sur sa médiatrice, donc  $O$  appartient à la médiatrice de  $[AD]$ .

On procède de même pour le reste de la question en remarquant que  $OA = OC$  et que  $OB = OD$ .

[Retour au sommaire : page 1](#)

### 3.12 Problème l

Tracer un parallélogramme  $ABCD$ , et les bissectrices de ses quatre angles. Elles se croisent intérieurement au parallélogramme en quatre points  $E$ ,  $F$ ,  $G$  et  $H$ . Que dire du quadrilatère  $EFGH$  formé? Le démontrer. [Retour au sommaire : page 1](#)

### 3.13 Problème m

On trace un triangle  $ABC$  et on place les milieux  $D$ ,  $E$ ,  $F$  de ses trois côtés. Montrer que le triangle  $DEF$  est une réduction du triangle  $ABC$  dont on déterminera le coefficient. [Retour au sommaire : page 1](#)

### 3.14 Problème n

Dans le même contexte que l'exercice précédent, on relie chaque milieu au sommet opposé, et on note  $G$  le point d'intersection des trois segments ainsi formés. Montrer que l'homothétie de centre  $G$  et de rapport  $-2$  envoie chaque sommet du triangle  $DEF$  sur un sommet du triangle  $ABC$ . Retour au sommaire : page 1

### 3.15 Problème o

Dans un triangle  $ABC$ , on trace la hauteur issue de  $A$  qui rencontre  $(BC)$  en  $H$ . On suppose  $AB^2 = BH \times BC$ . Montrer que  $ABC$  est rectangle en  $A$ . Retour au sommaire : page 1

### 3.16 Problème p

On considère un quadrilatère  $ABCD$ . Montrer que les milieux des côtés forment un parallélogramme. Retour au sommaire : page 1

### 3.17 Problème q

Trouver trois nombres entiers consécutifs (consécutifs : qui se suivent) dont la somme est égale à 57.

*Solution. Mise en équation :* Si on note  $x$  le premier des trois nombres, les trois nombres sont  $x$ , puis  $x + 1$  et enfin  $x + 2$ . On a donc

$$x + (x + 1) + (x + 2) = 57$$

**Résolution de l'équation :** On réduit l'expression obtenue qui devient :

$$3x + 3 = 57$$

Puis, en retranchant 3 :

$$3x = 54$$

Et, en divisant par 3 :

$$x = 18$$

On a donc trouvé que le premier nombre doit être 18. Les deux autres sont donc 19 et 20.

**Vérification :** On vérifie la solution : 18, 19 et 20 sont bien trois entiers consécutifs, et leur somme est  $18 + 19 + 20 = 57$ , ce qui convient.

Retour au sommaire : page 1

### 3.18 Problème r

La somme de cinq nombres impairs consécutifs est 85. Quels sont ces nombres ?

*Solution. Mise en équation :* Si on note  $x$  le premier des trois nombres, les cinq nombres sont  $x$ ,  $x + 2$ ,  $x + 4$ ,  $x + 6$  et  $x + 8$ . On a donc

$$x + (x + 2) + (x + 4) + (x + 6) + (x + 8) = 85$$

**Résolution de l'équation :** On réduit l'expression obtenue qui devient

$$5x + 2 + 4 + 6 + 8 = 85$$

c'est-à-dire

$$5x + 20 = 85$$

Puis, en retranchant 20 :

$$5x = 65$$

Et, en divisant par 5 :

$$x = 13$$

On a donc trouvé que le premier nombre doit être 13. Les quatre autres sont donc 15, 17, 19 et 21.

**Vérification :** On vérifie la solution : 13, 15, 17, 19 et 21 sont bien cinq entiers impairs consécutifs, et leur somme est  $13 + 15 + 17 + 19 + 21 = 85$ , ce qui convient.

Retour au sommaire : page 1

### 3.19 Problème s

Un père a 29 ans ; son fils a 5 ans ; dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le triple de l'âge du fils ?

*Solution. Mise en équation :* Notons  $N$  le nombre d'années recherché. Après ce temps, le père a  $29 + N$  années, et le fils  $5 + N$  années. La condition demandée s'écrit donc :

$$29 + N = 3(5 + N)$$

**Résolution de l'équation :** On développe pour avoir

$$29 + N = 3 \times 5 + 3N$$

puis

$$29 + N = 15 + 3N$$



On retranche  $N$  des deux côtés :

$$29 + N - N = 15 + 3N - N$$

ce qui donne

$$29 = 15 + 2N$$

On retranche alors 15 des deux côtés :

$$29 - 15 = 15 + 2N - 15$$

ce qui donne

$$14 = 2N$$

Puis, en divisant par 2 :

$$7 = N$$

On doit donc attendre  $N = 7$  années.

**Vérification :** On vérifie la solution : après 7 années, le père a  $29 + 7 = 36$  ans, et le fils a  $5 + 7 = 12$  ans. Comme  $36 = 3 \times 12$ , le père a bien le triple de l'âge de son fils.

Retour au sommaire : page 1

### 3.20 Problème t

Un père a 41 ans; ses trois enfants sont âgés de 7, 9 et 13 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il égal à la somme des âges de ses enfants ?

*Solution.* **Mise en équation :** Notons  $N$  le nombre d'années recherché. Après ce temps, le père a  $41 + N$  années, et ses fils ont respectivement  $7 + N$ ,  $9 + N$  et  $13 + N$  années. On veut donc avoir

$$41 + N = (7 + N) + (9 + N) + (13 + N)$$

**Résolution de l'équation :** On réduit l'expression obtenue qui devient

$$41 + N = 7 + 9 + 13 + N + N + N$$

donc

$$41 + N = 29 + 3N$$

On retranche alors  $N$  des deux côtés pour obtenir

$$41 + N - N = 29 + 3N - N$$

c'est-à-dire

$$41 = 29 + 2N$$

puis on retranche 29 des deux côtés pour obtenir

$$41 - 29 = 29 + 2N - 29$$

c'est-à-dire

$$12 = 2N$$

puis, en divisant par 2, on trouve enfin

$$6 = N$$

Il faut donc attendre 6 ans.

**Vérification :** On vérifie la solution : après 6 années, le père aura  $41 + 6 = 47$  ans, et ses fils auront respectivement  $7 + 6 = 13$  ans,  $9 + 6 = 15$  ans, et  $13 + 6 = 19$  ans. La somme des âges filiaux sera donc  $13 + 15 + 19 = 47$  ans, ce qui est bien l'âge qu'aura le père.

Retour au sommaire : page 1

### 3.21 Problème u

Trouver un nombre dont la somme des quotients par 5, 7 et 9 soit égale à 429.

*Solution.* **Mise en équation :** Notons  $x$  ce nombre. Les quotients demandés sont  $\frac{x}{5}$ ,  $\frac{x}{7}$  et  $\frac{x}{9}$ . La condition demandée est donc

$$\frac{x}{5} + \frac{x}{7} + \frac{x}{9} = 429$$

**Résolution de l'équation :** On multiplie toute l'égalité précédente par  $5 \times 7 \times 9 = 315$  pour éliminer les dénominateurs :

$$315 \left( \frac{x}{5} + \frac{x}{7} + \frac{x}{9} \right) = 429 \times 315$$

D'où :

$$\frac{315x}{5} + \frac{315x}{7} + \frac{315x}{9} = 429 \times 315$$

Comme  $315 = 5 \times 63 = 7 \times 45 = 9 \times 35$ , cela devient

$$63x + 45x + 35x = 429 \times 315$$

puis

$$143x = 429 \times 315$$

et enfin

$$x = \frac{429 \times 315}{143}$$

Cependant,  $429 = 143 \times 3$ , donc on peut simplifier :

$$x = \frac{143 \times 3 \times 315}{143} = 3 \times 315 = 945$$

Le nombre recherché est donc forcément 945.

**Vérification :** Il reste à vérifier que 945 est bien solution du problème (on a montré que c'était la seule solution possible, mais pas forcément que c'était une solution). On calcule les quotients de l'énoncé :

— Le quotient par 5 est  $945 \div 5 = 189$ .

— Le quotient par 7 est  $945 \div 7 = 135$ .

— Le quotient par 9 est  $945 \div 9 = 105$ .

La somme de ces trois nombres est  $189 + 135 + 105 = 429$ , ce qui est la condition demandée. On a bien

$$945 \div 5 + 945 \div 7 + 945 \div 9 = 429$$

Retour au sommaire : page 1

### 3.22 Problème v

Développer les produits suivants :

$$(x - 1)(x + 1)$$

$$(x - 1)(x^2 + x + 1)$$

$$(x - 1)(x^3 + x^2 + x + 1)$$

En déduire une formule générale. En déduire que

$$x^n + x^{n-1} + \dots + x^2 + x + 1 = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

*Solution.* On développe :

$$\begin{aligned} (x - 1)(x + 1) &= xx + x \times 1 - 1 \times x - 1 \times 1 \\ &= x^2 + x - x - 1 \\ &= x^2 - 1 \end{aligned}$$

Puis :

$$\begin{aligned} (x - 1)(x^2 + x + 1) &= xx^2 - 1 \times x^2 + xx + x \times 1 - 1 \times x - 1 \times 1 \\ &= x^3 - x^2 + x^2 + x - x - 1 \\ &= x^3 - 1 \end{aligned}$$

Et :

$$\begin{aligned}
 (x-1)(x^3+x^2+x+1) &= xx^3 - 1 \times x^2 + xx^2 \\
 &\quad - 1 \times x^2 + xx + x \times 1 - 1 \times x - 1 \times 1 \\
 &= x^4 - x^3 + x^3 - x^2 + x^2 + x - x - 1 \\
 &= x^4 - 1
 \end{aligned}$$

En général, on en tire :

$$\begin{aligned}
 (x-1) &\times (x^n + x^{n-1} + \dots + x^2 + x + 1) \\
 &= xx^n - 1 \times x^{n-1} + xx^{n-1} - 1 \times x^{n-1} \\
 &\quad + \dots + xx^2 - 1 \times x^2 + xx + x \times 1 - 1 \times x - 1 \times 1 \\
 &= x^{n+1} - x^n + x^n - x^{n-1} + \dots + x^3 - x^2 + x^2 - x + x - 1 \\
 &= x^{n+1} - 1
 \end{aligned}$$

En divisant par  $x-1$  les deux termes de cette égalité, il vient :

$$x^n + x^{n-1} + \dots + x^2 + x + 1 = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

Retour au sommaire : page 1

### 3.23 Problème w

[Utiliser l'exercice précédent] Conte classique : un sage demande à un roi de le payer en mettant une pièce sur la première case d'un échiquier, puis deux pièces sur la seconde, puis quatre pièces, et ainsi de suite sur les soixante-quatre cases en doublant à chaque nouvelle case le montant. Déterminer la somme reçue. En utilisant l'approximation  $2^{10} \sim 1000$ , en donner un ordre de grandeur.

*Solution.* La première case contient une pièce, la case 2 contient 2 pièces, la case 3 contient  $2 \times 2 = 2^2$  pièces, la case 4 contient  $2 \times 2^2 = 2^3$  pièces. On en déduit successivement que la case numéro  $k$  contient  $2^{k-1}$  pièces. Le montant total  $N$  est alors :

$$N = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^63.$$

L'exercice précédent permet de simplifier

$$N = \frac{2^{64} - 1}{2 - 1} = 2^{64} - 1.$$

En ordre de grandeur, on a  $2^{64} = 2^4 \times 2^{60} = 2^4 \times (2^{10})^6 \sim 16 \times 1000^6 = 16 \cdot 10^{18} \sim 2 \times 10^{19}$ . Il y a donc environ  $2 \cdot 10^{19}$  pièces au total sur l'échiquier (c'est-à-dire vingt milliards de milliards).

**Remarque :** Un calcul exact donnerait  $N = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,615$ . L'erreur commise par notre ordre de grandeur est donc de l'ordre de 13%.

Retour au sommaire : page 1

### 3.24 Problème x

Un cercle délimite deux régions du plan : l'intérieur et l'extérieur. Deux cercles peuvent en déterminer quatre. S'en convaincre par un dessin. Que dire du nombre maximal de régions délimitées par trois cercles ? Que se passe-t-il pour quatre ? Trouver une formule générale. Retour au sommaire : page 1

### 3.25 Problème y

Si on coupe un disque par une corde, on délimite deux régions. Une deuxième corde délimite alors quatre régions. Généraliser. Retour au sommaire : page 1

### 3.26 Problème z

Un nombre entier  $N$  est dit *pratique* si chaque entier entre 1 et  $N$  peut être écrit comme une somme de diviseurs de  $N$  (sans répétition). Par exemple, 6 est pratique car ses diviseurs sont 1, 2, 3 et 6 et que :

$$1 = 1$$

$$2 = 2$$

$$3 = 1 + 2$$

$$4 = 1 + 3 \text{ (mais } 2+2 \text{ ne serait pas autorisé)}$$

$$5 = 2 + 3$$

$$6 = 6$$

Déterminer les nombres pratiques jusqu'à 30.

Montrer que toute puissance de 2 est pratique (Penser à l'écriture en base 2).