# Relapse−related mortality − PTCy vs CNI + MTX/MMF

k = 34, N = 11 121, . = 0.08




| | PTCy events/N | Comparator events/N | Weight (%) |
|---|---|---|---|
| Bayesian pooled (M1) | – | – | – |
| Kunacheewa C (2020) | 4/21 | 1/21 | 0.3 |
| Khimani F (2021) | 12/75 | 7/89 | 1.5 |
| Blaise D (2016) | 6/31 | 5/47 | 0.9 |
| Yoshimitsu M (2025) | 30/121 | 16/91 | 3.2 |
| Otoukesh S (2024) | 6/64 | 13/205 | 1.4 |
| Desai N (2025) | 20/78 | 39/210 | 3.8 |
| Berger M (2022) | 8/40 | 6/39 | 1.1 |
| Barkhordar (2022) | 19/78 | 8/40 | 1.7 |
| Barkhordar M (2022) | 19/78 | 8/40 | 1.7 |
| Koura D (2025) | 2/25 | 1/15 | 0.2 |
| Doppelhammer (2019) | 9/34 | 8/34 | 1.2 |
| Xu ZL (2025) | 10/122 | 19/230 | 2.3 |
| Mushtaq MU (2024) | 22/176 | 35/276 | 4.5 |
| Curtis DJ (2025) | 8/66 | 9/68 | 1.4 |
| Yanada M (2026) | 22/241 | 86/848 | 6.0 |
| Baker M (2016) | 16/54 | 19/59 | 2.3 |
| Wieduwilt (2022) | 64/393 | 293/1627 | 16.6 |
| Raj K (2022) | 35/415 | 137/1414 | 9.7 |
| Cooper DL (2021) | 7/49 | 7/41 | 1.1 |
| Fuchs EJ (2021) | 46/182 | 55/186 | 6.9 |
| Bolanos−Meade J (2023) | 19/214 | 24/217 | 3.6 |
| Tang F (2020) | 3/44 | 16/176 | 0.9 |
| Baron F (2024) | 47/270 | 47/209 | 7.1 |
| Wang T (2022) | 4/52 | 3/29 | 0.6 |
| Ahmed S (2019) | 24/139 | 110/457 | 6.1 |
| Salas (2022) | 27/200 | 27/130 | 4.2 |
| Sharaf El−Deen MO (2024) | 3/89 | 5/90 | 0.7 |
| Luznik L (2022) | 13/109 | 22/114 | 2.6 |
| Cao J (2022) | 7/40 | 11/40 | 1.3 |
| Meyer T (2025) | 9/68 | 24/97 | 2.1 |
| Montoro J (2021) | 6/91 | 6/38 | 1.0 |
| Guo W (2026) | 1/30 | 3/31 | 0.3 |
| Metafuni E (2018) | 4/67 | 5/30 | 0.8 |
| Jia Y (2025) | 5/87 | 7/40 | 1.0 |

Study rows: raw per−study OR with Wald 95% CI (0·5 correction for zero cells). Weights: REML inverse−variance. Diamond: Bayesian pooled (M1).