Chronic GVHD mod−severe − PTCy vs CNI + MTX/MMF

k = 18, N = 2 762, . = 0.97



	PTCy events/N	Comparator events/N	Weight (%)
Bayesian pooled (M1)	–	–	–
Montoro J (2021)	29/91	1/38	2.7
Baker M (2016)	14/54	12/59	7.2
Tischer J (2015)	2/27	2/28	2.7
Shouman MT (2023)	9/67	9/57	6.5
Kara (2021)	3/14	5/20	3.8
Mushtaq MU (2024)	62/176	125/276	10.2
Kwon M (2019)	8/57	13/50	6.6
Ueda Oshima M (2023)	14/44	221/414	8.5
Bolanos−Meade J (2023)	14/208	35/212	8.6
Hassan K (2025)	8/36	35/71	7.0
Redondo S (2023)	4/28	22/59	5.5
Meyer T (2025)	16/68	51/97	8.4
Iqbal M (2023)	5/29	42/87	6.2
Guo W (2026)	2/30	8/31	3.7
Esquirol A (2020)	1/30	7/47	2.5
Cao J (2022)	1/40	5/40	2.4
Redondo S (2024)	5/81	20/58	6.2
Koura D (2025)	0/24	8/14	1.5

Study rows: raw per−study OR with Wald 95% CI (0·5 correction for zero cells). Weights: REML inverse−variance. Diamond: Bayesian pooled (M1).