
Tabuľka 1 Pravidelné a nepravidelné schémy očkovania

Tabuľku je potrebné používať spoločne s textom a vysvetlivkami pod tabuľkou.



vek pre pravidelné očkovanie

vek pre očkovanie pri premeškaní

Minimálny vek očkovania

**** vakcína s obsahom 20 µg HbsAg**

*****dávka VHB sa podá, iba ak nie je dostupná kombinovaná vakcína bez VHB zložky**

HBsAg pozitívna matka* - súčasne s 1. dávkou sa podáva HBIG (hyperimúnny špecifický ľudský imunoglobulín)

DTaP = vakcíny s vyšším obsahom diftériového a pertusového toxoidu

Tdap = vakcíny s nižším obsahom diftériového a pertusového toxoidu

d = dávka základného očkovania, p = dávka preočkovania

Tabuľka 2 Schéma očkovania pri začatí očkovania v neskoršom veku ako je určený vek

Poradie dávky a typ vakcíny		*Minimálny interval*	*Poznámka*
Dieťa vo veku 1 - 2 roky			
1. DTaP+IPV+VHB+Hib			
2. DTaP+IPV+VHB+/-(Hib)		4 týždne	odporúčaný interval: 2 mesiace s/bez Hib zložky
3. DTaP+IPV+VHB		6 mesiacov	odporúčaný interval: 6 mesiacov bez Hib zložky
1. MMR			očkovanie od 15. mesiaca veku kedykoľvek
PCV	A alternatíva 1. PCV 13	2 dávky od 1 roka do 2 rokov v odstupe minimálne 2 mesiace	od 2 rokov veku jedna dávka
	B alternatíva 1. PCV10	2 dávky od 1 roka do 2 rokov v odstupe minimálne 2 mesiace	od 2 rokov veku jedna dávka
Dieťa vo veku 3 - 4 roky			
1. DTaP+IPV+VHB+Hib			
2. DTaP+IPV+VHB+/-(Hib)		4 týždne	odporúčaný interval: 2 mesiace s/bez Hib zložky
3. DTaP+IPV a samostatná VHB		5 mesiacov (VHB) 6 mesiacov (DTaP)	odporúčaný interval: 6 mesiacov
PCV	1. PCV13		
	1. PCV10		možno podať do veku 5 rokov
1. MMR			kedykoľvek
2. MMR		4 týždne	odporúčaný interval: 6 mesiacov druhá dávka v 5. roku života
Dieťa vo veku 5 - 6 rokov			
1. DTaP+IPV a samostatná VHB			
2. DTaP+IPV a samostatná VHB		4 týždne	odporúčaný interval: 2 mesiace

3. DTaP+IPV a samostatná VHB	5 mesiacov (VHB) 6 mesiacov (DTaP)	odporúčaný interval: 6 mesiacov
4. DTaP+IPV	6 - 12 mesiacov	preočkovanie – 4. dávka Td
1. MMR		kedykoľvek
2. MMR	4 týždne	odporúčaný interval: 6 mesiacov
Dieťa od 7 rokov		
1. Tdap+IPV a samostatná VHB		
2. A. alternatíva: Td a samostatná IPV a samostatná VHB B. alternatíva: Tdap+IPV a samostatná VHB	4 týždne	odporúčaný interval: 2 mesiace prvá oficiálne odporúčaná alternatíva je komplikovaná nedostupnosťou samostatnej IPV vakcíny
3. A. alternatíva: Td a samostatná IPV a samostatná VHB B. alternatíva: Tdap+IPV a samostatná VHB	5 mesiacov (VHB) 6 mesiacov (DTaP)	odporúčaný interval: 6 mesiacov prvá oficiálne odporúčaná alternatíva je komplikovaná nedostupnosťou samostatnej IPV vakcíny
4. Td a samostatná IPV	6 – 12 mesiacov	najvhodnejšie v 13. roku
1. MMR		kedykoľvek
2. MMR	4 týždne	odporúčaný interval: 6 mesiacov