

# SUPPORT PENTRU CURSUL 7

## Funcții vectoriale de mai multe variabile

### Limite și continuitate

15 noiembrie

## 1 Funcții vectoriale de mai multe variabile reale

Fie  $n$  și  $p$  numere naturale nenule,  $p \geq 2$ , și fie  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ . Numim *funcție vectorială definită pe  $A$* , orice triplet  $f = (A, \mathbb{R}^p, \Gamma)$ , unde  $\Gamma \subseteq A \times \mathbb{R}^p$  are proprietatea că pentru orice  $x \in A$  există un unic  $b \in \mathbb{R}^p$  astfel încât  $(x, b) \in \Gamma$ . Ca în cazul funcțiilor reale, convenim ca acel unic  $b \in \mathbb{R}^p$ , cu proprietatea că  $(x, b) \in \Gamma$ , să îl notăm prin  $f(x)$  și să-l numim valoarea funcției  $f$  în  $x$ . Deoarece  $f(x) = b \in \mathbb{R}^p$ , lui  $b$  îi putem atașa coordonatele  $b_1, \dots, b_p$ . Cu ajutorul acestor  $p$  coordonate putem construi  $p$  funcții scalare astfel: pentru fiecare  $i \in \{1, \dots, p\}$ , considerăm funcția  $f_i : A \rightarrow \mathbb{R}$  cu proprietatea că, dacă  $x \in A$  și  $f(x) = b = (b_1, \dots, b_p)$ , atunci  $f_i(x) = b_i$ , pentru fiecare  $i \in \{1, \dots, p\}$ . În cele ce urmează vom indica mai precis modul în care se construiesc funcțiile  $f_i$ ,  $i \in \{1, \dots, p\}$ .

**Funcțiile de proiecție. Componentele scalare ale unei funcții vectoriale.** Fie  $p$  și  $j$  numere naturale,  $0 < j \leq p$ .

DEFINIȚIE. Funcția  $pr_j : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ , dată prin

$$pr_j(x) = x_j, \text{ pentru orice } x = (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p,$$

se numește *proiectorul sau funcția de proiecție pe axa  $j$* .

**Componentele scalare ale unei funcții vectoriale.** Fie  $n$  și  $p$  numere naturale nenule, fie  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  și fie funcția  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$ .

DEFINIȚIE. Funcțiile

$$f_j = pr_j \circ f, \quad j \in \{1, \dots, p\},$$

se numesc *componentele scalare ale funcției vectoriale  $f$* .

Pentru a pune în evidență componentele scalare ale funcției  $f$  vom folosi notația  $f = (f_1, \dots, f_p)$ . Această notație este foarte sugestivă, ea atrăgând atenția asupra faptului că, de fapt, a defini o funcție vectorială de la  $A$  la  $\mathbb{R}^p$  revine la a defini  $p$  funcții reale pe  $A$ .

EXEMPLU. Fie funcția  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,

$$f(x_1, x_2) = (1 + x_1 + x_2, x_1, x_2 - x_1) \text{ pentru orice } (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Funcțiile:

$$f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f_1(x_1, x_2) = 1 + x_1 + x_2, \text{ pentru orice } (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2,$$

$$f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f_2(x_1, x_2) = x_1, \text{ pentru orice } (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2,$$

și

$$f_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f_3(x_1, x_2) = x_2 - x_1, \text{ pentru orice } (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2,$$

constituie componentele scalare ale funcției  $f$ .

## 2 Limita unei funcții vectoriale într-un punct

În acest paragraf vom extinde noțiunea de limită pentru funcții vectoriale de variabile reale și vom arăta legătura cu limita unei funcții reale de mai multe variabile reale.

**Limita unei funcții vectoriale într-un punct.** Fie  $n$  și  $p$  numere naturale nenule, fie  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  și fie  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$  o funcție vectorială. Un element  $\lambda \in \mathbb{R}^p$  se numește *limită a funcției  $f$  în punctul  $x^0 \in A'$* , dacă oricare ar fi  $V$  o vecinătate a lui  $\lambda$ , există o vecinătate  $U$  a lui  $x^0$  astfel încât  $f(x) \in V$  pentru orice  $x \in U \cap A$ .

**Reducerea calculului limitei unei funcții vectoriale la calculul limitelor componentelor sale scalare.** Un rezultat important, legat de calculul limitei unei funcții vectoriale, este cel ce urmează.

**Teorema 2.1** *O condiție necesară și suficientă pentru ca  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p$  să fie limită funcției  $f = (f_1, \dots, f_p) : A \rightarrow \mathbb{R}^p$  în punctul  $a \in A'$  este ca*

$$\lambda_j = \lim_{x \rightarrow a} f_j(x), \text{ pentru fiecare } j \in \{1, \dots, p\}. \quad (1)$$

*Demonstrația* este imediată dacă se aplică teorema lui Heine și teorema de reducere a calculului limitei unui șir la calculul limitelor șirurilor coordonatelor.

Vom aminti o teoremă utilă în calculul limitei unei funcții de mai multe variabile.

**Teorema 2.2** *Fie  $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $E \subseteq \mathbb{R}^p$  și fie funcțiile  $f : D \rightarrow E$  și  $g : E \rightarrow \mathbb{R}^q$ . Dacă  $x^0 \in E'$ , există  $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = y^0$ ,  $y^0 \in E'$ , există  $\lim_{y \rightarrow y^0} g(y) = \lambda$  și  $f(x) \neq y^0$ , oricare ar fi  $x \in D$ , atunci funcția  $g \circ f$  admite limită în  $x^0$  și  $\lim_{x \rightarrow x^0} (g \circ f)(x) = \lambda$ .*

*Demonstrație\**. Fie  $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$  un șir cu elemente din  $D \setminus \{x^0\}$ , convergent la  $x^0$ . În baza teoremei lui Heine, șirul  $(f(x_k))_{k \in \mathbb{N}}$  are limită și

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = y^0. \quad (2)$$

Să considerăm acum șirul  $(y_k)_{k \in \mathbb{N}}$ , cu  $y_k = f(x_k)$ , pentru fiecare  $k \in \mathbb{N}$ . Deoarece  $f(x) \neq y^0$ , oricare ar fi  $x \in E$ , deducem că  $y_k \neq y^0$ , oricare ar fi  $k \in \mathbb{N}$ . Aplicând din nou teorema lui Heine, de această dată pentru funcția  $g$ , deducem că

$$\lim_{k \rightarrow \infty} g(y_k) = \lambda. \quad (3)$$

Ținând cont de (2) și (3), obținem

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (g \circ f)(x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} g(f(x_k)) = \lim_{k \rightarrow \infty} g(y_k) = \lambda. \diamond$$

EXEMPLU. Să se calculeze

$$\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} \frac{x_1 x_2}{\sqrt{x_1 x_2 + 1} - 1}.$$

Considerăm mulțimea  $D = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 x_2 + 1 \geq 0, x_1 \neq 0, x_2 \neq 0\}$ , funcția  $f : D \rightarrow \mathbb{R}^*$ ,  $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$ , oricare ar fi  $(x_1, x_2) \in D$ . De asemenea considerăm mulțimea  $E = \{t \in \mathbb{R} \mid t > -1, t \neq 0\}$  și funcția  $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(t) = \frac{t}{\sqrt{t+1}-1}$ , oricare ar fi  $t \in E$ .

Observăm că  $(0, 0) \in D'$ . Funcția  $f$  are limită în punctul  $(0, 0)$  și  $\lim_{(x_1, x_2) \rightarrow \{0,0\}} x_1 x_2 = 0$ . Cum  $0 \in E'$ ,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sqrt{t+1}-1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(\sqrt{t+1}+1)}{t+1-1} = \lim_{t \rightarrow 0} (\sqrt{t+1}+1) = 2$$

și  $f(x_1, x_2) \neq 0$ , oricare ar fi  $(x_1, x_2) \in D$ , în baza teoremei 2.2 avem

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{x_1 x_2}{\sqrt{x_1 x_2 + 1} - 1} = 2.$$

### 3 Noțiunea de funcție continuă într-un punct

Fie  $A$  o submulțime nevidă a lui  $\mathbb{R}^n$ .

DEFINIȚIE. Funcția  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$  se numește *continuă în punctul*  $a \in A$ , dacă oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există  $\delta > 0$  cu proprietatea că

$$\|f(x) - f(a)\|_p < \varepsilon, \text{ oricare ar fi } x \in A, \text{ cu } \|x - a\|_n < \delta. \quad (4)$$

OBSERVAȚIA 3.1. Din definiție deducem imediat că:

- (a) Orice funcție este continuă în orice punct izolat al domeniului său de definiție.
- (b) Analizând definiția limitei unei funcții într-un punct și definiția funcției continue într-un punct, rezultă că o funcție este continuă într-un punct din domeniul său de definiție, punct care este punct de acumulare al domeniului de definiție, dacă și numai dacă are limită în acel punct și limita funcției este egală cu valoarea funcției în acel punct.
- (c) Nu se pune problema continuității unei funcții în puncte care nu aparțin domeniului de definiție al funcției.

OBSERVAȚIA 3.2. În baza punctelor a) și b) din observația precedentă și a teoremei de reducere a calculului limitei unei funcții vectoriale la calculul limitelor componentelor sale scalare, deducem că o funcție  $f = (f_1, \dots, f_p) : A \rightarrow \mathbb{R}^p$  este continuă într-un punct  $a \in A$  dacă și numai dacă componentele sale scalare  $f_1, \dots, f_p$  sunt continue în acel punct.

OBSERVAȚIA 3.3. Fie funcția  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$  și fie  $a \in A$ . În baza punctelor a) și b) din observația 3.1 și a criteriului lui Heine de existență a limitei unei funcții într-un punct, deducem:

a) funcție  $f$  este continuă în  $a$  dacă și numai dacă oricare ar fi un șir  $(x_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  cu elemente din  $A$ , convergent la  $a$ , avem  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = f(a)$ ;

b) dacă există un șir  $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$  cu elemente din  $A$ , convergent la  $a$ , pentru care șirul  $(f(x_k))_{k \in \mathbb{N}}$  nu este convergent sau limita sa nu este egală cu  $f(a)$ , atunci  $f$  nu este continuă în  $a$ .

EXEMPLUL 3.1. Fie  $D = (0, +\infty) \times \mathbb{R} \cup \{(-1, 0), (0, 0)\}$  și funcția  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) = (-1, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \\ \frac{y}{x}, & (x, y) \in (0, +\infty) \times \mathbb{R}. \end{cases}$$

Deoarece  $(-1, 0)$  este un punct izolat al mulțimii de definiție a funcției,  $f$  va fi continuă în  $(-1, 0)$ . Întrucât pentru șirul  $(1/k, 1/k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ , convergent către  $(0, 0) \in D'$ , avem

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right) = 1 \neq 0 = f(0, 0),$$

$f$  nu va fi continuă în  $(0, 0)$ . Fie  $(x^*, y^*) \in (0, +\infty) \times \mathbb{R}$ . Oricare ar fi  $(x_k, y_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  un șir cu termeni din  $D$ , convergent către  $(x^*, y^*)$ , va exista un rang  $k_0$  de la care începând vom avea  $x_k \neq 0$ ; deci are sens  $\frac{y_k}{x_k}$ , oricare ar fi  $k \in \mathbb{N}$ ,  $k \geq k_0$ . Obținem

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k, y_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{y_k}{x_k} = \frac{y^*}{x^*} = f(x^*, y^*).$$

În baza observației 3.3, rezultă că  $f$  este continuă în  $(x^*, y^*)$ . Deci  $f$  este continuă în fiecare punct din  $D \setminus \{(0, 0)\}$  și discontinuă în punctul  $(0, 0)$ .

EXEMPLUL 3.2. Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Considerând șirurile  $(\frac{1}{k}, 0)_{k \in \mathbb{N}^*}$  și  $(0, \frac{1}{k})_{k \in \mathbb{N}^*}$ , avem

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k}, 0\right) = (0, 0) \quad \text{și} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{k}, 0\right) = 1$$

și

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(0, \frac{1}{k}\right) = (0, 0) \quad \text{și} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f\left(0, \frac{1}{k}\right) = -1$$

Deci nu există  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ . Cum  $(0, 0)$  este punct de acumulare al lui  $\mathbb{R}^2$  rezultă, în baza observației 3.1, că  $f$  nu este continuă în  $(0, 0)$ .

EXEMPLUL 3.3. Fie funcția  $f = (f_1, f_2) : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $f(x) = (\ln x^2, \sin x)$ , pentru fiecare  $x \in \mathbb{R}^*$ . Deoarece funcțiile:

$f_1 : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_1(x) = \ln x^2$ , pentru fiecare  $x \in \mathbb{R}^*$

și

$f_2 : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_2(x) = \sin x$ , pentru fiecare  $x \in \mathbb{R}^*$

sunt continue în fiecare punct din mulțimea de definiție, rezultă, în baza observației 3.2, că  $f$  este continuă în fiecare punct din  $\mathbb{R}^*$ .

EXEMPLUL 3.4. Fie funcția  $f = (f_1, f_2) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,

$$f(x) = \begin{cases} (\ln x^2, \sin x), & \text{dacă } x \in \mathbb{R}^* \\ (3, 0), & \text{dacă } x = 0. \end{cases}$$

Deoarece  $\lim_{x \rightarrow 0} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \ln x^2 = -\infty$ , rezultă că  $f_1$  nu este continuă în 0 și deci, în baza observației 3.2, funcția  $f$  nu este continuă în 0.

Majoritatea funcțiilor care descriu anumite relații existente în natură sunt funcții continue în fiecare punct din domeniul de definiție. În mecanica clasică, conform principiului perfecte localizări, se face ipoteza că spațiul, viteza și accelerația sunt funcții continue de timp (se exclude cazul ciocnirilor). Există însă și fenomene cărora li se atașează funcții care nu sunt continue. De exemplu, funcția care exprimă variația volumului unui corp solid în funcție de temperatură este o funcție discontinuă în punctul corespunzător temperaturii de topire (vezi *Compendiu de fizică*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1988, pag. 342). La fel, considerând funcția care exprimă alungirea relativă  $\frac{\Delta l}{l_0}$  a unei bare de lungime  $l_0$  și secțiune normală  $S$  în funcție de efortul unitar  $\sigma = \frac{|\vec{F}|}{S}$ , această funcție va fi discontinuă în punctul  $F$  de rupere (vezi ibidem, pag. 144-145). De asemenea, să luăm un fir material ideal, fixat într-un punct, fir asupra căruia acționează o forță  $\vec{F}$ . Forța va crea în fir o tensiune  $\vec{T}$ . Dacă considerăm funcția care exprimă variația modulului tensiunii în funcție de forță, se obține o funcție discontinuă într-un punct și anume, în punctul corespunzător valorii forței ce rupe firul căci, după rupere, modulul tensiunii în fir va fi egal cu 0.

## 4 Proprietăți ale funcțiilor continue într-un punct

**Teorema 4.1** (*Proprietatea funcției continue într-un punct de a păstra semnul*).

*Dacă funcția  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  este continuă în punctul  $a \in A$  și dacă  $f(a) \neq 0$ , atunci există un  $r > 0$  astfel încât*

$$\operatorname{sgn}(f(x)) = \operatorname{sgn}(f(a)), \forall x \in A \cap B(a, r).$$

*Demonstrație\**. Aplicând definiția continuității și luând  $\varepsilon = \frac{|f(a)|}{2}$ , deducem că există un  $\delta > 0$  astfel încât

$$|f(x) - f(a)| < \frac{|f(a)|}{2}, \text{ oricare ar fi } x \in A, \|x - a\|_n < \delta.$$

Relația poate fi rescrisă sub forma

$$f(a) - \frac{|f(a)|}{2} < f(x) < f(a) + \frac{|f(a)|}{2}, \text{ oricare ar fi } x \in A, \|x - a\|_n < \delta. \quad (5)$$

Dacă  $f(a) > 0$ , avem  $|f(a)| = f(a)$  și din (5) obținem

$$0 < \frac{f(a)}{2} < f(x), \text{ oricare ar fi } x \in A, \|x - a\|_n < \delta.$$

Dacă  $f(a) < 0$ , avem  $|f(a)| = -f(a)$  și din (5) obținem

$$f(x) < \frac{f(a)}{2} < 0, \text{ oricare ar fi } x \in A, \|x - a\|_n < \delta.$$

Deci, în ambele cazuri semnul lui  $f(x)$  este același cu semnul lui  $f(a)$  pentru orice  $x \in A$ , cu  $\|x - a\|_n < \delta$ .

**Consecința 4.2** *Să observăm că, dacă funcția  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  este continuă în punctul  $a \in A$  și dacă oricare ar fi numărul real  $r > 0$  există punctele  $u$  și  $v$  în  $B(a, r) \cap A$  astfel încât  $f(u) \cdot f(v) < 0$ , atunci  $f(a) = 0$ .*

Fără dificultate se poate demonstra că mulțimea funcțiilor continue într-un punct formează un spațiu vectorial real. În plus mai avem următorul rezultat important:

**Teorema 4.3** *Dacă  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  și  $B \subseteq \mathbb{R}^p$  și dacă funcția  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow B$  este continuă în punctul  $a \in A$  și funcția  $g : B \rightarrow \mathbb{R}^q$  este continuă în punctul  $b = f(a) \in B$ , atunci funcția  $g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}^q$  este continuă în  $a$ .*

## 5 Proprietăți ale funcțiilor continue pe o mulțime

Fie  $A$  o submulțime nevidă a spațiului  $\mathbb{R}^n$  și fie  $E$  o submulțime nevidă a lui  $A$ .

**DEFINIȚIE.** *Funcția  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$  se numește continuă pe  $E$  dacă  $f$  este continuă în fiecare punct din  $E$ .*

În cazul în care  $E = A$ , convenim să spunem simplu că  $f$  este continuă, subînțelegându-se prin aceasta că  $f$  este continuă pe tot domeniul său de definiție.

**EXEMPLUL 5.1.** Fie  $c \in \mathbb{R}^n$  și fie funcția liniară  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \langle c, x \rangle, \text{ pentru fiecare } x \in \mathbb{R}^n.$$

Fie  $x^0 \in \mathbb{R}^n$ . Vom arăta că  $f$  este continuă în  $x^0$ . Avem

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x^0)| &= \left| \sum_{j=1}^n c_j (x_j - x_j^0) \right| \leq \\ &\leq \sum_{j=1}^n |c_j| \cdot |x_j - x_j^0| \leq \\ &\leq (\max\{|c_j| \mid j \in \{1, \dots, n\}\}) \cdot \sum_{j=1}^n |x_j - x_j^0| \end{aligned} \quad (6)$$

Dacă notăm  $d = \max\{|c_1|, \dots, |c_n|\}$ , atunci avem

$$|f(x) - f(x^0)| \leq d \sum_{j=1}^n |x_j - x_j^0|. \quad (7)$$

Fie acum  $\delta > 0$ . Condiția  $\|x - x^0\|_n < \delta$ , echivalentă cu

$$\sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j - x_j^0)^2} < \delta,$$

implică  $|x_j - x_j^0| < \delta$ , oricare ar fi  $j \in \{1, \dots, n\}$ . Ca urmare, luând, pentru orice număr real  $\varepsilon > 0$ ,  $\delta_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{2n \cdot d}$  și ținând cont de (7), vom avea  $|f(x^0) - f(x)| \leq dn \frac{\varepsilon}{2n \cdot d} < \varepsilon$ , oricare ar fi  $x \in \mathbb{R}^n$ , cu  $\|x - x^0\|_n < \delta_\varepsilon$ . Deci  $f$  este continuă în  $x^0$ . Cum  $x^0 \in \mathbb{R}^n$  a fost ales oarecare, deducem că  $f$  este continuă pe  $\mathbb{R}^n$ .

## 5.1 Funcții continue pe mulțimi compacte

Reamintim că, o submulțime  $M$  a lui  $\mathbb{R}^n$  o numim compactă dacă este mărginită și închisă. Uneori este utilă următoarea caracterizare a acestor mulțimi.

**Teorema 5.1** *Mulțimea  $M \subseteq \mathbb{R}^n$  este compactă dacă și numai dacă oricare ar fi un șir  $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$  cu elemente din  $M$ , el conține un subșir  $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$  convergent și  $\lim_{j \rightarrow \infty} x_{k_j} \in M$ .*

În continuare vom prezenta câteva proprietăți deosebit de importante ale funcțiilor continue pe mulțimi compacte.

**Teorema 5.2** . *Dacă  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  este o mulțime compactă și funcția  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$  este o funcție continuă pe  $A$ , atunci  $f(A)$  este o mulțime compactă.*

*Demonstrație.* Va fi suficient să arătăm că oricare ar fi  $(y_k)_{k \in \mathbb{N}}$  un șir cu elemente din  $f(A)$ , el are un subșir convergent la un element din  $f(A)$ .

Fie deci  $(y_k)_{k \in \mathbb{N}}$  un șir cu elemente din  $f(A)$ . Pentru fiecare  $k \in \mathbb{N}$ , din  $y_k \in f(A)$ , deducem că există  $x_k \in A$  astfel încât  $f(x_k) = y_k$ . Deoarece  $A$  este o mulțime mărginită, șirul  $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$  va fi un șir mărginit. El conține un subșir  $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$  convergent. Fie  $a = \lim_{j \rightarrow \infty} x_{k_j}$ . Deoarece  $A$  este mulțime închisă, avem  $a \in A$ .

Cum  $a \in A$ , funcția  $f$  este continuă pe  $A$ , deci implicit și în  $a$ , și șirul  $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$  converge către  $a$ , șirul  $f(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$  este convergent și  $\lim_{j \rightarrow \infty} f(x_{k_j}) = f(a)$ . Ținând cont de faptul că  $f(x_{k_j}) = y_{k_j}$ , pentru fiecare  $j \in \mathbb{N}$ , deducem că șirul  $(y_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$  este convergent și

$$\lim_{j \rightarrow \infty} y_{k_j} = \lim_{j \rightarrow \infty} f(x_{k_j}) = f(a). \diamond$$

Ținând cont de faptul că orice submulțime compactă a lui  $\mathbb{R}^p$  este mărginită, în baza teoremei 5.2 obținem:

**Teorema 5.3** . *Dacă  $A$  este o submulțime compactă a lui  $\mathbb{R}^n$  și dacă  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$  este o funcție continuă pe  $A$ , atunci funcția  $f$  este mărginită.*

*Demonstrație.* În conformitate cu teorema 5.2, mulțimea  $f(A)$  este mărginită. Atunci, în conformitate cu definiția funcției mărginite,  $f$  este mărginită pe  $A$ .  $\diamond$

**Teorema 5.4** . Dacă  $A$  este o submulțime compactă a lui  $\mathbb{R}^n$  și funcția  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  este continuă, atunci  $f$  își atinge marginile, adică există cel puțin un punct  $x' \in A$  astfel încât

$$f(x') = \max\{f(x) \mid x \in A\}$$

și există cel puțin un punct  $x'' \in A$  astfel încât

$$f(x'') = \min\{f(x) \mid x \in A\}.$$

*Demonstrație.* Vom da demonstrația pentru existența maximului. Analog se demonstrează existența minimului.

Din teorema 5.3, deducem că există  $\mu = \sup\{f(x) \mid x \in A\}$ . Să presupunem, prin absurd, că minimul nu este atins. Atunci vom avea  $f(x) < \mu$ , oricare ar fi  $x \in A$ . Să construim funcția  $g : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$g(x) = \frac{1}{\mu - f(x)}, \quad \forall x \in A.$$

Evident  $g(x) > 0$ , oricare ar fi  $x \in A$ . Funcția  $g$  este continuă pe  $A$ . Deci va fi mărginită. Fie  $\nu = \sup\{g(x) \mid x \in A\}$ . Avem

$$0 < \frac{1}{\mu - f(x)} \leq \nu, \quad \forall x \in A.$$

De aici deducem că

$$f(x) \leq \mu - \frac{1}{\nu}, \quad \forall x \in A,$$

ceea ce contrazice ipoteza că  $\mu = \sup\{f(x) \mid x \in A\}$ .  $\diamond$

## 5.2 Funcții uniform continue (opțional)

Fie  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ .

**DEFINIȚIE.** O funcție  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$  se numește uniform continuă pe  $A$  dacă oricare ar fi un număr real  $\epsilon > 0$ , există un număr real  $\delta > 0$  astfel încât

$$\|f(x) - f(y)\|_p < \epsilon, \quad (8)$$

oricare ar fi  $x$  și  $y$  elemente ale lui  $A$  ce satisfac condiția

$$\|x - y\|_n < \delta. \quad (9)$$

**EXEMPLUL 5.2.** . Fie funcția  $f : ]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 1/x$ , pentru fiecare  $x \in ]0, 1]$ . Funcția  $f$  nu este uniform continuă pe  $]0, 1]$  deoarece pentru  $\epsilon = 1/2$ , oricare ar fi  $\delta > 0$ , luând  $x = 1/m$  și  $y = 1/(m+1)$ , unde  $m = [1/\delta] + 1$ , avem

$$x \in ]0, 1], y \in ]0, 1], \|x - y\| = \left| \frac{1}{m} - \frac{1}{m+1} \right| < \frac{1}{m} < \delta \text{ și } \|f(x) - f(y)\| = \left| \frac{1}{m} - \frac{1}{m+1} \right| > \epsilon.$$



OBSERVAȚIA 5.1. Dacă  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  și dacă funcția  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$  este uniform continuă pe  $A$ , atunci  $f$  este continuă pe  $A$ .

Reciproca nu este în general adevărată, după cum rezultă și din exemplul 5.2. Totuși, în anumite condiții suplimentare, o funcție continuă este uniform continuă, după cum se vede în teorema care urmează.

**Teorema 5.5 .** *Dacă  $A$  este o submulțime compactă a lui  $\mathbb{R}^n$  și dacă funcția  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$  este continuă pe  $A$ , atunci  $f$  este uniform continuă pe  $A$ .*

*Demonstrație.* (nu se cere). Să presupunem că  $f$  nu este uniform continuă pe  $A$ . Exista deci un număr real  $\varepsilon_0 > 0$  cu proprietatea că pentru orice  $\delta > 0$  există  $x \in A$  și  $y \in A$  astfel încât  $\|x - y\|_n < \delta$  și cu  $\|f(x) - f(y)\|_p \geq \varepsilon$ . Luând  $\delta = 1/k$  și făcând pe  $k$  să parcurgă mulțimea  $\mathbb{N}^*$ , vom pune în evidență șirurile  $(x_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  și  $(y_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  cu elemente din  $A$ , având proprietățile

$$\|x_k - y_k\|_n < \frac{1}{k} \text{ și } \|f(x_k) - f(y_k)\|_p \geq \varepsilon_0. \quad (10)$$

Cum  $A$  este compactă, șirul  $(x_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  va avea un subșir  $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$  convergent către un element  $a \in A$ . Vom arăta că subșirul  $(y_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$  converge tot la  $a$ . Fie  $e > 0$ . Va exista un număr natural  $j_e$  astfel încât

$$\frac{1}{j_e} < \frac{e}{2}. \quad (11)$$

Pe de altă parte,  $a$  fiind limita subșirului, va exista un rang  $j_0$  astfel încât să avem

$$\|x_{k_j} - a\|_n < \frac{e}{2}, \text{ pentru orice } j \in \mathbb{N}, j \geq j_0 \quad (12)$$

Utilizând proprietățile normei putem scrie:

$$\|y_k - a\|_n = \|y_k - x_k + x_k - a\|_n \leq \|y_k - x_k\|_n + \|x_k - a\|_n, \quad (13)$$

pentru orice  $k \in \mathbb{N}^*$ . Din (10)-(13) rezultă că pentru orice rang  $j$ ,  $j \geq \max\{j_e, j_0\}$  vom avea

$$\|y_{k_j} - a\|_n \leq \|y_{k_j} - x_{k_j}\|_n + \|x_{k_j} - a\|_n < \frac{e}{2} + \frac{e}{2} = e.$$

Deci subșirul  $(y_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$  converge la  $a$ .

Deoarece  $f$  este continuă pe  $A$ , deci și în  $a$ , vom avea  $\lim_{j \rightarrow \infty} f(x_{k_j}) = f(a)$ , și  $\lim_{j \rightarrow \infty} f(y_{k_j}) = f(a)$ . Prin urmare pentru  $\varepsilon_0 > 0$  vor exista rangurile  $j'$  și  $j''$  astfel încât

$$\|f(a) - f(x_{k_j})\|_p < \frac{\varepsilon_0}{2}, \text{ pentru orice număr natural } j \geq j'$$

și

$$\|f(a) - f(y_{k_j})\|_p < \frac{\varepsilon_0}{2}, \text{ pentru orice număr natural } j \geq j''.$$

Așadar, oricare ar fi numărul natural  $j$ ,  $j \geq \max\{j', j''\}$ , avem

$$\begin{aligned} \|f(x_{k_j}) - f(y_{k_j})\|_p &\leq \|f(x_{k_j}) - f(a)\|_p + \|f(a) - f(y_{k_j})\|_p < \\ &< \frac{\varepsilon_0}{2} + \frac{\varepsilon_0}{2} = \varepsilon_0. \end{aligned}$$

Aceasta contrazice (10). Presupunerea că  $f$  n-ar fi uniform continuă este deci falsă.  $\diamond$