

UNIAVAN - Centro Universitário Avantis  
Curso: Engenharia Elétrica  
Disciplina: Análise de Sistemas Lineares

# Modelos de Sinais

Prof. Luiz Fernando M. Arruda, Me. Eng.



# Sumário

1 Degrau Unitário

2 Impulso Unitário

3 Exponencial  $e^{st}$

# Funções Especiais


As funções especiais desempenham um papel fundamental em diversas áreas da matemática aplicada e engenharia, particularmente no campo da teoria de sinais e sistemas. Entre essas funções, destacam-se:

- degrau unitário
- impulso unitário
- exponencial


# Degrau unitário $u(t)$

A função degrau unitário  $u(t)$  expressa um sinal cujo valor inicial é 0 quando  $t < 0$ , e muda para 1 em  $t > 0$ .


$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 0 \\ 1 & \text{se } t \geq 0 \end{cases}$$



Aplicação do degrau unitário em uma função exponencial





Aplicação do degrau unitário com deslocamento temporal



## Degrau unitário $u(t)$


Exemplo de um pulso retangular  $x(t)$ , descrita em termos de funções degrau, pode ser descrito como a soma de dois degraus unitários atrasados. A função degrau atrasa em  $T$  segundos  $u(t - T)$ .

$$x(t) = u(t - 2) - u(t - 4)$$





# Degrau unitário $u(t)$



Análise de um sinal dividido no tempo:



(a)



(b)



O sinal  $x(t)$  pode ser dividido em dois sinais,  $x_1(t)$  e  $x_2(t)$ . Assim,  $x_1(t)$  pode ser obtido através da multiplicação de uma rampa  $t$  pelo de grau unitário,  $u(t) - u(t-2)$ .

$$x_1(t) = t[u(t) - u(t-2)]$$


Já o sinal  $x_2(t)$  pode ser obtido por outra rampa com inclinação  $-2$ , descrita por  $-2t + c$ , com valor 0 para  $t = 3$ , logo  $c = 6$ , ficando  $-2t + 6 = -2(t-3)$ . Adotado um de grau unitário em  $u(t-2) - u(t-3)$ .

$$x_2(t) = -2(t-3)[u(t-2) - u(t-3)]$$



# Degrau unitário $u(t)$

Análise de um sinal dividido no tempo:



Calcule o sinal  $x(t)$  a partir de  $x_1(t) + x_2(t)$ .



(a)




(b)





# Degrau unitário $u(t)$



Análise de um sinal dividido no tempo:



(a)



(b)




Calcule o sinal  $x(t)$  a partir de  $x_1(t) + x_2(t)$ .

$$\begin{aligned}x(t) &= x_1(t) + x_2(t) \\&= t[u(t) - u(t-2)] - 2(t-3)[u(t-2) - u(t-3)] \\&= t \cdot u(t) - t \cdot u(t-2) - 2(t-3)u(t-2) \\&\quad + 2(t-3)u(t-3) \\&= t \cdot u(t) - u(t-2)(t + 2(t-3)) \\&\quad + 2(t-3)u(t-3) \\&= t \cdot u(t) - u(t-2)(t + 2t - 6) \\&\quad + 2(t-3)u(t-3) \\&= t \cdot u(t) - u(t-2)(3t - 6) + 2(t-3)u(t-3) \\&= t \cdot u(t) - u(t-2)(3(t-2)) + 2(t-3)u(t-3) \\x(t) &= t \cdot u(t) - 3(t-2)u(t-2) + 2(t-3)u(t-3)\end{aligned}$$



## Exercício: Degrau Unitário

Descreva o sinal da figura abaixo através de uma expressão única para todo  $t$ .




Resposta

$$x(t) = 2 \cdot u(t + 1.5) - 2(1 - e^{-t/2})u(t) - 2e^{-t/2}u(t - 3)$$

## Exercício: Degrau Unitário

Mostre que o sinal apresentado na figura abaixo pode ser descrito por

$$x(t) = (t-1)u(t-1) - (t-2)u(t-2) - u(t-4).$$





# Impulso Unitário $\delta(t)$

De acordo com (LATHI; GREEN, 2004), o impulso unitário  $\delta$  é a função mais importante no estudo de sinais e sistemas. Ele é constituído de um pulso retangular muito pequeno ( $\epsilon \rightarrow 0$ ) e sua altura tende a um valor muito grande ( $1/\epsilon \rightarrow \infty$ ). Desta forma,  $\delta(t) = 0$  em todo  $t$  menos em 0.


$$\delta(t) = 0 \quad t \neq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$




Exponencial

$$\int_0^{\infty} \alpha \cdot e^{-\alpha \cdot t} dt = 1$$



Triangular



Gaussiano

# Propriedades do Impulso

## Multiplicação por um Impulso

Uma vez que uma função Impulso só tem valor em  $t = 0$ , a sua multiplicação por uma função  $\phi$  contínua no tempo, retornará justamente  $\phi(0)$ .

$$\phi(t)\delta(t) = \phi(0) \cdot \delta(t)$$

Assim, a multiplicação de uma função contínua no tempo pelo impulso unitário, retorna um impulso em  $t = 0$  com força  $\phi(0)$ . Adotando essa analogia temos:

$$\phi(t)\delta(t - T) = \phi(T)\delta(t - T)$$

## Amostragem de uma Função Impulso

A propriedade de amostragem de impulso unitario, diz que, desde que  $\phi(t)$  seja uma função contínua no instante  $t = 0$ , o resultado será o próprio sinal no instante do impulso.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \phi(t)\delta(t) dt &= \phi(0) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt \\ &= \phi(0)\end{aligned}$$

Portanto, para um impulso unitário localizado no tempo  $t = T$ , tem-se:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \phi(t)\delta(t - T) dt &= \phi(T) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt \\ &= \phi(T)\end{aligned}$$

# Propriedades do Impulso

## Função Generalizada

Uma vez que uma função Impulso é descontínua para  $t = 0$ , a sua derivada  $du/dt$  não existe para  $t = 0$  no sentido ordinário, mas existe no modelo generalizado e vale, de fato,  $\delta(t)$ .

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{du}{dt} \phi(t) dt &= u(t) \phi(t) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} u(t) \dot{\phi}(t) dt \\ &= \phi(\infty) - 0 - \int_{-\infty}^{\infty} \dot{\phi}(t) dt \\ &= \phi(\infty) - \phi(t) \Big|_0^{\infty} \\ &= \phi(0)\end{aligned}$$

Desta forma,

$$\frac{du}{dt} = \delta(t)$$

e consequentemente:

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = u(t)$$

Assim, a função de degrau unitário pode ser obtida da integração de uma função de impulso unitário. Similarmente, a rampa unitária  $x(t) = t \cdot u(t)$ .

## Exemplo - Impulso unitário

Mostre que:  $(t^3 + 3)\delta(t) = 3\delta(t)$

## Exemplo - Impulso unitário

Mostre que:  $(t^3 + 3)\delta(t) = 3\delta(t)$

$$\begin{aligned}f(t)\delta(t) &= f(0)\delta(t) \\(t^3 + 3)\delta(t) \\&= (0^3 + 3)\delta(t) \\&= 3\delta(t)\end{aligned}$$

# Exercício: Impulso Unitário

Mostre que:

- $\left[ \sin\left(t^2 - \frac{\pi}{2}\right) \right] \delta(t) = -\delta(t)$
- $e^{-2t} \delta(t) = \delta(t)$
- $\frac{\omega^2 + 1}{\omega^2 + 9} \delta(\omega - 1) = \frac{1}{5} \delta(\omega - 1)$



# Exponencial $e^{st}$





Outra função muito importante na área de sinais e sistemas é o sinal exponencial  $e^{st}$ , onde o termo  $s$  é gerado por um número complexo.

$$s = \sigma + j\omega$$

Logo,

$$\begin{aligned} e^{st} &= e^{\sigma + j\omega} t \\ &= e^{\sigma t} \cdot e^{j\omega t} \\ &= e^{\sigma t} (\cos(\omega t) + j \cdot \sin(\omega t)) \end{aligned}$$


$$e^{\sigma t} \cos(\omega t) = \frac{1}{2} (e^{st} + e^{s^* t})$$



a - Constante  $k = ke^{0t} (s=0)$   
b - Exponencial monotônica  
 $e^{\sigma t} (\omega=0, s=\sigma)$

c - Senoide  $\cos(\omega t)$  ( $\sigma=0, s=\pm j\omega$ )  
d - Senoide variando exponencialmente  
 $e^{\sigma t} \cos(\omega t)$  ( $s=\sigma \pm j\omega$ )

# Plano Frequência Complexa



# Exercícios

Simplifique as expressões

- (a)  $\left(\frac{\sin t}{t^2+2}\right)\delta(t)$
- (b)  $\left(\frac{j\omega+2}{\omega^2+9}\right)\delta(\omega)$
- (c)  $[e^{-t}\cos(3t-60^\circ)]\delta(t)$
- (d)  $\left(\frac{\sin[\frac{\pi}{2}(t-2)]}{t^2+4}\right)\delta(1-t)$
- (e)  $\left(\frac{1}{j\omega+2}\right)\delta(\omega+3)$
- (f)  $\left(\frac{\sin k\omega}{\omega}\right)\delta(\omega)$

Calcule as integrais

- (a)  $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau)x(t-\tau) d\tau$
- (b)  $\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau) d\tau$
- (c)  $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-j\omega t} dt$
- (d)  $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(2t-3)\sin(\pi t) dt$
- (e)  $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t+3)e^{-t} dt$
- (f)  $\int_{-\infty}^{\infty} (t^3+4)\delta(1-t) dt$
- (g)  $\int_{-\infty}^{\infty} x(2-t)\delta(3-t) dt$

Uma senóide  $e^{\sigma t}\cos\omega t$  pode ser expressa como a soma das exponenciais  $e^{st}$  e  $e^{-st}$  com frequências complexas  $s = \sigma + j\omega$  e  $s = \sigma - j\omega$ .

Localize no plano complexo as frequências das seguintes senóides:

- (a)  $\cos(3t)$
- (b)  $e^{-3t}\cos(3t)$
- (c)  $e^{2t}\cos(3t)$
- (d)  $e^{-2t}$
- (e)  $e^{2t}$
- (f) 5

## Próxima Aula

Introdução a sinais e sistemas: Sistemas Lineares e Não Lineares; Sistemas Invariantes e Variantes no Tempo; Sistemas Instantâneos e Dinâmicos; Sistema Causal e Não Causal; Sistema em Tempo Contínuo e em Tempo Discreto; Sinais Analógicos e Digitais; Sinais Invertíveis e Não Invertíveis; Sistemas Estáveis e Instáveis

Obrigado!!!

# Referencial Bibliográfico I

DISTEFANO, Joseph J; STUBBERUD, Allen J; WILLIAMS, Ivan J. **Schaum's outline of feedback and control systems**. New York: McGraw-Hill Professional, 2013.

HAYES, Monson H. **Schaum's outlines Digital Signal Processing**. New York: McGraw-Hill Professional, 2011.

HSU, Hwei P. **Schaum's outlines signals and systems, 4th Edition**. New York: McGraw-Hill Professional, 2019. v. 4.

LATHI, Bhagwandas Pannalal; GREEN, Roger A. **Linear systems and signals**. New York: Oxford University Press, 2004. v. 2.