

Duración: 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados; antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. En las preguntas de los literales de las preguntas 1, 2 y 3 debe presentar detalladamente el procedimiento para llegar a la solución — respuestas sin procedimiento no se tendrán en cuenta. No está permitido hacer preguntas, el uso de calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen.

1. [20pt] Las raíces de la ecuación $r^2 - 2r + 26 = 0$ son $r_1 = 1 + 5i$ y $r_2 = 1 - 5i$. Usando este hecho, halle la solución general de la ecuación diferencial

$$y'' - 2y' + 26y = e^x \tan(5x)$$

en el intervalo $\left(0, \frac{\pi}{10}\right)$.

Indicación: puede usar la siguiente fórmula $\int \sec t \, dt = \ln |\sec t + \tan t| + C$.

2. [25pt]

(a) [10pt] Una masa que pesa 2 lbs hace que se alargue $\frac{1}{4}$ pies un resorte. Después de estar en equilibrio, la masa se hala hacia abajo $\frac{1}{3}$ pies y se suelta desde el reposo. Sobre el sistema masa-resorte no hay fuerza de amortiguamiento, y una fuerza externa de $9 \cos(t)$ lbs actúa sobre la masa. Formule con precisión el PVI que describe el movimiento de la masa (no es necesario que lo resuelva, ni tal solución será tenida en cuenta).

(b) [15pt] La posición $x(t)$ de cierto sistema masa-resorte satisface el problema de valor inicial

$$\frac{3}{2}x''(t) + kx(t) = 0, \quad x(0) = 2, \quad x'(0) = \gamma,$$

donde k y γ son constantes positivas. Si el periodo T y la amplitud R del movimiento resultante son 4π y 6, respectivamente, determine los valores de k y γ .

3. [15pt]

(a) [10pt] Demuestre que las funciones y_1 , y_2 y y_3 cuyas gráficas se presentan en la figura son linealmente independientes en el intervalo $(0.9, 4.1)$.




Figura esquemática (redibujada): lo relevante son los cruces de las tres curvas en el intervalo, no sus valores exactos. Indicación: analice qué sucede al evaluar la expresión $c_1y_1(x) + c_2y_2(x) + c_3y_3(x) = 0$ en $x = 4$.

(b) [5pt] El Wronskiano de dos funciones f y g es $W(x) = x^3 - 2$, para cada $x \in (0, 5)$. Determine si las funciones f y g son L.I. o L.D. en tal intervalo. Justifique su respuesta.

NOTA: En las preguntas 4 y 5, se califica sólo la respuesta y no se tiene en cuenta el procedimiento.

4. [20pt] Escriba claramente su respuesta en la línea correspondiente.

(a) [8pt] Una forma adecuada de solución particular para la ecuación diferencial

$$y^{(4)} + 8y''' + 17y'' = 8 + e^x + e^{-4x} \sin x$$

es _____ (no halle las constantes).

(b) [6pt] El valor de c para que $y = e^{-x}$ sea una solución de la ED homogénea

$$y''' + 3y'' + 4y' + cy = 0$$

es _____

(c) [6pt] Sabiendo que $y = x^2 \cos(\ln x)$ y $x^2 \sin(\ln x)$ son soluciones de una ED de Cauchy-Euler homogénea de orden 2 en $(0, \infty)$, escriba dicha ecuación diferencial: _____

5. [20pt] En este problema denotamos a una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n , con coeficientes constantes como

$$a_n \frac{d^n y}{dx^n} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dx} + a_0 y = 0, \quad (1)$$

donde $a_i \in \mathbb{R}$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$, y $a_n \neq 0$. Recuerde que para la Ecuación (1), la ecuación característica asociada viene dada por

$$a_n r^n + \cdots + a_1 r + a_0 = 0. \quad (2)$$

Los siguientes literales se refieren a las funciones $z_1, \dots, z_4$ definidas en $\mathbb{R}$ cuyas porciones de gráficas se indican a continuación.




Figura esquemática (redibujada): representa el tipo de comportamiento (creciente/decreciente, oscilatorio, acotado) de cada función, no sus valores exactos.

(a) [5pt] Si la Ecuación (2) se escribe $(r - a)(r - b) = 0$ con $a < 0 < b$ números reales, y la solución de la Ecuación (1) en $\mathbb{R}$ tiene la estructura $y = c_1 z_i + c_2 z_j$ entonces $i = \underline{\hspace{1cm}}$, $j = \underline{\hspace{1cm}}$.

(b) [5pt] Si la ecuación (2) tiene una única raíz real positiva y z_i es solución de (1) en $\mathbb{R}$, entonces $i = \underline{\hspace{1cm}}$.

(c) [5pt] Si $z_1 \cdot z_3$ es una solución en $\mathbb{R}$ de la ED (1) y $z_i \cdot z_j$ es una solución de (1) en $\mathbb{R}$ linealmente independiente de $z_1 \cdot z_3$ entonces $i = \underline{\hspace{1cm}}$, $j = \underline{\hspace{1cm}}$.

- (d) **[5pt]** Si la Ecuación (2) es $r^2 + c^2 = 0$ con $c \in \mathbb{R}$, y la solución de la Ecuación (1) en $\mathbb{R}$ tiene la estructura $y = c_1 z_i + c_2 z_j$ entonces $i = \underline{\hspace{1cm}}$, $j = \underline{\hspace{1cm}}$.