

# DEVOIR SURVEILLÉ N°01

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

## Problème 1

**1**  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$  est une série géométrique de raison  $q$ . On sait qu'elle converge si et seulement si  $|q| < 1$ .

**2** On sait que

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} q^k = q^{n+1} \sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{q^{n+1}}{1-q}$$

**3** Remarquons que  $R_n = \frac{q}{1-q} q^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Or la série géométrique  $\sum_{n \in \mathbb{N}} q^n$  converge et a pour somme  $\frac{1}{1-q}$  donc  $\sum_{n \in \mathbb{N}} R_n$  converge et  $\sum_{n=0}^{+\infty} R_n = \frac{q}{(1-q)^2}$ .

**4** La série de Riemann  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^\alpha}$  converge si et seulement si  $\alpha > 1$ .

**5** Pour tout entier  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\int_{n+1}^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \leq R_n \leq \int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$$

ou encore

$$\left[ \frac{t^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_{n+1}^{+\infty} \leq R_n \leq \left[ \frac{t^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_n^{+\infty}$$

ou enfin

$$\frac{1}{(\alpha-1)(n+1)^{\alpha-1}} \leq R_n \leq \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$$

En multipliant par  $n^{\alpha-1}$ , on obtient

$$\frac{1}{\alpha-1} \left( \frac{n}{n+1} \right)^{\alpha-1} \leq n^{\alpha-1} R_n \leq \frac{1}{\alpha-1}$$

et donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\alpha-1} R_n = \frac{1}{\alpha-1}$  via le théorème des gendarmes. Autrement dit,  $R_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$ .

**6** La série de Riemann  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^{\alpha-1}}$  est une série de Riemann qui ne converge que si  $\alpha-1 > 1$ . Puisque c'est une série à termes positifs, la série  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} R_n$  est de même nature : elle ne converge donc que si  $\alpha > 2$ .

**7** On trouve évidemment  $\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$ .

**8** Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , la question précédente montre que

$$S_n = \sum_{k=1}^n \int_0^1 (-1)^k x^{k-1} dx = - \int_0^1 \sum_{k=0}^{n-1} (-x)^k dx$$

On reconnaît là la somme des termes d'une suite géométrique de raison  $-x$  donc

$$S_n = - \int_0^1 \frac{1 - (-x)^n}{1 - (-x)} dx = - \int_0^1 \frac{dx}{1+x} + (-1)^n \int_0^1 \frac{x^n dx}{1+x}$$

On calcule aisément

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln(2)$$

de sorte que

$$S_n = -\ln(2) + (-1)^n \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$$

**9** Pour tout  $x \in [0, 1]$ ,

$$0 \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n$$

donc, par croissance de l'intégrale

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$$

D'après le théorème des gendarmes,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = 0$ . La suite de terme général  $(-1)^n$  étant bornée, on a également

$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = 0$ . La question précédente permet d'affirmer que  $(S_n)$  converge vers  $-\ln(2)$ . Autrement dit, la série  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} a_n$  converge et a pour somme  $-\ln(2)$ .

**10** Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$R_n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n - S_n = (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^n dx}{1+x}$$

A l'aide d'une intégration par parties,

$$R_n = (-1)^{n+1} \left[ \frac{x^{n+1}}{(n+1)(1+x)} \right]_0^1 + (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1} dx}{(n+1)(1+x)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} + \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1} dx}{(1+x)^2}$$

A nouveau, pour tout  $x \in [0, 1]$ ,

$$0 \leq \frac{x^{n+1}}{(1+x)^2} \leq x^{n+1}$$

donc par croissance de l'intégrale

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1} dx}{(1+x)^2} \leq \frac{1}{n+2}$$

On en déduit donc que  $\int_0^1 \frac{x^{n+1} dx}{(1+x)^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$ . On sait également que  $\frac{(-1)^n}{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$ . Ainsi

$$\frac{(-1)^n}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1} dx}{(1+x)^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

et finalement

$$R_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Les constantes recherchées sont donc  $\beta = \frac{1}{2}$  et  $\alpha = 2$ .

**11** La question précédente montre que  $R_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{2} a_{n+1} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ . Posons  $v_n = R_n - \frac{1}{2} a_{n+1}$  pour  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a donc  $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ . Or la série  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^2}$  est une série à termes positifs convergente donc la série  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} v_n$  converge. Par ailleurs,  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} a_n$  converge donc la série  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} a_{n+1}$  converge également. Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $R_n = \frac{1}{2} a_{n+1} + v_n$  donc la série  $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} R_n$  converge comme combinaison linéaire de deux séries convergentes.

## Problème 2

**1** Posons  $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ . On a clairement  $\mathcal{A} = \text{vect}(E_1, E_2, E_3)$  donc  $\mathcal{A}$  est un

sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ . De plus, la famille  $(E_1, E_2, E_3)$  est libre donc c'est une base de  $\mathcal{A}$ . Ainsi  $\dim \mathcal{A} = 3$ .

**2** Comme  $\mathcal{A}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ , c'est a fortiori un sous-groupe de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ . De plus,  $I_3 \in \mathcal{A}$  (choisir  $a = b = 1$  et  $c = 0$ ). Enfin, pour  $(a, b, c, a', b', c') \in \mathbb{R}^6$

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & -c & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & 0 & 0 \\ 0 & b' & c' \\ 0 & -c' & b' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' & 0 & 0 \\ 0 & bb' - cc' & bc' + cb' \\ 0 & -(bc' + cb') & bb' - cc' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a' & 0 & 0 \\ 0 & b' & c' \\ 0 & -c' & b' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & -c & b \end{pmatrix}$$

Ceci montre que  $\mathcal{A}$  est stable par produit et commutatif. Ainsi  $\mathcal{A}$  est bien un sous-anneau commutatif de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ .

**3** On calcule  $M^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ . Tout d'abord, on a bien  $I_3, M, M^2 \in \mathcal{A}$ . Soit  $(\lambda, \mu, \nu) \in \mathbb{R}^3$  tels que  $\lambda I_3 + \mu M + \nu M^2 = 0$ .

Ceci équivaut à  $\begin{cases} \lambda - 2\mu + 4\nu = 0 \\ \lambda + \mu = 0 \\ -\mu - 2\nu = 0 \end{cases}$ . On voit facilement que l'unique solution de ce système est le triplet nul. La famille

$(I_3, M, M^2)$  est donc libre. Puisque  $\dim \mathcal{A} = 3$ , cette famille est une base de  $\mathcal{A}$ .

**4** On obtient  $M^3 = 2M - 4I_3$ .

**5** Comme  $\mathcal{A}$  est un anneau, il est stable par produit. On peut donc montrer par récurrence que pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $M^k \in \mathcal{A}$ , d'où l'existence des réels  $a_k, b_k$  et  $c_k$ .

**6** En écrivant  $M^{k+1} = MM^k$ , on trouve  $\begin{cases} a_{k+1} = -2a_k \\ b_{k+1} = b_k - c_k \\ c_{k+1} = b_k + c_k \end{cases}$ .

**7** On a  $z_{k+1} = b_{k+1} + ic_{k+1} = (b_k - c_k) + i(b_k + c_k) = (1+i)z_k$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ . La suite  $(z_k)$  est donc géométrique de raison  $1+i$  et de premier terme  $z_0 = b_0 + ic_0 = 1$  : on a alors  $z_k = (1+i)^k$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ . Enfin, puisque  $b_k$  et  $c_k$  sont réels,  $b_k = \text{Re}(z_k) = \text{Re}((1+i)^k)$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ .

**8** En utilisant la question 6, on montre que  $b_{k+2} = b_{k+1} - c_{k+1} = b_{k+1} - b_k - c_k = 2b_{k+1} - 2b_k$ . La suite  $(b_k)$  est donc une suite récurrente linéaire d'ordre 2 dont le polynôme caractéristique est  $X^2 - 2X + 2$ . Les racines de ce polynôme sont donc  $1 \pm i$ . Il existe donc  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$  tels que  $b_k = \lambda(1+i)^k + \mu(1-i)^k$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ . Or  $b_0 = b_1 = 1$  donc  $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$ .

Ainsi pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $b_k = \frac{(1+i)^k + (1-i)^k}{2} = \text{Re}((1+i)^k)$ .

**9** Comme  $u_0, u_1$  et  $u_2$  sont entiers et que  $u_{n+3}$  s'exprime comme une combinaison linéaire à coefficients entiers de  $u_n$  et  $u_{n+1}$ , on prouve par récurrence triple ou par récurrence forte que la suite  $(u_n)$  est à valeurs entières.

**10** Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\text{tr}(M^{n+3}) = \text{tr}(M^n M^3) = \text{tr}(M^n(2M - 4I_3)) = 2\text{tr}(M^{n+1}) - 4\text{tr}(M^n)$  en utilisant la question 4 et la linéarité de la trace. De plus,  $\text{tr}(M^0) = \text{tr}(I_3) = 3$ ,  $\text{tr}(M^1) = 0$  et  $\text{tr}(M^2) = 4$  : les suites  $(u_n)$  et  $(\text{tr}(M^n))$  ont les mêmes trois premiers termes et vérifient la même relation de récurrence d'ordre 3, elles sont donc égales.

**11** Soit  $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$ . Alors  $k \binom{p}{k} = p \binom{p-1}{k-1}$ . Notamment  $p$  divise  $k \binom{p}{k}$ . Puisque  $1 \leq k \leq p-1$ ,  $p$  ne divise pas  $k$ . Or  $p$  est premier donc  $p \wedge k = 1$ . D'après le lemme de Gauss,  $p$  divise  $\binom{p}{k}$ .

**12** 2 divise bien  $u_2 = 2$  : on peut donc supposer  $p$  impair. Posons  $n = \frac{p-1}{2}$ .

Puisque  $(a_k)$  est géométrique de raison  $-2$  et de premier terme  $a_0 = 1$ , on a  $a_k = (-2)^k$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ . Ainsi

$$u_p = a_p + 2b_p = (-2)^p + 2\text{Re}((1+i)^p) = -2^p + 2 \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \text{Re}(i^k)$$

Or pour  $k$  impair,  $\operatorname{Re}(i^k) = 0$  donc

$$u_p = -2^p + \sum_{k=0}^n \binom{p}{2k} (-1)^k = -(2^p - 2) + 2 \sum_{k=1}^n \binom{p}{2k} (-1)^k$$

D'après le petit théorème de Fermat,  $p$  divise  $2^p - 2$  et puisque pour  $1 \leq k \leq n$ , on a  $2 \leq 2k \leq p-1$ ,  $p$  divise également  $\binom{p}{2k}$  d'après le rappel de l'énoncé. Ainsi  $p$  divise  $u_p$ .

**Solution 1**

1. En convenant que  $A_{n_0-1} = 0$  :

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=n_0}^n a_k B_k &= \sum_{k=n_0}^n (A_k - A_{k-1}) B_k \\
 &= \sum_{k=n_0}^n A_k B_k - \sum_{k=n_0}^n A_{k-1} B_k \\
 &= \sum_{k=n_0}^n A_k B_k - \sum_{k=n_0-1}^{n-1} A_k B_{k+1} \\
 &= A_n B_n + \sum_{k=n_0}^{n-1} A_k (B_k - B_{k+1}) \\
 &= A_n B_n - \sum_{k=n_0}^{n-1} A_k b_k
 \end{aligned}$$

2. a. La série  $\sum b_n$ , autrement dit la série  $\sum B_{n+1} - B_n$ , est une série télescopique. Elle est donc de même nature que la suite  $(B_n)$ , c'est-à-dire convergente.

b. Tout d'abord,  $(A_n)$  est bornée donc  $A_n B_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(B_n)$ . Puisque  $(B_n)$  converge vers 0, il en est de même de la suite  $(A_n B_n)$ .

Ensuite, la suite  $(B_n)$  étant décroissante, la série  $\sum b_n$  est une série à termes de signe constant. Or  $A_n b_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(b_n)$  et la série  $\sum b_n$  converge donc la série  $\sum A_n b_n$  converge. On en déduit que la suite de ses sommes partielles converge. La suite de terme général  $\sum_{k=n_0}^{n-1} A_k b_k$  converge donc.

D'après la question 1, la suite de terme général  $\sum_{k=n_0}^n a_k B_k$  converge donc en tant que somme de deux suites convergentes. Puisque  $\sum_{k=n_0}^n a_k B_k$  est la somme de partielle de rang  $n$  de la série  $\sum a_n B_n$ , la série  $\sum a_n B_n$  converge également.

c. Posons  $a_n = (-1)^n$  pour  $n \geq n_0$ . Alors  $A_n$  vaut 0,  $-1$  ou  $1$  suivant la parité de  $n$  ou  $n_0$ . En particulier, la suite  $(A_n)$  est bornée et on peut donc appliquer le résultat de la question précédente. La série  $\sum (-1)^n B_n$  converge donc.

3. a. Il s'agit de la somme des termes d'une suite géométrique de raison  $e^{i\theta} \neq 1$  (car  $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$ ).

$$\sum_{k=1}^n e^{ki\theta} = e^{i\theta} \frac{e^{in\theta} - 1}{e^{i\theta} - 1} = e^{\frac{i(n+1)\theta}{2}} \frac{\sin \frac{n\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

b. Cas  $\alpha \leq 0$ . La suite de terme général  $\frac{e^{ni\theta}}{n^\alpha}$  ne tend pas vers 0. En effet,  $\left| \frac{e^{ni\theta}}{n^\alpha} \right| = n^{-\alpha} \geq 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Cas  $\alpha > 1$ . La série  $\sum \frac{e^{ni\theta}}{n^\alpha}$  converge absolument. En effet, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\left| \frac{e^{ni\theta}}{n^\alpha} \right| = \frac{1}{n^\alpha}$  et la série de Riemann  $\sum \frac{1}{n^\alpha}$  converge puisque  $\alpha > 1$ .

Cas  $0 < \alpha \leq 1$ . On utilise les résultats précédents avec  $n_0 = 1$ ,  $a_n = e^{in\theta}$  et  $B_n = \frac{1}{n}$ . D'après la question 3.a, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$|A_n| = \left| e^{\frac{i(n+1)\theta}{2}} \frac{\sin \frac{n\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{\theta}{2} \right|}$$

La suite  $(A_n)$  est donc bornée. La suite  $(B_n)$  est clairement décroissante de limite nulle. La question 2.b permet alors d'affirmer que la série  $\sum a_n B_n$  i.e. la série  $\sum \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$ , converge. Cette série ne converge pas absolument puisque  $\left| \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha} \right| = \frac{1}{n^\alpha}$  et que la série  $\sum \frac{1}{n^\alpha}$  ne converge pas ( $\alpha \leq 1$ ).

4. Rappelons que pour tout  $n \geq n_0$

$$\sum_{k=n_0}^n a_k B_k = A_n B_n - \sum_{k=n_0}^{n-1} A_k b_k$$

La suite  $(B_n)$  converge vers 0 et  $(A_n)$  est bornée donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n B_n = 0$ .

Puisque  $(A_n)$  est bornée,  $A_n b_n = \mathcal{O}(|b_n|)$ . Or la série  $\sum |b_n|$  converge car  $\sum_{n \geq n_0} b_n$  est absolument convergente. De plus, la série  $\sum |b_n|$  est à termes positifs donc la série  $\sum A_n b_n$  converge (absolument). Ainsi la suite de terme général  $\sum_{k=n_0}^{n-1} A_k b_k$  converge.

Il s'ensuit que la suite de terme général  $\sum_{k=n_0}^n a_k B_k$  converge également i.e. que la série  $\sum_{n \geq n_0} a_n B_n$  converge.