

DEVOIR SURVEILLÉ N°06

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Problème 1 – Centrale-Supelec Maths 2 MP 2012

Ce sujet est divisé en trois parties. La partie III est indépendante des deux premières (même si les parties II et III ont en commun de s'intéresser à des matrices dites de Hankel).

Il est attendu des candidat(e)s qu'ils fassent preuve de qualités de rédaction, de clarté et de présentation.

Notations

Dans tout le problème, \mathbb{K} désigne indifféremment \mathbb{R} ou \mathbb{C} .

On note $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ l'espace vectoriel des suites à valeurs dans \mathbb{K} .

Pour tout espace vectoriel E sur \mathbb{K} , on note $\mathcal{L}(E)$ l'algèbre des endomorphismes de E .

On note σ l'élément de $\mathcal{L}(\mathbb{K}^{\mathbb{N}})$ qui à tout $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ associe $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ de terme général $y_n = x_{n+1}$.

On note $\mathbb{K}[X]$ l'algèbre des polynômes à coefficients dans \mathbb{K} , et $\mathbb{K}_m[X]$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$ formé des polynômes de degré inférieur ou égal à m .

On rappelle qu'un polynôme non nul est dit unitaire si le coefficient de son monôme de plus haut degré vaut 1.

On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ l'algèbre des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans \mathbb{K} . Si M est une matrice carrée, on note M^T sa transposée et $\text{tr}(M)$ sa trace.

On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées symétriques d'ordre n à coefficients réels.

Rappels sur les polynômes d'endomorphisme

On effectue ici quelques rappels utiles sur les polynômes d'endomorphisme d'un espace vectoriel.

Soit E un espace vectoriel sur \mathbb{K} . On note Id l'endomorphisme identité de E .

Pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$ et tout $A = \sum_{k=0}^p a_k X^k$ de $\mathbb{K}[X]$, on note $A(f) = \sum_{k=0}^p a_k f^k$ avec la convention $f^0 = \text{Id}$.

Pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$, l'application $A \mapsto A(f)$ est alors un morphisme d'algèbre de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathcal{L}(E)$.

Rappelons que cela signifie que, pour tous A, B de $\mathbb{K}[X]$ et pour tous scalaires α, β de \mathbb{K} , on a :

- $(\alpha A + \beta B)(f) = \alpha A(f) + \beta B(f)$;
- si $A = 1$, alors $A(f) = \text{Id}$;
- $(AB)(f) = A(f) \circ B(f) = B(f) \circ A(f)$.

Cas particulier (utile dans la suite du problème) :

- Si $E = \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, $f = \sigma$ et $A = \sum_{k=0}^p a_k X^k$, alors $A(\sigma) = \sum_{k=0}^p a_k \sigma^k$.
- Pour tout $x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, $y = A(\sigma)(x)$ est donc la suite de terme général $y_n = \sum_{k=0}^p a_k x_{n+k}$.

I Suites récurrentes linéaires

Soit p un entier naturel. On dit qu'un élément x de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ est une suite récurrente linéaire (en abrégé une SRL) d'ordre $p > 0$ s'il existe un polynôme $A = \sum_{k=0}^p a_k X^k$ dans $\mathbb{K}[X]$ de degré p , tel que $A(\sigma)(x)$ soit la suite nulle, c'est-à-dire si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^p a_k x_{n+k} = 0 \quad (1)$$

On dit que la relation ci-dessus (dans laquelle, rappelons-le, a_p est non nul) est une relation de récurrence linéaire d'ordre p , dont A est un *polynôme caractéristique*.

L'ensemble des suites x de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ qui obéissent à la relation (1) est noté $\mathcal{R}_A(\mathbb{K})$.

On note $\mathcal{R}(\mathbb{K})$ l'ensemble de toutes les suites récurrentes linéaires, quel que soit leur ordre (autrement dit, $\mathcal{R}(\mathbb{K})$ est la réunion des $\mathcal{R}_A(\mathbb{K})$ pour tous les polynômes A non nuls dans $\mathbb{K}[X]$).

I.A Ordre (et polynôme) minimal d'une suite récurrente linéaire

Soit x une suite récurrente linéaire.

- 1** Montrer que l'ensemble J_x des polynômes A tels que $A(\sigma)(x) = 0$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$, non réduit à $\{0\}$.

On rappelle qu'il en résulte deux choses :

- d'une part, il existe dans J_x un unique polynôme unitaire B de degré minimal ;
- d'autre part, les éléments de J_x sont les multiples de B .

Par définition, on dit que B est le *polynôme minimal* de la suite x , que le degré de B est l'*ordre minimal* de x , et que la relation $B(\sigma)(x) = 0$ est la *relation de récurrence minimale* de x .

I.B Quelques exemples

- 2** Dans $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, quelles sont les suites récurrentes linéaires d'ordre 0 ? d'ordre 1 ?
Quelles sont les suites de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ dont le polynôme minimal est $(X - 1)^2$?
- 3** On considère la suite x définie par $x_0 = 0$, $x_1 = -1$, $x_2 = 2$ et par la relation de récurrence linéaire d'ordre 3 :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad x_{n+3} = -3x_{n+2} - 3x_{n+1} - x_n$$

Déterminer le polynôme minimal (et donc l'ordre minimal) de la suite x .

I.C L'espace vectoriel $\mathcal{R}_A(\mathbb{K})$ et deux cas particuliers

Soit $A = \sum_{k=0}^p a_k X^k$ un élément de $\mathbb{K}[X]$, de degré $p \geq 0$, que sans perdre de généralité, on suppose unitaire.

- 4** Prouver que $\mathcal{R}_A(\mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de dimension p de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et qu'il est stable par σ (on ne demande pas ici de déterminer une base de $\mathcal{R}_A(\mathbb{K})$, car c'est l'objet des questions suivantes).
- 5** Déterminer $\mathcal{R}_A(\mathbb{K})$ quand $A = X^p$ (avec $p \geq 1$) et en donner une base.
- 6** Dans cette question, on suppose $p \geq 1$ et $A = (X - \lambda)^p$, avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$. On note $E_A(\mathbb{K})$ l'ensemble des x de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ de terme général $x_n = Q(n)\lambda^n$, où Q est dans $\mathbb{K}_{p-1}[X]$.

6.a Montrer que $E_A(\mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ dont on précisera la dimension.

6.b Montrer l'égalité $\mathcal{R}_A(\mathbb{K}) = E_A(\mathbb{K})$.

I.D Étude de $\mathcal{R}_A(\mathbb{K})$ quand A est scindé sur \mathbb{K}

Dans cette question, on suppose que le polynôme A est scindé sur \mathbb{K} .

Plus précisément, on note $A = X^{m_0} \prod_{k=1}^d (X - \lambda_k)^{m_k}$, où :

- les scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_d$ sont les racines *non nulles distinctes éventuelles* de A dans \mathbb{K} , et m_1, m_2, \dots, m_d sont leurs multiplicités respectives (supérieures ou égales à 1) ;
- si A n'a pas de racine non nulle, on convient que $d = 0$ et que $\prod_{k=1}^d (X - \lambda_k)^{m_k} = 1$;
- l'entier m_0 est la multiplicité de 0 comme racine *éventuelle* de A ; si 0 n'est pas racine de A, on adopte la convention $m_0 = 0$.

Avec ces notations, on a $\sum_{k=0}^d m_k = \deg A = p$.

- 7** En utilisant le théorème de décomposition des noyaux, montrer que $\mathcal{R}_A(\mathbb{K})$ est l'ensemble des suites $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ telles que :

$$\forall n \geq m_0, \quad x_n = \sum_{k=1}^d Q_k(n) \lambda_k^n$$

où, pour tout k de $\{1, \dots, d\}$, Q_k est dans $\mathbb{K}[X]$ avec $\deg Q_k < m_k$.

Remarque : si $d = 0$, la somme $\sum_{k=1}^d Q_k(n) \lambda_k^n$ est par convention égale à 0.

II Matrices de Hankel associées à une suite récurrente linéaire

Soit x dans $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. Pour tout entier n de \mathbb{N} , on note $H_n(x)$ la matrice de $M_n(\mathbb{K})$ définie par

$$\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, \quad [H_n(x)]_{i,j} = x_{i+j-2}$$

On a par exemple $H_2(x) = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 \\ x_1 & x_2 \end{pmatrix}$, $H_3(x) = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_3 & x_4 \end{pmatrix}$ et $H_4(x) = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \end{pmatrix}$.

On identifie toute matrice de $M_n(\mathbb{K})$ avec l'endomorphisme de \mathbb{K}^n qui lui est associé dans la base canonique. On identifie de même tout élément de \mathbb{K}^n avec la matrice-colonne qui lui correspond.

II.A Calcul du rang de $H_n(x)$ lorsque x est une suite récurrente linéaire

Dans cette section, x est une suite récurrente linéaire d'ordre minimal $p \geq 1$ et de polynôme minimal B.

- 8** Montrer que la famille $(\sigma^k(x))_{0 \leq k \leq p-1}$ est une base de $R_B(\mathbb{K})$.
En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, le rang de la famille $(\sigma^k(x))_{0 \leq k \leq n-1}$.
- 9** Montrer que si $n \geq p$, l'application $\varphi_n : \begin{cases} \mathcal{R}_B(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathbb{K}^n \\ v & \longmapsto & (v_0, \dots, v_{n-1}) \end{cases}$ est injective.
En déduire que si $n \geq p$, alors $\text{rg}(H_n(x)) = p$.

Remarque : il est clair que ce résultat reste vrai si $p = 0$ (car la suite x et les matrices $H_n(x)$ sont nulles).

II.B Détermination de la récurrence minimale d'une suite récurrente linéaire

Soit x une suite récurrente linéaire non nulle, d'ordre $m \geq 1$. Soit $p = \text{rg}(H_m(x))$.

- 10** Montrer que x est d'ordre minimal p et que le noyau de $H_{p+1}(x)$ est une droite vectorielle dont un vecteur directeur peut s'écrire $(b_0, \dots, b_{p-1}, 1)$, où b_0, \dots, b_{p-1} sont dans \mathbb{K} .
- 11** Avec ces notations, montrer que le polynôme minimal de x est $B = X^p + b_{p-1}X^{p-1} + \dots + b_1X + b_0$.

II.C Etude d'un exemple

Dans cette question, on considère la suite $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $x_0 = 1, x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 0$, et $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+4} = x_{n+3} - 2x_{n+1}$.

- 12** Dans le langage Python, écrire une fonction de paramètre un entier naturel n et renvoyant la liste des x_k pour $0 \leq k \leq n$.
- 13** Préciser le rang de $H_n(x)$ pour tout entier n de \mathbb{N}^* et indiquer l'ordre minimal de la suite x .
- 14** Déterminer la relation de récurrence minimale de la suite x .
- 15** Donner une formule permettant, pour tout $n \geq 1$, de calculer directement x_n .
- 16** On décide de modifier *uniquement* la valeur de x_0 , en posant cette fois $x_0 = \frac{1}{2}$.
Avec cette modification, reprendre rapidement l'étude des questions **13** et **14**.

III Valeurs propres des matrices de Hankel réelles

Dans toute cette partie, n désigne un entier supérieur ou égal à 3.

On note $p = \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor$ la partie entière de $\frac{n+1}{2}$.

On a donc $n = 2p$ si n est pair, et $n = 2p - 1$ si n est impair.

\mathbb{R}^n est muni de sa structure euclidienne canonique dont le produit scalaire est noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et la norme associée est notée $\| \cdot \|$.

Un élément $x = (x_1, \dots, x_n)$ de \mathbb{R}^n est dit ordonné si $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n$.

On dit qu'une matrice $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est une matrice de Hankel s'il existe $a = (a_0, \dots, a_{2n-2})$ dans \mathbb{R}^{2n-1} tel que pour tous i et j de $\{1, \dots, n\}$, $m_{i,j} = a_{i+j-2}$. Une telle matrice est notée $M = H(a)$.

III.A Préliminaires

- 17** Montrer que si M une matrice de Hankel de taille n , alors elle admet n valeurs propres réelles $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (chacune étant répétée autant de fois que sa multiplicité) que l'on peut classer dans l'ordre décroissant $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$.

On note alors $\text{Spo}(M) = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ le spectre ordonné de la matrice M , c'est-à-dire le n -uplet ordonné des valeurs propres de M .

On s'intéresse au problème suivant : à quelles conditions un n -uplet ordonné de réels peut-il être le n -uplet ordonné des valeurs propres d'une matrice de Hankel de taille n ?

- 18** Montre que si $\lambda \in \mathbb{R}^*$, alors le n -uplet $(\lambda, \dots, \lambda)$ n'est pas le n -uplet ordonné des valeurs propres d'une matrice de Hankel de taille n .

III.B Une première condition nécessaire

Soit $a = (a_0, \dots, a_{2n-2})$ un élément de \mathbb{R}^{2n-1} et $M = H(a)$. On note $\text{Spo}(M) = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. On définit deux vecteurs $v = (v_1, \dots, v_n)$ et $w = (w_1, \dots, w_n)$ de \mathbb{R}^n par

$$\begin{cases} v_i = \sqrt{2i-1} a_{2(i-1)} \text{ et } w_i = \frac{1}{\sqrt{2i-1}} & \text{si } i \in \{1, \dots, p\} \\ v_i = \sqrt{2n-2i+1} a_{2(i-1)} \text{ et } w_i = \frac{1}{\sqrt{2n-2i+1}} & \text{si } i \in \{p+1, \dots, n\} \end{cases}$$

On pose enfin $K_n = n - \|w\|^2$.

19 Montrer que

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{k=0}^{n-1} a_{2k} \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) a_k^2 + \sum_{k=n}^{2n-2} (2n-k-1) a_k^2$$

20 Montrer que $\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ et $\|v\|^2 \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i^2$.

21 Montrer que $\sum_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_i - \lambda_j)^2 = n \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 - \langle v, w \rangle^2$ et en déduire l'inégalité

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_i - \lambda_j)^2 \geq K_n \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \quad (2)$$

22 Vérifier que, si $n = 3$, la condition (2) équivaut à :

$$2(\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2) \geq 3(\lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3)$$

III.C D'autres conditions nécessaires

Dans cette partie, on admet le résultat suivant : si A et B sont deux matrices de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ dont les valeurs propres respectives (avec répétitions éventuelles) sont $\alpha_1 \geq \dots \geq \alpha_n$ et $\beta_1 \geq \dots \geq \beta_n$ alors

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_{n+1-i} \leq \text{tr}(AB) \leq \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i \quad (3)$$

Soit $B = (b_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par

$$b_{1,2p-1} = 1 \quad b_{2p-1,1} = 1 \quad b_{p,p} = -2$$

tous les autres coefficients de B étant nuls (on rappelle que p désigne la partie entière de $(n+1)/2$).

23 Déterminer le spectre ordonné de la matrice B .

24 Soit $a = (a_0, \dots, a_{2n-2})$ un élément de \mathbb{R}^{2n-1} et $M = H(a)$. On note $\text{Spo}(M) = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Etablir que

$$\lambda_1 - \lambda_{n-1} - 2\lambda_n \geq 0 \quad \text{et} \quad 2\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_n \geq 0 \quad (4)$$

III.D Cas $n = 3$

Soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ trois réels vérifiant

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$$

$$\lambda_1 - \lambda_2 - 2\lambda_3 \geq 0$$

$$2\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 \geq 0$$

On définit la matrice de Hankel $M = H(a, b, c, b, a) = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & b \\ c & b & a \end{pmatrix}$, où a, b, c sont réels.

- 25** Calculer les valeurs propres de M (sans chercher à les ordonner).
- 26** Expliciter a, b, c (avec $b \geq 0$) en fonction de $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, de telle sorte que $\text{Spo}(M) = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$.
- 27** Que peut-on déduire du résultat précédent, quant à la condition (4) dans le cas $n = 3$?
En utilisant un triplet ordonné $(\lambda, 1, 1)$, montrer que pour $n = 3$, la condition (2) n'est pas suffisante.