

Ouverts et fermés

Exercice 1

Soit (u_n) une suite strictement croissante de réels. Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que $E = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ soit fermé.

Exercice 2

Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Montrer que l'ensemble des projecteurs de E est fermé dans $\mathcal{L}(E)$.

Exercice 3

CCP 2013

Soit E l'ensemble des fonctions continues de $[0, 1]$ dans \mathbb{R} que l'on munit de la norme uniforme. On pose

$$A = \left\{ f \in E \mid f(0) = 0, \int_0^1 f(t) dt \geq 1 \right\}$$

1. Montrer que A est une partie fermée de E .
2. Montrer que pour tout $f \in A$, $\|f\|_\infty > 1$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que l'on peut choisir $\alpha \in]0, 1]$ tel que la fonction

$$f_n : x \in [0, 1] \mapsto \begin{cases} \frac{1}{\alpha} \left(1 + \frac{1}{n}\right)x & \text{si } x \leq \alpha \\ 1 + \frac{1}{n} & \text{si } x > \alpha \end{cases}$$

appartienne à A .

4. En déduire la distance $d(0, A)$.

Exercice 4 ★★★

Soit (u_n) une suite à valeurs dans un espace vectoriel normé E . On note V l'ensemble des valeurs d'adhérence de (u_n) .

1. Montrer que $V = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\{u_k, k \geq n\}}$.
2. En déduire que V est fermé.

Exercice 5

Montrer que les seules parties à la fois ouvertes et fermées d'un espace vectoriel normé E sont \emptyset et E .

Exercice 6

Soit E l'ensemble des suites complexes u telles que $\sum_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$ converge. On pose $\|u\| = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$.

L'ensemble $F = \left\{ u \in E, \sum_{n=0}^{+\infty} u_n = 1 \right\}$ est-il fermé ? ouvert ? borné ?

Exercice 7 ★★

Petites Mines MP 2016

Soit $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$. On pose

$$O = \{f \in E \mid f(1) > 0\} \quad \text{et} \quad F = \left\{ f \in E, \int_0^1 f(t) dt \leq 0 \right\}$$

1. Montrer que O est ouvert pour $\|\cdot\|_\infty$.
2. Montrer que F est fermé pour $\|\cdot\|_\infty$ et pour $\|\cdot\|_1$.
3. O est-il ouvert pour $\|\cdot\|_1$?

Exercice 8

On note F l'ensemble des suites réelles nulles à partir d'un certain rang. On note E l'ensemble des suites réelles bornées muni de la norme infinie.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E .
2. F est-il fermé dans E ? ouvert dans E ?

Exercice 9 ★★★★★

Centrale MP

On note E l'ensemble des suites réelles bornées muni de la norme infinie. Les ensembles suivants sont-ils fermés ?

1. l'ensemble A des suites croissantes ;
2. l'ensemble B des suites convergeant vers 0 ;
3. l'ensemble C des suites convergentes ;
4. l'ensemble D des suites admettant 0 pour valeur d'adhérence ;
5. l'ensemble E des suites périodiques.

Exercice 10 ★

1. Montrer que $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, e^{xy} > (x + y)^2\}$ est une partie ouverte de \mathbb{R}^2 .
2. Montrer que $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \ln(1 + x^2 + y^2) \leq x + y\}$ est une partie fermée de \mathbb{R}^2 .
3. Montrer que $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \sin(x + y) = \sqrt{x^2 + y^2}\}$ est une partie fermée de \mathbb{R}^2 .

Exercice 11 ★

On munit l'espace vectoriel E des applications bornées de \mathbb{R} dans \mathbb{R} de la norme infinie. Montrer que

$$F = \{f \in E, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0\}$$

est fermé.

Exercice 12 ★★

On note E_n l'ensemble des polynômes unitaires de degré n à coefficients réels.

1. Montrer que E_n est une partie fermée de $\mathbb{R}_n[X]$.

2. Montrer que $\inf_{P \in E_n} \int_0^1 |P(t)| dt > 0$.

Adhérence et intérieur**Exercice 13**

Montrer que l'adhérence de l'ensemble des matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est l'ensemble des matrices trigonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

On pourra montrer que si $P \in \mathbb{R}[X]$ est scindé sur \mathbb{R} , unitaire et de degré n , alors pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|P(z)| \geq |\operatorname{Im}(z)|^n$.

Exercice 14 ★★★

Soit A une partie convexe d'un espace vectoriel normé E . Montrer que \overline{A} et $\overset{\circ}{A}$ sont convexes.

Exercice 15 ★★★★★

Soient $(n, p, r) \in (\mathbb{N}^*)^2 \times \mathbb{N}$. On pose

$$A_r = \{M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \operatorname{rg} M = r\}$$

$$B_r = \{M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \operatorname{rg} M \leq r\}$$

$$C_r = \{M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \operatorname{rg} M \geq r\}$$

Les ensembles A_r, B_r, C_r sont-ils ouverts ? fermés ?

Déterminer leurs adhérences et leurs intérieurs.

Exercice 16 ★★★★★**X (non PC/PSI) MP 2019**

1. On note A l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré n scindés sur \mathbb{R} à racines simples. Montrer que A est ouvert dans $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Quelle est l'adhérence de A ?

Exercice 17 ★★

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel normé E .

1. Montrer que si F est ouvert, alors $F = E$.
2. Montrer que si $F \neq E$, alors $\overset{\circ}{F} = \emptyset$.

Exercice 18 ★★

Soit F une partie fermée d'un espace vectoriel normé E . Montrer que $\text{Fr}(\text{Fr}(F)) = \text{Fr}(F)$.

Exercice 19 ★★**Orthogonal et topologie**

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace préhilbertien réel E que l'on munit de sa norme euclidienne.

1. Montrer que pour tout $y \in E$, $\varphi_y : x \in E \mapsto \langle x, y \rangle$ est continue.
2. Montrer que F^\perp est fermé dans E .
3. Montrer que de manière générale, $\overline{F} \subset (F^\perp)^\perp$.

Exercice 20 ★

Soit A une partie bornée d'un espace vectoriel normé E . Montrer que \overline{A} est également bornée.

Exercice 21 ★**ESTP 1977**

Soit E un espace vectoriel normé. On note respectivement $\overset{\circ}{X}$ et \overline{X} l'intérieur et l'adhérence d'une partie X de E . On note également $\alpha(X) = \overset{\circ}{\overline{X}}$ et $\beta(X) = \overline{\overset{\circ}{X}}$.

1. Montrer que si X est ouvert, alors $X \subset \alpha(X)$ et que si X est fermé, alors $\beta(X) \subset X$.
2. Montrer que, de manière générale, $\alpha(\alpha(X)) = \alpha(X)$ et $\beta(\beta(X)) = \beta(X)$.
3. Dans cette question, on considère $E = \mathbb{R}$. Déterminer les ensembles $\overline{\mathbb{Q}}$ et $\overset{\circ}{\mathbb{Q}}$.
4. Donner un exemple (dans \mathbb{R} si l'on veut), où les ensembles suivants sont tous distincts :

$$X, \overset{\circ}{X}, \overline{X}, \alpha(X), \beta(X), \alpha(\overset{\circ}{X}), \beta(\overline{X})$$

5. A et B étant deux parties de E , montrer que $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$. Donner un exemple simple où $A \cap \overline{B}$, $\overline{A} \cap B$ et $\overline{A} \cap \overline{B}$ sont distincts et un autre où, A n'étant pas ouvert, $A \cap \overline{B}$ n'est pas inclus dans $A \cap B$.

Densité**Exercice 22****ENS PC 2010**

1. Déterminer f continue de $[0, 1]$ dans \mathbb{R} vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \int_0^1 f(t)t^n dt = 0$$

2. Le résultat précédent persiste-t-il si on change la condition en

$$\forall n \geq n_0, \int_0^1 f(t)t^n dt = 0$$

où n_0 est un entier non nul.

Exercice 23**X MP 2010**

Soit A une partie convexe et dense de \mathbb{R}^n . Montrer que $A = \mathbb{R}^n$.

Exercice 24**ENS MP 2010**

Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite strictement croissante de réels strictement positifs. Montrer l'équivalence des conditions suivantes :

- (i) le sous-espace vectoriel engendré par la famille $(x \mapsto x^{a_n})_{n \geq 0}$ est dense dans $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$

pour la norme $\| \cdot \|_2 : f \mapsto \sqrt{\int_0^1 f^2}$;

- (ii) la série de terme général $\frac{1}{a_n}$ diverge.

Exercice 25

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\int_a^b f(t)t^k dt = 0$. Que peut-on dire de f ?

Exercice 26**Mines MP**

Soit E un espace vectoriel normé.

1. Soit F un sous-espace vectoriel de E . Montrer que \overline{F} est encore un sous-espace vectoriel de E .
2. Soit H un hyperplan de E . Montrer que H est fermé ou dense dans E .

Exercice 27**Lemme de Riemann-Lebesgue**

On considère un segment $[a, b]$ de \mathbb{R} et un espace vectoriel normé de dimension finie E .

1. Soit φ une fonction en escalier sur $[a, b]$ à valeurs dans E . Montrer que

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b e^{i\lambda t} \varphi(t) dt = 0$$

2. Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, b]$ à valeurs dans E . Montrer que

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b e^{i\lambda t} f(t) dt = 0$$

3. Soit f une fonction intégrable sur \mathbb{R} à valeurs dans E . Montrer que

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda t} f(t) dt = 0$$

Exercice 28**Adhérence des matrices diagonalisables**

On note $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ (resp. $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$) l'ensemble des matrices diagonalisables (resp. trigonalisables) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que $\mathcal{D}_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. a. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré d . Montrer que P est scindé dans $\mathbb{R}[X]$ si et seulement si

$$\forall z \in \mathbb{C}, |P(z)| \geq |\operatorname{Im}(z)|^d$$

- b. En déduire que $\overline{\mathcal{D}_n(\mathbb{R})} = \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 29

On note $\mathcal{D}_2(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{T}_2(\mathbb{R})$) l'ensemble des matrices diagonalisables (resp. trigonalisables) de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

1. Montrer que l'application $\varphi : M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mapsto \operatorname{tr}(M)^2 - 4 \det(M)$ est continue.
2. Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Montrer que M est trigonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ si et seulement si $\varphi(M) \geq 0$.
3. En déduire que $\mathcal{D}_2(\mathbb{R})$ n'est pas dense dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
4. Montrer que $\overline{\mathcal{D}_2(\mathbb{R})} = \mathcal{T}_2(\mathbb{R})$.

Exercice 30 ★★

Soient U et V deux parties denses d'un espace vectoriel normé E . On suppose que U est ouvert. Montrer que $U \cap V$ est dense dans E .

Exercice 31 ★★

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$.

1. On suppose A inversible. Montrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.
2. Montrer par un argument de densité que le résultat précédent reste valable si on ne suppose plus A inversible.

Limite et continuité

Exercice 32

Les fonctions suivantes ont-elles une limite en $(0, 0)$?

1. $f(x, y) = (x + y) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$.
2. $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$.
3. $f(x, y) = \frac{|x + y|}{x^2 + y^2}$.
4. $f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$.
5. $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2 - 1}{x} \sin x$.
6. $f(x, y) = x^y$.
7. $f(x, y) = \frac{\sin(x^2) + \sin(y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

Exercice 33 ★★

Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on pose $N_1(P) = \sum_{n=0}^{+\infty} |P^{(n)}(0)|$ et $N_2(P) = \sup_{t \in [-1, 1]} |P(t)|$. On considère l'endomorphisme D de $\mathbb{R}[X]$ défini par $D(P) = P'$ pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$.

1. Vérifier que N_1 et N_2 sont des normes sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer que si l'on munit $\mathbb{R}[X]$ de la norme N_1 , alors D est continu.
3. Montrer que si l'on munit $\mathbb{R}[X]$ de la norme N_2 , alors D n'est pas continu.

Exercice 34

On pose $E = \mathcal{C}^\infty([0, 1], \mathbb{R})$. Montrer que l'application $\varphi : f \in E \mapsto f'$ n'est jamais continue de (E, N) dans (E, N) quelque soit la norme N dont on munit E .

Exercice 35 ★**Mines-Télécom (hors Mines-Ponts) MP 2021**

Soit $E = \mathbb{C}[X]$. Pour $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \in E$, on pose $\|P\| = \sum_{k=0}^{+\infty} |a_k|$. Soit $b \in \mathbb{C}$. On définit l'application $f : P \in E \mapsto P(b)$.

1. Montrer que f est linéaire.
2. Etudier la continuité de f et calculer sa norme subordonnée le cas échéant.

Exercice 36 ★★

On note $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$. On munit E d'une norme définie de la manière suivante :

$$\forall f \in E, \|f\| = \int_0^1 |f(t)| dt$$

Pour $f \in E$, on définit

$$\phi(f) : x \in [0, 1] \mapsto \int_0^x f(t) dt$$

1. Justifier que ϕ est un endomorphisme de E .
2. Démontrer que ϕ est continu.
3. On pose $f_n : x \in [0, 1] \mapsto ne^{-nx}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\|f_n\|$ et $\|\phi(f_n)\|$.
4. En déduire la norme de ϕ subordonnée à la norme $\|\cdot\|$.

Exercice 37 ★

On note E l'ensemble des suites réelles bornées que l'on munit de la norme uniforme. On pose $\Delta : (u_n) \in E \mapsto (u_{n+1} - u_n)$. Montrer que Δ est un endomorphisme continu de E et déterminer sa norme d'opérateur.

Exercice 38 ★★**Banque Mines-Ponts MP 2022**

On fixe $\omega \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}_+^*)$. Pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on pose :

$$T_\omega(f)(x) = \frac{1}{\int_0^x \omega(t) dt} \int_0^x f(t) \omega(t) dt$$

1. Montrer que $T_\omega(f)$ est prolongeable par continuité en 0.
2. Soit $a > 0$. Montrer que T_ω est un endomorphisme continu et injectif de $\mathcal{C}^0([0, a], \mathbb{R})$ muni de la norme infinie.
3. Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, non nulle, telle que : $T_\omega(f) = \lambda f$.
 - a. Donner une équation différentielle vérifiée par f et la résoudre.
 - b. Montrer que $\lambda \in]0, 1]$.

Exercice 39**Norme d'opérateur (ou norme subordonnée)**

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

1. On suppose que $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ sont munis de leurs normes uniformes respectives. Montrer que

$$\|A\| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |A_{i,j}|$$

2. On suppose que $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ sont munis de leurs normes 1 respectives. Montrer que

$$\|A\| = \max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |A_{i,j}|$$

3. On suppose que $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ sont munis de leurs normes 2 respectives. Montrer que

$$\|A\| = \sqrt{\max \operatorname{Sp}(A^T A)}$$

Exercice 40 ★★

On note E l'espace vectoriel des fonctions continues sur $[0, \pi]$ à valeurs dans \mathbb{R} que l'on munit de la norme $\|\cdot\|_\infty$. On note D l'application qui à $f \in E$ associe $D(f) : x \in [0, \pi] \mapsto \int_0^x f(t) \sin(t) dt$. Montrer que D est un endomorphisme continu de E et calculer sa norme d'opérateur.

Exercice 41 ★★★

On munit $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ de la norme 1 définie par

$$\forall f \in E, \|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt$$

On note T l'application qui à $f \in E$ associe l'application $T(f) : x \in [0, 1] \mapsto \int_0^x f(t) dt$.

1. Montrer que T est un endomorphisme de E .
2. Démontrer que T est continu sur $(E, \|\cdot\|_1)$ et déterminer $\|T\|$.
3. Vérifier que la borne supérieure qui définit $\|T\|$ n'est pas atteinte.

Exercice 42**Mines-Télécom (hors Mines-Ponts) MP 2023**

On pose $E = \mathcal{C}^0([0, 1])$ que l'on muni de la norme uniforme $\|\cdot\|_\infty$.
On pose pour $f \in E$,

$$u(f) : x \in [0, 1] \mapsto \int_0^1 \min(x, t) f(t) dt$$

Montrer que u est un endomorphisme continu de E et calculer $\|u\|$.

Compacité**Exercice 43 ★★★****Centrale MP 2010**

Donner un exemple de partie fermée bornée non compacte d'un espace vectoriel normé.

Exercice 44 ★★★★★**ENS Ulm/Lyon/Cachan MP 2001**

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

1. On suppose qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $f^{-1}(\{a\})$ soit un singleton. Montrer que f admet un extremum global.
2. On suppose qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $f^{-1}(\{a\})$ soit compact et non vide. Montrer que f admet un extremum global.
3. On suppose que pour tout $a \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(\{a\})$ est compact. Montrer que $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x)$ existe.

Exercice 45 ★★★★★**Centrale MP 2018**

Soient E un espace vectoriel normé, K un compact de E et $g : K \rightarrow K$ une application 1-lipschitzienne. On cherche à montrer que g est surjective si, et seulement si, c'est une isométrie.

1. On commence par supposer g surjective. On considère x et y dans K ainsi que x_n et y_n des antécédents par g^n de x et y respectivement. On note (x', y') une valeur d'adhérence de la suite $(x_n, y_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Montrer que $x - y$ est une valeur d'adhérence de la suite $(g^n(x') - g^n(y'))_{n \in \mathbb{N}}$.
2. Montrer que la suite $(\|g^n(x') - g^n(y')\|)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $\|x - y\|$. En déduire que g est une isométrie.
3. On suppose maintenant que g est une isométrie. Montrer que g est surjective. Donner un contre-exemple lorsque K est seulement bornée.

Exercice 46 ★★★★★**Centrale MP**

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension finie.

1. Pour un compact K non vide, on pose $\delta(K) = \sup_{(x,y) \in K^2} \|x - y\|$. Montrer que $\delta(K)$ est bien défini. La borne supérieure est-elle atteinte ?
2. Pour $a \in E$, on note \mathcal{S}_a l'ensemble des compacts de E symétriques par rapport à a . Pour B compact de E , on pose

$$T(B) = \left\{ x \in B \mid \forall y \in B, \|x - y\| \leq \frac{1}{2} \delta(B) \right\}$$

Montrer que T induit une application de \mathcal{S}_a dans \mathcal{S}_a .

3. Soit $B_0 \in \mathcal{S}_a$. On pose $B_{n+1} = T(B_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$. Déterminer $\bigcap_{n \geq 0} B_n$.
4. En déduire que toute isométrie de E conserve les milieux.
Remarque : une isométrie de E est une application $u : E \rightarrow E$ telle que $\|u(x) - u(y)\| = \|x - y\|$ pour tout $(x, y) \in E^2$.

Exercice 47 ★★★**Mines MP**

Soit K une partie compacte non vide d'un espace vectoriel normé et $f : K \rightarrow K$ telle que

$$\forall (x, y) \in K^2, x \neq y \implies \|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$$

1. Montrer que f admet un unique point fixe.
2. Soit (x_n) une suite de premier terme $x_0 \in K$ et telle que $x_{n+1} = f(x_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (x_n) converge vers l'unique point fixe de f .
3. Donner un contre-exemple en ne supposant plus K compact.

Exercice 48 ★★★**Principe du maximum pour les polynômes (X 2019)**

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. On note

$$B = \{z \in \mathbb{C}, |z| \leq 1\} \quad \text{et} \quad S = \{z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$$

Montrer que

$$\max_{z \in B} |P(z)| = \max_{z \in S} |P(z)|$$

Exercice 49 ★

Montrer que $O_n(\mathbb{R})$ est une partie compacte de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 50

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On suppose que $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Montrer que f admet un minimum sur E .

Exercice 51 ★★★

Soient K et L des parties respectives de deux espaces vectoriels normés E et F . On suppose K compacte. Soit $f : K \rightarrow L$ bijective et continue. Montrer que f^{-1} est continue.

Exercice 52 ★★★★★**Théorème de compacité de Riesz**

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.

1. Soit F un sous-espace vectoriel fermé de E tel que $F \neq E$.
 - a. Soit $x \in E \setminus F$. Justifier que $\delta = d(x, F) > 0$.
 - b. Justifier qu'il existe $v \in F$ tel que $0 < \|x - v\| \leq 2\delta$.
 - c. On pose $u = \frac{x - v}{\|x - v\|}$. Justifier que $d(u, F) \geq \frac{1}{2}$.
2. On note B la boule unité fermée de E i.e. $B = \{x \in E, \|x\| \leq 1\}$. Montrer que si E n'est pas de dimension finie, alors B n'est pas compacte.

Exercice 53 ★★**Matrices stochastiques**

On note \mathcal{S} l'ensemble des matrices *stochastiques* de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, c'est-à-dire l'ensemble des matrices $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ à *coefficients positifs* et telles que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=1}^p M_{i,j} = 1$$

Montrer que \mathcal{S} est une partie compacte de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

Exercice 54 ★★★★★

Soient X une partie non vide d'un espace vectoriel normé E et $a \in E$.

1. On suppose X compacte. Montrer qu'il existe $x_0 \in X$ tel que $\|a - x_0\| \leq \|a - x\|$ pour tout $x \in X$.
2. On suppose X fermée et E de dimension finie. Montrer qu'il existe $x_0 \in X$ tel que $\|a - x_0\| \leq \|a - x\|$ pour tout $x \in X$.

Exercice 55 ★★★★★

Soit E un espace vectoriel normé. On note B la boule unité fermée de E et S la sphère unité de E . Montrer que S est compacte si et seulement si B est compacte.

Connexité**Exercice 56****ENS MP 2010**

1. Soient $r, n \in \mathbb{N}^*$, f_1, \dots, f_r des formes linéaires sur \mathbb{R}^n formant une famille libre. Quel est le nombre de composantes connexes par arcs de $\mathbb{R}^n \setminus \bigcup_{i=1}^r \text{Ker } f_i$?
2. Même question en remplaçant \mathbb{R} par \mathbb{C} .

Exercice 57

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel normé de dimension supérieure ou égale à 2.

1. Montrer que la sphère unité S de E est connexe par arcs.
2. En déduire que toutes les sphères de E sont connexes par arcs.

Exercice 58 ★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $O_n(\mathbb{R})$ est-il connexe par arcs ?

Exercice 59 ★★

Montrer que $SO_2(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

Exercice 60 ★★★★★**Connexité par arcs de $GL_n(\mathbb{C})$**

1. Soit $(A, B) \in GL_n(\mathbb{C})^2$. On pose

$$d : z \in \mathbb{C} \mapsto \det((1 - z)A + zB)$$

Montrer que $V = \{z \in \mathbb{C}, d(z) \neq 0\}$ est connexe par arcs.

2. En déduire que $GL_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.

Exercice 61 ★★

1. Déterminer les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x)^3 = x^3$.
2. Déterminer les applications $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ continues telles que $\forall z \in \mathbb{C}, f(z)^3 = z^3$.

Exercice 62 ★★★

Soit $f : \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Montrer que f n'est pas injective.

Exercice 63 ★★★

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Montrer que f n'est pas injective.