

作业二

最优化方法

截止时间：11 月 13 日 23:59 (周三晚)

请在规定时间前提交到大夏学堂，超时得分将有折扣。
计算、证明题提交 pdf 电子版，编程题提交 Python 代码、结果及必要的解释。

1 带 ℓ_2 惩罚的部分优化问题

考虑问题

$$\min_{\beta, \sigma \geq 0} f(\beta) + \frac{\lambda}{2} \sum_{i=1}^n g(\beta_i, \sigma_i), \quad (1)$$

其中， f 为定义在 \mathbb{R}^n 上的凸函数， $\lambda \geq 0$ ，且

$$g(x, y) = \begin{cases} x^2/y + y & \text{if } y > 0 \\ 0 & \text{if } x = 0, y = 0 \\ \infty & \text{else.} \end{cases}$$

a. 证明 g 是凸函数，即上述问题为凸优化问题。（后面我们可根据此进行部分优化，且部分优化后的函数也是凸函数）

b. 证明：

$$\min_{y \geq 0} g(x, y) = 2|x|$$

c. 证明问题 (1) 中对于 $\sigma \geq 0$ 的优化可得 ℓ_1 惩罚问题

$$\min_{\beta} f(\beta) + \lambda \|\beta\|_1.$$

2 Lipschitz 梯度与强凸性

令 f 为二次连续可微的凸函数

a. 证明以下命题等价：

- ∇f 为 L -Lipschitz 函数
(若函数 g 为 L -Lipschitz，即存在常数 $L > 0$ ，使得 $\|g(x) - g(y)\|_2 \leq L\|x - y\|_2$ ，对任意 x, y .)
- 对任意 x, y ， $(\nabla f(x) - \nabla f(y))^\top (x - y) \leq L\|x - y\|_2^2$
- 对任意 x ， $\nabla^2 f(x) \preceq LI$
- 对任意 x, y ， $f(y) \leq f(x) + \nabla f(x)^\top (y - x) + \frac{L}{2}\|y - x\|_2^2$

循环证明 $i \Rightarrow ii, ii \Rightarrow iii, iii \Rightarrow iv, iv \Rightarrow ii, iii \Rightarrow i$

b. 证明以下命题等价:

- i. f 为 m -强凸函数 (即 $f(x) - \frac{m}{2}\|x\|_2^2$ 为凸函数)
- ii. 对任意 x, y , $(\nabla f(x) - \nabla f(y))^\top (x - y) \geq m\|x - y\|_2^2$
- iii. 对任意 x , $\nabla^2 f(x) \succeq mI$
- iv. 对任意 x, y , $f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^\top (y - x) + \frac{m}{2}\|y - x\|_2^2$

循环证明 $i \Rightarrow ii, ii \Rightarrow iii, iii \Rightarrow iv, iv \Rightarrow i$

3 实践：使用 Pytorch 编写带回溯线搜索的梯度下降算法

- 确保你已经配置好 Python 环境，并已安装 Pytorch。
- Pytorch: <https://pytorch.org>
- 根据所给模板，编写带回溯线搜索的梯度下降函数，并用该函数解决以下非约束光滑优化问题：

– Rosenbrock 函数

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} (1 - x_1)^2 + 100(x_2 - x_1^2)^2. \quad (2)$$

– Beale 函数

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} (1.5 - x_1 + x_1 x_2)^2 + (2.25 - x_1 + x_1 x_2^2)^2 + (2.625 - x_1 + x_1 x_2^3)^2. \quad (3)$$

– 线性回归问题（已给定模拟数据）

$$\min_{\beta \in \mathbb{R}^p} \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta^\top x_i)^2. \quad (4)$$

– 逻辑回归问题（已给定模拟数据）

$$\min_{\beta \in \mathbb{R}^p} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(1 + \exp(-y_i \beta^\top x_i)). \quad (5)$$