

FOLHETO INFORMATIVO

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Brufen 400 mg cápsulas moles ibuprofeno

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento, pois contém informação importante para si.

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico, se a febre durar mais de 3 dias ou se a dor durar mais de 3 dias em adolescentes ou 4 dias em adultos.

O que contém este folheto

1. O que é Brufen e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Brufen
3. Como tomar Brufen
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Brufen
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Brufen e para que é utilizado

O ibuprofeno, a substância ativa deste medicamento, atua reduzindo a dor e a febre.

Brufen 400 mg está indicado em adultos e adolescentes com peso igual ou superior a 40 kg (com idade igual e superior a 12 anos) para o tratamento sintomático de curta duração de dores ligeiras a moderadas, como dores de cabeça, dores de dentes, dores menstruais e febre.

Deve consultar um médico se os sintomas piorarem ou não melhorarem e se a febre durar mais de 3 dias ou a dor durar mais de 3 dias em adolescentes ou 4 dias em adultos.

2. O que precisa de saber antes de tomar Brufen

Não tome Brufen

- Se tem alergia ao ibuprofeno ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- Se teve reações alérgicas, como erupções na pele com comichão, inchaço da face, lábios, língua ou garganta, corrimento nasal, dificuldade em respirar ou asma após ter tomado medicamentos que contêm ácido acetilsalicílico ou outros medicamentos para a dor e inflamação (AINEs).
- Se sofreu de hemorragia ou perfuração gastrointestinal relacionada com a utilização anterior de medicamentos para a dor e inflamação (AINEs).
- Se tem atualmente uma úlcera ou hemorragia ativa no estômago ou no intestino delgado (duodeno) ou se teve dois ou mais episódios destes no passado.
- Se tem doença grave do fígado, rins ou coração.
- Se estiver no terceiro trimestre de gravidez.
- Se sofre de uma condição de origem desconhecida que resulta na formação anormal de células sanguíneas.
- Se tem alguma hemorragia ativa (incluindo no cérebro).
- Se tem condições que envolvem uma tendência aumentada para ter hemorragias.

- Se tem desidratação grave (por exemplo causada por vômitos, diarreia ou ingestão insuficiente de líquidos).

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Brufen:

- Se teve ou desenvolveu uma úlcera, hemorragia ou perfuração no estômago ou duodeno, que se pode manifestar por dor abdominal intensa ou persistente e/ou fezes pretas, ou mesmo sem sintomas de aviso prévios. Este risco é maior quando se utilizam doses elevadas e tratamentos prolongados, em doentes com histórico de úlceras pépticas e em doentes idosos.
- Se sofre de doença de Crohn (uma doença crónica em que o sistema imunitário ataca o intestino, causando inflamação que geralmente leva a diarreia com sangue) ou colite ulcerosa, dado que os medicamentos com ibuprofeno podem agravar estas doenças.
- Se tem edema (retenção de líquidos).
- Se sofre de asma ou qualquer outra doença respiratória.
- Se sofre ou já sofreu de uma afeção cardíaca ou tem pressão arterial alta.
- Se tem doença renal ou hepática, tem mais de 60 anos de idade ou precisa de tomar este medicamento por recomendação médica durante um período prolongado (mais de 1 a 2 semanas), o seu médico poderá ter de realizar exames regulares.
- Se tem sintomas de desidratação, por exemplo, diarreia ou vômitos graves, beba muitos líquidos e contacte imediatamente o seu médico, pois, neste caso específico, o ibuprofeno pode causar insuficiência renal como resultado da desidratação.
- Em adolescentes desidratados, existe o risco de deterioração da função renal.
- Se está a tomar simultaneamente medicamentos que alteram a coagulação sanguínea, como anticoagulantes orais, medicamentos anti-agregantes plaquetários do tipo ácido acetilsalicílico. Deve também discutir a utilização de outros medicamentos que possam aumentar o risco de hemorragia, como corticosteroides e antidepressivos inibidores seletivos da recaptação da serotonina.
- Se está a ser tratado com diuréticos (medicamentos para urinar), o seu médico deverá monitorizar a sua função renal.
- Se tem lúpus eritematoso (uma doença crónica que afeta o sistema imunitário e que pode afetar vários órgãos vitais, o sistema nervoso, os vasos sanguíneos, a pele e as articulações) dado que pode ocorrer meningite asséptica.
- Se tem porfiria intermitente aguda (uma doença metabólica que afeta o sangue e pode causar sintomas como vermelhidão na urina ou doença hepática), para avaliar se o tratamento com ibuprofeno é adequado.
- Se sofre de dores de cabeça após um tratamento prolongado, não deve tomar doses mais elevadas deste medicamento.
- Reações alérgicas são possíveis com a toma deste medicamento.
- O médico irá proceder a um controlo mais rigoroso se receber ibuprofeno após uma cirurgia *major*.
- Se tem uma infeção, ver abaixo o título “Infeções”.
- Não é recomendado tomar este medicamento se tiver varicela.
- É importante que utilize a menor dose que alivie/controle a dor e não deve tomar este medicamento por mais tempo do que o necessário para controlar os seus sintomas.
- Foram notificados sinais de reação alérgica a este medicamento, incluindo problemas respiratórios, inchaço da face e da região do pescoço (angioedema) e dor no peito com ibuprofeno. Pare imediatamente de tomar Brufen e contacte imediatamente o seu médico ou os serviços de urgência se detetar algum destes sinais.

Precauções cardiovasculares

Os medicamentos anti-inflamatórios/analgésicos, como o ibuprofeno, podem estar associados a um pequeno aumento do risco de ataque cardíaco ou enfarte, especialmente se utilizados em doses elevadas. Não deve ser excedida a dose recomendada nem o tempo de duração do tratamento.

Deverá aconselhar-se sobre o tratamento com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Brufen, se:

- tiver problemas cardíacos, incluindo insuficiência cardíaca e angina de peito (dor no peito) ou se já tiver tido um ataque cardíaco, cirurgia de bypass, doença arterial periférica (má circulação nas

pernas ou pés devido a estreitamento ou bloqueio das artérias) ou qualquer tipo de AVC (incluindo “mini-AVC” ou acidente isquémico transitório, “AIT”).

- tiver pressão arterial alta, diabetes, colesterol alto, histórico familiar de doença cardíaca ou AVC, ou se for fumador.

Este tipo de medicamento também pode causar retenção de líquidos, especialmente em doentes com insuficiência cardíaca e/ou pressão arterial alta (hipertensão).

Reações cutâneas

Foram notificadas reações cutâneas graves, incluindo dermatite esfoliativa, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica, reação a fármaco com eosinofilia e sintomas sistémicos (DRESS), pustulose exantematosa generalizada aguda (PEGA), em associação com o tratamento com ibuprofeno. Pare de tomar Brufen e procure imediatamente aconselhamento médico se detetar algum dos sintomas relacionados com estas reações cutâneas graves descritas na secção 4.

Infeções

O ibuprofeno pode ocultar sinais de infeção, tais como febre e dor. Consequentemente, é possível que Brufen possa atrasar o tratamento adequado da infeção, o que pode levar a um risco aumentado de complicações. Isto foi observado na pneumonia causada por bactérias e em infeções cutâneas bacterianas relacionadas com a varicela. Se estiver a tomar este medicamento enquanto tem uma infeção e os seus sintomas da infeção persistirem ou se agravarem, consulte imediatamente um médico.

Outros medicamentos e Brufen

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Brufen pode afetar ou ser afetado por outros medicamentos.

Por exemplo:

- medicamentos anticoagulantes (por exemplo, para prevenir a coagulação/diluir o sangue, por exemplo, ácido acetilsalicílico, varfarina, ticlopidina);
- medicamentos para reduzir a pressão arterial alta (inibidores da ECA, como captopril, beta-bloqueadores, como medicamentos à base de atenolol e antagonistas dos recetores da angiotensina II, como losartan);
- medicamentos antiagregantes plaquetários (previnem a formação de trombos ou coágulos nos vasos sanguíneos), como ticlopidina ou ácido acetilsalicílico;
- outros AINEs, como ácido acetilsalicílico;
- corticoides, como cortisona e prednisolona;
- inibidores seletivos da recaptção da serotonina (utilizados para tratar a depressão);
- lítio (utilizado para tratar a depressão);
- metotrexato (utilizado para tratar o cancro e doenças inflamatórias). O seu médico poderá ter que ajustar a dose deste medicamento;
- mifepristona (indutor de aborto);
- digoxina e outros glicosídeos cardiotónicos (utilizados para afeções cardíacas);
- hidantoínas, como fenitoína (utilizada no tratamento da epilepsia);
- sulfamidas, como sulfametoxazol e cotrimoxazol (utilizadas para infeções bacterianas);
- diuréticos (medicamentos utilizados para aumentar a eliminação da urina);
- pentoxifilina (utilizada em perturbações circulatórias);
- probenecida (utilizada em doentes com gota ou para infeções em conjunto com penicilina);
- antibióticos do grupo das quinolonas, como norfloxacin;
- sulfinpirazona (para o tratamento da gota);
- insulina e hipoglicemiantes orais (utilizados para baixar a glicemia);
- ciclosporina e tacrolimus (utilizados para prevenir a rejeição de transplantes de órgãos);
- trombolíticos (medicamentos que dissolvem ou desintegram coágulos sanguíneos);
- zidovudina (medicamento utilizado contra o vírus VIH);
- antibióticos aminoglicosídeos, como a neomicina;
- extratos de ervas: da árvore Ginkgo biloba;

- baclofeno (utilizado para tratar contrações musculares involuntárias e persistentes);
- resinas de troca iônica, como colestiramina (utilizadas para reduzir os níveis de colesterol no sangue);
- tacrina (utilizada no tratamento da doença de Alzheimer);
- inibidores do CYP2C9, como voriconazol e fluconazol.

Outros medicamentos podem também afetar ou ser afetados pelo tratamento com Brufen. Por esse motivo procure sempre o aconselhamento do seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Brufen com outros medicamentos.

Interação com testes analíticos

Se estiver a realizar algum teste de diagnóstico (incluindo análises de sangue, exames de urina, testes cutâneos com alérgenos, etc.), informe o seu médico que está a tomar ou tomou recentemente este medicamento dado que pode alterar os resultados.

Brufen com alimentos, bebidas e álcool

Evite beber álcool dado que pode aumentar os efeitos indesejáveis deste medicamento, especialmente os que afetam o estômago, os intestinos ou o cérebro.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Não tome ibuprofeno se estiver nos últimos 3 meses de gravidez, pois poderá prejudicar o feto ou causar problemas durante o parto. Pode causar problemas renais e cardíacos no feto. Poderá afetar a sua tendência, ou a do seu bebé, para hemorragias e pode fazer com que o trabalho de parto seja mais tardio ou mais longo do que o esperado. Não deverá tomar ibuprofeno durante os primeiros 6 meses de gravidez a não ser que seja absolutamente necessário e se for aconselhado pelo seu médico. Se precisar de tratamento durante este período ou enquanto estiver a tentar engravidar, deve utilizar a dose mais baixa possível e a duração do tratamento a mais curta possível. No caso de toma durante mais do que alguns dias a partir da 20.^a semana de gravidez, o ibuprofeno pode causar problemas renais no feto, o que poderá ter como consequência níveis reduzidos do líquido amniótico que envolve o bebé (oligohidrâmnio) ou o estreitamento de um vaso sanguíneo (canal arterioso) no coração do bebé. Se precisar de tratamento durante mais do que alguns dias, o seu médico poder-lhe-á recomendar uma monitorização adicional.

Este medicamento passa para o leite materno, mas pode ser tomado durante a amamentação se for utilizado na dose recomendada durante o período de tempo mais curto possível.

Para doentes com potencial para engravidar, deve ter-se em atenção que medicamentos do tipo ibuprofeno têm sido associados a uma redução na capacidade de conceber. Evite tomar este medicamento se estiver a tentar engravidar.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Se sentir tonturas, vertigens, perturbações da visão ou outros sintomas enquanto estiver a tomar este medicamento, não conduza nem utilize máquinas perigosas.

Este medicamento contém sorbitol

Este medicamento contém 72,4 mg de sorbitol em cada cápsula, o que equivale a 1,03 mg/kg.

Este medicamento contém potássio

Este medicamento contém menos do que 1 mmol (39 mg) de potássio por cápsula, ou seja, é praticamente “isento de potássio”.

3. Como tomar Brufen

A dose recomendada é:

- Adultos e adolescentes com peso igual ou superior a 40 kg (com idade igual e superior a 12 anos):
A dose única recomendada é de 400 mg (1 cápsula), que pode ser tomada até 3 vezes por dia, se necessário. O intervalo entre as doses deve ser de, pelo menos, 6 horas.
A dose diária máxima é de 3 cápsulas (1200 mg de ibuprofeno), que não deve ser excedida num período de 24 horas.
- Os doentes com doença renal, hepática ou cardíaca devem consultar o seu médico dado que a dose pode ter de ser reduzida.
Doentes com mais de 65 anos de idade: a quantidade a ser tomada deve ser estabelecida pelo médico dado que pode ser necessária uma redução da dose habitual.

Deve ser utilizada a menor dose eficaz durante o menor período de tempo necessário para o alívio dos sintomas. Se tiver uma infeção, consulte de imediato um médico se os sintomas (tais como febre e dor) persistirem ou se agravarem (ver secção 2).

Crianças com menos de 12 anos de idade e adolescentes com peso inferior a 40 kg

Este medicamento não se destina a crianças com menos de 12 anos de idade e adolescentes com peso inferior a 40 kg, devido à dose de 400 mg de ibuprofeno. Existem outras dosagens mais adequadas para este grupo etário/peso corporal.

Como tomar

Este medicamento é tomado por via oral.

Tome o medicamento com um copo de água. Não mastigue.

Tome o medicamento com as refeições, especialmente se tiver problemas digestivos.

Duração do tratamento

A toma deste medicamento está condicionada pelo aparecimento de dor ou febre. Quando estes sintomas desaparecem, o medicamento deve ser interrompido.

Em adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos, se for necessário utilizar este medicamento durante mais de 3 dias ou se os sintomas se agravarem, deve consultar um médico.

Em adultos, no caso de agravamento dos sintomas, se a febre durar mais de 3 dias ou se a dor persistir por mais de 4 dias, consulte um médico.

Se tomar mais Brufen do que deveria

Se tomar mais Brufen do que deveria ou se uma criança tomou acidentalmente o medicamento, consulte imediatamente um médico ou ligue para o contacto nacional para notificação de informações toxicológicas, indicando o medicamento e a quantidade tomada, ou dirija-se ao hospital mais próximo para se informar sobre os riscos e pedir aconselhamento sobre as medidas a tomar. Recomenda-se que forneça ao profissional de saúde a embalagem e o folheto informativo do medicamento.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir dor de estômago, náuseas, vômitos (que podem conter expetoração com sangue), hemorragia gastrointestinal (ver também a parte 4 abaixo), diarreia, dor de cabeça, confusão, movimentos involuntários dos olhos e zumbido nos ouvidos. Também pode ocorrer agitação, sonolência, desorientação ou coma. Ocasionalmente, os doentes desenvolvem convulsões. Em doses elevadas, foram notificadas hipotensão, acidose metabólica, coma, sintomas de sonolência, dor torácica, palpitações, perda de consciência, convulsões (principalmente em crianças), fraqueza e tonturas, sangue presente na urina, baixo nível de potássio no sangue, arrepios e dificuldade em respirar. Além disso, o tempo de protrombina/INR pode prolongar-se, provavelmente devido à interferência com

as ações dos fatores de coagulação circulantes. Pode ocorrer insuficiência renal aguda e lesões hepáticas. É possível a exacerbação da asma em asmáticos. Além disso, pode ocorrer pressão arterial baixa e respiração reduzida.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Os efeitos adversos são mais frequentes em pessoas com mais de 65 anos. A ocorrência de efeitos adversos é menor em tratamentos de curta duração e se a dose diária for inferior à dose máxima recomendada.

PARE de tomar este medicamento e consulte um médico imediatamente, se tiver:

- **sinais de hemorragia intestinal**, tais como: dor intensa no abdômen, fezes pretas ou pegajosas e vômitos com sangue ou partículas escuras que se assemelham a grãos de café moídos;
- **sinais de uma reação alérgica muito rara, mas grave**, tais como agravamento da asma, pieira ou alteração da respiração de origem desconhecida, inchaço da face, língua ou garganta, dificuldade em respirar, aceleração cardíaca, diminuição da pressão arterial conduzindo a choque. Estes podem ocorrer mesmo na primeira utilização deste medicamento;
- **reações cutâneas graves**, tais como erupções cutâneas que cobrem todo o corpo, descamação, formação de bolhas ou descamação da pele.
- áreas da pele avermelhadas não inchadas, em forma de alvo ou circulares, no tronco, muitas vezes com bolhas no centro, descamação da pele, úlceras na boca, garganta, nariz, órgãos genitais e olhos. Estas erupções cutâneas graves podem ser antecedidas de febre e sintomas semelhantes à gripe [dermatite esfoliativa, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica].
- erupção cutânea generalizada, temperatura corporal elevada e gânglios linfáticos aumentados (síndrome DRESS).
- erupção cutânea disseminada, vermelha e escamosa, com inchaço sob a pele e bolhas, acompanhada de febre. Os sintomas aparecem geralmente no início do tratamento (pustulose exantematosa generalizada aguda).

Fale com o seu médico se sentir os seguintes efeitos adversos:

Frequentes (podem afetar até 1 em 10 pessoas):

- problemas gástricos, como azia, dor de estômago e náuseas, indigestão, diarreia, vômitos, flatulência (gases), obstipação e ligeiro sangramento gástrico e/ou intestinal que, em casos excepcionais, pode causar anemia.

Pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 pessoas):

- úlceras, perfuração ou hemorragia gastrointestinais, inflamação da membrana mucosa da boca com ulceração, agravamento de doenças intestinais existentes (colite ulcerosa ou doença de Crohn), gastrite;
- alterações visuais;
- várias erupções cutâneas;
- reações de hipersensibilidade com urticária e comichão.

Raros (podem afetar até 1 em 1000 pessoas):

- acufenos (zumbidos nos ouvidos);
- aumento da concentração de ureia no sangue, dor nas zonas laterais e/ou no abdômen, sangue na urina e febre, que podem ser sinais de lesões nos rins (necrose papilar);
- diminuição dos níveis de hemoglobina.

Muito raros (podem afetar até 1 em 10 000 pessoas):

- esofagite, pancreatite e formação de estenose intestinal do tipo diafragma;
- insuficiência cardíaca, ataque cardíaco e inchaço da face e das mãos (edema);
- diminuição da quantidade de urina, inchaço (edema) e urina turva (síndrome nefrótica), doença renal inflamatória (nefrite intersticial), que pode levar a insuficiência renal aguda. Se sentir algum dos sintomas acima, pare de tomar Brufen e consulte o seu médico imediatamente dado que estes podem ser os primeiros sinais de lesões ou insuficiência renal;
- reações psicóticas, depressão;
- pressão arterial alta, vasculite;
- palpitações;
- disfunção hepática (os primeiros sintomas podem ser a descoloração da pele), lesões no fígado, especialmente quando tratado a longo prazo, insuficiência hepática, inflamação aguda do fígado (hepatite aguda);
- problemas na produção de células sanguíneas. Os sintomas precoces incluem febre, dor de garganta, feridas na boca, sintomas gripais, cansaço excessivo, sangramento do nariz e da pele, e nódulos negros de origem desconhecida. Nestes casos, deve interromper imediatamente o tratamento e consultar o seu médico. Não deve automedicar-se com analgésicos ou medicamentos para reduzir a febre (medicamentos antipiréticos);
- infecções cutâneas graves e complicações nos tecidos moles durante a infeção por varicela;
- foi descrito o agravamento da inflamação associada à infeção (por exemplo, fasciite necrotizante) relacionada com a utilização de alguns analgésicos (AINEs). Se os sinais de infeção aparecerem ou se agravarem, deve consultar um médico imediatamente. Deve ser avaliada a necessidade de tratamento com antibióticos;
- foram observados sintomas de meningite asséptica com rigidez do pescoço, dores de cabeça, náuseas, vômitos, febre ou desorientação durante o tratamento com ibuprofeno. É mais provável que afete doentes com doenças autoimunes (por exemplo, LES, doença mista do tecido conjuntivo). Se isto acontecer, contacte imediatamente o seu médico;
- formas graves de reações cutâneas, como erupções cutâneas com vermelhidão e bolhas (por exemplo, síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, necrólise epidérmica tóxica, síndrome de Lyell) e queda de cabelo (alopecia).

Frequência desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados):

- reatividade do trato respiratório, incluindo asma, broncoespasmo ou dispneia;
- pode ocorrer uma reação cutânea grave conhecida como síndrome DRESS. Os sintomas de síndrome DRESS incluem erupção cutânea, inchaço dos gânglios linfáticos e um aumento dos eosinófilos (um tipo de glóbulos brancos);
- erupção cutânea generalizada, avermelhada e descamativa, com inchaços sob a pele e bolhas, localizada principalmente nas pregas cutâneas, no tronco e nas extremidades superiores, acompanhada por febre no início do tratamento (pustulose exantematosa generalizada aguda, PEGA). Pare de tomar Brufen se desenvolver estes sintomas e procure imediatamente aconselhamento médico. Ver também secção 2;
- a pele tornar-se sensível à luz;
- dores de cabeça, tonturas, insónias, agitação, irritabilidade ou cansaço;
- dor no peito, que pode ser um sinal de uma reação potencialmente grave chamada síndrome de Kounis.

Os medicamentos deste tipo podem estar associados a um ligeiro aumento do risco de ataque cardíaco ou cerebral (enfarte do miocárdio ou AVC). Também foram notificados casos de prolongamento do tempo de hemorragia, edema (retenção de líquidos), pressão arterial alta e insuficiência cardíaca em associação com tratamentos que utilizam medicamentos como o ibuprofeno.

Com base na experiência com AINEs, não se podem excluir casos de nefrite intersticial (doença renal), síndrome nefrótica (doença caracterizada pela presença de proteínas na urina e inchaço do corpo) e insuficiência renal (perda súbita da função renal).

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED, I.P através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>
(preferencialmente)

ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Brufen

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Conservar a uma temperatura inferior a 30 °C.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no blister ou na embalagem exterior, após “EXP”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não utilize este medicamento se verificar qualquer deterioração das cápsulas.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Brufen

- A substância ativa é o ibuprofeno. Cada cápsula mole contém 400 mg de ibuprofeno.
- Os outros componentes são:
 - Núcleo:* macrogol 600, hidróxido de potássio (E525), água purificada.
 - Cápsula:* gelatina (E441), sorbitol, líquido, parcialmente desidratado (E420) e água purificada.

Qual o aspeto de Brufen e conteúdo da embalagem

Brufen são cápsulas moles de gelatina com forma oval (aproximadamente 16 mm x 10 mm), incolores ou ligeiramente amarelas, cheias com uma solução transparente.

Brufen está disponível em embalagens contendo 10, 12, 15, 20 cápsulas moles, acondicionadas em blisters de PVC/PVDC/Al. É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Viatrix Healthcare, Lda.

Av. D. João II, Edifício Atlantis, N.º 44C - 7.3 e 7.4

1990-095 Lisboa

Fabricante

Laboratorios Liconsa S.A.
Pol. Ind. Miralcampo, Avenida Miralcampo nº7
19200, Azuqueca de Henares (Guadalajara),
Espanha

Este folheto foi revisto pela última vez em