

## 第 12 章 e: 傅里叶级数

数学系 梁卓滨

2018-2019 学年 II


# We are here now...

---


1. 周期为  $2\pi$  的周期函数的傅里叶级数

3. 一般周期函数的傅里叶级数


- 设  $f(x)$  是周期函数，周期为  $T = 2\pi$ 。



- 设  $f(x)$  是周期函数，周期为  $T = 2\pi$ 。



- 设  $f(x)$  是周期函数，周期为  $T = 2\pi$ 。




- 注意到三角函数系

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

也具有周期  $2\pi$

- 设  $f(x)$  是周期函数，周期为  $T = 2\pi$ 。




- 注意到三角函数系

$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$

也具有周期  $2\pi$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

- 设  $f(x)$  是周期函数，周期为  $T = 2\pi$ 。



- 注意到三角函数系

$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$

也具有周期  $2\pi$

**问题** 是否有如下展开

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

## 性质 三角函数系

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

在区间  $[-\pi, \pi]$  上正交。



## 性质 三角函数系

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

在区间  $[-\pi, \pi]$  上正交。即上述任意两个相异函数的乘积，在  $[-\pi, \pi]$  上的积分为零：

## 性质 三角函数系

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

在区间  $[-\pi, \pi]$  上正交。即上述任意两个相异函数的乘积，在  $[-\pi, \pi]$  上的积分为零：

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

## 性质 三角函数系

$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$

在区间  $[-\pi, \pi]$  上正交。即上述任意两个相异函数的乘积，在  $[-\pi, \pi]$  上的积分为零：

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cdot \cos nx dx = 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots)$$

## 性质 三角函数系

$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$

在区间  $[-\pi, \pi]$  上正交。即上述任意两个相异函数的乘积，在  $[-\pi, \pi]$  上的积分为零：

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cdot \cos nx dx = 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cdot \sin nx dx = 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots, k \neq n)$$

## 性质 三角函数系

$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$

在区间  $[-\pi, \pi]$  上正交。即上述任意两个相异函数的乘积，在  $[-\pi, \pi]$  上的积分为零：

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cdot \cos nx dx = 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cdot \sin nx dx = 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots, k \neq n)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cdot \cos nx dx = 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots, k \neq n)$$

## 性质 三角函数系

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

在区间  $[-\pi, \pi]$  上正交。即上述任意两个相异函数的乘积，在  $[-\pi, \pi]$  上的积分为零：

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cdot \cos nx dx = 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cdot \sin nx dx = 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots, k \neq n)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cdot \cos nx dx = 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots, k \neq n)$$

另外

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \pi \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

“性质” 若假设  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ , 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

“性质” 若假设  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ , 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$
$$(n = 0, 1, 2, \dots) \quad (n = 1, 2, \dots)$$



“性质” 若假设  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ , 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$
$$(n = 0, 1, 2, \dots) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

“形式推导” (1) 当  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

“性质” 若假设  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ , 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$
$$(n = 0, 1, 2, \dots) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

“形式推导” (1) 当  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \cos nx$$

“性质” 若假设  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ , 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$
$$(n = 0, 1, 2, \dots) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

“形式推导” (1) 当  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \cos nx dx$$

“性质” 若假设  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ , 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$
$$(n = 0, 1, 2, \dots) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

“形式推导” (1) 当  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \cos nx dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} a_n \cos nx \cdot \cos nx dx \end{aligned}$$

“性质” 若假设  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ , 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$
$$(n = 0, 1, 2, \dots) \qquad (n = 1, 2, \dots)$$

“形式推导” (1) 当  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \cos nx dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} a_n \cos nx \cdot \cos nx dx = \begin{cases} \pi a_n, & n = 1, 2, \dots \\ 2\pi a_0, & n = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

“性质” 若假设  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ , 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$
$$(n = 0, 1, 2, \dots) \qquad (n = 1, 2, \dots)$$

“形式推导” (1) 当  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \cos nx dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} a_n \cos nx \cdot \cos nx dx = \begin{cases} \pi a_n, & n = 1, 2, \dots \\ 2\pi a_0, & n = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 当  $n = 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

“性质” 若假设  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ , 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$
$$(n = 0, 1, 2, \dots) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

“形式推导” (1) 当  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \cos nx dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} a_n \cos nx \cdot \cos nx dx = \begin{cases} \pi a_n, & n = 1, 2, \dots \\ 2\pi a_0, & n = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 当  $n = 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \sin nx$$

“性质” 若假设  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ , 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$
$$(n = 0, 1, 2, \dots) \qquad (n = 1, 2, \dots)$$

“形式推导” (1) 当  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \cos nx dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} a_n \cos nx \cdot \cos nx dx = \begin{cases} \pi a_n, & n = 1, 2, \dots \\ 2\pi a_0, & n = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 当  $n = 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \sin nx dx$$



“性质” 若假设  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ , 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$
$$(n = 0, 1, 2, \dots) \qquad (n = 1, 2, \dots)$$

“形式推导” (1) 当  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \cos nx dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} a_n \cos nx \cdot \cos nx dx = \begin{cases} \pi a_n, & n = 1, 2, \dots \\ 2\pi a_0, & n = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 当  $n = 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \sin nx dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} b_n \sin nx \cdot \sin nx dx \end{aligned}$$

“性质” 若假设  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ , 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$
$$(n = 0, 1, 2, \dots) \qquad (n = 1, 2, \dots)$$

“形式推导” (1) 当  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \cos nx dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} a_n \cos nx \cdot \cos nx dx = \begin{cases} \pi a_n, & n = 1, 2, \dots \\ 2\pi a_0, & n = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 当  $n = 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \sin nx dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} b_n \sin nx \cdot \sin nx dx = \pi b_n \end{aligned}$$

定义  $f(x)$  的傅里叶级数定义为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$
$$(n = 0, 1, 2, \dots) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

定义  $f(x)$  的傅里叶级数定义为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

$(n = 0, 1, 2, \dots) \qquad \qquad \qquad (n = 1, 2, \dots)$

问题

- 对哪些  $x$  傅里叶级数  $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$  收敛?
- 对哪些  $x$  成立  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ ?

定义  $f(x)$  的傅里叶级数定义为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

$(n = 0, 1, 2, \dots) \qquad \qquad \qquad (n = 1, 2, \dots)$

问题

- 对哪些  $x$  傅里叶级数  $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$  收敛?
- 对哪些  $x$  成立  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ ?

定理 (收敛定理, 狄利克雷充分条件)

定理（收敛定理，狄利克雷充分条件） 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数，如果它满足：

1. 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点；
2. 在一个周期内至多只有有限个极值点，

定理（收敛定理，狄利克雷充分条件） 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数，如果它满足：

1. 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点；
2. 在一个周期内至多只有有限个极值点，

那么  $f(x)$  的傅里叶级数收敛

定理（收敛定理，狄利克雷充分条件） 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数，如果它满足：

1. 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点；
2. 在一个周期内至多只有有限个极值点，

那么  $f(x)$  的傅里叶级数收敛（但不一定绝对收敛）



定理（收敛定理，狄利克雷充分条件） 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数，如果它满足：

1. 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点；
2. 在一个周期内至多只有有限个极值点，

那么  $f(x)$  的傅里叶级数收敛（但不一定绝对收敛），并且

- 当  $x$  是  $f(x)$  的连续点时，
- 当  $x$  是  $f(x)$  的间断点时，

定理（收敛定理，狄利克雷充分条件） 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数，如果它满足：

1. 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点；
2. 在一个周期内至多只有有限个极值点，

那么  $f(x)$  的傅里叶级数收敛（但不一定绝对收敛），并且

- 当  $x$  是  $f(x)$  的连续点时，

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

- 当  $x$  是  $f(x)$  的间断点时，

定理（收敛定理，狄利克雷充分条件） 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数，如果它满足：

1. 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点；
2. 在一个周期内至多只有有限个极值点，

那么  $f(x)$  的傅里叶级数收敛（但不一定绝对收敛），并且

- 当  $x$  是  $f(x)$  的连续点时，

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

- 当  $x$  是  $f(x)$  的间断点时，

$$\frac{1}{2} [f(x^-) + f(x^+)] = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

例 1 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数, 在  $[-\pi, \pi)$  上的表达式为


$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

求出  $f(x)$  的傅里叶级数。

例 1 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数, 在  $[-\pi, \pi)$  上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$


求出  $f(x)$  的傅里叶级数。



例 1 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数, 在  $[-\pi, \pi)$  上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$


求出  $f(x)$  的傅里叶级数。



例 1 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数, 在  $[-\pi, \pi)$  上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

求出  $f(x)$  的傅里叶级数。




解 计算傅里叶系数如下:

$$a_n$$

例 1 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数, 在  $[-\pi, \pi)$  上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

求出  $f(x)$  的傅里叶级数。



解 计算傅里叶系数如下:


$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$



例 1 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数, 在  $[-\pi, \pi)$  上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

求出  $f(x)$  的傅里叶级数。



解 计算傅里叶系数如下:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$b_n$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot (-1) \cdot \left. \frac{\cos nx}{n} \right|_0^{\pi} \end{aligned}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot (-1) \cdot \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} [1 - \cos n\pi] \end{aligned}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot (-1) \cdot \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} [1 - \cos n\pi] = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n] \end{aligned}$$



$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot (-1) \cdot \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} [1 - \cos n\pi] = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n] \\ &= \begin{cases} n = 1, 3, 5, \dots \\ n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot (-1) \cdot \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} [1 - \cos n\pi] = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n] \\ &= \begin{cases} & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot (-1) \cdot \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} [1 - \cos n\pi] = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n] \\ &= \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot (-1) \cdot \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} [1 - \cos n\pi] = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n] \\ &= \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

所以傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot (-1) \cdot \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} [1 - \cos n\pi] = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n] \\ &= \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

所以傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot (-1) \cdot \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} [1 - \cos n\pi] = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n] \\ &= \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

所以傅里叶级数为

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) &= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx \\ &= \frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots \right] \end{aligned}$$

注 1  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$ ,

注 1  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$ , 利用收

敛定理分析可知:

- 当  $x \neq n\pi$  时,

- 当  $x = n\pi$  是,



注 1  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$ , 利用收

敛定理分析可知:

- 当  $x \neq n\pi$  时, 是  $f$  的连续点,

- 当  $x = n\pi$  是,

注 1  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$ , 利用收敛定理分析可知:

- 当  $x \neq n\pi$  时, 是  $f$  的连续点, 此时

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$$

- 当  $x = n\pi$  是,

注 1  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$ , 利用收敛定理分析可知:

- 当  $x \neq n\pi$  时, 是  $f$  的连续点, 此时

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$$

- 当  $x = n\pi$  是, 是  $f$  的间断点,

注 1  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$ , 利用收敛定理分析可知:

- 当  $x \neq n\pi$  时, 是  $f$  的连续点, 此时

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$$

- 当  $x = n\pi$  是, 是  $f$  的间断点, 此时

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{1}{2} \left[ f(x^-) + f(x^+) \right]$$

注 1  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$ , 利用收敛定理分析可知:

- 当  $x \neq n\pi$  时, 是  $f$  的连续点, 此时

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$$

- 当  $x = n\pi$  是, 是  $f$  的间断点, 此时

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{1}{2} \left[ f(x^-) + f(x^+) \right] = 0$$

注 1  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$ , 利用收敛定理分析可知:

- 当  $x \neq n\pi$  时, 是  $f$  的连续点, 此时

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$$

- 当  $x = n\pi$  是, 是  $f$  的间断点, 此时

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{1}{2} \left[ f(x^-) + f(x^+) \right] = 0$$

(显然, 可直接看出当  $x = n\pi$  时傅里叶级数的值为 0)

注1  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots \right]$ , 利用收敛定理分析可知:

- 当  $x \neq n\pi$  时, 是  $f$  的连续点, 此时

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots \right]$$

- 当  $x = n\pi$  是, 是  $f$  的间断点, 此时

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots \right] = \frac{1}{2} [f(x^-) + f(x^+)] = 0$$

(显然, 可直接看出当  $x = n\pi$  时傅里叶级数的值为 0)

注2 取  $x = \frac{\pi}{2}$ , 可得到

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \dots$$

注1  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$ , 利用收敛定理分析可知:

- 当  $x \neq n\pi$  时, 是  $f$  的连续点, 此时

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$$

- 当  $x = n\pi$  是, 是  $f$  的间断点, 此时

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{1}{2} [f(x^-) + f(x^+)] = 0$$

(显然, 可直接看出当  $x = n\pi$  时傅里叶级数的值为 0)

注2 取  $x = \frac{\pi}{2}$ , 可得到

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \cdots = \frac{\pi}{4}$$



**注 1**  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$ , 利用收敛定理分析可知:

- 当  $x \neq n\pi$  时, 是  $f$  的连续点, 此时

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$$

- 当  $x = n\pi$  是, 是  $f$  的间断点, 此时

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{1}{2} [f(x^-) + f(x^+)] = 0$$

(显然, 可直接看出当  $x = n\pi$  时傅里叶级数的值为 0)

**注 2** 取  $x = \frac{\pi}{2}$ , 可得到

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \cdots = \frac{\pi}{4}$$

**注 3** 当  $x = \frac{\pi}{2}$ , 傅里叶级数仅仅是条件收敛

**注 1**  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$ , 利用收敛定理分析可知:

- 当  $x \neq n\pi$  时, 是  $f$  的连续点, 此时

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$$

- 当  $x = n\pi$  是, 是  $f$  的间断点, 此时

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{1}{2} [f(x^-) + f(x^+)] = 0$$

(显然, 可直接看出当  $x = n\pi$  时傅里叶级数的值为 0)

**注 2** 取  $x = \frac{\pi}{2}$ , 可得到

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \cdots = \frac{\pi}{4}$$

**注 3** 当  $x = \frac{\pi}{2}$ , 傅里叶级数仅仅是条件收敛

**注 4** 奇函数  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$

$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$$

$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$

$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$

考虑部分和


$$\frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$

$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$

考虑部分和

$$\frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$




$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$

考虑部分和

$$\frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$




$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$

考虑部分和

$$\frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$






$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots \right] = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$

考虑部分和

$$\frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$




$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$

考虑部分和

$$\frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$




$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$

考虑部分和

$$\frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$




$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$

考虑部分和

$$\frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$




$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$

考虑部分和

$$\frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$




$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$

考虑部分和

$$\frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$



例 2 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数，在  $[-\pi, \pi)$  上的表达式为


$$f(x) = |x|$$

求出  $f(x)$  的傅里叶级数。

例 2 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数，在  $[-\pi, \pi)$  上的表达式为

$$f(x) = |x|$$

求出  $f(x)$  的傅里叶级数。






例 2 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数，在  $[-\pi, \pi)$  上的表达式为

$$f(x) = |x|$$


求出  $f(x)$  的傅里叶级数。



例 2 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数，在  $[-\pi, \pi)$  上的表达式为

$$f(x) = |x|$$

求出  $f(x)$  的傅里叶级数。




解 计算傅里叶系数如下：

$$b_n$$

例 2 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数，在  $[-\pi, \pi)$  上的表达式为

$$f(x) = |x|$$

求出  $f(x)$  的傅里叶级数。




解 计算傅里叶系数如下：

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

例 2 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数，在  $[-\pi, \pi)$  上的表达式为

$$f(x) = |x|$$

求出  $f(x)$  的傅里叶级数。



解 计算傅里叶系数如下：

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$a_n =$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx$$



$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \sin nx \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \sin nx = \frac{2}{n\pi} \left[ x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \sin nx = \frac{2}{n\pi} \left[ x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[ \frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right] \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \sin nx = \frac{2}{n\pi} \left[ x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[ \frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{2}{n^2\pi} \left[ (-1)^n - 1 \right] \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \sin nx = \frac{2}{n\pi} \left[ x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[ \frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{2}{n^2\pi} \left[ (-1)^n - 1 \right] = \begin{cases} n = 1, 3, 5, \dots \\ n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \sin nx = \frac{2}{n\pi} \left[ x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[ \frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{2}{n^2\pi} \left[ (-1)^n - 1 \right] = \begin{cases} -\frac{4}{n^2\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \sin nx = \frac{2}{n\pi} \left[ x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[ \frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{2}{n^2\pi} \left[ (-1)^n - 1 \right] = \begin{cases} -\frac{4}{n^2\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \sin nx = \frac{2}{n\pi} \left[ x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[ \frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{2}{n^2\pi} \left[ (-1)^n - 1 \right] = \begin{cases} -\frac{4}{n^2\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$a_0$$



$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \sin nx = \frac{2}{n\pi} \left[ x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[ \frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{2}{n^2\pi} \left[ (-1)^n - 1 \right] = \begin{cases} -\frac{4}{n^2\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \sin nx = \frac{2}{n\pi} \left[ x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[ \frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{2}{n^2\pi} \left[ (-1)^n - 1 \right] = \begin{cases} -\frac{4}{n^2\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \sin nx = \frac{2}{n\pi} \left[ x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[ \frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{2}{n^2\pi} \left[ (-1)^n - 1 \right] = \begin{cases} -\frac{4}{n^2\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \sin nx = \frac{2}{n\pi} \left[ x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[ \frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{2}{n^2\pi} \left[ (-1)^n - 1 \right] = \begin{cases} -\frac{4}{n^2\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{\pi}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \sin nx = \frac{2}{n\pi} \left[ x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[ \frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{2}{n^2\pi} \left[ (-1)^n - 1 \right] = \begin{cases} -\frac{4}{n^2\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{\pi} = \pi.$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \sin nx = \frac{2}{n\pi} \left[ x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[ \frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{2}{n^2\pi} [(-1)^n - 1] = \begin{cases} -\frac{4}{n^2\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{\pi} = \pi.$$

所以傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \sin nx = \frac{2}{n\pi} \left[ x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[ \frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{2}{n^2\pi} \left[ (-1)^n - 1 \right] = \begin{cases} -\frac{4}{n^2\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{\pi} = \pi.$$

所以傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \dots \right]$$

注 1  $f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right]$$



注 1  $f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right]$$

又因为  $f(x)$  是连续函数,

注 1  $f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right]$$

又因为  $f(x)$  是连续函数，故利用收敛定理分析可知：

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right]$$

注 1  $f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right]$$

又因为  $f(x)$  是连续函数，故利用收敛定理分析可知：

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right]$$

注 2 取  $x = 0$ ，可得到

注 1  $f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right]$$

又因为  $f(x)$  是连续函数，故利用收敛定理分析可知：

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right]$$

注 2 取  $x = 0$ ，可得到

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$$

注1  $f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right]$$

又因为  $f(x)$  是连续函数, 故利用收敛定理分析可知:

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right]$$

注2 取  $x = 0$ , 可得到

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$$

注3 偶函数  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$

$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right]$$

$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right] = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}$$

$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right] = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}$$

考虑部分和

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{(2n-1)^2} \cos[(2n-1)x]$$




$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right] = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}$$

考虑部分和

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{(2n-1)^2} \cos[(2n-1)x]$$




$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right] = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}$$

考虑部分和

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{(2n-1)^2} \cos[(2n-1)x]$$

$N = 1$




$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right] = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}$$

考虑部分和

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{(2n-1)^2} \cos[(2n-1)x]$$

$N = 2$




$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right] = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}$$

考虑部分和

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{(2n-1)^2} \cos[(2n-1)x]$$

$N = 3$




$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right] = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}$$

考虑部分和

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{(2n-1)^2} \cos[(2n-1)x]$$

$N = 4$




$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right] = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}$$

考虑部分和

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{(2n-1)^2} \cos[(2n-1)x]$$

$N = 5$




$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right] = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}$$

考虑部分和

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{(2n-1)^2} \cos[(2n-1)x]$$

$N = 6$




$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right] = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}$$

考虑部分和

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{(2n-1)^2} \cos[(2n-1)x]$$

$N = 7$






$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right] = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}$$

考虑部分和

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{(2n-1)^2} \cos[(2n-1)x]$$

$N = 8$



性质 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数,

- 若  $f(x)$  是奇函数, 则傅里叶级数为
- 若  $f(x)$  是偶函数, 则傅里叶级数为

性质 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数,

- 若  $f(x)$  是奇函数, 则傅里叶级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx,$$

- 若  $f(x)$  是偶函数, 则傅里叶级数为

性质 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数,

- 若  $f(x)$  是奇函数, 则傅里叶级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx,$$

- 若  $f(x)$  是偶函数, 则傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx,$$

性质 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数,

- 若  $f(x)$  是奇函数, 则傅里叶级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

- 若  $f(x)$  是偶函数, 则傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx,$$

性质 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数,

- 若  $f(x)$  是奇函数, 则傅里叶级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

- 若  $f(x)$  是偶函数, 则傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx.$$

性质 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数,

- 若  $f(x)$  是奇函数, 则傅里叶级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

- 若  $f(x)$  是偶函数, 则傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx.$$

证明 (1) 假设  $f$  为奇函数, 则

$$a_n =$$

$$b_n =$$

性质 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数,

- 若  $f(x)$  是奇函数, 则傅里叶级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

- 若  $f(x)$  是偶函数, 则傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx.$$

证明 (1) 假设  $f$  为奇函数, 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$



性质 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数,

- 若  $f(x)$  是奇函数, 则傅里叶级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

- 若  $f(x)$  是偶函数, 则傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx.$$

证明 (1) 假设  $f$  为奇函数, 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

性质 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数,

- 若  $f(x)$  是奇函数, 则傅里叶级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

- 若  $f(x)$  是偶函数, 则傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx.$$

证明 (1) 假设  $f$  为奇函数, 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

性质 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数,

- 若  $f(x)$  是奇函数, 则傅里叶级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

- 若  $f(x)$  是偶函数, 则傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx.$$

证明 (2) 假设  $f$  为偶函数, 则

$$b_n =$$

$$a_n =$$

**性质** 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数,

- 若  $f(x)$  是奇函数, 则傅里叶级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

- 若  $f(x)$  是偶函数, 则傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx.$$

**证明** (2) 假设  $f$  为偶函数, 则

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

**性质** 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数,

- 若  $f(x)$  是奇函数, 则傅里叶级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

- 若  $f(x)$  是偶函数, 则傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx.$$

**证明** (2) 假设  $f$  为偶函数, 则

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

性质 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数,

- 若  $f(x)$  是奇函数, 则傅里叶级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

- 若  $f(x)$  是偶函数, 则傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx.$$

证明 (2) 假设  $f$  为偶函数, 则

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$$


# 周期延拓

---

设  $f(x)$  是定义在区间  $[-\pi, \pi)$  (或  $(-\pi, \pi]$ ) 上的函数, 可以对其进行周期延拓, 从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期函数

# 周期延拓


设  $f(x)$  是定义在区间  $[-\pi, \pi)$  (或  $(-\pi, \pi]$ ) 上的函数, 可以对其进行周期延拓, 从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期函数, 如图:






# 周期延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $[-\pi, \pi)$  (或  $(-\pi, \pi]$ ) 上的函数, 可以对其进行**周期延拓**, 从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期函数, 如图:



# 周期延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $[-\pi, \pi)$  (或  $(-\pi, \pi]$ ) 上的函数, 可以对其进行**周期延拓**, 从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期函数, 如图:



延拓后的周期函数任然记为  $f(x)$ , 此时可以进行傅里叶展开。

# 奇延拓


---

设  $f(x)$  是定义在区间  $(0, \pi]$  上的函数，可以对其进行奇延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期奇函数。

# 奇延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $(0, \pi]$  上的函数，可以对其进行奇延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期奇函数。


奇延拓步骤：



# 奇延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $(0, \pi]$  上的函数，可以对其进行奇延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期奇函数。


奇延拓步骤：



# 奇延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $(0, \pi]$  上的函数，可以对其进行奇延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期奇函数。


奇延拓步骤：



# 奇延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $(0, \pi]$  上的函数，可以对其进行奇延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期奇函数。

奇延拓步骤：




# 奇延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $(0, \pi]$  上的函数，可以对其进行奇延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期奇函数。

奇延拓步骤：

- 定义  $f(0) = 0$






# 奇延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $(0, \pi]$  上的函数，可以对其进行奇延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期奇函数。

奇延拓步骤：

- 定义  $f(0) = 0$ ；当  $x \in (-\pi, 0)$  时，定义  $f(x) = -f(-x)$ ；




# 奇延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $(0, \pi]$  上的函数，可以对其进行奇延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期奇函数。

奇延拓步骤：

- 定义  $f(0) = 0$ ；当  $x \in (-\pi, 0)$  时，定义  $f(x) = -f(-x)$ ；  
(此时  $f$  在  $(-\pi, \pi]$  上有定义，且在  $(-\pi, \pi)$  上为奇函数)




# 奇延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $(0, \pi]$  上的函数，可以对其进行奇延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期奇函数。

奇延拓步骤：

- 定义  $f(0) = 0$ ；当  $x \in (-\pi, 0)$  时，定义  $f(x) = -f(-x)$ ；  
(此时  $f$  在  $(-\pi, \pi]$  上有定义，且在  $(-\pi, \pi)$  上为奇函数)
- 周期延拓  $f$  在  $(-\pi, \pi]$  上的取值。




## 偶延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $[0, \pi]$  上的函数，可以对其进行偶延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期偶函数。

## 偶延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $[0, \pi]$  上的函数，可以对其进行偶延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期偶函数。


偶延拓步骤：



## 偶延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $[0, \pi]$  上的函数，可以对其进行偶延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期偶函数。


偶延拓步骤：



## 偶延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $[0, \pi]$  上的函数，可以对其进行偶延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期偶函数。

偶延拓步骤：




## 偶延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $[0, \pi]$  上的函数，可以对其进行偶延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期偶函数。

偶延拓步骤：

- 当  $x \in [-\pi, 0]$  时，定义  $f(x) = f(-x)$ ；






## 偶延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $[0, \pi]$  上的函数，可以对其进行偶延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期偶函数。

偶延拓步骤：

- 当  $x \in [-\pi, 0]$  时，定义  $f(x) = f(-x)$ ；  
(此时  $f$  成为定义在  $[-\pi, \pi]$  上为偶函数)




## 偶延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $[0, \pi]$  上的函数，可以对其进行偶延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期偶函数。

偶延拓步骤：

- 当  $x \in [-\pi, 0]$  时，定义  $f(x) = f(-x)$ ；  
(此时  $f$  成为定义在  $[-\pi, \pi]$  上为偶函数)
- 周期延拓  $f$  在  $[-\pi, \pi]$  上的取值。



# We are here now...

---

1. 周期为  $2\pi$  的周期函数的傅里叶级数

3. 一般周期函数的傅里叶级数

假设  $f(x)$  是定义在  $\mathbb{R}$  上周期函数, 周期为  $T = 2l$ ,

假设  $f(x)$  是定义在  $\mathbb{R}$  上周期函数，周期为  $T = 2l$ ，其傅里叶级数应为：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

假设  $f(x)$  是定义在  $\mathbb{R}$  上周期函数, 周期为  $T = 2l$ , 其傅里叶级数应为:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

假设  $f(x)$  是定义在  $\mathbb{R}$  上周期函数，周期为  $T = 2l$ ，其傅里叶级数应为：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

“推导” 令  $g(x) = f\left(\frac{l}{\pi}x\right)$ ,

假设  $f(x)$  是定义在  $\mathbb{R}$  上周期函数，周期为  $T = 2l$ ，其傅里叶级数应为：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

“推导” 令  $g(x) = f(\frac{l}{\pi}x)$ ，则  $g$  是周期为  $2\pi$  的周期函数：



假设  $f(x)$  是定义在  $\mathbb{R}$  上周期函数，周期为  $T = 2l$ ，其傅里叶级数应为：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

“推导” 令  $g(x) = f(\frac{l}{\pi}x)$ ，则  $g$  是周期为  $2\pi$  的周期函数：

$$g(x + 2\pi)$$

假设  $f(x)$  是定义在  $\mathbb{R}$  上周期函数，周期为  $T = 2l$ ，其傅里叶级数应为：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

“推导” 令  $g(x) = f(\frac{l}{\pi}x)$ ，则  $g$  是周期为  $2\pi$  的周期函数：

$$g(x + 2\pi) = f\left(\frac{l}{\pi}(x + 2\pi)\right)$$

假设  $f(x)$  是定义在  $\mathbb{R}$  上周期函数，周期为  $T = 2l$ ，其傅里叶级数应为：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

“推导” 令  $g(x) = f(\frac{l}{\pi}x)$ ，则  $g$  是周期为  $2\pi$  的周期函数：

$$g(x + 2\pi) = f\left(\frac{l}{\pi}(x + 2\pi)\right) = f\left(\frac{l}{\pi}x + 2l\right)$$

假设  $f(x)$  是定义在  $\mathbb{R}$  上周期函数，周期为  $T = 2l$ ，其傅里叶级数应为：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

“推导” 令  $g(x) = f(\frac{l}{\pi}x)$ ，则  $g$  是周期为  $2\pi$  的周期函数：

$$g(x + 2\pi) = f\left(\frac{l}{\pi}(x + 2\pi)\right) = f\left(\frac{l}{\pi}x + 2l\right) = f\left(\frac{l}{\pi}x\right)$$

假设  $f(x)$  是定义在  $\mathbb{R}$  上周期函数，周期为  $T = 2l$ ，其傅里叶级数应为：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

“推导” 令  $g(x) = f(\frac{l}{\pi}x)$ ，则  $g$  是周期为  $2\pi$  的周期函数：

$$g(x + 2\pi) = f\left(\frac{l}{\pi}(x + 2\pi)\right) = f\left(\frac{l}{\pi}x + 2l\right) = f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x)$$

假设  $f(x)$  是定义在  $\mathbb{R}$  上周期函数，周期为  $T = 2l$ ，其傅里叶级数应为：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

“推导” 令  $g(x) = f(\frac{l}{\pi}x)$ ，则  $g$  是周期为  $2\pi$  的周期函数：

$$g(x + 2\pi) = f\left(\frac{l}{\pi}(x + 2\pi)\right) = f\left(\frac{l}{\pi}x + 2l\right) = f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x)$$

所以

$$g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

假设  $f(x)$  是定义在  $\mathbb{R}$  上周期函数，周期为  $T = 2l$ ，其傅里叶级数应为：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

“推导” 令  $g(x) = f(\frac{l}{\pi}x)$ ，则  $g$  是周期为  $2\pi$  的周期函数：

$$g(x + 2\pi) = f\left(\frac{l}{\pi}(x + 2\pi)\right) = f\left(\frac{l}{\pi}x + 2l\right) = f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x)$$

所以

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$



既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n$$

$$b_n$$

既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \cos n z dz$$

$$b_n$$

既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \cos n z dz$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \sin n z dz$$

既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \cos n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \cos n z dz$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \sin n z dz$$

既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \cos n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \cos n z dz$$

$$\underline{\underline{x = \frac{l}{\pi}z}}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \sin n z dz$$

既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \cos n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \cos n z dz$$

$$\stackrel{x=\frac{l}{\pi}z}{=} \frac{1}{\pi} \int f(x) \cos \frac{n\pi x}{l}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \sin n z dz$$

既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \cos n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \cos n z dz$$

$$\stackrel{x=\frac{l}{\pi}z}{=} \frac{1}{\pi} \int f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} d\left(\frac{\pi}{l}x\right)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \sin n z dz$$



既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \cos n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \cos n z dz$$

$$\stackrel{x=\frac{l}{\pi}z}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} d\left(\frac{\pi}{l}x\right)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \sin n z dz$$

既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \cos n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \cos n z dz \\ &\stackrel{x=\frac{l}{\pi}z}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} d\left(\frac{\pi}{l}x\right) = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \sin n z dz \end{aligned}$$

既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \cos n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \cos n z dz \\ &\stackrel{x=\frac{l}{\pi}z}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} d\left(\frac{\pi}{l}x\right) = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \sin n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \sin n z dz \end{aligned}$$

既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \cos n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \cos n z dz \\ &\stackrel{x=\frac{l}{\pi}z}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} d\left(\frac{\pi}{l}x\right) = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \sin n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \sin n z dz \\ &\stackrel{x=\frac{l}{\pi}z}{=} \end{aligned}$$

既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \cos n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \cos n z dz \\ &\stackrel{x=\frac{l}{\pi}z}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} d\left(\frac{\pi}{l}x\right) = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \sin n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \sin n z dz \\ &\stackrel{x=\frac{l}{\pi}z}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \end{aligned}$$

既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \cos n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \cos n z dz \\ &\stackrel{x=\frac{l}{\pi}z}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} d\left(\frac{\pi}{l}x\right) = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \sin n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \sin n z dz \\ &\stackrel{x=\frac{l}{\pi}z}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} d\left(\frac{\pi}{l}x\right) \end{aligned}$$

既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \cos n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \cos n z dz \\ &\stackrel{x=\frac{l}{\pi}z}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} d\left(\frac{\pi}{l}x\right) = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \sin n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \sin n z dz \\ &\stackrel{x=\frac{l}{\pi}z}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} d\left(\frac{\pi}{l}x\right) \end{aligned}$$

既然

$$f\left(\frac{l}{\pi}x\right) = g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos nx + b_n \sin nx \right)$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \cos n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \cos n z dz \\ &\stackrel{x=\frac{l}{\pi}z}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} d\left(\frac{\pi}{l}x\right) = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(z) \sin n z dz = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{l}{\pi}z\right) \sin n z dz \\ &\stackrel{x=\frac{l}{\pi}z}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} d\left(\frac{\pi}{l}x\right) = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx. \end{aligned}$$