

Outline

1. 一个方程的情形


2. 方程组的情形

We are here now...


1. 一个方程的情形

2. 方程组的情形


隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_1(x_1, y_1)$ 附近有定义，具有连续偏导；




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_1(x_1, y_1)$ 附近有定义，具有连续偏导；




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_1(x_1, y_1)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_1, y_1) = 0$;




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_1(x_1, y_1)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_1, y_1) = 0$;



隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_1(x_1, y_1)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_1, y_1) = 0$ ； $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 。




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_1(x_1, y_1)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_1, y_1) = 0$ ； $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 。则存在开区间 $I_1 = (x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon)$
和 $J_1 = (y_1 - \delta, y_1 + \delta)$ ，使得




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_1(x_1, y_1)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_1, y_1) = 0$ ； $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 。则存在开区间 $I_1 = (x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon)$
 和 $J_1 = (y_1 - \delta, y_1 + \delta)$ ，使得

1. 对任意 $x \in I_1$ ，方程 $f(x, y) = 0$ 有唯一的解 $y \in J_1$ 。




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_1(x_1, y_1)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_1, y_1) = 0$ ； $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 。则存在开区间 $I_1 = (x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon)$
 和 $J_1 = (y_1 - \delta, y_1 + \delta)$ ，使得

1. 对任意 $x \in I_1$ ，方程 $f(x, y) = 0$ 有唯一的解 $y = \varphi(x) \in J_1$ 。




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_1(x_1, y_1)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_1, y_1) = 0$ ； $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 。则存在开区间 $I_1 = (x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon)$
 和 $J_1 = (y_1 - \delta, y_1 + \delta)$ ，使得

1. 对任意 $x \in I_1$ ，方程 $f(x, y) = 0$ 有唯一的解 $y = \varphi(x) \in J_1$ 。




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_1(x_1, y_1)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_1, y_1) = 0$ ； $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 。则存在开区间 $I_1 = (x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon)$
 和 $J_1 = (y_1 - \delta, y_1 + \delta)$ ，使得

1. 对任意 $x \in I_1$ ，方程 $f(x, y) = 0$ 有唯一的解 $y = \varphi(x) \in J_1$ 。




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_1(x_1, y_1)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_1, y_1) = 0$ ； $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 。则存在开区间 $I_1 = (x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon)$
 和 $J_1 = (y_1 - \delta, y_1 + \delta)$ ，使得

1. 对任意 $x \in I_1$ ，方程 $f(x, y) = 0$ 有唯一的解 $y = \varphi(x) \in J_1$ 。




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_1(x_1, y_1)$ 附近有定义，具有连续偏导； $f(x_1, y_1) = 0$ ； $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 。则存在开区间 $I_1 = (x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon)$ 和 $J_1 = (y_1 - \delta, y_1 + \delta)$ ，使得


1. 对任意 $x \in I_1$, 方程 $f(x, y) = 0$ 有唯一的解 $y = \varphi(x) \in J_1$ 。
2. 函数 $y = \varphi(x)$ 在区间 I 上具有连续导数。




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_2(x_2, y_2)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_2, y_2) = 0$ ； $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 。



隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_2(x_2, y_2)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_2, y_2) = 0$ ； $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 。




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_2(x_2, y_2)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_2, y_2) = 0$ ； $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 。则存在开区间 $I_2 = (x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon)$
 和 $J_2 = (y_2 - \delta, y_2 + \delta)$ ，使得




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_2(x_2, y_2)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_2, y_2) = 0$ ； $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 。则存在开区间 $I_2 = (x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon)$
 和 $J_2 = (y_2 - \delta, y_2 + \delta)$ ，使得

1. 对任意 $y \in J_2$




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_2(x_2, y_2)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_2, y_2) = 0$ ； $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 。则存在开区间 $I_2 = (x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon)$
 和 $J_2 = (y_2 - \delta, y_2 + \delta)$ ，使得

1. 对任意 $y \in J_2$ ，方程 $f(x, y) = 0$ 有唯一的解 $x \in I_2$ 。




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_2(x_2, y_2)$ 附近有定义, 具有连续偏导;
 $f(x_2, y_2) = 0$; $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 。则存在开区间 $I_2 = (x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon)$
 和 $J_2 = (y_2 - \delta, y_2 + \delta)$, 使得

1. 对任意 $y \in J_2$, 方程 $f(x, y) = 0$ 有唯一的解 $x = \psi(y) \in I_2$ 。




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_2(x_2, y_2)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_2, y_2) = 0$ ； $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 。则存在开区间 $I_2 = (x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon)$
 和 $J_2 = (y_2 - \delta, y_2 + \delta)$ ，使得

1. 对任意 $y \in J_2$ ，方程 $f(x, y) = 0$ 有唯一的解 $x = \psi(y) \in I_2$ 。




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_2(x_2, y_2)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_2, y_2) = 0$ ； $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 。则存在开区间 $I_2 = (x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon)$
 和 $J_2 = (y_2 - \delta, y_2 + \delta)$ ，使得

1. 对任意 $y \in J_2$ ，方程 $f(x, y) = 0$ 有唯一的解 $x = \psi(y) \in I_2$ 。




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_2(x_2, y_2)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_2, y_2) = 0$ ； $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 。则存在开区间 $I_2 = (x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon)$
 和 $J_2 = (y_2 - \delta, y_2 + \delta)$ ，使得

1. 对任意 $y \in J_2$ ，方程 $f(x, y) = 0$ 有唯一的解 $x = \psi(y) \in I_2$ 。




隐函数定理 设 $f(x, y)$ 在点 $p_2(x_2, y_2)$ 附近有定义，具有连续偏导；
 $f(x_2, y_2) = 0$ ； $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 。则存在开区间 $I_2 = (x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon)$
 和 $J_2 = (y_2 - \delta, y_2 + \delta)$ ，使得

1. 对任意 $y \in J_2$ ，方程 $f(x, y) = 0$ 有唯一的解 $x = \psi(y) \in I_2$ 。
2. 函数 $x = \psi(y)$ 在区间 I 上具有连续导数。




注 隐函数定理中条件 $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 和 $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 不能去掉, 否则结论可能不成立




注 隐函数定理中条件 $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 和 $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 不能去掉, 否则结论可能不成立

以 $f(x, y) = x^2 - y^2 - 1$ 为例说明:




注 隐函数定理中条件 $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 和 $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 不能去掉, 否则结论可能不成立

以 $f(x, y) = x^2 - y^2 - 1$ 为例说明:




注 隐函数定理中条件 $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 和 $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 不能去掉, 否则结论可能不成立

以 $f(x, y) = x^2 - y^2 - 1$ 为例说明:




注 隐函数定理中条件 $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 和 $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 不能去掉, 否则结论可能不成立

以 $f(x, y) = x^2 - y^2 - 1$ 为例说明:




注 隐函数定理中条件 $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 和 $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 不能去掉, 否则结论可能不成立

以 $f(x, y) = x^2 - y^2 - 1$ 为例说明:




注 隐函数定理中条件 $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 和 $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 不能去掉, 否则结论可能不成立

以 $f(x, y) = x^2 - y^2 - 1$ 为例说明:




注 隐函数定理中条件 $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 和 $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 不能去掉, 否则结论可能不成立

以 $f(x, y) = x^2 - y^2 - 1$ 为例说明:




注 隐函数定理中条件 $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 和 $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 不能去掉, 否则结论可能不成立

以 $f(x, y) = x^2 - y^2 - 1$ 为例说明:




注 隐函数定理中条件 $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 和 $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 不能去掉, 否则结论可能不成立

以 $f(x, y) = x^2 - y^2 - 1$ 为例说明:




注 隐函数定理中条件 $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 和 $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 不能去掉, 否则结论可能不成立

以 $f(x, y) = x^2 - y^2 - 1$ 为例说明:




注 隐函数定理中条件 $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 和 $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 不能去掉, 否则结论可能不成立

以 $f(x, y) = x^2 - y^2 - 1$ 为例说明:



注 隐函数定理中条件 $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 和 $f_y(x_2, y_2) \neq 0$ 不能去掉, 否则结论可能不成立

以 $f(x, y) = x^2 - y^2 - 1$ 为例说明:



隐函数定理的一个理论应用

性质 设 $f(x, y)$ 具有连续偏导, 且 f_x, f_y 处处不同时为零, 若

$$E = \{(x, y) | f(x, y) = 0\}$$

非空, 则 E 是平面上“一条曲线”。

隐函数定理 设 $f(x, y, z)$ 在点 $p(x_0, y_0, z_0)$ 附近有定义, 具有连续偏导; $f(x_0, y_0, z_0) = 0$;

隐函数定理 设 $f(x, y, z)$ 在点 $p(x_0, y_0, z_0)$ 附近有定义, 具有连续偏导; $f(x_0, y_0, z_0) = 0$;

方程 $f(x, y, z) = 0$ 有唯一的解

$$z = \varphi(x, y)$$

隐函数定理 设 $f(x, y, z)$ 在点 $p(x_0, y_0, z_0)$ 附近有定义，具有连续偏导； $f(x_0, y_0, z_0) = 0$ ； $f_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。

方程 $f(x, y, z) = 0$ 有唯一的解

$$z = \varphi(x, y)$$

隐函数定理 设 $f(x, y, z)$ 在点 $p(x_0, y_0, z_0)$ 附近有定义, 具有连续偏导; $f(x_0, y_0, z_0) = 0$; $f_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。则存在开区间

$$I_1 = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon), \quad I_2 = (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon), \quad J = (z_0 - \delta, z_0 + \delta)$$

使得:

方程 $f(x, y, z) = 0$ 有唯一的解

$$z = \varphi(x, y)$$

隐函数定理 设 $f(x, y, z)$ 在点 $p(x_0, y_0, z_0)$ 附近有定义, 具有连续偏导; $f(x_0, y_0, z_0) = 0$; $f_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。则存在开区间

$$I_1 = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon), \quad I_2 = (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon), \quad J = (z_0 - \delta, z_0 + \delta)$$

使得:

1. 对任意 $(x, y) \in I_1 \times I_2$, 方程 $f(x, y, z) = 0$ 有唯一的解
 $z = \varphi(x, y)$

隐函数定理 设 $f(x, y, z)$ 在点 $p(x_0, y_0, z_0)$ 附近有定义, 具有连续偏导; $f(x_0, y_0, z_0) = 0$; $f_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。则存在开区间

$$I_1 = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon), \quad I_2 = (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon), \quad J = (z_0 - \delta, z_0 + \delta)$$

使得:

1. 对任意 $(x, y) \in I_1 \times I_2$, 方程 $f(x, y, z) = 0$ 有唯一的解 $z = \varphi(x, y) \in J$

隐函数定理 设 $f(x, y, z)$ 在点 $p(x_0, y_0, z_0)$ 附近有定义, 具有连续偏导; $f(x_0, y_0, z_0) = 0$; $f_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。则存在开区间

$$I_1 = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon), \quad I_2 = (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon), \quad J = (z_0 - \delta, z_0 + \delta)$$

使得:

1. 对任意 $(x, y) \in I_1 \times I_2$, 方程 $f(x, y, z) = 0$ 有唯一的解 $z = \varphi(x, y) \in J$
2. 函数 $z = \varphi(x, y)$ 在区域 $I_1 \times I_2$ 上具有连续导数。

隐函数定理的一个理论应用

性质 设 $f(x, y, z)$ 具有连续偏导, 且 f_x, f_y, f_z 处处不同时为零, 若

$$E = \{(x, y, z) | f(x, y, z) = 0\}$$

非空, 则 E 是空间中“一张曲面”。

隐函数的求导法 I

公式 设 $y = F(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$,

隐函数的求导法 I

公式 设 $y = F(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$,

隐函数的求导法 I

公式 设 $y = F(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} =$$

隐函数的求导法 I

公式 设 $y = F(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

隐函数的求导法 I

公式 设 $y = F(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

隐函数的求导法 I

公式 设 $y = F(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

证明 $\because F(x, y(x)) = 0$

隐函数的求导法 I

公式 设 $y = F(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

证明 $\because F(x, y(x)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) =$$


隐函数的求导法 I

公式 设 $y = F(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

证明 $\because F(x, y(x)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) =$$




隐函数的求导法 I

公式 设 $y = F(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

证明 $\because F(x, y(x)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) =$$



隐函数的求导法 I


公式 设 $y = F(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

证明

$$\because F(x, y(x)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) = F_x +$$



隐函数的求导法 I


公式 设 $y = F(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

证明

$$\because F(x, y(x)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) = F_x + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$



隐函数的求导法 I

公式 设 $y = F(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则


$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

证明

$$\because F(x, y(x)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) = F_x + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$



例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一

$$F(x, y) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$

$$F(x, y) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 令 $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$,
 $F(x, y) = 0$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 令 $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} =$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 令 $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{\quad}{\quad}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 令 $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 令 $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 令 $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 令 $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二 注意 $\sin y(x) + e^x - xy(x)^2 = 0$,

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 令 $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二 注意 $\sin y(x) + e^x - xy(x)^2 = 0$, 所以

$$0 = (\sin y(x) + e^x - xy(x)^2)'_x$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 令 $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二 注意 $\sin y(x) + e^x - xy(x)^2 = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (\sin y(x) + e^x - xy(x)^2)'_x \\ &= (\sin y(x))'_x + (e^x)'_x - (xy(x)^2)'_x \end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 令 $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二 注意 $\sin y(x) + e^x - xy(x)^2 = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (\sin y(x) + e^x - xy(x)^2)'_x \\ &= (\sin y(x))'_x + (e^x)'_x - (xy(x)^2)'_x \\ &= \cos y \cdot y' \end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 令 $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二 注意 $\sin y(x) + e^x - xy(x)^2 = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (\sin y(x) + e^x - xy(x)^2)'_x \\ &= (\sin y(x))'_x + (e^x)'_x - (xy(x)^2)'_x \\ &= \cos y \cdot y' + e^x \end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 令 $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二 注意 $\sin y(x) + e^x - xy(x)^2 = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (\sin y(x) + e^x - xy(x)^2)'_x \\ &= (\sin y(x))'_x + (e^x)'_x - (xy(x)^2)'_x \\ &= \cos y \cdot y' + e^x - y^2 - 2xy \cdot y' \end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 令 $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二 注意 $\sin y(x) + e^x - xy(x)^2 = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (\sin y(x) + e^x - xy(x)^2)'_x \\ &= (\sin y(x))'_x + (e^x)'_x - (xy(x)^2)'_x \\ &= \cos y \cdot y' + e^x - y^2 - 2xy \cdot y' \\ &= e^x - y^2 + (\cos y - 2xy)y' \end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\sin y + e^x = xy^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 令 $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二 注意 $\sin y(x) + e^x - xy(x)^2 = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (\sin y(x) + e^x - xy(x)^2)'_x \\ &= (\sin y(x))'_x + (e^x)'_x - (xy(x)^2)'_x \\ &= \cos y \cdot y' + e^x - y^2 - 2xy \cdot y' \\ &= e^x - y^2 + (\cos y - 2xy)y' \end{aligned}$$

$$\text{所以 } y' = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$, 求 $\frac{dy}{dx}$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解

$$F(x, y) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解 注意 $\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4 = 0$

$$F(x, y) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解 注意 $\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4 = 0$, 令

$$F(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4$$

$$F(x, y) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解 注意 $\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4 = 0$, 令

$$F(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4$$

则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_x}{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_y}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解 注意 $\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4 = 0$, 令

$$F(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4$$

则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_x}{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_y}$$

$$= -\frac{\frac{2x}{x^2 + y^2} + 3y}{\frac{2y}{x^2 + y^2} + 3x}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解 注意 $\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4 = 0$, 令

$$F(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4$$

则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_x}{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_y} \\ &= -\frac{\frac{2x}{x^2 + y^2} + 3y}{\frac{2y}{x^2 + y^2} + 3x}\end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解 注意 $\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4 = 0$, 令

$$F(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4$$

则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_x}{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_y} \\ &= -\frac{\frac{2x}{x^2+y^2} + 3y}{\frac{2y}{x^2+y^2} + 3x}\end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解 注意 $\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4 = 0$, 令

$$F(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4$$

则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_x}{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_y} \\&= -\frac{\frac{2x}{x^2+y^2} + 3y}{\frac{2y}{x^2+y^2} + 3x} \\&= \frac{2x + 3x^2y + 3y^3}{2y + 3xy^2 + 3x^3}\end{aligned}$$

隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$,

隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$,

隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \quad , \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

证明 $\because F(x, y, z(x, y)) = 0$

隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

证明 $\because F(x, y, z(x, y)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) =$$

隐函数的求导法 II


公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

证明

$$\because F(x, y, z(x, y)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) =$$



隐函数的求导法 II


公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

证明

$$\because F(x, y, z(x, y)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) =$$




隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

证明 $\because F(x, y, z(x, y)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) = F_x + F_z \cdot \frac{\partial z}{\partial x}$$



隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, 则


$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

证明

$$\because F(x, y, z(x, y)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) = F_x + F_z \cdot \frac{\partial z}{\partial x}$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z},$$



隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, 则


$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

证明

$$\because F(x, y, z(x, y)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) = F_x + F_z \cdot \frac{\partial z}{\partial x}$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \text{同理} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$



例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$F(x, y, z) = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, $F(x, y, z) = 0$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z}$$

$$= -\frac{1 + z}{1 - e^z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z}$$

$$= -\frac{1}{1 - e^z}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{\quad}{0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{\quad}{\quad}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{\quad}{0 + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{\quad}{\quad}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x}{0 + 0 + 1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + 0}{0 + 0 + 1}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z}{0 + 0 + x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + 0 - 0}{0 + 0 + x - e^z}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + 0 - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 1 + 0 - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 1}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 1 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 1 + 0 - 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 1 + 0 - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1}{x - e^z}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$F(x, y, z) = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$,

$$F(x, y, z) = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$, 则

$F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z}$$

=

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$, 则

$F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{-1 - 3}{-3} = \frac{4}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 - 3}{-3} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$, 则

$F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{-6 \cos(x + 2y - 3z)}{-6 \cos(x + 2y - 3z)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{-6 \cos(x + 2y - 3z)}{-6 \cos(x + 2y - 3z)}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$, 则

$F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 1}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 2}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$, 则

$F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z)}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z)}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$, 则

$F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z) - 1}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z) - 1}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$, 则

$F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z) - 1}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z) - 1}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$, 则

$F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z) - 1}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{4 \cos(x + 2y - 3z)}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$, 则

$F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z) - 1}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{4 \cos(x + 2y - 3z) - 2}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$, 求 dz

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$, 求 dz

解

$$\frac{\partial z}{\partial x} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} =$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$, 求 dz

解 令 $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$, 则 $F(x, y, z) = 0$

$$\frac{\partial z}{\partial x} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} =$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$, 求 dz

解 令 $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$, 求 dz

解 令 $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_x}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_y}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$, 求 dz

解 令 $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_x}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z}$$
$$= -\frac{-1+e^{z-y-x}}{1+e^{z-y-x}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_y}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1+e^{z-y-x}}{1+e^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$, 求 dz

解 令 $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_x}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{1}{1+xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_y}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1+xe^{z-y-x}}{1+xe^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$, 求 dz

解 令 $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_x}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{-1}{1+xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_y}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1}{1+xe^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$, 求 dz

解 令 $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_x}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{-1+e^{z-y-x}}{1+xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_y}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1}{1+xe^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$, 求 dz

解 令 $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_x}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{-1+e^{z-y-x}-xe^{z-y-x}}{1+xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_y}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1+e^{z-y-x}-xe^{z-y-x}}{1+xe^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$, 求 dz

解 令 $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_x}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{-1+e^{z-y-x}-xe^{z-y-x}}{1+xe^{z-y-x}} = -\frac{1+(x-1)e^{z-y-x}}{1+xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_y}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1+e^{z-y-x}-xe^{z-y-x}}{1+xe^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$, 求 dz

解 令 $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_x}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{-1 + e^{z-y-x} - xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} = -\frac{1 + (x-1)e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_y}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1 + e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$, 求 dz

解 令 $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_x}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{-1+e^{z-y-x}-xe^{z-y-x}}{1+xe^{z-y-x}} = -\frac{1+(x-1)e^{z-y-x}}{1+xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_y}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1}{1+xe^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$, 求 dz

解 令 $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_x}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{-1 + e^{z-y-x} - xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} = -\frac{1 + (x-1)e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_y}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1 - xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$, 求 dz

解 令 $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_x}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{-1 + e^{z-y-x} - xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} = -\frac{1 + (x-1)e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_y}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1 - xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} = 1$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$, 求 dz

解 令 $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_x}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{-1+e^{z-y-x}-xe^{z-y-x}}{1+xe^{z-y-x}} = -\frac{1+(x-1)e^{z-y-x}}{1+xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_y}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1-xe^{z-y-x}}{1+xe^{z-y-x}} = 1$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy = -\frac{1+(x-1)e^{z-y-x}}{1+xe^{z-y-x}}dx + dy$$

例 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 满足 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$, 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

例 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 满足 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$, 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令 $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$, 则

例 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 满足 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$, 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令 $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$, 则

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= - \frac{F_x}{F_z} = \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= - \frac{F_y}{F_z} = \end{aligned}$$

例 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 满足 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$, 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令 $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 满足 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$, 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令 $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$, 则

$$F_x =$$

$$F_y =$$

$$F_z =$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 满足 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$, 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令 $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$, 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x$$

$$F_y =$$

$$F_z =$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 满足 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$, 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令 $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$, 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c \Phi_u$$

$$F_y =$$

$$F_z =$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 满足 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$, 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令 $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$, 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c \Phi_u$$

$$F_y = \Phi_u \cdot u_y + \Phi_v \cdot v_y$$

$$F_z =$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 满足 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$, 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令 $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$, 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c\Phi_u$$

$$F_y = \Phi_u \cdot u_y + \Phi_v \cdot v_y = c\Phi_v$$

$$F_z =$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 满足 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$, 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令 $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$, 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c\Phi_u$$

$$F_y = \Phi_u \cdot u_y + \Phi_v \cdot v_y = c\Phi_v$$

$$F_z = \Phi_u \cdot u_z + \Phi_v \cdot v_z$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 满足 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$, 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令 $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$, 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c\Phi_u$$

$$F_y = \Phi_u \cdot u_y + \Phi_v \cdot v_y = c\Phi_v$$

$$F_z = \Phi_u \cdot u_z + \Phi_v \cdot v_z = -a\Phi_u - b\Phi_v$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 满足 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$, 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令 $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$, 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c\Phi_u$$

$$F_y = \Phi_u \cdot u_y + \Phi_v \cdot v_y = c\Phi_v$$

$$F_z = \Phi_u \cdot u_z + \Phi_v \cdot v_z = -a\Phi_u - b\Phi_v$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{c\Phi_u}{a\Phi_u + b\Phi_v}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 满足 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$, 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令 $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$, 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c\Phi_u$$

$$F_y = \Phi_u \cdot u_y + \Phi_v \cdot v_y = c\Phi_v$$

$$F_z = \Phi_u \cdot u_z + \Phi_v \cdot v_z = -a\Phi_u - b\Phi_v$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{c\Phi_u}{a\Phi_u + b\Phi_v}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{c\Phi_v}{a\Phi_u + b\Phi_v}$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 满足 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$, 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令 $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$, 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c\Phi_u$$

$$F_y = \Phi_u \cdot u_y + \Phi_v \cdot v_y = c\Phi_v$$

$$F_z = \Phi_u \cdot u_z + \Phi_v \cdot v_z = -a\Phi_u - b\Phi_v$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{c\Phi_u}{a\Phi_u + b\Phi_v}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{c\Phi_v}{a\Phi_u + b\Phi_v}$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{ac\Phi_u}{a\Phi_u + b\Phi_v} + \frac{bc\Phi_v}{a\Phi_u + b\Phi_v}$$

例 设 $\Phi(u, v)$ 具有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 满足 $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$, 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令 $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$, 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c\Phi_u$$

$$F_y = \Phi_u \cdot u_y + \Phi_v \cdot v_y = c\Phi_v$$

$$F_z = \Phi_u \cdot u_z + \Phi_v \cdot v_z = -a\Phi_u - b\Phi_v$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{c\Phi_u}{a\Phi_u + b\Phi_v}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{c\Phi_v}{a\Phi_u + b\Phi_v}$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{ac\Phi_u}{a\Phi_u + b\Phi_v} + \frac{bc\Phi_v}{a\Phi_u + b\Phi_v} = c$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解 $F(x, y, z) = x + ye^z - z$, 则 $F(x, y, z) = 0$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解 $F(x, y, z) = x + ye^z - z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解 $F(x, y, z) = x + ye^z - z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解 $F(x, y, z) = x + ye^z - z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解 $F(x, y, z) = x + ye^z - z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{e^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{e^z}{e^z - 1}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{1}{e^z - 1} \right) = \frac{e^z}{(e^z - 1)^2}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解 $F(x, y, z) = x + ye^z - z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解 $F(x, y, z) = x + ye^z - z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解 $F(x, y, z) = x + ye^z - z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解 $F(x, y, z) = x + ye^z - z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{e^z}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解 $F(x, y, z) = x + ye^z - z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{e^z}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \left(-\frac{1}{ye^z - 1} \right)'_y$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解 $F(x, y, z) = x + ye^z - z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{e^z}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \left(-\frac{1}{ye^z - 1} \right)'_y = \frac{(ye^z - 1)'_y}{(ye^z - 1)^2}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解 $F(x, y, z) = x + ye^z - z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{e^z}{ye^z - 1}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \left(-\frac{1}{ye^z - 1} \right)'_y = \frac{(ye^z - 1)'_y}{(ye^z - 1)^2} \\ &= \frac{e^z + y(e^z)'_y}{(ye^z - 1)^2}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解 $F(x, y, z) = x + ye^z - z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{e^z}{ye^z - 1}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \left(-\frac{1}{ye^z - 1} \right)'_y = \frac{(ye^z - 1)'_y}{(ye^z - 1)^2} \\ &= \frac{e^z + y(e^z)'_y}{(ye^z - 1)^2} = \frac{e^z + ye^z \cdot \frac{\partial z}{\partial y}}{(ye^z - 1)^2}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解 $F(x, y, z) = x + ye^z - z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{e^z}{ye^z - 1}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \left(-\frac{1}{ye^z - 1} \right)'_y = \frac{(ye^z - 1)'_y}{(ye^z - 1)^2} \\ &= \frac{e^z + y(e^z)'_y}{(ye^z - 1)^2} = \frac{e^z + ye^z \cdot \frac{\partial z}{\partial y}}{(ye^z - 1)^2} = \frac{e^z + ye^z \cdot \left(-\frac{e^z}{ye^z - 1} \right)}{(ye^z - 1)^2}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解 $F(x, y, z) = x + ye^z - z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{e^z}{ye^z - 1}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \left(-\frac{1}{ye^z - 1} \right)'_y = \frac{(ye^z - 1)'_y}{(ye^z - 1)^2} \\ &= \frac{e^z + y(e^z)'_y}{(ye^z - 1)^2} = \frac{e^z + ye^z \cdot \frac{\partial z}{\partial y}}{(ye^z - 1)^2} = \frac{e^z + ye^z \cdot \left(-\frac{e^z}{ye^z - 1} \right)}{(ye^z - 1)^2} \\ &= \frac{-e^z}{(ye^z - 1)^3}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $z = x + ye^z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解 $F(x, y, z) = x + ye^z - z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{e^z}{ye^z - 1}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \left(-\frac{1}{ye^z - 1} \right)'_y = \frac{(ye^z - 1)'_y}{(ye^z - 1)^2} \\ &= \frac{e^z + y(e^z)'_y}{(ye^z - 1)^2} = \frac{e^z + ye^z \cdot \frac{\partial z}{\partial y}}{(ye^z - 1)^2} = \frac{e^z + ye^z \cdot \left(-\frac{e^z}{ye^z - 1} \right)}{(ye^z - 1)^2} \\ &= \frac{-e^z}{(ye^z - 1)^3} = \frac{e^z}{(1 + x - z)^3}\end{aligned}$$

We are here now...

1. 一个方程的情形

2. 方程组的情形

回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法解：

回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{22} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{12} \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去 y ，得：

回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11} a_{22}x + a_{12} a_{22}y = a_{22}b_1 & (1) \times a_{22} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{12} \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去 y ，得：

回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{22} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{12} \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去 y ，得：

回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去 y ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去 y ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{21} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{11} \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去 y ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$ ，消去 x ，得：

回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{21} \\ a_{21}a_{11}x + a_{22}a_{11}y = a_{11}b_2 & (2) \times a_{11} \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去 y ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$ ，消去 x ，得：

回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法解：

(1) $\times a_{22}$ - (2) $\times a_{12}$ ，消去 y ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

(2) $\times a_{11}$ - (1) $\times a_{21}$ ，消去 x ，得：

回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法解：

(1) $\times a_{22}$ - (2) $\times a_{12}$ ，消去 y ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

(2) $\times a_{11}$ - (1) $\times a_{21}$ ，消去 x ，得：

$$y = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去 y ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$ ，消去 x ，得：

$$y = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法解：

(1) $\times a_{22}$ - (2) $\times a_{12}$ ，消去 y ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

(2) $\times a_{11}$ - (1) $\times a_{21}$ ，消去 x ，得：

$$y = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法解：

(1) $\times a_{22}$ - (2) $\times a_{12}$ ，消去 y ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

(2) $\times a_{11}$ - (1) $\times a_{21}$ ，消去 x ，得：

$$y = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法解：

(1) $\times a_{22}$ - (2) $\times a_{12}$ ，消去 y ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

(2) $\times a_{11}$ - (1) $\times a_{21}$ ，消去 x ，得：

$$y = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

公式：

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \quad , \quad y =$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad , \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \text{---} \quad , \quad y =$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad , \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \text{---} \quad , \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \text{---}$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad , \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = -\frac{1}{1}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = -$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad, \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = -\frac{1}{1}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{1}{1}$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad, \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \bar{1}$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad, \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1}$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad, \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1}$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad, \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad, \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \text{---}, \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = - \quad , \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = -$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-17}{3}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-10}{3}$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{1}{3}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-5}{3}$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{21}{3}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-3}{3}$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{21}{3}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-9}{3}$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{21}{3} = 7, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-9}{3}$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{21}{3} = 7, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-9}{3} = -3$$

方程组的隐函数求导公式

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

方程组的隐函数求导公式

假设函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

方程组的隐函数求导公式

假设函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$?

方程组的隐函数求导公式

假设函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}}$$

方程组的隐函数求导公式

假设函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$

方程组的隐函数求导公式

假设函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$

方程组的隐函数求导公式

假设函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = -F_x \\ G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = -G_x \end{cases}$$

方程组的隐函数求导公式

假设函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = -F_x \\ G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = -G_x \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_x = \underline{\hspace{2cm}}, \quad v_x = \underline{\hspace{2cm}}$$

方程组的隐函数求导公式

假设函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = -F_x \\ G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = -G_x \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_x = \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_x = \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

方程组的隐函数求导公式

假设函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = -F_x \\ G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = -G_x \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_x = \frac{\begin{vmatrix} -F_x & F_v \\ -G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_x = \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

方程组的隐函数求导公式

假设函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$?

求解如下：

$$\begin{aligned} \begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} &\xrightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = -F_x \\ G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = -G_x \end{cases} \\ \Rightarrow u_x &= \frac{\begin{vmatrix} -F_x & F_v \\ -G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, & v_x &= \frac{\begin{vmatrix} -F_u & F_x \\ -G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} \end{aligned}$$

方程组的隐函数求导公式

假设函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = -F_x \\ G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = -G_x \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_x = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_x = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

方程组的隐函数求导公式

假设函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = -F_x \\ G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = -G_x \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_x = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_x = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$
$$= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}$$

方程组的隐函数求导公式

假设函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = -F_x \\ G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = -G_x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow u_x &= -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, & v_x &= -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} \\ &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)} & &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = -F_y \\ G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = -G_y \end{cases}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = -F_y \\ G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = -G_y \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_y = \underline{\hspace{2cm}}, \quad v_y = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = -F_y \\ G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = -G_y \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_y = \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_y = \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = -F_y \\ G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = -G_y \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_y = \frac{\begin{vmatrix} -F_y & F_v \\ -G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_y = \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = -F_y \\ G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = -G_y \end{cases} \\
 \Rightarrow u_y = &\frac{\begin{vmatrix} -F_y & F_v \\ -G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_y = \frac{\begin{vmatrix} -F_u & F_y \\ -G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = -F_y \\ G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = -G_y \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_y = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_y = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = -F_y \\ G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = -G_y \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_y = - \frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_y = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$= - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = -F_y \\ G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = -G_y \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_y = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_y = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)} \quad = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)}$$

总结 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$$

总结 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

总结 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \begin{matrix} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \\ \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \end{matrix}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

总结 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

总结 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0 \end{cases}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

总结 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \begin{aligned} &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \end{cases} \\ &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

所以

$$u_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$v_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

总结 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \begin{matrix} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \\ \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \end{matrix} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \\ \\ F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0 \end{cases}$$

所以

$$u_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$u_y = - \frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$v_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$v_y = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

总结 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \begin{matrix} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \\ \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \end{matrix} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \\ F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0 \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} u_x &= - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}, & v_x &= - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} \\ u_y &= - \frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, & v_y &= - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} \end{aligned}$$

总结 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \begin{aligned} &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \end{cases} \\ &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} u_x &= - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}, & v_x &= - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)} \\ u_y &= - \frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, & v_y &= - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} \end{aligned}$$

总结 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$

$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0 \end{cases}$$

所以

$$u_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}, \quad v_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)}$$

$$u_y = - \frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)}, \quad v_y = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

总结 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$

$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0 \end{cases}$$

所以

$$u_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}, \quad v_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)}$$

$$u_y = - \frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)}, \quad v_y = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)}$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \begin{matrix} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \\ \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \end{matrix}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \begin{matrix} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \\ \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \end{matrix}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \end{cases}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$

$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

所以 $J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix}$

$$u_x = - \frac{\begin{vmatrix} & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_x = - \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & \\ e^u - \cos v & \end{vmatrix}}{J}$$

$$u_y = - \frac{\begin{vmatrix} & u \cos v \\ & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_y = - \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & \\ & \end{vmatrix}}{J}$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$

$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

所以 $J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix}$

$$u_x = - \frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_x = - \frac{\begin{vmatrix} & \\ & \end{vmatrix}}{J}$$

$$u_y = - \frac{\begin{vmatrix} & \\ & \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_y = - \frac{\begin{vmatrix} & \\ & \end{vmatrix}}{J}$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$

$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

所以 $J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix}$

$$u_x = - \frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_x = - \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{J}$$

$$u_y = - \frac{\begin{vmatrix} & \\ & \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_y = - \frac{\begin{vmatrix} & \\ & \end{vmatrix}}{J}$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix}$$

$$u_x = - \frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_x = - \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{J}$$

$$u_y = - \frac{\begin{vmatrix} 0 & u \cos v \\ 1 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_y = - \frac{\begin{vmatrix} & \\ & \end{vmatrix}}{J}$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix}$$

$$u_x = - \frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_x = - \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{J}$$

$$u_y = - \frac{\begin{vmatrix} 0 & u \cos v \\ 1 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_y = - \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 0 \\ e^u - \cos v & 1 \end{vmatrix}}{J}$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix} = ue^u(\sin v - \cos v) + u$$

$$u_x = - \frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_x = - \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{J}$$

$$u_y = - \frac{\begin{vmatrix} 0 & u \cos v \\ 1 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_y = - \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 0 \\ e^u - \cos v & 1 \end{vmatrix}}{J}$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix} = ue^u(\sin v - \cos v) + u$$

$$u_x = -\frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J} = \frac{-\sin v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1}, \quad v_x = -\frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{J}$$

$$u_y = -\frac{\begin{vmatrix} 0 & u \cos v \\ 1 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}, \quad v_y = -\frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 0 \\ e^u - \cos v & 1 \end{vmatrix}}{J}$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix} = ue^u(\sin v - \cos v) + u$$

$$u_x = -\frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J} = \frac{-\sin v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1}, \quad v_x = -\frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{J} = \frac{e^u - \cos v}{ue^u(\sin v - \cos v) + u}$$

$$u_y = -\frac{\begin{vmatrix} 0 & u \cos v \\ 1 & u \sin v \end{vmatrix}}{J} \quad v_y = -\frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 0 \\ e^u - \cos v & 1 \end{vmatrix}}{J}$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$

$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix} = ue^u(\sin v - \cos v) + u$$

$$u_x = -\frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J} = \frac{-\sin v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1}, \quad v_x = -\frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{J} = \frac{e^u - \cos v}{ue^u(\sin v - \cos v) + u}$$

$$u_y = -\frac{\begin{vmatrix} 0 & u \cos v \\ 1 & u \sin v \end{vmatrix}}{J} = \frac{\cos v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1}, \quad v_y = -\frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 0 \\ e^u - \cos v & 1 \end{vmatrix}}{J}$$

例 设 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix} = ue^u(\sin v - \cos v) + u$$

$$u_x = -\frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J} = \frac{-\sin v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1}, \quad v_x = -\frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{J} = \frac{e^u - \cos v}{ue^u(\sin v - \cos v) + u}$$

$$u_y = -\frac{\begin{vmatrix} 0 & u \cos v \\ 1 & u \sin v \end{vmatrix}}{J} = \frac{\cos v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1}, \quad v_y = -\frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 0 \\ e^u - \cos v & 1 \end{vmatrix}}{J} = -\frac{e^u + \sin v}{ue^u(\sin v - \cos v) + u}$$