

第 3 章 d : 向量组的秩

数学系 梁卓滨

2019-2020 学年 I

向量组的极大无关组

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{能被其余向量线性表示的向量}]{\text{逐个剔除}}$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\begin{array}{c} \text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量} \end{array}}$

向量组的极大无关组

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\begin{array}{c} \text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量} \end{array}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow{\alpha_4 = 2\alpha_1 + 0\alpha_2 + 0\alpha_3}$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\begin{smallmatrix} \text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量} \end{smallmatrix}}$ $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4 = 2\alpha_1 + 0\alpha_2 + 0\alpha_3}$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ **极大无关组**

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2}$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2}$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2$ 极大无关组

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2$ 极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\begin{smallmatrix} \text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量} \end{smallmatrix}}$ $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4 = 2\alpha_1 + 0\alpha_2 + 0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow{\alpha_1 = -\alpha_2 + \alpha_3 + 0\alpha_4}$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_1]{\alpha_1=-\alpha_2+\alpha_3+0\alpha_4}$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_1]{\alpha_1=-\alpha_2+\alpha_3+0\alpha_4} \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_1]{\alpha_1=-\alpha_2+\alpha_3+0\alpha_4} \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow{\alpha_2=\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4}$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_1]{\alpha_1=-\alpha_2+\alpha_3+0\alpha_4} \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4}$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_1]{\alpha_1=-\alpha_2+\alpha_3+0\alpha_4} \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_3, \alpha_4$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_1]{\alpha_1=-\alpha_2+\alpha_3+0\alpha_4} \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_3, \alpha_4 \quad \text{极大无关组}$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_1]{\alpha_1=-\alpha_2+\alpha_3+0\alpha_4} \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_3, \alpha_4 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4 = 2\alpha_1 + 0\alpha_2 + 0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_1]{\alpha_1 = -\alpha_2 + \alpha_3 + 0\alpha_4} \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2 = \alpha_3 - \frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_3, \alpha_4 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow{\alpha_2 = 0\alpha_1 + \alpha_3 - \frac{1}{2}\alpha_4}$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_1]{\alpha_1=-\alpha_2+\alpha_3+0\alpha_4} \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_3, \alpha_4 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=0\alpha_1+\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_1]{\alpha_1=-\alpha_2+\alpha_3+0\alpha_4} \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_3, \alpha_4 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=0\alpha_1+\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_1]{\alpha_1=-\alpha_2+\alpha_3+0\alpha_4} \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_3, \alpha_4 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=0\alpha_1+\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_3}$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_1]{\alpha_1=-\alpha_2+\alpha_3+0\alpha_4} \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_3, \alpha_4 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=0\alpha_1+\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_3 \quad \text{极大无关组}$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_1]{\alpha_1=-\alpha_2+\alpha_3+0\alpha_4} \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_3, \alpha_4 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=0\alpha_1+\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_3$$

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_1]{\alpha_1=-\alpha_2+\alpha_3+0\alpha_4} \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_3, \alpha_4 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=0\alpha_1+\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_3 \quad \text{极大无关组}$$

还有其他极大无关组吗？

向量组的极大无关组

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ $\xrightarrow[\text{直到不能再剔除为止}]{\substack{\text{逐个剔除} \\ \text{能被其余向量线性表示的向量}}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 极大无关组

例 求 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组。

解

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_2+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_1]{\alpha_1=-\alpha_2+\alpha_3+0\alpha_4} \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_3, \alpha_4 \quad \text{极大无关组}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_2]{\alpha_2=0\alpha_1+\alpha_3-\frac{1}{2}\alpha_4} \alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_4]{\alpha_4=2\alpha_1+0\alpha_3} \alpha_1, \alpha_3 \quad \text{极大无关组}$$

还有其他极大无关组吗？

注 极大无关组不唯一！

极大无关组的性质

定理 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，当且仅当

- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每个向量都可由 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性表示
- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关

极大无关组的性质

定理 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，当且仅当

- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每个向量都可由 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性表示
 - $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关
-

定理 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。

极大无关组的性质

定理 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，当且仅当

- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每个向量都可由 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性表示
 - $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关
-

定理 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，则

极大无关组的性质

定理 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，当且仅当

- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每个向量都可由 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性表示
 - $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关
-

定理 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，则 $r = t$ 。

极大无关组的性质

定理 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，当且仅当

- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每个向量都可由 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性表示
 - $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关
-

定理 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，则 $r = t$ 。

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ ，则极大无关组是：

$$\alpha_1, \alpha_2; \quad \alpha_1, \alpha_3; \quad \alpha_2, \alpha_3; \quad \alpha_2, \alpha_4; \quad \alpha_3, \alpha_4$$

极大无关组的性质

定理 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，当且仅当

- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每个向量都可由 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性表示
 - $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关
-

定理 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，则 $r = t$ 。

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ ，则极大无关组是：

$$\alpha_1, \alpha_2; \quad \alpha_1, \alpha_3; \quad \alpha_2, \alpha_3; \quad \alpha_2, \alpha_4; \quad \alpha_3, \alpha_4$$

可见，每个极大无关组都由 2 个向量构成。

向量组的秩

定义 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组所包含向量的个数，称为向量组的**秩**，记为：

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$$

向量组的秩

定义 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组所包含向量的个数，称为向量组的**秩**，记为：

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$$

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则
 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{\hspace{2cm}}$

向量组的秩

定义 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组所包含向量的个数，称为向量组的**秩**，记为：

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$$

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则
 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{\quad 2 \quad}$

向量组的秩

定义 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组所包含向量的个数，称为向量组的**秩**，记为：

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$$

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则
 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$

注 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq s$ 且 $\leq m$ (维数)。

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

• $r(A) =$:

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

• $r(A) =$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

• $r(A) =$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1}$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

• $r(A) =$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} \overset{\alpha_1}{1} & \overset{\alpha_2}{3} & \overset{\alpha_3}{5} \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) =$:

例 设 $A = \begin{pmatrix} \overset{\alpha_1}{1} & \overset{\alpha_2}{3} & \overset{\alpha_3}{5} \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) =$:

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

例 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) =$:

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow{\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2}$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) =$:

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2}$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) =$:

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) =$:

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \xrightarrow{\alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性无关}}$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) =$:

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \xrightarrow{\alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性无关}} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 为极大无关组}$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$:

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \xrightarrow{\alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性无关}} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 为极大无关组}$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{matrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$:

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \xrightarrow{\alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性无关}} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 为极大无关组}$$

• $r(\beta_1, \beta_2) =$:

例 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{matrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$:

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \xrightarrow{\alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性无关}} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 为极大无关组}$$

• $r(\beta_1, \beta_2) =$:

$$\beta_1, \beta_2$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{matrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$:

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \xrightarrow{\alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性无关}} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 为极大无关组}$$

• $r(\beta_1, \beta_2) =$:

$$\beta_1, \beta_2 \xrightarrow{\beta_1, \beta_2 \text{ 线性无关}}$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{matrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$:

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \xrightarrow{\alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性无关}} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 为极大无关组}$$

• $r(\beta_1, \beta_2) =$:

$$\beta_1, \beta_2 \xrightarrow{\beta_1, \beta_2 \text{ 线性无关}} \beta_1, \beta_2 \text{ 为极大无关组}$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{matrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$:

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \xrightarrow{\alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性无关}} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 为极大无关组}$$

• $r(\beta_1, \beta_2) = 2$:

$$\beta_1, \beta_2 \xrightarrow{\beta_1, \beta_2 \text{ 线性无关}} \beta_1, \beta_2 \text{ 为极大无关组}$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{matrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$:

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \xrightarrow{\alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性无关}} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 为极大无关组}$$

• $r(\beta_1, \beta_2) = 2$:

$$\beta_1, \beta_2 \xrightarrow{\beta_1, \beta_2 \text{ 线性无关}} \beta_1, \beta_2 \text{ 为极大无关组}$$

可见，以上三个秩均相等，即 $r(A) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\beta_1, \beta_2)$ 。

例 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{matrix}$

• $r(A) = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$:

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \xrightarrow[\text{剔除}\alpha_3]{\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2} \alpha_1, \alpha_2 \xrightarrow{\alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性无关}} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 为极大无关组}$$

• $r(\beta_1, \beta_2) = 2$:

$$\beta_1, \beta_2 \xrightarrow{\beta_1, \beta_2 \text{ 线性无关}} \beta_1, \beta_2 \text{ 为极大无关组}$$

可见，以上三个秩均相等，即 $r(A) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\beta_1, \beta_2)$ 。

这不是巧合，而是恒成立！

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{matrix}$$

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{matrix}$$

定义

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 称为 A 的 **列秩**;
- $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 称为 A 的 **行秩**;

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{matrix}$$

定义

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 称为 A 的 **列秩**;
- $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 称为 A 的 **行秩**;

定理 $r(A) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{matrix}$$

定义

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 称为 A 的 **列秩**;
- $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 称为 A 的 **行秩**;

定理 $r(A) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$

应用 计算向量组的秩可转化为计算矩阵的秩。

初等变换求极大无关组

问题 给出 m 维的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如何求出其一组极大无关组?

步骤

初等变换求极大无关组

问题 给出 m 维的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如何求出其一组极大无关组?

步骤

1.

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

初等变换求极大无关组

问题 给出 m 维的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如何求出其一组极大无关组?

步骤

1.

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$$

初等变换求极大无关组

问题 给出 m 维的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如何求出其一组极大无关组?

步骤

1.
$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$$

2. 通过简化的阶梯型矩阵, 求出 $r(A)$ 。

初等变换求极大无关组

问题 给出 m 维的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如何求出其一组极大无关组?

步骤

1.
$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$$

2. 通过简化的阶梯型矩阵, 求出 $r(A)$ 。

利用 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(A)$, 得出极大无关组所包含向量的个数

初等变换求极大无关组

问题 给出 m 维的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如何求出其一组极大无关组?

步骤

1.
$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$$

2. 通过简化的阶梯型矩阵, 求出 $r(A)$ 。

利用 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(A)$, 得出极大无关组所包含向量的个数

3. 通过简化的阶梯型矩阵, 容易看出线性无关的 $r(A)$ 列, 这就找到一组极大无关组

初等变换求极大无关组

问题 给出 m 维的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如何求出其一组极大无关组?

步骤

1.
$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$$

2. 通过简化的阶梯型矩阵, 求出 $r(A)$ 。

利用 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(A)$, 得出极大无关组所包含向量的个数

3. 通过简化的阶梯型矩阵, 容易看出线性无关的 $r(A)$ 列, 这就找到一组极大无关组

4. 通过简化的阶梯型矩阵, 容易看出其余列如何用该选定极大无关组线性表示

例 1 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

例 1 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

	α_1	α_2	α_3	α_4
$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$				

例 1 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

$$\begin{array}{cccc} & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \left(\begin{array}{cccc} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} & & & \end{array}$$

例 1 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

α_1	α_2	α_3	α_4
------------	------------	------------	------------

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

例 1 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 1 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2}$$

例 1 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 1 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1}$$

例 1 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 1 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 1 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2;$

例 1 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2;$

例 1 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2$;
- α_1, α_2 是极大无关组;

例 1 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2$;
- α_1, α_2 是极大无关组;
- $\alpha_3 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2$

例 2 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

例 2 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

α_1	α_2	α_3	α_4
------------	------------	------------	------------

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

例 2 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

$$\begin{array}{cccc} & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} & \end{array}$$

例 2 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

$$\begin{array}{cccc} & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} & \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \end{array}$$

例 2 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

$$\begin{array}{cccc}
 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\
 \left(\begin{array}{cccc}
 1 & 0 & 1 & 2 \\
 2 & 1 & 1 & 4 \\
 1 & 1 & 0 & 3 \\
 0 & 2 & -2 & 3
 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} & \left(\begin{array}{cccc}
 1 & 0 & 1 & 2 \\
 0 & 1 & -1 & 0 \\
 0 & 1 & -1 & 1 \\
 0 & 2 & -2 & 3
 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2}
 \end{array}$$

例 2 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

$$\begin{array}{cccc}
 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\
 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} & \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} & \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

例 2 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

$$\begin{array}{cccc}
 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\
 \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} & \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} & \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right) \\
 & & & & \xrightarrow[r_1-2r_3]{r_4-3r_3}
 \end{array}$$

例 2 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

$$\begin{array}{cccc}
 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\
 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} & \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} & \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow[r_1-2r_3]{r_4-3r_3} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

例 2 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

$$\begin{array}{cccc}
 \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\
 \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} & \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right) \\
 & & \xrightarrow[r_1-2r_3]{r_4-3r_3} & \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)
 \end{array}$$

例 2 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

$$\begin{array}{cccc}
 \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\
 \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} & \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right) \\
 & & \xrightarrow[r_1-2r_3]{r_4-3r_3} & \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)
 \end{array}$$

所以

例 2 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1-2r_3]{r_4-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 3;$

例 2 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

$$\begin{array}{cccc}
 \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\
 \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} & \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right) \\
 & & \xrightarrow[r_1-2r_3]{r_4-3r_3} & \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)
 \end{array}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 3;$

例 2 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

$$\begin{array}{cccc}
 \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\
 \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} & \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right) \\
 & & \xrightarrow[r_1-2r_3]{r_4-3r_3} & \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)
 \end{array}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 3$;
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是极大无关组;

例 2 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

α_1	α_2	α_3	α_4
$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$
$\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}$			
$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$
$\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2}$			
$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$
$\xrightarrow[r_1-2r_3]{r_4-3r_3}$			
$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 3$;
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是极大无关组;
- $\alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2$

例 3 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

例 3 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 α_1 α_2 α_3 α_4

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

例 3 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}}$$

例 3 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$

例 3 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2}$$

例 3 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 3 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 3 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 3 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2;$

例 3 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2;$

例 3 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2$;
- α_1, α_2 是极大无关组;

例 3 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2$;
- α_1, α_2 是极大无关组;
- $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$

例 3 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2$;
- α_1, α_2 是极大无关组;
- $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, $\alpha_4 = -2\alpha_1 + 3\alpha_2$

例 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

例 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s),$$

$$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t),$$

例 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t),$

例 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t), \quad \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 是极大无关组

例 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t), \quad \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 是极大无关组

注意到 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 能由 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 线性表示,

例 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t), \quad \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 是极大无关组

注意到 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 能由 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 线性表示, 所以

$$r_1 \leq r_2.$$

例 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t), \quad \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 是极大无关组

注意到 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 能由 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 线性表示, 所以 $r_1 \leq r_2$ 。

定理 设有向量组

(A): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$

(B): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$

若它们等价,

例 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t), \quad \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 是极大无关组

注意到 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 能由 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 线性表示, 所以 $r_1 \leq r_2$ 。

定理 设有向量组 (A): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$

(B): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$

若它们等价, 则 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$ 。

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \overset{\alpha_1}{\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A} \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{matrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{matrix} \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \overset{\gamma_1}{c_{11}} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \overset{\alpha_1}{a_{11}} & \overset{\alpha_2}{a_{12}} & \cdots & \overset{\alpha_n}{a_{1n}} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{matrix} & \gamma_1 & \gamma_2 & & \\ \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix} \end{matrix}}_C = \underbrace{\begin{matrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix}}_A \underbrace{\begin{matrix} & & & & \\ \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix} \end{matrix}}_B$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n \quad \text{等等}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n \quad \text{等等}$$

可见 $\gamma_1, \dots, \gamma_s$ 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示,

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n \quad \text{等等}$$

可见 $\gamma_1, \dots, \gamma_s$ 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 所以

$$r(\gamma_1, \dots, \gamma_s) \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n \quad \text{等等}$$

可见 $\gamma_1, \dots, \gamma_s$ 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 所以

$$r(\gamma_1, \dots, \gamma_s) \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = r(A)$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n \quad \text{等等}$$

可见 $\gamma_1, \dots, \gamma_s$ 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 所以

$$r(AB) = r(\gamma_1, \dots, \gamma_s) \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = r(A)$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B^{\beta_1}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{matrix}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\delta_1 \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

例 设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

例 设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

例 设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}}_B$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \quad \text{等等}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \quad \text{等等}$$

可见 $\delta_1, \dots, \delta_m$ 由 β_1, \dots, β_n 线性表示,

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \quad \text{等等}$$

可见 $\delta_1, \dots, \delta_m$ 由 β_1, \dots, β_n 线性表示, 所以

$$r(\delta_1, \dots, \delta_m) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_n)$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \quad \text{等等}$$

可见 $\delta_1, \dots, \delta_m$ 由 β_1, \dots, β_n 线性表示, 所以

$$r(\delta_1, \dots, \delta_m) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_n) = r(B)$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \quad \text{等等}$$

可见 $\delta_1, \dots, \delta_m$ 由 β_1, \dots, β_n 线性表示, 所以

$$r(AB) = r(\delta_1, \dots, \delta_m) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_n) = r(B)$$