

向量组的极大无关组

m 维
向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$

向量组的极大无关组

m 维
向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ (部分组)

向量组的极大无关组

m 维
向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ (部分组)

满足:

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关; 且
- 对 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 再加入任一 α_i 后都是线性相关,

向量组的极大无关组

m 维
向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ (部分组)

满足:

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关; 且
- 对 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 再加入任一 α_i 后都是线性相关,

(“不可扩充” 的)
线性无关

向量组的极大无关组

m 维
向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ (部分组)

满足:

(“不可扩充” 的)
线性无关

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关; 且
- 对 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 再加入任一 α_i 后都是线性相关,

则称 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大 (线性) 无关组。

向量组的极大无关组

m 维
向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ (部分组)

满足:

(“不可扩充” 的)
线性无关

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关; 且
- 对 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 再加入任一 α_i 后都是线性相关,

则称 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大 (线性) 无关组。

注 $r \leq s$

向量组的极大无关组

m 维
向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ (部分组)

满足:

(“不可扩充” 的)
线性无关

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关; 且
- 对 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 再加入任一 α_i 后都是线性相关,

则称 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大 (线性) 无关组。

注 $r \leq s$ 且 $r \leq m$ 。

向量组的极大无关组

m 维
向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ (部分组)

满足:

(“不可扩充” 的)
线性无关

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关; 且
- 对 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 再加入任一 α_i 后都是线性相关,

则称 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大 (线性) 无关组。

注 $r \leq s$ 且 $r \leq m$ 。

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则极大无关组是:

向量组的极大无关组

m 维
向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ (部分组)

满足:

(“不可扩充” 的)
线性无关

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关; 且
- 对 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 再加入任一 α_i 后都是线性相关,

则称 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大 (线性) 无关组。

注 $r \leq s$ 且 $r \leq m$ 。

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则极大无关组是:
 α_1, α_2 ;

向量组的极大无关组

m 维
向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ (部分组)

满足:

(“不可扩充” 的)
线性无关

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关; 且
- 对 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 再加入任一 α_i 后都是线性相关,

则称 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大 (线性) 无关组。

注 $r \leq s$ 且 $r \leq m$ 。

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则极大无关组是:

$\alpha_1, \alpha_2; \quad \alpha_1, \alpha_3;$

向量组的极大无关组

m 维
向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ (部分组)

满足:

(“不可扩充” 的)
线性无关

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关; 且
- 对 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 再加入任一 α_i 后都是线性相关,

则称 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大 (线性) 无关组。

注 $r \leq s$ 且 $r \leq m$ 。

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则极大无关组是:

$\alpha_1, \alpha_2; \quad \alpha_1, \alpha_3; \quad \alpha_2, \alpha_3;$

向量组的极大无关组

m 维
向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ (部分组)

满足:

(“不可扩充” 的)
线性无关

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关; 且
- 对 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 再加入任一 α_i 后都是线性相关,

则称 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大 (线性) 无关组。

注 $r \leq s$ 且 $r \leq m$ 。

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则极大无关组是:

α_1, α_2 ; α_1, α_3 ; α_2, α_3 ; α_2, α_4 ;

向量组的极大无关组

m 维
向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \xrightarrow{\text{挑选}} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ (部分组)

满足:

(“不可扩充” 的)
线性无关

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关; 且
- 对 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 再加入任一 α_i 后都是线性相关,

则称 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大 (线性) 无关组。

注 $r \leq s$ 且 $r \leq m$ 。

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则极大无关组是:

α_1, α_2 ; α_1, α_3 ; α_2, α_3 ; α_2, α_4 ; α_3, α_4

向量组的极大无关组

定理 设 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性无关部分组, 则:

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} \iff$$

是极大无关组

向量组的极大无关组

定理 设 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性无关部分组，则：

$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是极大无关组 \iff $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每个向量
都可由 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性表示

向量组的极大无关组

定理 设 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性无关部分组, 则:

$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是极大无关组 \iff $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每个向量
都可由 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性表示

证明

" \Rightarrow "

" \Leftarrow "

向量组的极大无关组

定理 设 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性无关部分组, 则:

$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是极大无关组 \iff $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每个向量
都可由 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性表示

证明

" \Rightarrow " 对任意 α_i 成立: $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}, \alpha_i$ 线性相关

" \Leftarrow "

向量组的极大无关组

定理 设 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性无关部分组, 则:

$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是极大无关组 \iff $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每个向量
都可由 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性表示

证明

" \Rightarrow " 对任意 α_i 成立: $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}, \alpha_i$ 线性相关, 所以 α_i 是
 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性组合

" \Leftarrow "

向量组的极大无关组

定理 设 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性无关部分组, 则:

$$\begin{array}{ccc} \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} & \Longleftrightarrow & \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \text{ 中每个向量} \\ \text{是极大无关组} & & \text{都可由 } \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} \text{ 线性表示} \end{array}$$

证明

" \Rightarrow " 对任意 α_i 成立: $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}, \alpha_i$ 线性相关, 所以 α_i 是 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性组合

" \Leftarrow " 对任意 α_i 成立: α_i 是 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性组合

向量组的极大无关组

定理 设 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性无关部分组, 则:

$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是极大无关组 $\iff \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每个向量
都可由 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性表示

证明

" \Rightarrow " 对任意 α_i 成立: $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}, \alpha_i$ 线性相关, 所以 α_i 是 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性组合

" \Leftarrow " 对任意 α_i 成立: α_i 是 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性组合, 所以 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}, \alpha_i$ 线性相关

向量组的秩

定理 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。

向量组的秩

定理 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，则

向量组的秩

定理 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，则 $r = t$

向量组的秩

定理 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，则 $r = t$

证明 注意到

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 与 $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$ 等价（相互线性表示）；且

向量组的秩

定理 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，则 $r = t$

证明 注意到

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 与 $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$ 等价（相互线性表示）；且
- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 与 $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$ 都是线性无关，

向量组的秩

定理 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，则 $r = t$

证明 注意到

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 与 $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$ 等价（相互线性表示）；且
 - $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 与 $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$ 都是线性无关，
- 所以 $r = t$

向量组的秩

定理 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，则 $r = t$

证明 注意到

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 与 $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$ 等价（相互线性表示）；且
- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 与 $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$ 都是线性无关，

所以 $r = t$

定义 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组所包含向量的个数，称向量组的**秩**，记为：

向量组的秩

定理 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，则 $r = t$

证明 注意到

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 与 $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$ 等价（相互线性表示）；且
- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 与 $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$ 都是线性无关，

所以 $r = t$

定义 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组所包含向量的个数，称向量组的**秩**，记为：

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$$

向量组的秩

定理 极大无关组所包含向量的个数是唯一确定的。即：若

$$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}; \quad \beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$$

都是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组，则 $r = t$

证明 注意到

- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 与 $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$ 等价（相互线性表示）；且
- $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 与 $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \dots, \beta_{k_t}$ 都是线性无关，

所以 $r = t$

定义 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组所包含向量的个数，称向量组的**秩**，记为：

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$$

注 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq s$ 且 $\leq m$ (维数)。

向量组的秩

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则
 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{\hspace{2cm}}$

向量组的秩

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则
 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$

向量组的秩

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- α_1, α_2 是极大无关组,

向量组的秩

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- α_1, α_2 是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

向量组的秩

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- α_1, α_2 是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

事实上, α_1, α_2 线性无关,

向量组的秩

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- α_1, α_2 是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

事实上, α_1, α_2 线性无关, 且 α_3, α_4 均能由 α_1, α_2 线性表示

向量组的秩

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- α_1, α_2 是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

事实上, α_1, α_2 线性无关, 且 α_3, α_4 均能由 α_1, α_2 线性表示

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2;$$

向量组的秩

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- α_1, α_2 是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

事实上, α_1, α_2 线性无关, 且 α_3, α_4 均能由 α_1, α_2 线性表示

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2; \quad \alpha_4 = 2\alpha_2$$

向量组的秩

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- α_1, α_2 是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

事实上, α_1, α_2 线性无关, 且 α_3, α_4 均能由 α_1, α_2 线性表示

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2; \quad \alpha_4 = 2\alpha_2$$

或者说:

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \leq 2$

向量组的秩

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- α_1, α_2 是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

事实上, α_1, α_2 线性无关, 且 α_3, α_4 均能由 α_1, α_2 线性表示

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2; \quad \alpha_4 = 2\alpha_2$$

或者说:

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \leq 2$
- 有两个线性无关向量,

向量组的秩

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- α_1, α_2 是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

事实上, α_1, α_2 线性无关, 且 α_3, α_4 均能由 α_1, α_2 线性表示

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2; \quad \alpha_4 = 2\alpha_2$$

或者说:

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \leq 2$
- 有两个线性无关向量, 如 α_1, α_2 ,

向量组的秩

例 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \underline{2}$$

这是:

- α_1, α_2 是极大无关组, 所以极大无关组包含个 2 向量。

事实上, α_1, α_2 线性无关, 且 α_3, α_4 均能由 α_1, α_2 线性表示

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2; \quad \alpha_4 = 2\alpha_2$$

或者说:

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \leq 2$
- 有两个线性无关向量, 如 α_1, α_2 , 所以 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \geq 2$

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & & \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & & \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n)$$

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n)$$

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{matrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ \beta_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \beta_2 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ & a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{matrix} = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n)$$

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{matrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix} = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n)$$

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{matrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix} = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}$$

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{matrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix} = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}$$

定义

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 称为 A 的列秩;

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{matrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix} = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}$$

定义

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 称为 A 的列秩;
- $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 称为 A 的行秩;

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{matrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix} = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}$$

定义

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 称为 A 的列秩;
- $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 称为 A 的行秩;

$$r(A) \quad r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \quad r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$$

秩

设

$$A_{m \times n} = \begin{matrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix} = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}$$

定义

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 称为 A 的列秩;
- $r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 称为 A 的行秩;

定理 $r(A) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$

初等变换求极大无关组

问题 给出 m 维的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如何求出其一组极大无关组?

步骤

初等变换求极大无关组

问题 给出 m 维的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如何求出其一组极大无关组?

步骤

$$1. A_{m \times n} = \begin{matrix} & \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

初等变换求极大无关组

问题 给出 m 维的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如何求出其一组极大无关组?

步骤

1.
$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$$

初等变换求极大无关组

问题 给出 m 维的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如何求出其一组极大无关组?

步骤

1.
$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$$

2. 通过简化的阶梯型矩阵, 求出 $r(A)$ 。

初等变换求极大无关组

问题 给出 m 维的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如何求出其一组极大无关组?

步骤

1.
$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$$

2. 通过简化的阶梯型矩阵, 求出 $r(A)$ 。

利用 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(A)$, 得出极大无关组所包含向量的个数

初等变换求极大无关组

问题 给出 m 维的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如何求出其一组极大无关组?

步骤

1.
$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$$

2. 通过简化的阶梯型矩阵, 求出 $r(A)$ 。

利用 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(A)$, 得出极大无关组所包含向量的个数

3. 通过简化的阶梯型矩阵, 容易看出线性无关的 $r(A)$ 列, 这就找到一组极大无关组

初等变换求极大无关组

问题 给出 m 维的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如何求出其一组极大无关组?

步骤

1.
$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$$

2. 通过简化的阶梯型矩阵, 求出 $r(A)$ 。

利用 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(A)$, 得出极大无关组所包含向量的个数

3. 通过简化的阶梯型矩阵, 容易看出线性无关的 $r(A)$ 列, 这就找到一组极大无关组

4. 通过简化的阶梯型矩阵, 容易看出其余列如何用该选定极大无关组线性表示

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

	α_1	α_2	α_3	α_4
$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$				

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

	α_1	α_2	α_3	α_4	
$\left(\begin{array}{cccc}$	2	1	2	3	
$\begin{array}{cccc}$	4	1	3	5	$\xrightarrow{r_2-2r_1}$
$\begin{array}{cccc}$	2	0	1	2	$\xrightarrow{r_3-r_1}$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

	α_1	α_2	α_3	α_4			
$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$					$\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}$	$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	\rightarrow

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 α_1 α_2 α_3 α_4

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2;$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2;$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2$;
- α_1, α_2 是极大无关组;

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2$;
- α_1, α_2 是极大无关组;
- $\alpha_3 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

	α_1	α_2	α_3	α_4
$\begin{pmatrix}$	1	0	1	2
$\begin{pmatrix}$	2	1	1	4
$\begin{pmatrix}$	1	1	0	3
$\begin{pmatrix}$	0	2	-2	3
$\end{pmatrix}$				

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解

α_1	α_2	α_3	α_4
1	0	1	2
2	1	1	4
1	1	0	3
0	2	-2	3

$$\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_4-3r_3}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_4-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_4-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_4-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_4-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 3;$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_4-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 3;$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_4-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 3;$

- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是极大无关组;

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的一个

极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_4-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 3$;
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是极大无关组;
- $\alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2;$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

• $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2;$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组; 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2$;
- α_1, α_2 是极大无关组;

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2$;
- α_1, α_2 是极大无关组;
- $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$

例 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组；并把其余向量用该极大无关组线性表示。

解 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-4r_1]{\begin{matrix} r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(A) = 2$;
- α_1, α_2 是极大无关组;
- $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, $\alpha_4 = -2\alpha_1 + 3\alpha_2$

例 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

例 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s),$$

$$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t),$$

例 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}} \text{ 是极大无关组}$$

$$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t),$$

例 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t), \quad \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 是极大无关组

例 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t), \quad \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 是极大无关组

注意到 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 能由 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 线性表示,

例 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t), \quad \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 是极大无关组

注意到 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 能由 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 线性表示, 所以

$$r_1 \leq r_2.$$

例 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t), \quad \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 是极大无关组

注意到 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 能由 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 线性表示, 所以

$r_1 \leq r_2$ 。

定理 设有向量组

(A): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$

(B): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$

若它们等价,

例 假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

证明 设

$r_1 = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \quad \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 是极大无关组

$r_2 = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t), \quad \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 是极大无关组

注意到 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_{r_1}}$ 能由 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{r_2}}$ 线性表示, 所以

$r_1 \leq r_2$ 。

定理 设有向量组

$$(A): \quad \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

$$(B): \quad \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

若它们等价, 则 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$ 。

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

例 设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{matrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{matrix} \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & & & \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & & \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n \quad \text{等等}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n \quad \text{等等}$$

可见 $\gamma_1, \dots, \gamma_s$ 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示,

例 设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n \quad \text{等等}$$

可见 $\gamma_1, \dots, \gamma_s$ 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 所以

$$r(\gamma_1, \dots, \gamma_s) \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n \quad \text{等等}$$

可见 $\gamma_1, \dots, \gamma_s$ 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 所以

$$r(\gamma_1, \dots, \gamma_s) \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = r(A)$$

例 设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_s \\ C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

即

$$(\gamma_1 \ \gamma_2 \ \cdots \ \gamma_s) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n \quad \text{等等}$$

可见 $\gamma_1, \dots, \gamma_s$ 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 所以

$$r(AB) = r(\gamma_1, \dots, \gamma_s) \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = r(A)$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \beta_1$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{matrix}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\delta_1 \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ C_{m1} \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{array}{c} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \end{array} \underbrace{\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{array}{c} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{array}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{array}{c} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{array} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{array}{c} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{array}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1s} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \quad \text{等等}$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{array}{c} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{array} \underbrace{\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{array}{c} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{array}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \quad \text{等等}$$

可见 $\delta_1, \dots, \delta_m$ 由 β_1, \dots, β_s 线性表示,

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \quad \text{等等}$$

可见 $\delta_1, \dots, \delta_m$ 由 β_1, \dots, β_n 线性表示, 所以

$$r(\delta_1, \dots, \delta_m) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_n)$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \quad \text{等等}$$

可见 $\delta_1, \dots, \delta_m$ 由 β_1, \dots, β_n 线性表示, 所以

$$r(\delta_1, \dots, \delta_m) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_n) = r(B)$$

例 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 为矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

证明 设 $AB = C_{m \times s}$

$$\begin{matrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{matrix} \underbrace{\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{ms} \end{pmatrix}}_C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}}_B \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{matrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \delta_1 = a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \quad \text{等等}$$

可见 $\delta_1, \dots, \delta_m$ 由 β_1, \dots, β_n 线性表示, 所以

$$r(AB) = r(\delta_1, \dots, \delta_m) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_n) = r(B)$$