


# 第 12 章 e: 傅里叶级数

数学系 梁卓滨

2017.07 暑期班

# 周期函数

假设  $f(t)$  是定义域为  $\mathbb{R}$  的周期函数，周期也是  $T = 2\pi$ 。



问题 是否有如下展开

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

## 性质 三角函数系

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

在区间  $[-\pi, \pi]$  上正交。即上述任意相异两个函数的乘积，在  $[-\pi, \pi]$  上的积分为零：

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cdot \cos nx dx = 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots, k \neq n)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cdot \sin nx dx = 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots, k \neq n)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cdot \cos nx dx = 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots, k \neq n)$$

另外

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \pi \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

有理由认为 若假设

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

“形式推导” (1) 当  $n = 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \cos nx dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} a_n \cos nx \cdot \cos nx dx = \pi a_n \end{aligned}$$

有理由认为 若假设

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

“形式推导” (2) 当  $n = 1, 2, 3, \dots$  时,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] \sin nx dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} b_n \sin nx \cdot \sin nx dx = \pi b_n \end{aligned}$$

有理由认为 若假设

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

“形式推导” (3)

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \right] dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} dx = \pi a_0 \end{aligned}$$

定义  $f(x)$  的傅里叶级数定义为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

问题 何时成立  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ ?

定理 (收敛定理, 狄利克雷充分条件)

**定理（收敛定理，狄利克雷充分条件）** 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数，如果它满足：

1. 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点；
2. 在一个周期内至多只有有限个极值点，

那么  $f(x)$  的傅里叶级数收敛（但不一定绝对收敛），并且

- 当  $x$  是  $f(x)$  的连续点时，

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

- 当  $x$  是  $f(x)$  的间断点时，


$$\frac{1}{2} [f(x^-) + f(x^+)] = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$



例 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数，在  $[-\pi, \pi)$  上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

求出  $f(x)$  的傅里叶级数。



解 计算傅里叶系数如下：

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \stackrel{\text{奇偶性}}{=} 0,$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot (-1) \cdot \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} [1 - \cos n\pi] = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n] \\ &= \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

所以傅里叶级数为

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) &= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx \\ &= \frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots \right] \end{aligned}$$

注 1  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$ , 利用收敛定理分析可知:

- 当  $x \neq n\pi$  时, 是  $f$  的连续点, 此时

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right]$$

- 当  $x = n\pi$  是, 是  $f$  的间断点, 此时

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{1}{2} \left[ f(x^-) + f(x^+) \right] = 0$$

(显然, 可直接看出当  $x = n\pi$  时傅里叶级数的值为 0)

注 2 取  $x = \frac{\pi}{2}$ , 可得到

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \cdots = \frac{\pi}{4}$$

注 3 当  $x = \frac{\pi}{2}$ , 傅里叶级数仅仅是条件收敛


注 4 奇函数  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$

$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{4}{\pi} \left[ \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right] = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$

考虑部分和


$$\frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x]$$



例 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数，在  $[-\pi, \pi)$  上的表达式为

$$f(x) = |x|$$

求出  $f(x)$  的傅里叶级数。



解 计算傅里叶系数如下：

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} x d \sin nx = \frac{2}{n\pi} \left[ x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx dx \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[ \frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right] = \frac{2}{n^2\pi} [(-1)^n - 1] = \begin{cases} -\frac{4}{n^2\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{\pi} = \pi.$$

所以傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \dots \right]$$

注 1  $f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right]$$

又因为  $f(x)$  是连续函数, 故利用收敛定理分析可知:

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right]$$

注 2 取  $x = 0$ , 可得到

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$$

注 3 偶函数  $f(x)$  的傅里叶级数是  $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$


$f(x)$  的傅里叶级数是

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left[ \cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right] = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos[(2n-1)x]}{(2n-1)^2}$$

考虑部分和

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{(2n-1)^2} \cos[(2n-1)x]$$

$N = 8$





**性质** 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数,

- 若  $f(x)$  是奇函数, 则傅里叶级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

- 若  $f(x)$  是偶函数, 则傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx.$$

**证明** (1) 假设  $f$  为奇函数, 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

性质 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的周期函数,

- 若  $f(x)$  是奇函数, 则傅里叶级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

- 若  $f(x)$  是偶函数, 则傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx.$$


证明 (2) 假设  $f$  为偶函数, 则

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \xrightarrow{\text{奇偶性}} \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

## 周期延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $[-\pi, \pi)$  (或  $(-\pi, \pi]$ ) 上的函数, 可以对其进行**周期延拓**, 从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期函数, 如图:




延拓后的周期函数任然记为  $f(x)$ , 此时可以进行傅里叶展开。

# 奇延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $(0, \pi]$  上的函数，可以对其进行奇延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期奇函数。

奇延拓步骤：

- 定义  $f(0) = 0$ ；当  $x \in (-\pi, 0)$  时，定义  $f(x) = -f(-x)$ ；  
(此时  $f$  在  $(-\pi, \pi]$  上有定义，且在  $(-\pi, \pi)$  上为奇函数)
- 周期延拓  $f$  在  $(-\pi, \pi]$  上的取值。



## 偶延拓

设  $f(x)$  是定义在区间  $[0, \pi]$  上的函数，可以对其进行偶延拓，从而得到定义在  $\mathbb{R}$  上的周期偶函数。

偶延拓步骤：

- 当  $x \in [-\pi, 0]$  时，定义  $f(x) = f(-x)$ ；  
(此时  $f$  成为定义在  $[-\pi, \pi]$  上为偶函数)
- 周期延拓  $f$  在  $[-\pi, \pi]$  上的取值。

