

第 1 章 f : 行列式的公式表示

数学系 梁卓滨

2020-2021 学年 I

回顾二三阶行列式的公式

- $$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

- $$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned}$$

回顾二三阶行列式的公式

- $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

- $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{matrix} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{matrix}$

规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，

回顾二三阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + \underline{a_{12}a_{23}a_{31}} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned}$$

规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，

回顾二三阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{matrix} a_{11}a_{22}a_{33} + \end{matrix} \underbrace{a_{12}a_{23}a_{31}}_{\substack{\text{231} \\ \uparrow}} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，

回顾二三阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{matrix} a_{11}a_{22}a_{33} + \end{matrix} \overbrace{a_{12}a_{23}a_{31}}^{231} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - \overbrace{a_{13}a_{22}a_{31}}$$

规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，

回顾二三阶行列式的公式

- $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

- $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{matrix} a_{11}a_{22}a_{33} + \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \textcolor{red}{a_{12}a_{23}a_{31}} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - \textcolor{blue}{a_{12}a_{21}a_{33}} - \textcolor{blue}{a_{13}a_{22}a_{31}} \end{matrix}$

规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，

231

321

回顾二三阶行列式的公式

- $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

- $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{matrix} a_{11}a_{22}a_{33} + \end{matrix} \underbrace{a_{12}a_{23}a_{31}}_{\text{231}} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - \underbrace{a_{13}a_{22}a_{31}}_{\text{321}}$


规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，形如

$$a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$

回顾二三阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{matrix} a_{11}a_{22}a_{33} + \underbrace{a_{12}a_{23}a_{31}}_{231} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - \underbrace{a_{13}a_{22}a_{31}}_{321} \end{matrix}$$


规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，形如

$$a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}$$

其中 $j_1j_2j_3$ 是“123”的任意一个排列。

回顾二三阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + \underbrace{a_{12}a_{23}a_{31}}_{\text{231}} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{11}a_{23}a_{32} - \underbrace{a_{12}a_{21}a_{33}}_{\text{321}} - \underbrace{a_{13}a_{22}a_{31}}_{\text{321}} \end{aligned}$$

规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，形如

$$a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}$$

其中 $j_1j_2j_3$ 是“123”的任意一个排列。

2. 共有 $3! = 6$ 项.

回顾二三阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + \underbrace{a_{12}a_{23}a_{31}}_{\text{231}} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{11}a_{23}a_{32} - \underbrace{a_{12}a_{21}a_{33}}_{\text{321}} - \underbrace{a_{13}a_{22}a_{31}}_{\text{321}} \end{aligned}$$

规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，形如

$$a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}$$


其中 $j_1j_2j_3$ 是“123”的任意一个排列。

2. 共有 $3! = 6$ 项.

3. 一半项带“+”号，另一半带“-”号

回顾二三阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + \underbrace{a_{12}a_{23}a_{31}}_{\text{231}} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{11}a_{23}a_{32} - \underbrace{a_{12}a_{21}a_{33}}_{\text{321}} - \underbrace{a_{13}a_{22}a_{31}}_{\text{321}} \end{aligned}$$


规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，形如

$$a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}$$

其中 $j_1j_2j_3$ 是“123”的任意一个排列。

2. 共有 $3! = 6$ 项.

3. 一半项带“+”号，另一半带“-”号

- 取正号的项，列标为排列：(1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2)
- 取负号的项，列标为排列：(1, 3, 2), (2, 1, 3), (3, 2, 1)

四阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} =$$

四阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

四阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，

四阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + \underline{a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，

四阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + \underline{a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，

四阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + \underline{a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - \underline{a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，

四阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + \underline{a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - \underline{a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，

四阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + \underline{a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - \underline{a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，形如

$$a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$$

1342

4312

四阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + \underline{a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - \underline{a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，形如

$$a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$$

其中 $j_1 j_2 j_3 j_4$ 是“1234”的任意一个排列。

四阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + \underline{a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - \underline{a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，形如

$$a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$$

其中 $j_1 j_2 j_3 j_4$ 是“1234”的任意一个排列。

2. 共有 $4! = 24$ 项.

四阶行列式的公式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + \underline{a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - \underline{a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

规律：

1. 每一项是不同行不同列的元素的乘积，形如

$$a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$$

其中 $j_1 j_2 j_3 j_4$ 是“1234”的任意一个排列。

2. 共有 $4! = 24$ 项.

3. 一半项带“+”号，另一半带“-”号.

更一般地, n 阶行列式的公式表达式是什么?

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = ?$$

更一般地, n 阶行列式的公式表达式是什么?

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = ?$$

猜

1. n 阶行列式应该有 $n!$ 项;

更一般地, n 阶行列式的公式表达式是什么?

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = ?$$

猜

1. n 阶行列式应该有 $n!$ 项;
2. 每一项是不同行不同列的 n 个元素的乘积, 形如

$$a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $j_1 j_2 j_3 \cdots j_n$ 是 “ $123 \cdots n$ ” 的任意一个排列.

更一般地, n 阶行列式的公式表达式是什么?

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = ?$$

猜

1. n 阶行列式应该有 $n!$ 项;
2. 每一项是不同行不同列的 n 个元素的乘积, 形如

$$a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $j_1 j_2 j_3 \cdots j_n$ 是 “ $123 \cdots n$ ” 的任意一个排列.

3. 其中一半取正号, 一半取负号.

排列、逆序

定义 由 n 个不同的数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组 $i_1 i_2 \cdots i_n$, 称为一个 n 级排列。

排列、逆序

定义 由 n 个不同的数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组 $i_1 i_2 \cdots i_n$, 称为一个 n 级排列。

例 41253 是一个 5 级排列.

排列、逆序

定义 由 n 个不同的数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组 $i_1 i_2 \cdots i_n$, 称为一个 n 级排列。

例 41253 是一个 5 级排列. 还有 23514, 43152... 都是 5 级排列.

排列、逆序

定义 由 n 个不同的数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组 $i_1 i_2 \dots i_n$, 称为一个 n 级排列。

例 41253 是一个 5 级排列. 还有 23514, 43152... 都是 5 级排列.
5 级排列一共有 _____ 个.

排列、逆序

定义 由 n 个不同的数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组 $i_1 i_2 \cdots i_n$, 称为一个 n 级排列。

例 41253 是一个 5 级排列. 还有 23514, 43152... 都是 5 级排列.

5 级排列一共有 5! 个.

排列、逆序

定义 由 n 个不同的数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组 $i_1 i_2 \cdots i_n$, 称为一个 n 级排列。

例 41253 是一个 5 级排列. 还有 23514, 43152... 都是 5 级排列.

5 级排列一共有 $5! = 120$ 个.

排列、逆序

定义 由 n 个不同的数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组 $i_1 i_2 \cdots i_n$, 称为一个 n 级排列。

例 41253 是一个 5 级排列. 还有 23514, 43152... 都是 5 级排列.

5 级排列一共有 $5! = 120$ 个.

注 n 级排列一共有 $n!$ 种.

排列、逆序

定义 由 n 个不同的数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组 $i_1 i_2 \cdots i_n$, 称为一个 n 级排列。

例 41253 是一个 5 级排列. 还有 23514, 43152... 都是 5 级排列.
5 级排列一共有 $5! = 120$ 个.

注 n 级排列一共有 $n!$ 种.

定义 在排列 $i_1 i_2 \cdots \cdots \cdots i_n$ 中,

排列、逆序

定义 由 n 个不同的数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组 $i_1 i_2 \cdots i_n$, 称为一个 n 级排列。

例 41253 是一个 5 级排列. 还有 23514, 43152... 都是 5 级排列.
5 级排列一共有 $5! = 120$ 个.

注 n 级排列一共有 $n!$ 种.

定义 在排列 $i_1 i_2 \cdots i_s \cdots i_t \cdots i_n$ 中,

排列、逆序

定义 由 n 个不同的数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组 $i_1 i_2 \cdots i_n$, 称为一个 n 级排列。

例 41253 是一个 5 级排列. 还有 23514, 43152... 都是 5 级排列.
5 级排列一共有 $5! = 120$ 个.

注 n 级排列一共有 $n!$ 种.

定义 在排列 $i_1 i_2 \cdots i_s \cdots i_t \cdots i_n$ 中, 如果 $i_s > i_t$ (前面比后面大),

排列、逆序

定义 由 n 个不同的数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组 $i_1 i_2 \cdots i_n$, 称为一个 n 级排列。

例 41253 是一个 5 级排列. 还有 23514, 43152... 都是 5 级排列.
5 级排列一共有 $5! = 120$ 个.

注 n 级排列一共有 $n!$ 种.

定义 在排列 $i_1 i_2 \cdots i_s \cdots i_t \cdots i_n$ 中, 如果 $i_s > i_t$ (前面比后面大), 则称 i_t 和 i_s 组成一个逆序.

排列、逆序

定义 由 n 个不同的数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组 $i_1 i_2 \dots i_n$, 称为一个 n 级排列。

例 41253 是一个 5 级排列. 还有 23514, 43152... 都是 5 级排列.
5 级排列一共有 $5! = 120$ 个.

注 n 级排列一共有 $n!$ 种.

定义 在排列 $i_1 i_2 \dots i_s \dots i_t \dots i_n$ 中, 如果 $i_s > i_t$ (前面比后面大), 则称 i_t 和 i_s 组成一个 **逆序**.

例 (4, 1), (4, 2) 是排列 41253 的逆序

排列、逆序

定义 由 n 个不同的数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组 $i_1 i_2 \dots i_n$, 称为一个 n 级排列。

例 41253 是一个 5 级排列. 还有 23514, 43152... 都是 5 级排列.
5 级排列一共有 $5! = 120$ 个.

注 n 级排列一共有 $n!$ 种.

定义 在排列 $i_1 i_2 \dots i_s \dots i_t \dots i_n$ 中, 如果 $i_s > i_t$ (前面比后面大), 则称 i_t 和 i_s 组成一个逆序.

例 (4, 1), (4, 2) 是排列 41253 的逆序, 其余的逆序还有:

排列、逆序

定义 由 n 个不同的数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组 $i_1 i_2 \dots i_n$, 称为一个 n 级排列。

例 41253 是一个 5 级排列. 还有 23514, 43152... 都是 5 级排列.
5 级排列一共有 $5! = 120$ 个.

注 n 级排列一共有 $n!$ 种.

定义 在排列 $i_1 i_2 \dots i_s \dots i_t \dots i_n$ 中, 如果 $i_s > i_t$ (前面比后面大), 则称 i_t 和 i_s 组成一个 **逆序**.

例 (4, 1), (4, 2) 是排列 41253 的逆序, 其余的逆序还有:
(4, 3),

排列、逆序

定义 由 n 个不同的数 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组 $i_1 i_2 \dots i_n$, 称为一个 n 级排列。

例 41253 是一个 5 级排列. 还有 23514, 43152... 都是 5 级排列.
5 级排列一共有 $5! = 120$ 个.

注 n 级排列一共有 $n!$ 种.

定义 在排列 $i_1 i_2 \dots i_s \dots i_t \dots i_n$ 中, 如果 $i_s > i_t$ (前面比后面大), 则称 i_t 和 i_s 组成一个 **逆序**.

例 (4, 1), (4, 2) 是排列 41253 的逆序, 其余的逆序还有:
(4, 3), (5, 3)

排列、逆序

练习 写出以下 6 阶排列的所有逆序

- 243165:
- 213465:

排列、逆序

练习 写出以下 6 阶排列的所有逆序

- 243165: (2, 1),
- 213465:

排列、逆序

练习 写出以下 6 阶排列的所有逆序

- 243165: $(2, 1), (4, 3),$
- 213465:

排列、逆序

练习 写出以下 6 阶排列的所有逆序

- 243165: $(2, 1), (4, 3), (4, 1),$
- 213465:

排列、逆序

练习 写出以下 6 阶排列的所有逆序

- 243165: $(2, 1), (4, 3), (4, 1), (3, 1),$
- 213465:

排列、逆序

练习 写出以下 6 阶排列的所有逆序

- 243165: $(2, 1), (4, 3), (4, 1), (3, 1), (6, 5)$
- 213465:

排列、逆序

练习 写出以下 6 阶排列的所有逆序

- 243165: $(2, 1), (4, 3), (4, 1), (3, 1), (6, 5)$
- 213465: $(2, 1),$

排列、逆序

练习 写出以下 6 阶排列的所有逆序

- 243165: $(2, 1), (4, 3), (4, 1), (3, 1), (6, 5)$
- 213465: $(2, 1), (6, 5)$

排列、逆序

练习 写出以下 6 阶排列的所有逆序

- 243165: (2, 1), (4, 3), (4, 1), (3, 1), (6, 5)
- 213465: (2, 1), (6, 5)

定义 一个 n 级排列 i_1, i_2, \dots, i_n 的全部的逆序的总数，称为它的**逆序数**，记为 $N(i_1 i_2 \cdots i_n)$.

排列、逆序

练习 写出以下 6 阶排列的所有逆序

- 243165: (2, 1), (4, 3), (4, 1), (3, 1), (6, 5)
- 213465: (2, 1), (6, 5)

定义 一个 n 级排列 i_1, i_2, \dots, i_n 的全部的逆序的总数，称为它的**逆序数**，记为 $N(i_1 i_2 \dots i_n)$.

例 $N(243165) =$, $N(213465) =$

排列、逆序

练习 写出以下 6 阶排列的所有逆序

- 243165: (2, 1), (4, 3), (4, 1), (3, 1), (6, 5)
- 213465: (2, 1), (6, 5)

定义 一个 n 级排列 i_1, i_2, \dots, i_n 的全部的逆序的总数，称为它的**逆序数**，记为 $N(i_1 i_2 \dots i_n)$.

例 $N(243165) = 5$, $N(213465) =$

排列、逆序

练习 写出以下 6 阶排列的所有逆序

- 243165: (2, 1), (4, 3), (4, 1), (3, 1), (6, 5)
- 213465: (2, 1), (6, 5)

定义 一个 n 级排列 i_1, i_2, \dots, i_n 的全部的逆序的总数, 称为它的**逆序数**, 记为 $N(i_1 i_2 \dots i_n)$.

例 $N(243165) = 5$, $N(213465) = 2$

排列、逆序

练习 写出以下 6 阶排列的所有逆序

- 243165: (2, 1), (4, 3), (4, 1), (3, 1), (6, 5)
- 213465: (2, 1), (6, 5)

定义 一个 n 级排列 i_1, i_2, \dots, i_n 的全部的逆序的总数, 称为它的**逆序数**, 记为 $N(i_1 i_2 \dots i_n)$.

例 $N(243165) = 5$, $N(213465) = 2$

定义 若一个排列的逆序数为奇数 (偶数), 则称它为**奇排列** (**偶排列**).

排列、逆序

练习 写出以下 6 阶排列的所有逆序

- 243165: (2, 1), (4, 3), (4, 1), (3, 1), (6, 5)
- 213465: (2, 1), (6, 5)

定义 一个 n 级排列 i_1, i_2, \dots, i_n 的全部的逆序的总数, 称为它的**逆序数**, 记为 $N(i_1 i_2 \dots i_n)$.

例 $N(243165) = 5$, $N(213465) = 2$

定义 若一个排列的逆序数为奇数 (偶数), 则称它为**奇排列** (**偶排列**).

例 243165 , 213465

排列、逆序

练习 写出以下 6 阶排列的所有逆序

- 243165: (2, 1), (4, 3), (4, 1), (3, 1), (6, 5)
- 213465: (2, 1), (6, 5)

定义 一个 n 级排列 i_1, i_2, \dots, i_n 的全部的逆序的总数, 称为它的**逆序数**, 记为 $N(i_1 i_2 \dots i_n)$.

例 $N(243165) = 5$, $N(213465) = 2$

定义 若一个排列的逆序数为奇数 (偶数), 则称它为**奇排列** (**偶排列**).

例 243165是奇排列, 213465

排列、逆序

练习 写出以下 6 阶排列的所有逆序

- 243165: (2, 1), (4, 3), (4, 1), (3, 1), (6, 5)
- 213465: (2, 1), (6, 5)

定义 一个 n 级排列 i_1, i_2, \dots, i_n 的全部的逆序的总数, 称为它的**逆序数**, 记为 $N(i_1 i_2 \dots i_n)$.

例 $N(243165) = 5$, $N(213465) = 2$

定义 若一个排列的逆序数为奇数 (偶数), 则称它为**奇排列** (**偶排列**).

例 243165是奇排列, 213465是偶排列.

对换

定义 对一个排列作**对换**是指：

对换

定义 对一个排列作**对换**是指：

$$i_1 \ i_2 \ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \ i_n$$

对换

定义 对一个排列作**对换**是指：

$$i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_s \ \cdots \ i_t \ \cdots \ i_n$$

对换

定义 对一个排列作**对换**是指：

$$i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_s \ \cdots \ i_t \ \cdots \ i_n \longrightarrow i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_t \ \cdots \ i_s \ \cdots \ i_n$$

对换

定义 对一个排列作**对换**是指：

$$i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_s \ \cdots \ i_t \ \cdots \ i_n \xrightarrow{(i_s, i_t)} i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_t \ \cdots \ i_s \ \cdots \ i_n$$

对换

定义 对一个排列作**对换**是指：

$$i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_s \ \cdots \ i_t \ \cdots \ i_n \xrightarrow{(i_s, i_t)} i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_t \ \cdots \ i_s \ \cdots \ i_n$$

例 把排列 243165 对换 (4, 1) 后得到 213465

对换

定义 对一个排列作**对换**是指：

$$i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_s \ \cdots \ i_t \ \cdots \ i_n \xrightarrow{(i_s, i_t)} i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_t \ \cdots \ i_s \ \cdots \ i_n$$

例 把排列 243165 对换 (4, 1) 后得到 213465 (奇排列 \Rightarrow 偶排列)

对换

定义 对一个排列作**对换**是指：

$$i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_s \ \cdots \ i_t \ \cdots \ i_n \xrightarrow{(i_s, i_t)} i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_t \ \cdots \ i_s \ \cdots \ i_n$$

例 把排列 243165 对换 (4, 1) 后得到 213465 (奇排列 \Rightarrow 偶排列)

定理 任何排列经过一个对换之后奇偶性改变

对换

定义 对一个排列作**对换**是指：

$$i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_s \ \cdots \ i_t \ \cdots \ i_n \xrightarrow{(i_s, i_t)} i_1 \ i_2 \ \cdots \ i_t \ \cdots \ i_s \ \cdots \ i_n$$

例 把排列 243165 对换 (4, 1) 后得到 213465 (奇排列 \Rightarrow 偶排列)

定理 任何排列经过一个对换之后奇偶性改变

注 因为排列经过对换之后奇偶性改变，所以在所有 n 级排列中，奇排列和偶排列各占一半

再看三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned}$$

再看三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned}$$

- 每一项的乘积形如：

$$\pm a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$

再看三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{matrix} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{matrix}$$

- 每一项的乘积形如：

$$\pm a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$

- 正负号

再看三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{matrix} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{matrix}$$

- 每一项的乘积形如：

$$\pm a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$

- 正负号

- 取正号：列标顺序是 (1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2)

再看三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{matrix} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{matrix}$$

- 每一项的乘积形如：

$$\pm a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$

- 正负号

- 取正号：列标顺序是 (1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2)
- 取负号：列标顺序是 (1, 3, 2), (2, 1, 3), (3, 2, 1)

再看三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{matrix} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{matrix}$$

- 每一项的乘积形如：

$$\pm a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$

- 正负号

- 取正号：列标顺序是 (1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2)：偶排列
- 取负号：列标顺序是 (1, 3, 2), (2, 1, 3), (3, 2, 1)

再看三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{matrix} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{matrix}$$

- 每一项的乘积形如：

$$\pm a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$

- 正负号

- 取正号：列标顺序是 (1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2)：偶排列
- 取负号：列标顺序是 (1, 3, 2), (2, 1, 3), (3, 2, 1)：奇排列

再看三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{matrix} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{matrix}$$

- 每一项的乘积形如：

$$\pm a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$

- 正负号

- 取正号：列标顺序是 (1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2)：偶排列
- 取负号：列标顺序是 (1, 3, 2), (2, 1, 3), (3, 2, 1)：奇排列

- 三阶行列式中每一项形如

$$(-1)^{N(j_1 j_2 j_3)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$

其中 $(j_1 j_2 j_3)$ 是 (1, 2, 3) 的所有排列

再看四阶行列式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} =$$

再看四阶行列式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

再看四阶行列式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

● 每一项的乘积形如：

$$\pm a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$$

再看四阶行列式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

- 每一项的乘积形如：

$$\pm a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$$

- 正负号

- 取正号的项：
- 取负号的项：

再看四阶行列式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

- 每一项的乘积形如：

$$\pm a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$$

- 正负号

- 取正号的项：列标的排列是偶排列
- 取负号的项：列标的排列是奇排列

再看四阶行列式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + \underline{a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

- 每一项的乘积形如：

$$\pm a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$$

- 正负号

- 取正号的项：列标的排列是偶排列
- 取负号的项：：列标的排列是奇排列

1342



再看四阶行列式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + \underline{a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - \underline{a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

- 每一项的乘积形如：

$$\pm a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$$

- 正负号

- 取正号的项：列标的排列是偶排列
- 取负号的项：：列标的排列是奇排列

1342

4312

再看四阶行列式

$$\bullet \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + \underline{a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ & + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\ & + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} \\ & - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\ & - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\ & - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - \underline{a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \end{aligned}$$

- 每一项的乘积形如：

$$\pm a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$$

- 正负号

- 取正号的项：列标的排列是偶排列
- 取负号的项：：列标的排列是奇排列

- 三阶行列式中中每一项形如

$$(-1)^{N(j_1 j_2 j_3, j_4)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$$

其中 $(j_1 j_2 j_3, j_4)$ 是 $(1, 2, 3, 4)$ 的所有排列

n 阶行列式的公式表示

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

n 阶行列式的公式表示

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

n 阶行列式的公式表示

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$(-1)^{N(j_1 j_2 \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

n 阶行列式的公式表示

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{N(j_1 j_2 \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

n 阶行列式的公式表示

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{N(j_1 j_2 \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $(j_1 j_2 \dots, j_n)$ 是 $(1, 2, \dots, n)$ 的所有排列.

n 阶行列式的公式表示

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{N(j_1 j_2 \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $(j_1 j_2 \dots, j_n)$ 是 $(1, 2, \dots, n)$ 的所有排列.

总结

- 和式中每一项

$$(-1)^{N(j_1 j_2 \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

称为行列式的**一般项**. 列标排列 $j_1 j_2 \dots, j_n$ 为奇排列时, 取负号;
偶排列时, 取正号.

n 阶行列式的公式表示

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{N(j_1 j_2 \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $(j_1 j_2 \dots, j_n)$ 是 $(1, 2, \dots, n)$ 的所有排列.

总结

- 和式中每一项

$$(-1)^{N(j_1 j_2 \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

称为行列式的**一般项**. 列标排列 $j_1 j_2 \dots, j_n$ 为奇排列时, 取负号;
偶排列时, 取正号.

- 共 $n!$ 个一般项, 一半取正号, 一半取负号

n 阶行列式的公式表示

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{N(j_1 j_2 \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $(j_1 j_2 \dots, j_n)$ 是 $(1, 2, \dots, n)$ 的所有排列.

总结

- 和式中每一项

$$(-1)^{N(j_1 j_2 \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

称为行列式的**一般项**. 列标排列 $j_1 j_2 \dots, j_n$ 为奇排列时, 取负号; 偶排列时, 取正号.

- 共 $n!$ 个一般项, 一半取正号, 一半取负号
- 不同行不同列的元素乘积的代数和

例 四阶行列式 $|a_{ij}|$ 中 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ 前应冠以正号还是负号？

例 四阶行列式 $|a_{ij}|$ 中 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ 前应冠以正号还是负号?

解 该项在 4 阶行列式中为

$$(-1)^{N(4312)} a_{14} a_{23} a_{31} a_{42}$$

例 四阶行列式 $|a_{ij}|$ 中 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ 前应冠以正号还是负号?

解 该项在 4 阶行列式中为

$$(-1)^{N(4312)} a_{14} a_{23} a_{31} a_{42}$$

因为 $N(4312) = 5$,

例 四阶行列式 $|a_{ij}|$ 中 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ 前应冠以正号还是负号?

解 该项在 4 阶行列式中为

$$(-1)^{N(4312)} a_{14} a_{23} a_{31} a_{42}$$

因为 $N(4312) = 5$, 所以 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ 前应冠以负号.

例 四阶行列式 $|a_{ij}|$ 中 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ 前应冠以正号还是负号?

解 该项在 4 阶行列式中为

$$(-1)^{N(4312)}a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$$

因为 $N(4312) = 5$, 所以 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ 前应冠以负号.

例 六阶行列式 $|a_{ij}|$ 中 $a_{21}a_{53}a_{16}a_{42}a_{65}a_{34}$ 前应冠以正号还是负号?

例 四阶行列式 $|a_{ij}|$ 中 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ 前应冠以正号还是负号?

解 该项在 4 阶行列式中为

$$(-1)^{N(4312)}a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$$

因为 $N(4312) = 5$, 所以 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ 前应冠以负号.

例 六阶行列式 $|a_{ij}|$ 中 $a_{21}a_{53}a_{16}a_{42}a_{65}a_{34}$ 前应冠以正号还是负号?

解 现将行标按次序排好:

$$a_{21}a_{53}a_{16}a_{42}a_{65}a_{34} = a_{16}a_{21}a_{34}a_{42}a_{53}a_{65}$$

例 四阶行列式 $|a_{ij}|$ 中 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ 前应冠以正号还是负号?

解 该项在 4 阶行列式中为

$$(-1)^{N(4312)}a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$$

因为 $N(4312) = 5$, 所以 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ 前应冠以负号.

例 六阶行列式 $|a_{ij}|$ 中 $a_{21}a_{53}a_{16}a_{42}a_{65}a_{34}$ 前应冠以正号还是负号?

解 现将行标按次序排好:

$$a_{21}a_{53}a_{16}a_{42}a_{65}a_{34} = a_{16}a_{21}a_{34}a_{42}a_{53}a_{65}$$

该项在 6 阶行列式中为

$$(-1)^{N(614235)}a_{16}a_{21}a_{34}a_{42}a_{53}a_{65}$$

例 四阶行列式 $|a_{ij}|$ 中 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ 前应冠以正号还是负号?

解 该项在 4 阶行列式中为

$$(-1)^{N(4312)}a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$$

因为 $N(4312) = 5$, 所以 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ 前应冠以负号.

例 六阶行列式 $|a_{ij}|$ 中 $a_{21}a_{53}a_{16}a_{42}a_{65}a_{34}$ 前应冠以正号还是负号?

解 现将行标按次序排好:

$$a_{21}a_{53}a_{16}a_{42}a_{65}a_{34} = a_{16}a_{21}a_{34}a_{42}a_{53}a_{65}$$

该项在 6 阶行列式中为

$$(-1)^{N(614235)}a_{16}a_{21}a_{34}a_{42}a_{53}a_{65}$$

因为 $N(614235) = 7$,

例 四阶行列式 $|a_{ij}|$ 中 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ 前应冠以正号还是负号?

解 该项在 4 阶行列式中为

$$(-1)^{N(4312)}a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$$

因为 $N(4312) = 5$, 所以 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ 前应冠以负号.

例 六阶行列式 $|a_{ij}|$ 中 $a_{21}a_{53}a_{16}a_{42}a_{65}a_{34}$ 前应冠以正号还是负号?

解 现将行标按次序排好:

$$a_{21}a_{53}a_{16}a_{42}a_{65}a_{34} = a_{16}a_{21}a_{34}a_{42}a_{53}a_{65}$$

该项在 6 阶行列式中为

$$(-1)^{N(614235)}a_{16}a_{21}a_{34}a_{42}a_{53}a_{65}$$

因为 $N(614235) = 7$, 所以 $a_{16}a_{21}a_{34}a_{42}a_{53}a_{65}$ 前应冠以负号.

定理 n 阶行列式 $|a_{ij}|$ 的一般项可以记为

$$(-1)^{N(i_1 i_2 \dots, i_n) + N(j_1 j_2 \dots, j_n)} a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$$

其中 $i_1 i_2 \dots, i_n, j_1 j_2 \dots, j_n$ 均为 n 阶排列

例 用行列式的公式计算

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

例 用行列式的公式计算

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

解

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \sum (-1)^{N(j_1 j_2 j_3 j_4)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$$
$$=$$

例 用行列式的公式计算

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

解

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \sum (-1)^{N(j_1 j_2 j_3 j_4)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$$
$$= a_1 a_2 a_3 a_4$$

例 用行列式的公式计算

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

解

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \sum (-1)^{N(j_1 j_2 j_3 j_4)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$$
$$= a_1 a_2 a_{32} a_4$$

例 用行列式的公式计算

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

解

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \sum (-1)^{N(j_1 j_2 j_3 j_4)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4}$$
$$= a_{14} a_{21} a_{32} a_{43}$$

例 用行列式的公式计算

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

解

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \sum (-1)^{N(j_1 j_2 j_3 j_4)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4} \\ = a_{14} a_{21} a_{32} a_{43}$$

例 用行列式的公式计算

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

解

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \sum (-1)^{N(j_1 j_2 j_3 j_4)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4} \\ = a_{14} a_{21} a_{32} a_{43}$$

例 用行列式的公式计算

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

解

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} &= \sum (-1)^{N(j_1 j_2 j_3 j_4)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4} \\ &= (-1)^{N(4123)} a_{14} a_{21} a_{32} a_{43} \\ &= \end{aligned}$$

例 用行列式的公式计算

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

解

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \sum (-1)^{N(j_1 j_2 j_3 j_4)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4} \\ = (-1)^{N(4123)} a_{14} a_{21} a_{32} a_{43} \\ = (-1)^3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 =$$

例 用行列式的公式计算

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

解

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} &= \sum (-1)^{N(j_1 j_2 j_3 j_4)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4} \\ &= (-1)^{N(4123)} a_{14} a_{21} a_{32} a_{43} \\ &= (-1)^3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = -1 \end{aligned}$$