

§5.1 二次型与对称矩阵

数学系 梁卓滨

2018 - 2019 学年上学期

本节内容

- ◇ 二次型，二次型与对称矩阵一一对应
- ♣ 二次型的标准型、规范型
- ♥ 矩阵的合同关系

二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2$$

二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地,

$$f(x_1, x_2) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2$$

二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= (x_1, x_2) \begin{pmatrix} & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= (x_1, x_2) \begin{pmatrix} a_{11} & \\ & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= (x_1, x_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地，

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x \end{aligned}$$

二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地，

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$f(x_1, x_2) = -3x_1^2 + 2x_1x_2 + 5x_2^2 =$$

二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$f(x_1, x_2) = -3x_1^2 + 2x_1x_2 + 5x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$f(x_1, x_2) = -3x_1^2 + 2x_1x_2 + 5x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

二次型：引例

二元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2) = 6x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

一般地，

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例

$$f(x_1, x_2) = -3x_1^2 + 2x_1x_2 + 5x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) = & a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ & + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \end{aligned}$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & a_{22} & \\ & & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \\ & a_{22} & \\ & & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ & a_{22} & \\ & & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ & a_{22} & a_{23} \\ & & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2, x_3) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3$$

$$= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3$

$$= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3$

$$= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3$

$$= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3$

$$= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3$

$$= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \\ & 0 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3$

$$= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ & 0 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3$

$$= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ & 0 & -1 \\ & & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

二次型：引例

三元二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 \\ &\quad + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, x_3)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = x^T A x \end{aligned}$$

例 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_3^2 - 2x_2x_3$

$$= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

=

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 3 \\ & 2 & 4 \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ & 1 & 2 & 0 \\ & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ & 2 & 2 \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ & 1 & 2 & 0 \\ & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \end{aligned}$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \underline{\quad} x_1^2 + \underline{\quad} x_2^2 + \underline{\quad} x_3^2 + 2 \underline{\quad} x_1x_2 + 2 \underline{\quad} x_1x_3 + 2 \underline{\quad} x_2x_3 \end{aligned}$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \underline{\quad} x_1^2 + \underline{\quad} x_2^2 + \underline{\quad} x_3^2 + 2 \underline{\quad} x_1x_2 + 2 \underline{\quad} x_1x_3 + 2 \underline{\quad} x_2x_3 \end{aligned}$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \underline{\quad} x_1^2 + \underline{\quad} x_2^2 + \underline{\quad} x_3^2 + 2 \underline{\quad} x_1x_2 + 2 \underline{\quad} x_1x_3 + 2 \underline{\quad} x_2x_3 \end{aligned}$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \underline{-1}x_1^2 + \underline{2}x_2^2 + \underline{0}x_3^2 + 2\underline{\quad}x_1x_2 + 2\underline{\quad}x_1x_3 + 2\underline{\quad}x_2x_3 \end{aligned}$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \underline{-1}x_1^2 + \underline{2}x_2^2 + \underline{0}x_3^2 + 2 \cdot \underline{1} \cdot x_1x_2 + 2 \underline{\quad} x_1x_3 + 2 \underline{\quad} x_2x_3 \end{aligned}$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \underline{-1}x_1^2 + \underline{2}x_2^2 + \underline{0}x_3^2 + 2 \cdot \underline{1} \cdot x_1x_2 + 2 \cdot \underline{\frac{1}{2}} \cdot x_1x_3 + 2 \underline{\quad} x_2x_3 \end{aligned}$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \underline{-1}x_1^2 + \underline{2}x_2^2 + \underline{0}x_3^2 + 2 \cdot \underline{1} \cdot x_1x_2 + 2 \cdot \underline{\frac{1}{2}} \cdot x_1x_3 + 2 \cdot \underline{0} \cdot x_2x_3 \end{aligned}$$

二次型：引例

例 1 给定二次型，写出对称矩阵 A ：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 2 给定对称矩阵 A ，写出相应二次型：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \underline{-1}x_1^2 + \underline{2}x_2^2 + \underline{0}x_3^2 + 2 \cdot \underline{1} \cdot x_1x_2 + 2 \cdot \underline{\frac{1}{2}} \cdot x_1x_3 + 2 \cdot \underline{0} \cdot x_2x_3 \\ &= -x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_3 + x_1x_3 \end{aligned}$$

二次型

定义 n 元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots \dots \dots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

二次型

定义 n 元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots\dots\dots \\ & + a_{nn}x_n^2 \\ = & (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

二次型

定义 n 元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ &\quad + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ &\quad + \dots \\ &\quad + a_{nn}x_n^2 \\ &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

二次型

定义 n 元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & + a_{nn}x_n^2 \\ = (x_1, x_2, \dots, x_n) & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

二次型

定义 n 元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & + a_{nn}x_n^2 \\ = (x_1, x_2, \dots, x_n) & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

二次型

定义 n 元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ &\quad + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ &\quad + \dots \dots \dots \\ &\quad + a_{nn}x_n^2 \\ &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

二次型

定义 n 元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ &\quad + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ &\quad + \dots \dots \dots \\ &\quad \quad \quad + a_{nn}x_n^2 \\ &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

二次型

定义 n 元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ &\quad + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ &\quad + \dots \\ &\quad + a_{nn}x_n^2 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, \dots, x_n)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_x \end{aligned}$$

二次型

定义 n 元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ &\quad + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ &\quad + \dots \\ &\quad + a_{nn}x_n^2 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, \dots, x_n)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_x \\ &= x^T A x \end{aligned}$$

二次型

定义 n 元二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ &\quad + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ &\quad + \dots \\ &\quad + a_{nn}x_n^2 \\ &= \underbrace{(x_1, x_2, \dots, x_n)}_{x^T} \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_x \\ &= x^T A x \end{aligned}$$

注 n 元二次型与对称矩阵，是一一对应

给定二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \cdots \cdots \cdots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

给定二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \cdots \cdots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

作线性变量代换：

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \cdots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

给定二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \cdots \cdots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

作线性变量代换：

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \cdots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 得

$$f = b_{11}y_1^2 + 2b_{12}y_1y_2 + \cdots \quad (\text{关于 } y_1, \dots, y_n \text{ 的二次型})$$

给定二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \cdots \cdots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

作线性变量代换：

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \cdots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 得

$$f = b_{11}y_1^2 + 2b_{12}y_1y_2 + \cdots \quad (\text{关于 } y_1, \dots, y_n \text{ 的二次型})$$

问题：如何选择适当的变量代换 y_1, y_2, \dots, y_n ，把 f 化简？

给定二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \cdots \cdots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

作线性变量代换：（要求 $C = (c_{ij})$ 可逆矩阵，这样可以反解出 y ）

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \cdots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 得

$$f = b_{11}y_1^2 + 2b_{12}y_1y_2 + \cdots \quad (\text{关于 } y_1, \dots, y_n \text{ 的二次型})$$

问题：如何选择适当的变量代换 y_1, y_2, \dots, y_n ，把 f 化简？

给定二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \cdots \cdots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

作线性变量代换：（要求 $C = (c_{ij})$ 可逆矩阵，这样可以反解出 y ）

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \cdots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

代入二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 得

$$f = b_{11}y_1^2 + 2b_{12}y_1y_2 + \cdots \quad (\text{关于 } y_1, \dots, y_n \text{ 的二次型})$$

问题：如何选择适当的变量代换 y_1, y_2, \dots, y_n ，把 f 化简？

给定二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \cdots \cdots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

作线性变量代换：（要求 $C = (c_{ij})$ 可逆矩阵，这样可以反解出 y ）

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \cdots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow x = Cy$$

代入二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 得

$$f = b_{11}y_1^2 + 2b_{12}y_1y_2 + \cdots \quad (\text{关于 } y_1, \dots, y_n \text{ 的二次型})$$

问题：如何选择适当的变量代换 y_1, y_2, \dots, y_n ，把 f 化简？

给定二次型

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \cdots \cdots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

作线性变量代换：（要求 $C = (c_{ij})$ 可逆矩阵，这样可以反解出 $y = C^{-1}x$ ）

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \cdots + c_{1n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow x = Cy$$

代入二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 得

$$f = b_{11}y_1^2 + 2b_{12}y_1y_2 + \cdots \quad (\text{关于 } y_1, \dots, y_n \text{ 的二次型})$$

问题：如何选择适当的变量代换 y_1, y_2, \dots, y_n ，把 f 化简？

问题：如何选择适当的变量代换 y_1, y_2, \dots, y_n ($x = Cy$), 把 f 化简?

问题：如何选择适当的变量代换 y_1, y_2, \dots, y_n ($x = Cy$), 把 f 化简?

注意到:

$$f = x^T A x \quad \underline{\underline{x=Cy}}$$

问题：如何选择适当的变量代换 y_1, y_2, \dots, y_n ($x = Cy$), 把 f 化简?

注意到:

$$f = x^T A x \xrightarrow{x=Cy} (Cy)^T A (Cy)$$

问题：如何选择适当的变量代换 y_1, y_2, \dots, y_n ($x = Cy$), 把 f 化简?

注意到:

$$f = x^T A x \xrightarrow{x=Cy} (Cy)^T A (Cy) = y^T C^T$$

问题：如何选择适当的变量代换 y_1, y_2, \dots, y_n ($x = Cy$), 把 f 化简?

注意到:

$$f = x^T A x \xrightarrow{x=Cy} (Cy)^T A (Cy) = y^T C^T A C y$$

问题：如何选择适当的变量代换 y_1, y_2, \dots, y_n ($x = Cy$), 把 f 化简?

注意到:

$$f = x^T A x \xrightarrow{x=Cy} (Cy)^T A (Cy) = y^T C^T A C y$$

所以上述问题等价于以下问题:

问题'：给定对称矩阵 A , 尝试找出可逆矩阵 C 使得

$$C^T A C$$

尽可能简单?

问题：如何选择适当的变量代换 y_1, y_2, \dots, y_n ($x = Cy$), 把 f 化简?

注意到:

$$f = x^T A x \xrightarrow{x=Cy} (Cy)^T A (Cy) = y^T C^T A C y$$

所以上述问题等价于以下问题:

问题': 给定对称矩阵 A , 尝试找出可逆矩阵 C 使得

$$C^T A C$$

尽可能简单?

定理 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

问题：如何选择适当的变量代换 y_1, y_2, \dots, y_n ($x = Cy$), 把 f 化简?

注意到:

$$f = x^T A x \xrightarrow{x=Cy} (Cy)^T A (Cy) = y^T C^T A C y$$

所以上述问题等价于以下问题:

问题': 给定对称矩阵 A , 尝试找出可逆矩阵 C 使得

$$C^T A C$$

尽可能简单?

定理 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

所以, 任意二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 都存在可逆线性变换 $x = Cy$, 使得

问题：如何选择适当的变量代换 y_1, y_2, \dots, y_n ($x = Cy$), 把 f 化简?

注意到:

$$f = x^T A x \xrightarrow{x=Cy} (Cy)^T A (Cy) = y^T C^T A C y$$

所以上述问题等价于以下问题:

问题': 给定对称矩阵 A , 尝试找出可逆矩阵 C 使得

$$C^T A C$$

尽可能简单?

定理 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

所以, 任意二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 都存在可逆线性变换 $x = Cy$, 使得

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

定理 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

所以, 任意二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 都存在可逆线性变换 $x = Cy$, 使得

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

定理 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

所以, 任意二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 都存在可逆线性变换 $x = Cy$, 使得

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

定理 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

所以, 任意二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 都存在可逆线性变换 $x = Cy$, 使得

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

标准型

定理 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

所以, 任意二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 都存在可逆线性变换 $x = Cy$, 使得

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

标准型

在标准型的系数 d_1, d_2, \dots, d_n 中

- 非零数的个数 r , 称为二次型的秩

定理 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

所以, 任意二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 都存在可逆线性变换 $x = Cy$, 使得

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

标准型

在标准型的系数 d_1, d_2, \dots, d_n 中

- 非零数的个数 r , 称为二次型的秩
- 正数的个数 p , 称为正惯性指标; 负数的个数 q , 称为负惯性指标

定理 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

所以, 任意二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 都存在可逆线性变换 $x = Cy$, 使得

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

标准型

在标准型的系数 d_1, d_2, \dots, d_n 中

- 非零数的个数 r , 称为二次型的秩
- 正数的个数 p , 称为正惯性指标; 负数的个数 q , 称为负惯性指标

性质 1. $r = p + q$; 2. $r = r(A)$.

定理 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

所以, 任意二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 都存在可逆线性变换 $x = Cy$, 使得

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

标准型

在标准型的系数 d_1, d_2, \dots, d_n 中

- 非零数的个数 r , 称为二次型的秩
- 正数的个数 p , 称为正惯性指标; 负数的个数 q , 称为负惯性指标

性质 1. $r = p + q$; 2. $r = r(A)$.

证明 $r = p + q$ 是显然的。

定理 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

所以, 任意二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 都存在可逆线性变换 $x = Cy$, 使得

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

标准型

在标准型的系数 d_1, d_2, \dots, d_n 中

- 非零数的个数 r , 称为二次型的秩
- 正数的个数 p , 称为正惯性指标; 负数的个数 q , 称为负惯性指标

性质 1. $r = p + q$; 2. $r = r(A)$.

证明 $r = p + q$ 是显然的。 $r = r \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$

定理 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

所以, 任意二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 都存在可逆线性变换 $x = Cy$, 使得

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

标准型

在标准型的系数 d_1, d_2, \dots, d_n 中

- 非零数的个数 r , 称为二次型的秩
- 正数的个数 p , 称为正惯性指标; 负数的个数 q , 称为负惯性指标

性质 1. $r = p + q$; 2. $r = r(A)$.

证明 $r = p + q$ 是显然的。 $r = r \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix} = r(C^T A C)$

定理 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

所以, 任意二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 都存在可逆线性变换 $x = Cy$, 使得

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

标准型

在标准型的系数 d_1, d_2, \dots, d_n 中

- 非零数的个数 r , 称为二次型的秩
- 正数的个数 p , 称为正惯性指标; 负数的个数 q , 称为负惯性指标

性质 1. $r = p + q$; 2. $r = r(A)$.

证明 $r = p + q$ 是显然的。 $r = r \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix} = r(C^T A C) = r(A)$ 。

定理 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

所以, 任意二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 都存在可逆线性变换 $x = Cy$, 使得

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

标准型

问题 如何找出可逆矩阵 C , 以及标准型 $d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$?

定理 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

所以, 任意二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 都存在可逆线性变换 $x = Cy$, 使得

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

标准型

问题 如何找出可逆矩阵 C , 以及标准型 $d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$?

三种方法 正交变换法 配方法 初等变换法

定理 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

所以, 任意二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 都存在可逆线性变换 $x = Cy$, 使得

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

标准型

问题 如何找出可逆矩阵 C , 以及标准型 $d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$?

三种方法 正交变换法 配方法 初等变换法

注

- 用不同的方法, 可能得到不同的标准型。
- 但是可以证明, 二次型的秩, 正、负惯性指标是恒定不变的。

正交变换法化二次型为标准型

由上一章，我们知道

定理 任意对称矩阵 A , 都存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$.

正交变换法化二次型为标准型

由上一章，我们知道

定理 任意对称矩阵 A , 都存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$.

设二次型 $f(x) = x^T A x$, 作可逆线性变换 $x = Qy$, 则

正交变换法化二次型为标准型

由上一章，我们知道

定理 任意对称矩阵 A , 都存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$.

设二次型 $f(x) = x^T A x$, 作可逆线性变换 $x = Qy$, 则

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

正交变换法化二次型为标准型

由上一章，我们知道

定理 任意对称矩阵 A , 都存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$.

设二次型 $f(x) = x^T A x$, 作可逆线性变换 $x = Qy$, 则

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

特别地,

- 二次型的秩 =
- 正惯性指标 = ; 负惯性指标 =

正交变换法化二次型为标准型

由上一章，我们知道

定理 任意对称矩阵 A , 都存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$.

设二次型 $f(x) = x^T A x$, 作可逆线性变换 $x = Qy$, 则

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

特别地,

- 二次型的秩 = 非零特征值的个数;
- 正惯性指标 = ; 负惯性指标 =

正交变换法化二次型为标准型

由上一章，我们知道

定理 任意对称矩阵 A , 都存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$.

设二次型 $f(x) = x^T A x$, 作可逆线性变换 $x = Qy$, 则

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

特别地,

- 二次型的秩 = 非零特征值的个数;
- 正惯性指标 = 正特征值的个数; 负惯性指标 =

正交变换法化二次型为标准型

由上一章，我们知道

定理 任意对称矩阵 A , 都存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$.

设二次型 $f(x) = x^T A x$, 作可逆线性变换 $x = Qy$, 则

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

特别地,

- 二次型的秩 = 非零特征值的个数;
- 正惯性指标 = 正特征值的个数; 负惯性指标 = 负特征值的个数

正交变换法化二次型为标准型

由上一章，我们知道

定理 任意对称矩阵 A , 都存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$.

设二次型 $f(x) = x^T A x$, 作可逆线性变换 $x = Qy$, 则

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

特别地,

- 二次型的秩 = 非零特征值的个数;
- 正惯性指标 = 正特征值的个数; 负惯性指标 = 负特征值的个数

注 Q 为正交矩阵, 称线性变换 $x = Qy$ 为**正交变换**

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型，写出所用的正交变换 $x = Qy$

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型，写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • f 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} & & \end{pmatrix}$

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型，写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • f 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型，写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • f 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型，写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • f 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型，写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • f 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ & 1 & 2 \\ & & 1 \end{pmatrix}$

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型，写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • f 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型，写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • f 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ，特征方程： $0 = |\lambda I - A|$

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型，写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • f 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ，特征方程： $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 5)(\lambda + 1)^2$

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • f 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 特征方程: $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 5)(\lambda + 1)^2$

- $\lambda_1 = 5$

- $\lambda_2 = -1$ (二重)

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型，写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • f 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ，特征方程： $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 5)(\lambda + 1)^2$

- $\lambda_1 = 5$

- $\lambda_2 = -1$ (二重)

-

$$f = 5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$$

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型，写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • f 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ，特征方程： $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 5)(\lambda + 1)^2$

- $\lambda_1 = 5$ ，特征向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

- $\lambda_2 = -1$ （二重），特征向量

$$\begin{cases} \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

- $f = 5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型，写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • f 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ，特征方程： $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 5)(\lambda + 1)^2$

• $\lambda_1 = 5$ ，特征向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{单位化}} \gamma_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$

• $\lambda_2 = -1$ (二重)，特征向量

$$\begin{cases} \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

•
$$f = 5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$$

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • f 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 特征方程: $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 5)(\lambda + 1)^2$

• $\lambda_1 = 5$, 特征向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{单位化}} \gamma_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$

• $\lambda_2 = -1$ (二重), 特征向量

$$\begin{cases} \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \xrightarrow{\text{正交化}} \begin{cases} \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \beta_3 = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

• $f = 5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • f 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 特征方程: $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 5)(\lambda + 1)^2$

• $\lambda_1 = 5$, 特征向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{单位化}} \gamma_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$

• $\lambda_2 = -1$ (二重), 特征向量

$$\begin{cases} \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \xrightarrow{\text{正交化}} \begin{cases} \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \beta_3 = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \xrightarrow{\text{单位化}} \begin{cases} \gamma_2 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \\ \gamma_3 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \end{cases}$$

• $f = 5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • f 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 特征方程: $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 5)(\lambda + 1)^2$

• $\lambda_1 = 5$, 特征向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{单位化}} \gamma_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$

• $\lambda_2 = -1$ (二重), 特征向量

$$\begin{cases} \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \xrightarrow{\text{正交化}} \begin{cases} \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \beta_3 = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \xrightarrow{\text{单位化}} \begin{cases} \gamma_2 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \\ \gamma_3 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \end{cases}$$

• 令 $Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}$,

$$f = 5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$$

例 1 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • f 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 特征方程: $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 5)(\lambda + 1)^2$

• $\lambda_1 = 5$, 特征向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{单位化}} \gamma_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$

• $\lambda_2 = -1$ (二重), 特征向量

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{正交化}} \left\{ \begin{array}{l} \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \beta_3 = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{单位化}} \left\{ \begin{array}{l} \gamma_2 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \\ \gamma_3 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \end{array} \right\}$$

• 令 $Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}$, $x = Qy$, 则 $f = 5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型，写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • $A = \begin{pmatrix} & & \end{pmatrix}$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型，写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • $A = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 5 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ & 5 & -4 \\ & & 5 \end{pmatrix}$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ & 5 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ & 5 & -4 \\ & & 5 \end{pmatrix}$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$, 特征方程: $0 = |\lambda I - A|$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$, 特征方程: $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10)$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$, 特征方程: $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10)$

- $\lambda_1 = 1$ (二重)

- $\lambda_3 = 10$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$, 特征方程: $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10)$

- $\lambda_1 = 1$ (二重)

- $\lambda_3 = 10$

-

$$\text{则 } f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$, 特征方程: $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10)$

• $\lambda_1 = 1$ (二重), 特征向量

$$\begin{cases} \alpha_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

• $\lambda_3 = 10$, 特征向量 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

• 则 $f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$, 特征方程: $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10)$

• $\lambda_1 = 1$ (二重), 特征向量

$$\begin{cases} \alpha_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \xrightarrow{\text{正交化}} \begin{cases} \beta_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \beta_2 = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

• $\lambda_3 = 10$, 特征向量 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

• 则 $f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$, 特征方程: $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10)$

• $\lambda_1 = 1$ (二重), 特征向量

$$\begin{cases} \alpha_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \xrightarrow{\text{正交化}} \begin{cases} \beta_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \beta_2 = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \xrightarrow{\text{单位化}} \begin{cases} \gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \gamma_2 = \frac{5}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

• $\lambda_3 = 10$, 特征向量 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

• 则 $f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$, 特征方程: $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10)$

• $\lambda_1 = 1$ (二重), 特征向量

$$\begin{cases} \alpha_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \xrightarrow{\text{正交化}} \begin{cases} \beta_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \beta_2 = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \xrightarrow{\text{单位化}} \begin{cases} \gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \gamma_2 = \frac{5}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

• $\lambda_3 = 10$, 特征向量 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{单位化}} \gamma_3 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}$

• 则 $f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$, 特征方程: $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10)$

• $\lambda_1 = 1$ (二重), 特征向量

$$\begin{cases} \alpha_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \xrightarrow{\text{正交化}} \begin{cases} \beta_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \beta_2 = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \xrightarrow{\text{单位化}} \begin{cases} \gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \gamma_2 = \frac{5}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

• $\lambda_3 = 10$, 特征向量 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{单位化}} \gamma_3 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}$

• 令 $Q = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & \sqrt{5}/3 & -2/3 \end{pmatrix}$, 则 $f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$

例 2 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准型, 写出所用的正交变换 $x = Qy$

解 • $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$, 特征方程: $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10)$

• $\lambda_1 = 1$ (二重), 特征向量

$$\begin{cases} \alpha_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \xrightarrow{\text{正交化}} \begin{cases} \beta_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \beta_2 = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \xrightarrow{\text{单位化}} \begin{cases} \gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \gamma_2 = \frac{5}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

• $\lambda_3 = 10$, 特征向量 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{单位化}} \gamma_3 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}$

• 令 $Q = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & \sqrt{5}/3 & -2/3 \end{pmatrix}$, $x = Qy$, 则 $f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$

例 3 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$$

为标准型，写出所用的正交变换 $x = Qy$

例 4 用正交变换化二次型

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 + 4x_1x_2$$

为标准型，写出所用的正交变换 $x = Qy$

配方法化二次型为标准型

例 1 配方法化二次型为标准型

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

配方法化二次型为标准型

例 1 配方法化二次型为标准型

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2$$

配方法化二次型为标准型

- 想法: $a^2 + 2ab =$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

配方法化二次型为标准型

- 想法: $a^2 + 2ab = a^2 + 2ab + b^2 - b^2 =$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

配方法化二次型为标准型

- 想法: $a^2 + 2ab = a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

配方法化二次型为标准型

- 想法: $a^2 + 2ab = a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2$
 $a^2 + 2ab + 2ac =$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

配方法化二次型为标准型

- 想法：
$$a^2 + 2ab = a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2$$
$$a^2 + 2ab + 2ac = a^2 + 2a(b + c)$$
$$=$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

配方法化二次型为标准型

● 想法: $a^2 + 2ab = a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2$

$$\begin{aligned} a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\ &= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\ &= \end{aligned}$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

配方法化二次型为标准型

- 想法：
$$\begin{aligned}a^2 + 2ab &= a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2 \\a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\&= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\&= (a + b + c)^2 - (b + c)^2\end{aligned}$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

配方法化二次型为标准型

● 想法:
$$\begin{aligned} a^2 + 2ab &= a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2 \\ a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\ &= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\ &= (a + b + c)^2 - (b + c)^2 \end{aligned}$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) \end{aligned}$$

配方法化二次型为标准型

● 想法:

$$\begin{aligned}a^2 + 2ab &= a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2 \\a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\&= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\&= (a + b + c)^2 - (b + c)^2\end{aligned}$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2\end{aligned}$$

配方法化二次型为标准型

● 想法:

$$\begin{aligned}a^2 + 2ab &= a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2 \\a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\&= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\&= (a + b + c)^2 - (b + c)^2\end{aligned}$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2\end{aligned}$$

配方法化二次型为标准型

● 想法: $a^2 + 2ab = a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2$

$$\begin{aligned} a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\ &= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\ &= (a + b + c)^2 - (b + c)^2 \end{aligned}$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + \end{aligned}$$

配方法化二次型为标准型

● 想法:

$$\begin{aligned}a^2 + 2ab &= a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2 \\a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\&= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\&= (a + b + c)^2 - (b + c)^2\end{aligned}$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3\end{aligned}$$

配方法化二次型为标准型

- 想法：
$$\begin{aligned}a^2 + 2ab &= a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2 \\a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\&= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\&= (a + b + c)^2 - (b + c)^2\end{aligned}$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2\end{aligned}$$

配方法化二次型为标准型

- 想法：
$$\begin{aligned}a^2 + 2ab &= a^2 + 2ab + b^2 - b^2 = (a + b)^2 - b^2 \\a^2 + 2ab + 2ac &= a^2 + 2a(b + c) \\&= a^2 + 2a(b + c) + (b + c)^2 - (b + c)^2 \\&= (a + b + c)^2 - (b + c)^2\end{aligned}$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = \quad \quad x_2 + x_3 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases}$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases}y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\y_2 = \quad \quad x_2 + x_3 \\y_3 = \quad \quad \quad x_3\end{cases}$$

则

$$f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = \quad \quad x_2 + x_3 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \\ x_2 = \\ x_3 = \end{cases}$$

则

$$f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = \quad \quad x_2 + x_3 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \\ x_2 = \\ x_3 = \end{cases} y_3$$

则

$$f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = \quad \quad x_2 + x_3 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \\ x_2 = \quad y_2 - y_3 \\ x_3 = \quad \quad y_3 \end{cases}$$

则

$$f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = \quad \quad x_2 + x_3 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = \quad \quad y_2 - y_3 \\ x_3 = \quad \quad \quad y_3 \end{cases}$$

则

$$f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = \quad \quad x_2 + x_3 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = \quad \quad y_2 - y_3 \\ x_3 = \quad \quad \quad y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{pmatrix} y$$

则

$$f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y$$

则

$$f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y$$

则

$$f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y$$

则

$$f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C: \text{可逆}} y$$

则

$$f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

例 1 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2 - (x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 - x_3^2 \\&= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C: \text{可逆}} y$$

则

$$f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

例 2 配方法化 $f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$ 为标准型

例 2 配方法化二次型为标准型

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$
$$=$$

例 2 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\ &= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) \end{aligned}$$

例 2 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2\end{aligned}$$

例 2 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2\end{aligned}$$

例 2 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2\end{aligned}$$

例 2 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

例2 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\ &= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\ &\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\ &= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2 \end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 \end{cases}$$

例2 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 \end{cases}$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

例2 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

例2 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases}$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

例2 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = \quad \quad \quad x_2 \\ y_3 = \quad \quad \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 - 2y_3 \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

例2 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = \quad \quad \quad x_2 \\ y_3 = \quad \quad \quad \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = \quad \quad y_2 \\ x_3 = \quad \quad \quad y_3 \end{cases}$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

例2 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = \quad \quad \quad x_2 \\ y_3 = \quad \quad \quad \quad x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 - 2y_3 \\ x_2 = \quad \quad \quad y_2 \\ x_3 = \quad \quad \quad \quad y_3 \end{cases}$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

例2 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 - 2y_3 \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C: \text{可逆}} y$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

例2 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= x_1^2 + 2x_1 \cdot (2x_2 + 2x_3) + (2x_2 + 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 \\&\quad + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2 \\&= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 - 2y_3 \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C: \text{可逆}} y$$

则

$$f = y_1^2 - 2y_2^2$$

例3 配方法化 $f = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 为标准型

例 3 配方法化二次型为标准型

$$f = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

=

例 3 配方法化二次型为标准型

$$f = \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3$$

=

例 3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned} f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\ &= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) \quad \quad \quad] \end{aligned}$$

例 3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned} f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\ &= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] \end{aligned}$$

例 3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned} f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\ &= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \end{aligned}$$

例 3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned} f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\ &= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\ &\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \end{aligned}$$

例 3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned} f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\ &= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\ &\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\ &= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 \end{aligned}$$

例 3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\&= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\&\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_2x_3\end{aligned}$$

例 3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned} f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\ &= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\ &\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\ &= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_2x_3 \\ &\quad + 3[x_2^2 - 2x_2 \cdot \frac{2}{3}x_3 \quad \quad \quad] \end{aligned}$$

例 3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\&= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\&\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_2x_3 \\&\quad + 3[x_2^2 - 2x_2 \cdot \frac{2}{3}x_3 + (\frac{2}{3}x_3)^2]\end{aligned}$$

例 3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\&= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\&\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_2x_3 \\&\quad + 3[x_2^2 - 2x_2 \cdot \frac{2}{3}x_3 + (\frac{2}{3}x_3)^2] - 3(\frac{2}{3}x_3)^2\end{aligned}$$

例 3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\&= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\&\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_2x_3 \\&\quad + 3[x_2^2 - 2x_2 \cdot \frac{2}{3}x_3 + (\frac{2}{3}x_3)^2] - 3(\frac{2}{3}x_3)^2 + 3x_3^2\end{aligned}$$

例 3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\&= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\&\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3[x_2^2 - 2x_2 \cdot \frac{2}{3}x_3 + (\frac{2}{3}x_3)^2] - 3(\frac{2}{3}x_3)^2 + 3x_3^2\end{aligned}$$

例 3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\&= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\&\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3[x_2^2 - 2x_2 \cdot \frac{2}{3}x_3 + (\frac{2}{3}x_3)^2] - 3(\frac{2}{3}x_3)^2 + 3x_3^2 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2\end{aligned}$$

例 3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\&= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\&\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3[x_2^2 - 2x_2 \cdot \frac{2}{3}x_3 + (\frac{2}{3}x_3)^2] - 3(\frac{2}{3}x_3)^2 + 3x_3^2 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3(x_2 - \frac{2}{3}x_3)^2\end{aligned}$$

例 3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\&= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\&\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3[x_2^2 - 2x_2 \cdot \frac{2}{3}x_3 + (\frac{2}{3}x_3)^2] - 3(\frac{2}{3}x_3)^2 + 3x_3^2 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3(x_2 - \frac{2}{3}x_3)^2 + \frac{5}{3}x_3^2\end{aligned}$$

例3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\&= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\&\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3[x_2^2 - 2x_2 \cdot \frac{2}{3}x_3 + (\frac{2}{3}x_3)^2] - 3(\frac{2}{3}x_3)^2 + 3x_3^2 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3(x_2 - \frac{2}{3}x_3)^2 + \frac{5}{3}x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - x_3 \\ y_2 = x_2 - \frac{2}{3}x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

例3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\&= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\&\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3[x_2^2 - 2x_2 \cdot \frac{2}{3}x_3 + (\frac{2}{3}x_3)^2] - 3(\frac{2}{3}x_3)^2 + 3x_3^2 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3(x_2 - \frac{2}{3}x_3)^2 + \frac{5}{3}x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - x_3 \\ y_2 = x_2 - \frac{2}{3}x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

$$\text{则 } f = 2y_1^2 + 3y_2^2 + \frac{5}{3}y_3^2$$

例3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\&= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\&\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3[x_2^2 - 2x_2 \cdot \frac{2}{3}x_3 + (\frac{2}{3}x_3)^2] - 3(\frac{2}{3}x_3)^2 + 3x_3^2 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3(x_2 - \frac{2}{3}x_3)^2 + \frac{5}{3}x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - x_3 \\ y_2 = x_2 - \frac{2}{3}x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + y_3 \\ x_2 = y_2 + \frac{2}{3}y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

$$\text{则 } f = 2y_1^2 + 3y_2^2 + \frac{5}{3}y_3^2$$

例3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\&= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\&\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3[x_2^2 - 2x_2 \cdot \frac{2}{3}x_3 + (\frac{2}{3}x_3)^2] - 3(\frac{2}{3}x_3)^2 + 3x_3^2 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3(x_2 - \frac{2}{3}x_3)^2 + \frac{5}{3}x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - x_3 \\ y_2 = x_2 - \frac{2}{3}x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + y_3 \\ x_2 = y_2 + \frac{2}{3}y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

$$\text{则 } f = 2y_1^2 + 3y_2^2 + \frac{5}{3}y_3^2$$

例3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\&= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\&\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3[x_2^2 - 2x_2 \cdot \frac{2}{3}x_3 + (\frac{2}{3}x_3)^2] - 3(\frac{2}{3}x_3)^2 + 3x_3^2 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3(x_2 - \frac{2}{3}x_3)^2 + \frac{5}{3}x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - x_3 \\ y_2 = x_2 - \frac{2}{3}x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + \frac{1}{3}y_3 \\ x_2 = y_2 + \frac{2}{3}y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

$$\text{则 } f = 2y_1^2 + 3y_2^2 + \frac{5}{3}y_3^2$$

例3 配方法化二次型为标准型

$$\begin{aligned}f &= \underline{2x_1^2} + 5x_2^2 + 5x_3^2 + \underline{4x_1x_2 - 4x_1x_3} - 8x_2x_3 \\&= 2[x_1^2 + 2x_1 \cdot (x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 \\&\quad + 5x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_2x_3 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3[x_2^2 - 2x_2 \cdot \frac{2}{3}x_3 + (\frac{2}{3}x_3)^2] - 3(\frac{2}{3}x_3)^2 + 3x_3^2 \\&= 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3(x_2 - \frac{2}{3}x_3)^2 + \frac{5}{3}x_3^2\end{aligned}$$

作线性变量代换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - x_3 \\ y_2 = x_2 - \frac{2}{3}x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + \frac{1}{3}y_3 \\ x_2 = y_2 + \frac{2}{3}y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{C: \text{可逆}} y$$

$$\text{则 } f = 2y_1^2 + 3y_2^2 + \frac{5}{3}y_3^2$$

初等变换法化二次型为标准型

设 A 是对称矩阵, 则存在可逆矩阵 C , 满足

$$C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix} =: D$$

初等变换法求解 C :

初等变换法化二次型为标准型

设 A 是对称矩阵，则存在可逆矩阵 C ，满足

$$C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix} =: D$$

初等变换法求解 C :

$$\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix}$$

初等变换法化二次型为标准型

设 A 是对称矩阵, 则存在可逆矩阵 C , 满足

$$C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix} =: D$$

初等变换法求解 C :

$$\left(\begin{array}{c} A \\ I \end{array} \right) \xrightarrow[\text{2. 对 } A \text{ 作同一类型行变换}]{\text{1. 整体做列变换}}$$

初等变换法化二次型为标准型

设 A 是对称矩阵, 则存在可逆矩阵 C , 满足

$$C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix} =: D$$

初等变换法求解 C :

$$\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{2. 对 } A \text{ 作同一类型行变换}]{\text{1. 整体做列变换}} \dots \xrightarrow{\text{重复直至}} \begin{pmatrix} D \\ C \end{pmatrix}$$

初等变换法化二次型为标准型

设 A 是对称矩阵, 则存在可逆矩阵 C , 满足

$$C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix} =: D$$

初等变换法求解 C :

$$\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{2. 对 } A \text{ 作同一类型行变换}]{\text{1. 整体做列变换}} \cdots \xrightarrow{\text{重复直至}} \begin{pmatrix} D \\ C \end{pmatrix}$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C$ 为对角阵。

初等变换法化二次型为标准型

设 A 是对称矩阵, 则存在可逆矩阵 C , 满足

$$C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix} =: D$$

初等变换法求解 C :

$$\left(\begin{array}{c} A \\ I \end{array} \right) \xrightarrow[\text{2. 对 } A \text{ 作同一类型行变换}]{\text{1. 整体做列变换}} \cdots \xrightarrow{\text{重复直至}} \left(\begin{array}{c} D \\ C \end{array} \right)$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C$ 为对角阵。

解

$$\left(\begin{array}{c} A \\ I \end{array} \right) =$$

初等变换法化二次型为标准型

设 A 是对称矩阵, 则存在可逆矩阵 C , 满足

$$C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix} =: D$$

初等变换法求解 C :

$$\left(\begin{array}{c} A \\ I \end{array} \right) \xrightarrow[\text{2. 对 } A \text{ 作同一类型行变换}]{\text{1. 整体做列变换}} \cdots \xrightarrow{\text{重复直至}} \left(\begin{array}{c} D \\ C \end{array} \right)$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C$ 为对角阵。

解

$$\left(\begin{array}{c} A \\ I \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

初等变换法化二次型为标准型

设 A 是对称矩阵, 则存在可逆矩阵 C , 满足

$$C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix} =: D$$

初等变换法求解 C :

$$\left(\begin{array}{c} A \\ I \end{array} \right) \xrightarrow[\text{2. 对 } A \text{ 作同一类型行变换}]{\text{1. 整体做列变换}} \cdots \xrightarrow{\text{重复直至}} \left(\begin{array}{c} D \\ C \end{array} \right)$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C$ 为对角阵。

解

$$\left(\begin{array}{c} A \\ I \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{c_2 - 2c_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

初等变换法化二次型为标准型

设 A 是对称矩阵, 则存在可逆矩阵 C , 满足

$$C^T A C = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix} =: D$$

初等变换法求解 C :

$$\left(\begin{array}{c} A \\ I \end{array} \right) \xrightarrow[\text{2. 对 } A \text{ 作同一类型行变换}]{\text{1. 整体做列变换}} \cdots \xrightarrow{\text{重复直至}} \left(\begin{array}{c} D \\ C \end{array} \right)$$

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C$ 为对角阵。

解

$$\left(\begin{array}{c} A \\ I \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{c_2 - 2c_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\frac{A}{I}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 - 2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{A}{I}\right) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 - 2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{c_3 - 2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & -3 \\ \hline 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{A}{I}\right) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2-2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{c_3-2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & -3 \\ \hline 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & -3 \\ \hline 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\left(\frac{A}{I}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 - 2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_3 - 2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & -3 \\ \hline 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & -3 \\ \hline 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_3 - \frac{2}{3}c_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & -\frac{5}{3} \\ \hline 1 & -2 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{A}{I}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 - 2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_3 - 2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & -3 \\ \hline 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & -3 \\ \hline 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_3 - \frac{2}{3}c_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & -\frac{5}{3} \\ \hline 1 & -2 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - \frac{2}{3}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{3} \\ \hline 1 & -2 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{A}{I}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 - 2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_3 - 2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & -3 \\ \hline 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & -3 \\ \hline 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_3 - \frac{2}{3}c_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & -\frac{5}{3} \\ \hline 1 & -2 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - \frac{2}{3}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{3} \\ \hline 1 & -2 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \therefore C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{A}{I}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 - 2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_3 - 2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & -3 \\ \hline 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & -3 \\ \hline 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_3 - \frac{2}{3}c_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & -\frac{5}{3} \\ \hline 1 & -2 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - \frac{2}{3}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{3} \\ \hline 1 & -2 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \therefore C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

注 A 对应的二次型, 其标准型为 $y_1^2 - 3y_2^2 - \frac{5}{3}y_3^2$,

$$\left(\frac{A}{I}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 - 2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \\ \hline 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_3 - 2c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & -3 \\ \hline 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & -3 \\ \hline 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_3 - \frac{2}{3}c_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & -\frac{5}{3} \\ \hline 1 & -2 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - \frac{2}{3}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{3} \\ \hline 1 & -2 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \therefore C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

注 A 对应的二次型，其标准型为 $y_1^2 - 3y_2^2 - \frac{5}{3}y_3^2$ ，秩为 3，正惯性指标为 1，负惯性指标为 2

例 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C$ 为对角阵。

对 $f = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 采取两种方法化为标准型:

对 $f = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 采取两种方法化为标准型:

- 方法一: 求系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ 的特征值 ($\lambda = 1, 1, 10$)、

特征向量

对 $f = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 采取两种方法化为标准型:

- 方法一: 求系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ 的特征值 ($\lambda = 1, 1, 10$)、

特征向量 $\xrightarrow{\text{单位正交化}}$

对 $f = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 采取两种方法化为标准型:

- 方法一: 求系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ 的特征值 ($\lambda = 1, 1, 10$)、

特征向量 $\xrightarrow{\text{单位正交化}}$ 得到正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & \sqrt{5}/3 & -2/3 \end{pmatrix}$$

对 $f = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 采取两种方法化为标准型:

- 方法一: 求系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ 的特征值 ($\lambda = 1, 1, 10$)、

特征向量 $\xrightarrow{\text{单位正交化}}$ 得到正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & \sqrt{5}/3 & -2/3 \end{pmatrix}$$

令 $x = Qy$, 则

对 $f = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 采取两种方法化为标准型:

- 方法一: 求系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ 的特征值 ($\lambda = 1, 1, 10$)、

特征向量 $\xrightarrow{\text{单位正交化}}$ 得到正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & \sqrt{5}/3 & -2/3 \end{pmatrix}$$

令 $x = Qy$, 则

$$f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$$

对 $f = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 采取两种方法化为标准型:

- 方法一: 求系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ 的特征值 ($\lambda = 1, 1, 10$)、

特征向量 $\xrightarrow{\text{单位正交化}}$ 得到正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & \sqrt{5}/3 & -2/3 \end{pmatrix}$$

令 $x = Qy$, 则

$$f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$$

- 方法二: 配方法

对 $f = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 采取两种方法化为标准型:

- 方法一: 求系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ 的特征值 ($\lambda = 1, 1, 10$)、

特征向量 $\xrightarrow{\text{单位正交化}}$ 得到正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & \sqrt{5}/3 & -2/3 \end{pmatrix}$$

令 $x = Qy$, 则

$$f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$$

- 方法二: 配方法

$$f = 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3(x_2 - \frac{2}{3}x_3)^2 + \frac{5}{3}x_3^2$$

对 $f = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 采取两种方法化为标准型:

- 方法一: 求系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ 的特征值 ($\lambda = 1, 1, 10$)、

特征向量 $\xrightarrow{\text{单位正交化}}$ 得到正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & \sqrt{5}/3 & -2/3 \end{pmatrix}$$

令 $x = Qy$, 则

$$f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$$

- 方法二: 配方法

$$f = 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3(x_2 - \frac{2}{3}x_3)^2 + \frac{5}{3}x_3^2 = 2y_1^2 + 3y_2^2 + \frac{5}{3}y_3^2$$

对 $f = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 采取两种方法化为标准型:

- 方法一: 求系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ 的特征值 ($\lambda = 1, 1, 10$)、

特征向量 $\xrightarrow{\text{单位正交化}}$ 得到正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & \sqrt{5}/3 & -2/3 \end{pmatrix}$$

令 $x = Qy$, 则

$$f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$$

- 方法二: 配方法

$$f = 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + 3(x_2 - \frac{2}{3}x_3)^2 + \frac{5}{3}x_3^2 = 2y_1^2 + 3y_2^2 + \frac{5}{3}y_3^2$$

注 标准型不唯一

二次型的规范型

定理 任意二次型 $f(x_1, \dots, x_n)$ 都可以通过非退化线性变换

$$x = Cy$$

化为

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_r y_r^2$$

二次型的规范型

定理 任意二次型 $f(x_1, \dots, x_n)$ 都可以通过非退化线性变换

$$x = Cy$$

化为

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$$

二次型的规范型

定理 任意二次型 $f(x_1, \dots, x_n)$ 都可以通过非退化线性变换

$$x = Cy$$

化为

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2 \quad (\text{规范型})$$

二次型的规范型

定理 任意二次型 $f(x_1, \dots, x_n)$ 都可以通过非退化线性变换

$$x = Cy$$

化为

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2 \quad (\text{规范型})$$

$$\begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$$

二次型的规范型

定理 任意二次型 $f(x_1, \dots, x_n)$ 都可以通过非退化线性变换

$$x = Cy$$

化为

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2 \quad (\text{规范型})$$

$$A \quad \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$$

二次型的规范型

定理 任意二次型 $f(x_1, \dots, x_n)$ 都可以通过非退化线性变换

$$x = Cy$$

化为

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2 \quad (\text{规范型})$$

也就是, 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得

$$C^T A C = \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$$

二次型的规范型

定理 任意二次型 $f(x_1, \dots, x_n)$ 都可以通过非退化线性变换

$$x = Cy$$

化为

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2 \quad (\text{规范型})$$

也就是, 任意对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得

$$C^T A C = \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$$

注 $r = r(A)$, $p =$ 正惯性指标, $r - p =$ 负惯性指标

二次型的规范型

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

二次型的规范型

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$\begin{aligned} &= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2 \\ &\quad (\sqrt{2}x_2)^2 \end{aligned}$$

二次型的规范型

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - (\sqrt{2}x_2)^2$$

二次型的规范型

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - (\sqrt{2}x_2)^2$$

$$= y_1^2 - y_2^2$$

二次型的规范型

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - (\sqrt{2}x_2)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x$$

$$= y_1^2 - y_2^2$$

二次型的规范型

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - (\sqrt{2}x_2)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2} & -2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y$$

$$= y_1^2 - y_2^2$$

二次型的规范型

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 4x_3^2$$

配方法

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 2x_2^2$$

$$= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - (\sqrt{2}x_2)^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2} & -2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

$$= y_1^2 - y_2^2$$

二次型的规范型

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

二次型的规范型

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1\right)^2$$

二次型的规范型

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

二次型的规范型

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 - (x_1 - x_2)^2$$

二次型的规范型

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 - (x_1 - x_2)^2 = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

二次型的规范型

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 - (x_1 - x_2)^2 = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} x$$

二次型的规范型

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 - (x_1 - x_2)^2 = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 2/\sqrt{3} & 0 & -1 \\ -1/\sqrt{3} & 1 & 1 \end{pmatrix} y$$

二次型的规范型

$$f = x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

配方法

$$= \frac{3}{4}x_1^2 - (x_1 - x_2)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_1\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3\right)^2 - (x_1 - x_2)^2 = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

$$\text{变量代换 } y = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} x \Rightarrow x = \underbrace{\begin{pmatrix} 2/\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 2/\sqrt{3} & 0 & -1 \\ -1/\sqrt{3} & 1 & 1 \end{pmatrix}}_C y$$

合同，合同的等价条件

定义 设 A, B 为两个 n 阶方阵，若存在可逆 n 阶方阵 C ，使得

$$C^T A C = B$$

则称 A **合同于** B ，记为 $A \simeq B$

合同，合同的等价条件

定义 设 A, B 为两个 n 阶方阵，若存在可逆 n 阶方阵 C ，使得

$$C^T A C = B$$

则称 A **合同于** B ，记为 $A \simeq B$

定理 任意对称矩阵 A ，都成立

$$A \simeq \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$$

合同，合同的等价条件

定义 设 A, B 为两个 n 阶方阵，若存在可逆 n 阶方阵 C ，使得

$$C^T A C = B$$

则称 A **合同于** B ，记为 $A \simeq B$

定理 任意对称矩阵 A ，都成立

$$A \simeq \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$$

定理 设 A, B 为对称矩阵，则 $A \simeq B$ 的充分必要条件是 A, B 具有相同的规范形（也就是，秩、正惯性指标都相等）