

## 第 9 章 e: 方向导数与梯度

数学系 梁卓滨

2017.07 暑期班

# 提要


## 1. 二元函数的

- 梯度
- 方向导数

## 2. 三元函数的


- 梯度
- 方向导数

# 梯度




**定义** 设  $f(x, y)$  在平面区域  $D$  内具有一阶连续偏导数, 对于每一点  $p_0(x_0, y_0)$ ,

# 梯度




**定义** 设  $f(x, y)$  在平面区域  $D$  内具有一阶连续偏导数, 对于每一点  $p_0(x_0, y_0)$ ,

# 梯度



**定义** 设  $f(x, y)$  在平面区域  $D$  内具有一阶连续偏导数, 对于每一点  $p_0(x_0, y_0)$ ,

# 梯度




**定义** 设  $f(x, y)$  在平面区域  $D$  内具有一阶连续偏导数, 对于每一点  $p_0(x_0, y_0)$ , 定义向量

$$(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)),$$

称为  $f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处的**梯度**, 记为

$$\text{grad } f(x_0, y_0) \quad \text{或} \quad \nabla f(x_0, y_0)$$

# 梯度



**定义** 设  $f(x, y)$  在平面区域  $D$  内具有一阶连续偏导数, 对于每一点  $p_0(x_0, y_0)$ , 定义向量

$$(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)),$$


称为  $f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处的**梯度**, 记为

$$\text{grad } f(x_0, y_0) \quad \text{或} \quad \nabla f(x_0, y_0)$$

---

**例** 设  $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ , 求  $\nabla f$

## 梯度



**定义** 设  $f(x, y)$  在平面区域  $D$  内具有一阶连续偏导数, 对于每一点  $p_0(x_0, y_0)$ , 定义向量

$$(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)),$$

称为  $f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处的**梯度**, 记为


$$\text{grad } f(x_0, y_0) \quad \text{或} \quad \nabla f(x_0, y_0)$$

**例** 设  $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ , 求  $\nabla f$

**解**  $\nabla f = (f_x, f_y) = ( \quad , \quad )$



## 梯度



**定义** 设  $f(x, y)$  在平面区域  $D$  内具有一阶连续偏导数, 对于每一点  $p_0(x_0, y_0)$ , 定义向量

$$(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)),$$


称为  $f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处的**梯度**, 记为

$$\text{grad } f(x_0, y_0) \quad \text{或} \quad \nabla f(x_0, y_0)$$

**例** 设  $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ , 求  $\nabla f$

**解**  $\nabla f = (f_x, f_y) = \left(\frac{x}{2}, \quad \right)$

## 梯度



**定义** 设  $f(x, y)$  在平面区域  $D$  内具有一阶连续偏导数, 对于每一点  $p_0(x_0, y_0)$ , 定义向量

$$(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)),$$

称为  $f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处的**梯度**, 记为


$$\text{grad } f(x_0, y_0) \quad \text{或} \quad \nabla f(x_0, y_0)$$

**例** 设  $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ , 求  $\nabla f$


**解**  $\nabla f = (f_x, f_y) = (\frac{x}{2}, 2y)$

例 设  $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ , 则  $\nabla f(x, y) = (\frac{x}{2}, 2y)$


例 设  $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ , 则  $\nabla f(x, y) = (\frac{x}{2}, 2y)$




例 设  $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ , 则  $\nabla f(x, y) = (\frac{x}{2}, 2y)$



例 设  $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ , 则  $\nabla f(x, y) = (\frac{x}{2}, 2y)$




例 设  $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ , 则  $\nabla f(x, y) = (\frac{x}{2}, 2y)$



- 梯度  $\nabla f$  是一个向量场

例 设  $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ , 则  $\nabla f(x, y) = (\frac{x}{2}, 2y)$




- 梯度  $\nabla f$  是一个向量场
- 反过来，向量场并不总是某个函数的梯度！




例 向量场  $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$ , 不是任何函数的梯度


例 向量场  $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$ , 不是任何函数的梯度




例 向量场  $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$ , 不是任何函数的梯度



例 向量场  $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$ , 不是任何函数的梯度




例 向量场  $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$ , 不是任何函数的梯度



证明 若  $F(x, y) = (y, -\sin(xy)) = \nabla f = (f_x, f_y)$ , 则


例 向量场  $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$ , 不是任何函数的梯度



证明 若  $F(x, y) = (y, -\sin(xy)) = \nabla f = (f_x, f_y)$ , 则

$$f_x = y, \quad f_y = -\sin(xy)$$

例 向量场  $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$ , 不是任何函数的梯度




证明 若  $F(x, y) = (y, -\sin(xy)) = \nabla f = (f_x, f_y)$ , 则

$$f_x = y, \quad f_y = -\sin(xy)$$

$$f_{xy} = \quad, \quad f_{yx} =$$

例 向量场  $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$ , 不是任何函数的梯度




证明 若  $F(x, y) = (y, -\sin(xy)) = \nabla f = (f_x, f_y)$ , 则

$$f_x = y, \quad f_y = -\sin(xy)$$

$$f_{xy} = 1, \quad f_{yx} =$$



例 向量场  $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$ , 不是任何函数的梯度




证明 若  $F(x, y) = (y, -\sin(xy)) = \nabla f = (f_x, f_y)$ , 则

$$f_x = y, \quad f_y = -\sin(xy)$$

$$f_{xy} = 1, \quad f_{yx} = -y \cos(xy)$$

例 向量场  $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$ , 不是任何函数的梯度




证明 若  $F(x, y) = (y, -\sin(xy)) = \nabla f = (f_x, f_y)$ , 则

$$f_x = y, \quad f_y = -\sin(xy)$$

$$f_{xy} = 1, \quad f_{yx} = -y \cos(xy) \Rightarrow f_{xy} \neq f_{yx}$$

例 向量场  $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$ , 不是任何函数的梯度




证明 若  $F(x, y) = (y, -\sin(xy)) = \nabla f = (f_x, f_y)$ , 则

$$f_x = y, \quad f_y = -\sin(xy)$$


$$f_{xy} = 1, \quad f_{yx} = -y \cos(xy) \Rightarrow f_{xy} \neq f_{yx}$$

不可能


# 方向导数




# 方向导数




# 方向导数



# 方向导数



# 方向导数




$z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $l$  的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} :=$$




# 方向导数



$z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $l$  的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} :=$$


# 方向导数



$z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $l$  的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} :=$$


# 方向导数



$z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $l$  的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} := \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t}$$


# 方向导数



$z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $l$  的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} := \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t}$$

# 方向导数




$z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $\ell$  的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} := \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t}$$

$$f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha)$$


# 方向导数



$z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $\ell$  的变化率，即方向导数：

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} &:= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t} \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) \end{aligned}$$

# 方向导数




$z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $\ell$  的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} := \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t}$$

$$= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha)$$

$$= f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \sin \alpha$$

# 方向导数



$z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $l$  的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} := \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t}$$


$$= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha)$$

$$= f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \sin \alpha$$

$$= \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{e}_l$$



# 方向导数



$z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $l$  的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} := \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t}$$


$$= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha)$$

$$= f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \sin \alpha$$

$$= \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{e}_l = |\nabla f| \cos \theta$$


- $z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $\ell$  的方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{e}_\ell = |\nabla f| \cos \theta$$




- $z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $l$  的**方向导数**：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_l = |\nabla f| \cos \theta$$




**例** 求  $z = xe^{2y}$  在点  $p(1, 0)$  处，往点  $q(2, -1)$  方向上的方向导数。



- $z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $l$  的方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_l = |\nabla f| \cos \theta$$



**例** 求  $z = xe^{2y}$  在点  $p(1, 0)$  处，往点  $q(2, -1)$  方向上的方向导数。


**解 1.** 方向  $l = \overrightarrow{pq} = ( \quad )$ ，对应单位向量  $e_l = ( \quad )$

**2.** 计算梯度

$$\nabla z = (z_x, z_y) =$$


**3.** 方向导数

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(1, 0)} = \nabla z(1, 0) \cdot e_l =$$



- $z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $l$  的方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_l = |\nabla f| \cos \theta$$



**例** 求  $z = xe^{2y}$  在点  $p(1, 0)$  处，往点  $q(2, -1)$  方向上的方向导数。


**解 1.** 方向  $l = \overrightarrow{pq} = (1, -1)$ ，对应单位向量  $e_l = ( \quad )$

**2.** 计算梯度

$$\nabla z = (z_x, z_y) =$$


**3.** 方向导数

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(1, 0)} = \nabla z(1, 0) \cdot e_l =$$



- $z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $l$  的方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_l = |\nabla f| \cos \theta$$



例 求  $z = xe^{2y}$  在点  $p(1, 0)$  处，往点  $q(2, -1)$  方向上的方向导数。


解 1. 方向  $l = \overrightarrow{pq} = (1, -1)$ ，对应单位向量  $e_l = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$

2. 计算梯度

$$\nabla z = (z_x, z_y) =$$


3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(1, 0)} = \nabla z(1, 0) \cdot e_l =$$



- $z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $l$  的方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_l = |\nabla f| \cos \theta$$



例 求  $z = xe^{2y}$  在点  $p(1, 0)$  处，往点  $q(2, -1)$  方向上的方向导数。


解 1. 方向  $l = \overrightarrow{pq} = (1, -1)$ ，对应单位向量  $e_l = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$

2. 计算梯度

$$\nabla z = (z_x, z_y) = (e^{2y}, 2xe^{2y})$$


3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(1, 0)} = \nabla z(1, 0) \cdot e_l =$$



- $z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $l$  的方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_l = |\nabla f| \cos \theta$$



**例** 求  $z = xe^{2y}$  在点  $p(1, 0)$  处，往点  $q(2, -1)$  方向上的方向导数。


**解 1.** 方向  $l = \overrightarrow{pq} = (1, -1)$ ，对应单位向量  $e_l = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$

**2.** 计算梯度

$$\nabla z = (z_x, z_y) = (e^{2y}, 2xe^{2y})$$

**3.** 方向导数


$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(1, 0)} = \nabla z(1, 0) \cdot e_l = (1, 2) \cdot \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$





- $z = f(x, y)$  在点  $p_0(x_0, y_0)$  处沿方向  $l$  的方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_l = |\nabla f| \cos \theta$$



**例** 求  $z = xe^{2y}$  在点  $p(1, 0)$  处，往点  $q(2, -1)$  方向上的方向导数。


**解 1.** 方向  $l = \overrightarrow{pq} = (1, -1)$ ，对应单位向量  $e_l = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$

**2.** 计算梯度


$$\nabla z = (z_x, z_y) = (e^{2y}, 2xe^{2y})$$

**3.** 方向导数

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(1, 0)} = \nabla z(1, 0) \cdot e_l = (1, 2) \cdot \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$




- $$\frac{\partial f}{\partial \ell} \Big|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$$




- $$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$$

假设  $\nabla f \neq 0$ ,




- $$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$$

假设  $\nabla f \neq 0$ , 令  $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$



- $\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$

假设  $\nabla f \neq 0$ , 令  $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$




- 当  $\theta = 0$  时,

- 当  $\theta = \pi$  时,

- 当  $\theta = \frac{\pi}{2}$  时,

- $\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$

假设  $\nabla f \neq 0$ , 令  $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$




- 当  $\theta = 0$  时,  $e_\ell = \vec{n}$ ,

- 当  $\theta = \pi$  时,

- 当  $\theta = \frac{\pi}{2}$  时,

- $$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$$

假设  $\nabla f \neq 0$ , 令  $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$



- 当  $\theta = 0$  时,  $e_\ell = \vec{n}$ , 并且方向导数达到最大值:


$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| > 0,$$

- 当  $\theta = \pi$  时,

- 当  $\theta = \frac{\pi}{2}$  时,

- $\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$

假设  $\nabla f \neq 0$ , 令  $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$



- 当  $\theta = 0$  时,  $e_\ell = \vec{n}$ , 并且方向导数达到最大值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| > 0, \text{ 说明沿梯度方向, 函数增速最快}$$


- 当  $\theta = \pi$  时,

- 当  $\theta = \frac{\pi}{2}$  时,



- $\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$

假设  $\nabla f \neq 0$ , 令  $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$



- 当  $\theta = 0$  时,  $e_\ell = \vec{n}$ , 并且方向导数达到最大值:


$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| > 0, \text{ 说明沿梯度方向, 函数增速最快}$$

- 当  $\theta = \pi$  时,  $e_\ell = -\vec{n}$ ,

- 当  $\theta = \frac{\pi}{2}$  时,

- $$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$$

假设  $\nabla f \neq 0$ , 令  $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$



- 当  $\theta = 0$  时,  $e_\ell = \vec{n}$ , 并且方向导数达到最大值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| > 0, \text{ 说明沿梯度方向, 函数增速最快}$$


- 当  $\theta = \pi$  时,  $e_\ell = -\vec{n}$ , 并且方向导数达到最小值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = -|\nabla f(x_0, y_0)| < 0,$$

- 当  $\theta = \frac{\pi}{2}$  时,

- $$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$$

假设  $\nabla f \neq 0$ , 令  $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$



- 当  $\theta = 0$  时,  $e_\ell = \vec{n}$ , 并且方向导数达到最大值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| > 0, \text{ 说明沿梯度方向, 函数增速最快}$$


- 当  $\theta = \pi$  时,  $e_\ell = -\vec{n}$ , 并且方向导数达到最小值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = -|\nabla f(x_0, y_0)| < 0, \text{ 说明沿梯度反方向, 函数减速最快}$$

- 当  $\theta = \frac{\pi}{2}$  时,

- $$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$$

假设  $\nabla f \neq 0$ , 令  $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$



- 当  $\theta = 0$  时,  $e_\ell = \vec{n}$ , 并且方向导数达到最大值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| > 0, \text{ 说明沿梯度方向, 函数增速最快}$$


- 当  $\theta = \pi$  时,  $e_\ell = -\vec{n}$ , 并且方向导数达到最小值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = -|\nabla f(x_0, y_0)| < 0, \text{ 说明沿梯度反方向, 函数减速最快}$$

- 当  $\theta = \frac{\pi}{2}$  时,  $e_\ell \perp \vec{n}$ ,

- $$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$$

假设  $\nabla f \neq 0$ , 令  $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$



- 当  $\theta = 0$  时,  $e_\ell = \vec{n}$ , 并且方向导数达到最大值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| > 0, \text{ 说明沿梯度方向, 函数增速最快}$$


- 当  $\theta = \pi$  时,  $e_\ell = -\vec{n}$ , 并且方向导数达到最小值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = -|\nabla f(x_0, y_0)| < 0, \text{ 说明沿梯度反方向, 函数减速最快}$$


- 当  $\theta = \frac{\pi}{2}$  时,  $e_\ell \perp \vec{n}$ , 并且方向导数为零:  $\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = 0$ 。

**例** 函数  $z = x^2 - y^2$  在点  $(0, 1)$  处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？

**例** 函数  $z = x^2 - y^2$  在点  $(0, 1)$  处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？




**例** 函数  $z = x^2 - y^2$  在点  $(0, 1)$  处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



**解** 梯度  $\nabla z = (2x, -2y)$ ,




**例** 函数  $z = x^2 - y^2$  在点  $(0, 1)$  处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



**解** 梯度  $\nabla z = (2x, -2y)$ ,

- 沿方向  $\nabla z(0, 1) = ( \quad )$  增加最快
- 沿方向  $-\nabla z(0, 1) = ( \quad )$  减少最快


**例** 函数  $z = x^2 - y^2$  在点  $(0, 1)$  处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



**解** 梯度  $\nabla z = (2x, -2y)$ ，所以在点  $(0, 1)$  时，

- 沿方向  $\nabla z(0, 1) = (0, -2)$  增加最快
- 沿方向  $-\nabla z(0, 1) = (0, 2)$  减少最快


**例** 函数  $z = x^2 - y^2$  在点  $(0, 1)$  处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



**解** 梯度  $\nabla z = (2x, -2y)$ ，所以在点  $(0, 1)$  时，

- 沿方向  $\nabla z(0, 1) = (0, -2)$  增加最快
- 沿方向  $-\nabla z(0, 1) = (0, 2)$  减少最快


**例** 函数  $z = x^2 - y^2$  在点  $(0, 1)$  处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



**解** 梯度  $\nabla z = (2x, -2y)$ ，所以在点  $(0, 1)$  时，

- 沿方向  $\nabla z(0, 1) = (0, -2)$  增加最快
- 沿方向  $-\nabla z(0, 1) = (0, 2)$  减少最快


**例** 函数  $z = x^2 - y^2$  在点  $(0, 1)$  处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



**解** 梯度  $\nabla z = (2x, -2y)$ ，所以在点  $(0, 1)$  时，

- 沿方向  $\nabla z(0, 1) = (0, -2)$  增加最快
- 沿方向  $-\nabla z(0, 1) = (0, 2)$  减少最快


**例** 函数  $z = x^2 - y^2$  在点  $(0, 1)$  处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



**解** 梯度  $\nabla z = (2x, -2y)$ ，所以在点  $(0, 1)$  时，

- 沿方向  $\nabla z(0, 1) = (0, -2)$  增加最快
- 沿方向  $-\nabla z(0, 1) = (0, 2)$  减少最快


**例** 函数  $z = x^2 - y^2$  在点  $(0, 1)$  处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



**解** 梯度  $\nabla z = (2x, -2y)$ ，所以在点  $(0, 1)$  时，

- 沿方向  $\nabla z(0, 1) = (0, -2)$  增加最快
- 沿方向  $-\nabla z(0, 1) = (0, 2)$  减少最快

**例** 函数  $z = x^2 - y^2$  在点  $(0, 1)$  处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



**解** 梯度  $\nabla z = (2x, -2y)$ ，所以在点  $(0, 1)$  时，

- 沿方向  $\nabla z(0, 1) = (0, -2)$  增加最快
- 沿方向  $-\nabla z(0, 1) = (0, 2)$  减少最快



# 三元函数梯度

- 三元函数  $z = f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的梯度:

## 三元函数梯度

- 三元函数  $z = f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的梯度:

$$\left( f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0) \right)$$

# 三元函数梯度

- 三元函数  $z = f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的梯度:

$$\begin{aligned} & f_x(x_0, y_0, z_0) \vec{i} + f_y(x_0, y_0, z_0) \vec{j} + f_z(x_0, y_0, z_0) \vec{k} \\ &= \left( f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0) \right) \end{aligned}$$

# 三元函数梯度

- 三元函数  $z = f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的梯度:

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} f(x_0, y_0, z_0) &\stackrel{\text{或}}{=} \nabla f(x_0, y_0, z_0) \\&= f_x(x_0, y_0, z_0) \vec{i} + f_y(x_0, y_0, z_0) \vec{j} + f_z(x_0, y_0, z_0) \vec{k} \\&= \left( f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0) \right)\end{aligned}$$

# 三元函数梯度

- 三元函数  $z = f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的梯度:

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} f(x_0, y_0, z_0) &\stackrel{\text{或}}{=} \nabla f(x_0, y_0, z_0) \\&= f_x(x_0, y_0, z_0) \vec{i} + f_y(x_0, y_0, z_0) \vec{j} + f_z(x_0, y_0, z_0) \vec{k} \\&= \left( f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0) \right)\end{aligned}$$

例 设  $f(x, y, z) = e^{xy} \sin z$ , 计算  $\nabla f$ 。

## 三元函数梯度

- 三元函数  $z = f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的梯度:

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} f(x_0, y_0, z_0) &\stackrel{\text{或}}{=} \nabla f(x_0, y_0, z_0) \\&= f_x(x_0, y_0, z_0) \vec{i} + f_y(x_0, y_0, z_0) \vec{j} + f_z(x_0, y_0, z_0) \vec{k} \\&= \left( f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0) \right)\end{aligned}$$

例 设  $f(x, y, z) = e^{xy} \sin z$ , 计算  $\nabla f$ 。

解  $f$  的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = ( \quad )$$

## 三元函数梯度

- 三元函数  $z = f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的梯度:

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} f(x_0, y_0, z_0) &\stackrel{\text{或}}{=} \nabla f(x_0, y_0, z_0) \\&= f_x(x_0, y_0, z_0) \vec{i} + f_y(x_0, y_0, z_0) \vec{j} + f_z(x_0, y_0, z_0) \vec{k} \\&= \left( f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0) \right)\end{aligned}$$

例 设  $f(x, y, z) = e^{xy} \sin z$ , 计算  $\nabla f$ 。

解  $f$  的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (ye^{xy} \sin z, \quad \quad \quad)$$

# 三元函数梯度

- 三元函数  $z = f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的梯度:

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} f(x_0, y_0, z_0) &\stackrel{\text{或}}{=} \nabla f(x_0, y_0, z_0) \\&= f_x(x_0, y_0, z_0) \vec{i} + f_y(x_0, y_0, z_0) \vec{j} + f_z(x_0, y_0, z_0) \vec{k} \\&= \left( f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0) \right)\end{aligned}$$

例 设  $f(x, y, z) = e^{xy} \sin z$ , 计算  $\nabla f$ 。

解  $f$  的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (ye^{xy} \sin z, xe^{xy} \sin z, \quad )$$



## 三元函数梯度

- 三元函数  $z = f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的梯度:

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} f(x_0, y_0, z_0) &\stackrel{\text{或}}{=} \nabla f(x_0, y_0, z_0) \\&= f_x(x_0, y_0, z_0) \vec{i} + f_y(x_0, y_0, z_0) \vec{j} + f_z(x_0, y_0, z_0) \vec{k} \\&= \left( f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0) \right)\end{aligned}$$

例 设  $f(x, y, z) = e^{xy} \sin z$ , 计算  $\nabla f$ 。

解  $f$  的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (ye^{xy} \sin z, xe^{xy} \sin z, e^{xy} \cos z)$$

当  $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq 0$  时, 则函数在点  $(x_0, y_0, z_0)$  处,

当  $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq 0$  时, 则函数在点  $(x_0, y_0, z_0)$  处,

- 沿梯度方向, 增加速度最快,
- 沿梯度反方向, 减少速度最快,
- 梯度垂直方向, 其改变率为零

当  $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq 0$  时, 则函数在点  $(x_0, y_0, z_0)$  处,

- 沿梯度方向, 增加速度最快, 达到  $|\nabla f(x_0, y_0, z_0)|$
- 沿梯度反方向, 减少速度最快,
- 梯度垂直方向, 其改变率为零

当  $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq 0$  时, 则函数在点  $(x_0, y_0, z_0)$  处,

- 沿梯度方向, 增加速度最快, 达到  $|\nabla f(x_0, y_0, z_0)|$
- 沿梯度反方向, 减少速度最快, 达到  $-|\nabla f(x_0, y_0, z_0)|$
- 梯度垂直方向, 其改变率为零

例 设  $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$ ,  $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问:  $f$  在  $p_0$  点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

例 设  $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$ ,  $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问:  $f$  在  $p_0$  点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1.  $f$  的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = ( \quad \quad \quad )$$

例 设  $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$ ,  $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问:  $f$  在  $p_0$  点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1.  $f$  的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, \quad \quad \quad )$$



例 设  $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$ ,  $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问:  $f$  在  $p_0$  点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1.  $f$  的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

例 设  $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$ ,  $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问:  $f$  在  $p_0$  点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1.  $f$  的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

例 设  $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$ ,  $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问:  $f$  在  $p_0$  点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1.  $f$  的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

所以  $\nabla f(0.5, 0.5, 1) =$

例 设  $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$ ,  $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问:  $f$  在  $p_0$  点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1.  $f$  的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

所以  $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$

例 设  $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$ ,  $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问:  $f$  在  $p_0$  点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1.  $f$  的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

所以  $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$

2. 函数沿梯度方向  $\nabla f(0.5, 0.5, 1)$  , 增加速度最大, 达到  $|\nabla f(x_0, y_0)|$

例 设  $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$ ,  $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问:  $f$  在  $p_0$  点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1.  $f$  的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

所以  $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$

2. 函数沿梯度方向  $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$ , 增加速度最大, 达到  $|\nabla f(x_0, y_0)|$

例 设  $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$ ,  $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问:  $f$  在  $p_0$  点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1.  $f$  的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

所以  $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$

2. 函数沿梯度方向  $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$ , 增加速度最大, 达到  $|\nabla f(x_0, y_0)| = \sqrt{1.5}$

例 设  $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$ ,  $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问:  $f$  在  $p_0$  点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1.  $f$  的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

所以  $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$

2. 函数沿梯度方向  $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$ , 增加速度最大, 达到  $|\nabla f(x_0, y_0)| = \sqrt{1.5}$

3. 函数沿梯度反方向  $-\nabla f(0.5, 0.5, 1)$ , 减少速度最大, 达到  $-|\nabla f(x_0, y_0)|$



例 设  $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$ ,  $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问:  $f$  在  $p_0$  点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1.  $f$  的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

所以  $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$

2. 函数沿梯度方向  $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$ , 增加速度最大, 达到  $|\nabla f(x_0, y_0)| = \sqrt{1.5}$

3. 函数沿梯度反方向  $-\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (0.5, -0.5, -1)$ , 减少速度最大, 达到  $-|\nabla f(x_0, y_0)|$

例 设  $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$ ,  $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问:  $f$  在  $p_0$  点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1.  $f$  的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

所以  $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$

2. 函数沿梯度方向  $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$ , 增加速度最大, 达到  $|\nabla f(x_0, y_0)| = \sqrt{1.5}$

3. 函数沿梯度反方向  $-\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (0.5, -0.5, -1)$ , 减少速度最大, 达到  $-|\nabla f(x_0, y_0)| = -\sqrt{1.5}$

设三元函数  $f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的一个邻域内有定义, 设  $\ell$  是从  $p_0$  出发的射线, 方向向量为

$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

设三元函数  $f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的一个邻域内有定义, 设  $\ell$  是从  $p_0$  出发的射线, 方向向量为

$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则  $f(x, y, z)$  在点  $p_0$  处沿方向  $\ell$  的变化率, 即方向导数, 为

设三元函数  $f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的一个邻域内有定义, 设  $\ell$  是从  $p_0$  出发的射线, 方向向量为

$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则  $f(x, y, z)$  在点  $p_0$  处沿方向  $\ell$  的变化率, 即方向导数, 为

$$\frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t}$$

设三元函数  $f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的一个邻域内有定义, 设  $l$  是从  $p_0$  出发的射线, 方向向量为

$$e_l = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则  $f(x, y, z)$  在点  $p_0$  处沿方向  $l$  的变化率, 即方向导数, 为

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t}$$

设三元函数  $f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的一个邻域内有定义, 设  $\ell$  是从  $p_0$  出发的射线, 方向向量为

$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则  $f(x, y, z)$  在点  $p_0$  处沿方向  $\ell$  的变化率, 即方向导数, 为

$$\begin{aligned} & \left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} : \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} \end{aligned}$$

设三元函数  $f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的一个邻域内有定义, 设  $\ell$  是从  $p_0$  出发的射线, 方向向量为

$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则  $f(x, y, z)$  在点  $p_0$  处沿方向  $\ell$  的变化率, 即方向导数, 为

$$\begin{aligned} & \left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} : \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} \\ & \quad f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) \end{aligned}$$



设三元函数  $f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的一个邻域内有定义, 设  $\ell$  是从  $p_0$  出发的射线, 方向向量为

$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则  $f(x, y, z)$  在点  $p_0$  处沿方向  $\ell$  的变化率, 即方向导数, 为

$$\begin{aligned} & \left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} : \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) \end{aligned}$$

设三元函数  $f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的一个邻域内有定义, 设  $\ell$  是从  $p_0$  出发的射线, 方向向量为

$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则  $f(x, y, z)$  在点  $p_0$  处沿方向  $\ell$  的变化率, 即方向导数, 为

$$\begin{aligned} & \left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} : \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) \\ &= f_x(x_0, y_0, z_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0, z_0) \cos \beta + f_z(x_0, y_0, z_0) \cos \gamma \end{aligned}$$

设三元函数  $f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的一个邻域内有定义, 设  $\ell$  是从  $p_0$  出发的射线, 方向向量为

$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则  $f(x, y, z)$  在点  $p_0$  处沿方向  $\ell$  的变化率, 即方向导数, 为

$$\begin{aligned} & \left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} : \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) \\ &= f_x(x_0, y_0, z_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0, z_0) \cos \beta + f_z(x_0, y_0, z_0) \cos \gamma \\ &= \nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot e_\ell \end{aligned}$$

设三元函数  $f(x, y, z)$  在点  $p_0(x_0, y_0, z_0)$  的一个邻域内有定义, 设  $\ell$  是从  $p_0$  出发的射线, 方向向量为


$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则  $f(x, y, z)$  在点  $p_0$  处沿方向  $\ell$  的变化率, 即方向导数, 为


$$\begin{aligned} & \left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} : \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) \\ &= f_x(x_0, y_0, z_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0, z_0) \cos \beta + f_z(x_0, y_0, z_0) \cos \gamma \\ &= \nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot e_\ell = |\nabla f| \cos \theta \end{aligned}$$

其中  $\theta$  是  $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$  与  $e_\ell$  的夹角

例 求  $u = xyz$  在点  $p(5, 1, 2)$  处，往点  $q(9, 4, 14)$  方向上的方向导数。



例 求  $u = xyz$  在点  $p(5, 1, 2)$  处, 往点  $q(9, 4, 14)$  方向上的方向导数。



解 1. 方向  $l = \overrightarrow{pq} = ( \quad )$ , 对应单位向量  $e_l = ( \quad )$


2. 计算梯度

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) =$$

3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{(5, 1, 2)} = \nabla u(5, 1, 2) \cdot e_l =$$

例 求  $u = xyz$  在点  $p(5, 1, 2)$  处, 往点  $q(9, 4, 14)$  方向上的方向导数。



解 1. 方向  $\ell = \vec{pq} = (4, 3, 12)$ , 对应单位向量  $e_\ell = ( \quad )$


2. 计算梯度

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) =$$

3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \ell} \right|_{(5, 1, 2)} = \nabla u(5, 1, 2) \cdot e_\ell =$$

例 求  $u = xyz$  在点  $p(5, 1, 2)$  处, 往点  $q(9, 4, 14)$  方向上的方向导数。



解 1. 方向  $\ell = \overrightarrow{pq} = (4, 3, 12)$ , 对应单位向量  $e_\ell = (\frac{4}{13}, \frac{3}{13}, \frac{12}{13})$

2. 计算梯度


$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) =$$

3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \ell} \right|_{(5, 1, 2)} = \nabla u(5, 1, 2) \cdot e_\ell =$$



例 求  $u = xyz$  在点  $p(5, 1, 2)$  处, 往点  $q(9, 4, 14)$  方向上的方向导数。



解 1. 方向  $\ell = \overrightarrow{pq} = (4, 3, 12)$ , 对应单位向量  $e_\ell = (\frac{4}{13}, \frac{3}{13}, \frac{12}{13})$


2. 计算梯度

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (yz, xz, xy)$$

3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \ell} \right|_{(5, 1, 2)} = \nabla u(5, 1, 2) \cdot e_\ell =$$

例 求  $u = xyz$  在点  $p(5, 1, 2)$  处, 往点  $q(9, 4, 14)$  方向上的方向导数。



解 1. 方向  $\ell = \overrightarrow{pq} = (4, 3, 12)$ , 对应单位向量  $e_\ell = (\frac{4}{13}, \frac{3}{13}, \frac{12}{13})$


2. 计算梯度

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (yz, xz, xy)$$

3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \ell} \right|_{(5, 1, 2)} = \nabla u(5, 1, 2) \cdot e_\ell = (2, 10, 5) \cdot \left( \frac{4}{13}, \frac{3}{13}, \frac{12}{13} \right)$$

例 求  $u = xyz$  在点  $p(5, 1, 2)$  处, 往点  $q(9, 4, 14)$  方向上的方向导数。



解 1. 方向  $\ell = \overrightarrow{pq} = (4, 3, 12)$ , 对应单位向量  $e_\ell = (\frac{4}{13}, \frac{3}{13}, \frac{12}{13})$

2. 计算梯度

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (yz, xz, xy)$$

3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \ell} \right|_{(5, 1, 2)} = \nabla u(5, 1, 2) \cdot e_\ell = (2, 10, 5) \cdot \left( \frac{4}{13}, \frac{3}{13}, \frac{12}{13} \right) = \frac{98}{13}$$

例 求  $u = xy^2z$  在点  $p(1, -1, 2)$  处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

**例** 求  $u = xy^2z$  在点  $p(1, -1, 2)$  处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

**解** 1.  $u$  的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = ( \quad \quad \quad )$$

例 求  $u = xy^2z$  在点  $p(1, -1, 2)$  处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

解 1.  $u$  的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, \quad , \quad )$$

**例** 求  $u = xy^2z$  在点  $p(1, -1, 2)$  处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

**解** 1.  $u$  的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, \quad )$$

例 求  $u = xy^2z$  在点  $p(1, -1, 2)$  处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

解 1.  $u$  的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$



**例** 求  $u = xy^2z$  在点  $p(1, -1, 2)$  处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

**解** 1.  $u$  的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向  $\nabla u(1, -1, 2) =$  增加最快。

**例** 求  $u = xy^2z$  在点  $p(1, -1, 2)$  处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

**解** 1.  $u$  的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向  $\nabla u(1, -1, 2) = (2, -4, 1)$  增加最快。

**例** 求  $u = xy^2z$  在点  $p(1, -1, 2)$  处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

**解** 1.  $u$  的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向  $\nabla u(1, -1, 2) = (2, -4, 1)$  增加最快。

2. 梯度方向的单位化向量是  $e = \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u$ ,

**例** 求  $u = xy^2z$  在点  $p(1, -1, 2)$  处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

**解** 1.  $u$  的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向  $\nabla u(1, -1, 2) = (2, -4, 1)$  增加最快。

2. 梯度方向的单位化向量是  $e = \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u$ ，所以沿梯度方向的方向导数是

**例** 求  $u = xy^2z$  在点  $p(1, -1, 2)$  处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

**解** 1.  $u$  的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向  $\nabla u(1, -1, 2) = (2, -4, 1)$  增加最快。

2. 梯度方向的单位化向量是  $e = \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u$ ，所以沿梯度方向的方向导数是

$$\nabla u \cdot e \Big|_{(1, -1, 2)}$$

**例** 求  $u = xy^2z$  在点  $p(1, -1, 2)$  处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

**解** 1.  $u$  的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向  $\nabla u(1, -1, 2) = (2, -4, 1)$  增加最快。

2. 梯度方向的单位化向量是  $e = \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u$ ，所以沿梯度方向的方向导数是

$$\nabla u \cdot e|_{(1, -1, 2)} = \nabla u \cdot \left( \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u \right) |_{(1, -1, 2)}$$

**例** 求  $u = xy^2z$  在点  $p(1, -1, 2)$  处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

**解 1.**  $u$  的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向  $\nabla u(1, -1, 2) = (2, -4, 1)$  增加最快。

**2.** 梯度方向的单位化向量是  $e = \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u$ ，所以沿梯度方向的方向导数是

$$\begin{aligned}\nabla u \cdot e|_{(1, -1, 2)} &= \nabla u \cdot \left( \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u \right) |_{(1, -1, 2)} \\ &= |\nabla u|_{(1, -1, 2)}\end{aligned}$$

**例** 求  $u = xy^2z$  在点  $p(1, -1, 2)$  处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

**解 1.**  $u$  的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向  $\nabla u(1, -1, 2) = (2, -4, 1)$  增加最快。

**2.** 梯度方向的单位化向量是  $e = \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u$ ，所以沿梯度方向的方向导数是

$$\begin{aligned}\nabla u \cdot e|_{(1, -1, 2)} &= \nabla u \cdot \left( \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u \right) |_{(1, -1, 2)} \\ &= |\nabla u|_{(1, -1, 2)} = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 1^2}\end{aligned}$$



**例** 求  $u = xy^2z$  在点  $p(1, -1, 2)$  处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

**解** 1.  $u$  的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向  $\nabla u(1, -1, 2) = (2, -4, 1)$  增加最快。

2. 梯度方向的单位化向量是  $e = \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u$ ，所以沿梯度方向的方向导数是

$$\begin{aligned}\nabla u \cdot e|_{(1, -1, 2)} &= \nabla u \cdot \left( \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u \right) |_{(1, -1, 2)} \\ &= |\nabla u|_{(1, -1, 2)} = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 1^2} = \sqrt{21}\end{aligned}$$