

第 3 章 α : 线性方程组的消元解法

数学系 梁卓滨

2019-2020 学年 I

简化的阶梯型矩阵

$$A \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & * & * & \dots & * & * & \dots & * & * & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & * & * & \dots & * & * & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & \dots & * & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & * & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & \dots \end{pmatrix}$$

简化的阶梯型矩阵

$$A \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & * & 0 & \dots & * & * & \dots & \dots & * & * & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & * & * & \dots & \dots & * & * & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & \dots & * & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

简化的阶梯型矩阵

$$A \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & * & 0 & \dots & * & 0 & \dots & \dots & * & * & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & * & 0 & \dots & \dots & * & * & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & \dots & \dots & * & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & * & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

简化的阶梯型矩阵

$$A \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & * & 0 & \dots & * & 0 & \dots & \dots & * & 0 & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & * & 0 & \dots & \dots & * & 0 & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & \dots & \dots & * & 0 & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

简化的阶梯型矩阵

$$A \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & * & 0 & \dots & * & 0 & \dots & \dots & * & 0 & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & * & 0 & \dots & \dots & * & 0 & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & \dots & * & 0 & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

后者称为简化的阶梯型矩阵。

记号

考虑 n 个未知量 m 个方程的线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

记号

考虑 n 个未知量 m 个方程的线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

可以，等价地，改写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

记号

考虑 n 个未知量 m 个方程的线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

可以，等价地，改写成矩阵形式

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{A \quad m \times n} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_b$$

记号

考虑 n 个未知量 m 个方程的线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

可以，等价地，改写成矩阵形式

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{A \quad m \times n} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_b \Rightarrow Ax = b$$

记号

考虑 n 个未知量 m 个方程的线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

可以，等价地，改写成矩阵形式

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{A \quad m \times n} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{x} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_b \Rightarrow Ax = b$$

整个方程组的信息包含在：

$$(A:b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

记号

考虑 n 个未知量 m 个方程的线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

可以，等价地，改写成矩阵形式

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{A \quad m \times n} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{x} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_b \Rightarrow Ax = b$$

整个方程组的信息包含在：

增广矩阵 $(A:b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases}$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases}$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 & (2)-(1) \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 & (3)-4\times(1) \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 & (4)-3\times(1) \end{cases}$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{array} \right. \xrightarrow[\substack{(3)-4\times(1) \\ (4)-3\times(1)}]{(2)-(1)} \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 3x_2 + 3x_3 = -9 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{array} \right.$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{array} \right. \xrightarrow[\substack{(3)-4\times(1) \\ (4)-3\times(1)}]{(2)-(1)} \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 3x_2 + 3x_3 = -9 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{array} \right.$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{array} \right. \xrightarrow[\substack{(3)-4\times(1) \\ (4)-3\times(1)}}{(2)-(1)} \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 3x_2 + 3x_3 = -9 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{array} \right. \xrightarrow[\substack{(3)-3\times(2) \\ (4)-(2)}}{(1)-(2)}$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-4\times(1) \\ (4)-3\times(1)}]{(2)-(1)} \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 3x_2 + 3x_3 = -9 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-3\times(2) \\ (4)-(2)}]{(1)-(2)} \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-4\times(1) \\ (4)-3\times(1)}]{(2)-(1)} \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 3x_2 + 3x_3 = -9 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-3\times(2) \\ (4)-(2)}]{(1)-(2)} \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

所以

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-4\times(1) \\ (4)-3\times(1)}]{(2)-(1)} \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 3x_2 + 3x_3 = -9 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-3\times(2) \\ (4)-(2)}]{(1)-(2)} \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

所以

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 5 + 2x_3 \\ x_2 = -3 - x_3 \end{cases}$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-4\times(1) \\ (4)-3\times(1)}]{(2)-(1)} \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 3x_2 + 3x_3 = -9 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-3\times(2) \\ (4)-(2)}]{(1)-(2)} \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

\Downarrow

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 7 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

所以

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 5 + 2x_3 \\ x_2 = -3 - x_3 \end{cases}$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\begin{cases} \boxed{x_1} + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-4\times(1) \\ (4)-3\times(1)}]{(2)-(1)} \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ \boxed{x_2} + x_3 = -3 \\ 3x_2 + 3x_3 = -9 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-3\times(2) \\ (4)-(2)}]{(1)-(2)} \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

\Downarrow

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 7 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

所以

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 5 + 2x_3 \\ x_2 = -3 - x_3 \end{cases}$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\begin{cases} \boxed{x_1} + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-4\times(1) \\ (4)-3\times(1)}]{(2)-(1)} \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ \boxed{x_2} + x_3 = -3 \\ 3x_2 + 3x_3 = -9 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-3\times(2) \\ (4)-(2)}]{(1)-(2)} \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

\Downarrow

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 7 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 2 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{r_3-4r_1 \\ r_4-3r_1}]{r_2-r_1}$$

所以

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 5 + 2x_3 \\ x_2 = -3 - x_3 \end{cases}$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\begin{cases} \boxed{x_1} + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-4\times(1) \\ (4)-3\times(1)}]{(2)-(1)} \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ \boxed{x_2} + x_3 = -3 \\ 3x_2 + 3x_3 = -9 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-3\times(2) \\ (4)-(2)}]{(1)-(2)} \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{ccc} \Downarrow & & \Downarrow \\ (A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 7 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 2 & 3 \end{array} \right) & \xrightarrow[\substack{r_3-4r_1 \\ r_4-3r_1}]{r_2-r_1} & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \end{array} \right) \end{array}$$

所以

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 5 + 2x_3 \\ x_2 = -3 - x_3 \end{cases}$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\begin{cases} \boxed{x_1} + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-4\times(1) \\ (4)-3\times(1)}]{(2)-(1)} \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ \boxed{x_2} + x_3 = -3 \\ 3x_2 + 3x_3 = -9 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-3\times(2) \\ (4)-(2)}]{(1)-(2)} \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{ccc} \Downarrow & & \Downarrow \\ (A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 7 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 2 & 3 \end{array} \right) & \xrightarrow[\substack{r_3-4r_1 \\ r_4-3r_1}]{r_2-r_1} & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \end{array} \right) \end{array}$$

所以

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 5 + 2x_3 \\ x_2 = -3 - x_3 \end{cases}$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\begin{cases} \boxed{x_1} + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-4\times(1) \\ (4)-3\times(1)}]{(2)-(1)} \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ \boxed{x_2} + x_3 = -3 \\ 3x_2 + 3x_3 = -9 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-3\times(2) \\ (4)-(2)}]{(1)-(2)} \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

\Downarrow

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 7 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 2 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{r_3-4r_1 \\ r_4-3r_1}]{r_2-r_1}$$

\Downarrow

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{r_3-3r_2 \\ r_4-r_2}]{r_1-r_2}$$

所以

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 5 + 2x_3 \\ x_2 = -3 - x_3 \end{cases}$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\begin{cases} \boxed{x_1} + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-4\times(1) \\ (4)-3\times(1)}]{(2)-(1)} \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ \boxed{x_2} + x_3 = -3 \\ 3x_2 + 3x_3 = -9 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-3\times(2) \\ (4)-(2)}]{(1)-(2)} \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$
$$\Downarrow \quad \Downarrow \quad \Downarrow$$
$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 7 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 2 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-3r_1]{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-4r_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ \boxed{0} & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_2]{\substack{r_1-r_2 \\ r_3-3r_2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

所以

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 5 + 2x_3 \\ x_2 = -3 - x_3 \end{cases}$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\begin{cases} \boxed{x_1} + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-4\times(1) \\ (4)-3\times(1)}]{(2)-(1)} \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ \boxed{x_2} + x_3 = -3 \\ 3x_2 + 3x_3 = -9 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-3\times(2) \\ (4)-(2)}]{(1)-(2)} \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{ccc} \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow \\ (A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 7 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 2 & 3 \end{array} \right) & \xrightarrow[\substack{r_3-4r_1 \\ r_4-3r_1}]{r_2-r_1} & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ \boxed{0} & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \end{array} \right) \\ & & \xrightarrow[\substack{r_3-3r_2 \\ r_4-r_2}]{r_1-r_2} & \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 0 & -2 & 5 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

所以

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 5 + 2x_3 \\ x_2 = -3 - x_3 \end{cases}$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\begin{cases} \boxed{x_1} + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-4\times(1) \\ (4)-3\times(1)}]{(2)-(1)} \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ \boxed{x_2} + x_3 = -3 \\ 3x_2 + 3x_3 = -9 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-3\times(2) \\ (4)-(2)}]{(1)-(2)} \begin{cases} \text{主元} \\ \boxed{x_1} - 2x_3 = 5 \\ \boxed{x_2} + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$
$$\begin{array}{ccc} \Downarrow & & \Downarrow \\ (A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 7 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 2 & 3 \end{array} \right) & \xrightarrow[\substack{r_3-4r_1 \\ r_4-3r_1}]{r_2-r_1} & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ \boxed{0} & \boxed{1} & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \end{array} \right) \\ & & \xrightarrow[\substack{r_3-3r_2 \\ r_4-r_2}]{r_1-r_2} \\ & & \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 0 & -2 & 5 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & -3 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

所以

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 5 + 2x_3 \\ x_2 = -3 - x_3 \end{cases}$$

消元法求解线性方程组——示例

例 解方程组

$$\begin{cases} \boxed{x_1} + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 4x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-4\times(1) \\ (4)-3\times(1)}]{(2)-(1)} \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ \boxed{x_2} + x_3 = -3 \\ 3x_2 + 3x_3 = -9 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(3)-3\times(2) \\ (4)-(2)}]{(1)-(2)} \begin{cases} \text{主元 } \textcircled{x_1} - 2\text{自由变量 } \textcircled{x_3} = 5 \\ \textcircled{x_2} + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$
$$\begin{array}{c} \Downarrow \\ (A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & 7 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 2 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-3r_1]{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-4r_1}} \end{array}$$
$$\begin{array}{c} \Downarrow \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ \boxed{0} & \boxed{1} & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_2]{\substack{r_1-r_2 \\ r_3-3r_2}} \end{array}$$
$$\begin{array}{c} \Downarrow \\ \left(\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 0 & -2 & 5 \\ 0 & \textcircled{1} & 1 & -3 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

所以

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 5 + 2x_3 \\ x_2 = -3 - x_3 \end{cases}$$

初等行变换求解线性方程组

步骤：

1. $Ax = b \implies (A:b) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$
2. 确定主元、自由变量

初等行变换求解线性方程组

步骤：

1. $Ax = b \implies (A:b) \xrightarrow{\text{初等行变换}}$ 简化的阶梯型矩阵
2. 确定主元、自由变量

例如

$$(A:b) \xrightarrow{\text{行变换}} \left(\begin{array}{cccccccccccccccc|c} 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & * & 0 & \dots & * & 0 & \dots & \dots & * & 0 & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & * & 0 & \dots & \dots & * & 0 & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & \dots & * & 0 & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \end{array} \right)$$

初等行变换求解线性方程组

步骤：

1. $Ax = b \implies (A:b) \xrightarrow{\text{初等行变换}}$ 简化的阶梯型矩阵
2. 确定主元、自由变量

例如

$$(A:b) \xrightarrow{\text{行变换}} \left(\begin{array}{cccccccccccc|c} 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & * & 0 & \cdots & * & 0 & \cdots & * & 0 & \cdots & * \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 1 & \cdots & * & 0 & \cdots & * & 0 & \cdots & * \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 1 & \cdots & * & 0 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 1 & \cdots & * \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{array} \right)$$

初等行变换求解线性方程组

步骤：

1. $Ax = b \implies (A:b) \xrightarrow{\text{初等行变换}}$ 简化的阶梯型矩阵
2. 确定主元、自由变量

例如

$$(A:b) \xrightarrow{\text{行变换}} \left(\begin{array}{cccccccccccc|c} 0 & \dots & 0 & \text{主元} & \dots & * & 0 & \dots & * & 0 & \dots & * & 0 & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & \text{主元} & \dots & * & 0 & \dots & * & 0 & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & \text{主元} & \dots & * & 0 & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & \text{主元} & \dots & * \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \end{array} \right)$$

初等行变换求解线性方程组

步骤：

1. $Ax = b \implies (A:b) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{简化的阶梯型矩阵}$
2. 确定主元、自由变量

例如

[illegible]

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - r_1 \\ r_3 - 2r_1 \\ r_4 + 2r_1 \end{array}}$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{\begin{matrix} r_2-r_1 \\ r_3-2r_1 \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ & 1 & 1 & -3 \\ & 1 & -1 & -9 \\ & 1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{\begin{matrix} r_2-r_1 \\ r_3-2r_1 \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{\begin{matrix} r_2-r_1 \\ r_3-2r_1 \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & -1 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{\begin{array}{l} r_2-r_1 \\ r_3-2r_1 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{\begin{matrix} r_2-r_1 \\ r_3-2r_1 \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1, r_3-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-r_2, r_3-3r_2}$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1, r_3-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-r_2, r_3-3r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1, r_3-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 3 & -1 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-r_2, r_3-3r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1, r_3-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-r_2, r_3-3r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1, r_3-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-r_2, r_3-3r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1, r_3-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-r_2, r_3-3r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1, r_3-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-r_2, r_3-3r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1, r_3-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-r_2, r_3-3r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

x_1, x_2 为主元, x_3 为自由变量。

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1, r_3-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-r_2, r_3-3r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

x_1, x_2 为主元, x_3 为自由变量。所以原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases}$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-2r_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{\substack{r_1-r_2 \\ r_3-3r_2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

x_1, x_2 为主元, x_3 为自由变量。所以原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 5 + 2x_3 \\ x_2 = -3 - x_3 \end{cases}$$

例 1 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1, r_3-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-r_2, r_3-3r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

x_1, x_2 为主元, x_3 为自由变量。所以原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 5 + 2x_3 \\ x_2 = -3 - x_3 \end{cases}$$

所以通解是：

$$\begin{cases} x_1 = 5 + 2c_1 \\ x_2 = -3 - c_1 \\ x_3 = c_1 \end{cases} \quad (c_1 \text{ 为任意常数})$$

例 1 解方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1, r_3-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-r_2, r_3-3r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

x_1, x_2 为主元, x_3 为自由变量。所以原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 5 + 2x_3 \\ x_2 = -3 - x_3 \end{cases}$$

所以通解是:

$$\begin{cases} x_1 = 5 + 2c_1 \\ x_2 = -3 - c_1 \\ x_3 = c_1 \end{cases} \quad (c_1 \text{ 为任意常数})$$

例 1 解方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1, r_3-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-r_2, r_3-3r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

x_1, x_2 为主元, x_3 为自由变量。所以原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + x_3 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 5 + 2x_3 \\ x_2 = -3 - x_3 \end{cases}$$

所以通解是:

$$\begin{cases} x_1 = 5 + 2c_1 \\ x_2 = -3 - c_1 \\ x_3 = c_1 \end{cases} \quad (c_1 \text{ 为任意常数})$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right)$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right)$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 + 2r_1 \\ r_3 - 3r_1 \\ r_4 - 5r_1 \end{array}}$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1 \\ r_4-5r_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{array} \right)$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 5r_1]{\begin{array}{l} r_2 + 2r_1 \\ r_3 - 3r_1 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ 0 & 1 & -1 & 28 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & 28 \end{array} \right)$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-5r_1]{\begin{array}{l} r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ 0 & 1 & -1 & 28 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 4 \end{array} \right)$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 5r_1]{\begin{array}{l} r_2 + 2r_1 \\ r_3 - 3r_1 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 5r_1]{\begin{array}{l} r_2 + 2r_1 \\ r_3 - 3r_1 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-5r_1]{\begin{array}{l} r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-2r_2}$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-5r_1]{\begin{array}{l} r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-5r_1]{\begin{array}{l} r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \boxed{2} & 4 & 28 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 6 & 22 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-5r_1]{\begin{array}{l} r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{\begin{array}{l} r_1-2r_2 \\ r_4+r_2 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 6 & 22 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-5r_1]{\begin{array}{l} r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \boxed{2} & 4 & 28 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right)$$
$$\xrightarrow[r_4+r_2]{\begin{array}{l} r_1-2r_2 \\ r_4+r_2 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 6 & 22 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-5r_1]{\substack{r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \boxed{2} & 4 & 28 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{\substack{r_1-2r_2 \\ r_3-6r_2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 6 & 22 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_3]{\substack{r_1-6r_3 \\ r_2+r_3}}$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-5r_1]{\substack{r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 6 & 22 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_3]{\substack{r_1-6r_3 \\ r_2+r_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \end{aligned}$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-5r_1]{\substack{r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 6 & 22 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_3]{r_1-6r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

例 2 解方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-5r_1]{\substack{r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 6 & 22 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_3]{\substack{r_1-6r_3 \\ r_2+r_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \end{aligned}$$

例 2 解方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-5r_1]{\substack{r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4+r_2]{\substack{r_1-2r_2 \\ r_1-6r_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 6 & 22 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_3]{\substack{r_1-6r_3 \\ r_2+r_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

例 2 解方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-5r_1]{\substack{r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4+r_2]{\substack{r_1-2r_2 \\ r_4-6r_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 6 & 22 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_3]{\substack{r_1-6r_3 \\ r_2+r_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

例 2 解方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-5r_1]{\substack{r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 6 & 22 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_3]{\substack{r_1-6r_3 \\ r_2+r_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 0 & 0 & -2 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 7 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-5r_1]{\substack{r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 6 & 22 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_3]{\substack{r_1-6r_3 \\ r_2+r_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 0 & 0 & -2 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 7 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

x_1, x_2, x_3 为主元，没有自由变量。

例 2 解方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 4 & 28 \\ -2 & -3 & -9 & -53 \\ 3 & 6 & 13 & 88 \\ 5 & 9 & 22 & 141 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-5r_1]{\substack{r_2+2r_1 \\ r_3-3r_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 28 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4+r_2]{r_1-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 6 & 22 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_3]{\substack{r_1-6r_3 \\ r_2+r_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 0 & 0 & -2 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 7 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

x_1, x_2, x_3 为主元，没有自由变量。所以原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 & = -2 \\ x_2 & = 7 \\ x_3 & = 4 \end{cases}$$

例 3 解方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

例 3 解方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right)$$

例 3 解方程组:
$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4}$$

例 3 解方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 4 & 2 & -7 & -3 \end{array} \right)$$

例 3 解方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 4 & 2 & -7 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 5r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}}$$

例 3 解方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 4 & 2 & -7 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 5r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right)$$

例 3

解方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 4 & 2 & -7 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 5r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \end{array} \right)$$

例 3 解方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 4 & 2 & -7 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 5r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & 9 & -8 \end{array} \right)$$

例 3 解方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 4 & 2 & -7 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 5r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & 9 & -8 \\ 0 & -2 & 9 & -11 \end{array} \right)$$

例 3 解方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 4 & 2 & -7 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 5r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & 9 & -8 \\ 0 & -2 & 9 & -11 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_3 - 2r_2 \\ r_4 - 2r_2 \end{array}}$$

例 3 解方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 4 & 2 & -7 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 5r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & 9 & -8 \\ 0 & -2 & 9 & -11 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_3 - 2r_2 \\ r_4 - 2r_2 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

例3 解方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 4 & 2 & -7 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 5r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & 9 & -8 \\ 0 & -2 & 9 & -11 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_3 - 2r_2 \\ r_4 - 2r_2 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

例 3

解方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 4 & 2 & -7 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 5r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & 9 & -8 \\ 0 & -2 & 9 & -11 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_3 - 2r_2 \\ r_4 - 2r_2 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

例 3

解方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 4 & 2 & -7 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 5r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & 9 & -8 \\ 0 & -2 & 9 & -11 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_3 - 2r_2 \\ r_4 - 2r_2 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4 - r_3}$$

例3 解方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 4 & 2 & -7 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 5r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & 9 & -8 \\ 0 & -2 & 9 & -11 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_3 - 2r_2 \\ r_4 - 2r_2 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4 - r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

例 3

解方程组：

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 4 & 2 & -7 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 5r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & 9 & -8 \\ 0 & -2 & 9 & -11 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_3 - 2r_2 \\ r_4 - 2r_2 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4 - r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

所以原方程组等价于

例3 解方程组:

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 4 & 2 & -7 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 5r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & 9 & -8 \\ 0 & -2 & 9 & -11 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_3 - 2r_2 \\ r_4 - 2r_2 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4 - r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

所以原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \\ -x_2 + 4x_3 = -5 \\ x_3 = 2 \\ 0 = -3 \end{cases}$$

例3 解方程组:

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 4 & 2 & -7 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 5r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & 9 & -8 \\ 0 & -2 & 9 & -11 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_3 - 2r_2 \\ r_4 - 2r_2 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4 - r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

所以原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \\ -x_2 + 4x_3 = -5 \\ x_3 = 2 \\ 0 = -3 \end{cases} \Rightarrow \text{无解!}$$

例3 解方程组:

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -7 & -3 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & -11 & 2 \\ 4 & 2 & -7 & -3 \end{array} \right) \begin{array}{l} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 5r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array} \\ &\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & 9 & -8 \\ 0 & -2 & 9 & -11 \end{array} \right) \begin{array}{l} r_3 - 2r_2 \\ r_4 - 2r_2 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4 - r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

所以原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \\ -x_2 + 4x_3 = -5 \\ x_3 = 2 \\ 0 = -3 \end{cases} \Rightarrow \text{无解!}$$

总结

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

总结

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$



$(A:b)$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$



$(A:b)$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$



$(A:b)$

总结

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$



$(A:b)$

初等 ⇓ 行变换

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$



$(A:b)$

初等 ⇓ 行变换

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$



$(A:b)$

初等 ⇓ 行变换

总结

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

总结

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

无穷多解

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

唯一解

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

无解

总结

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

无穷多解

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

唯一解

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

无解

总结

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

无穷多解

$$r(A) \quad r(A:b)$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

唯一解

$$r(A) \quad r(A:b)$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

无解

$$r(A) \quad r(A:b)$$

总结

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

无穷多解

$$r(A) \quad r(A:b)$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

唯一解

$$r(A) \quad r(A:b)$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

无解

$$r(A) \neq r(A:b)$$

总结

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

无穷多解

$$r(A) = r(A:b)$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

唯一解

$$r(A) = r(A:b)$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

无解

$$r(A) \neq r(A:b)$$

总结

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

无穷多解

$$r(A) = r(A:b)$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

唯一解

$$r(A) = r(A:b)$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

无解

$$r(A) < r(A:b)$$

总结

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

无穷多解

$$r(A) = r(A:b) < n$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

唯一解

$$r(A) = r(A:b)$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

无解

$$r(A) < r(A:b)$$

总结

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

无穷多解

$$r(A) = r(A:b) < n$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 28 \\ -2x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -53 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 = 88 \\ 5x_1 + 9x_2 + 22x_3 = 141 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

唯一解

$$r(A) = r(A:b) = n$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -1 \\ 5x_1 + 3x_2 - 11x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

↓

$(A:b)$

初等 ↓ 行变换

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

无解

$$r(A) < r(A:b)$$

总结

定理 方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow Ax = b \text{ 的}$$

解有如下情形：

总结

定理 方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow Ax = b \text{ 的}$$

解有如下情形：

1. $r(A:b) = r(A)$

2. $r(A) \neq r(A:b)$

总结

定理 方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow Ax = b \text{ 的}$$

解有如下情形:

1. $r(A:b) = r(A)$

2. $r(A) \neq r(A:b) \Leftrightarrow r(A) < r(A:b)$

总结

定理 方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow Ax = b \text{ 的}$$

解有如下情形:

1. $r(A:b) = r(A)$

$$r(A) = r(A:b) < n$$

$$r(A) = r(A:b) = n$$

2. $r(A) \neq r(A:b) \Leftrightarrow r(A) < r(A:b)$

总结

定理 方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow Ax = b \text{ 的}$$

解有如下情形:

1.
$$r(A:b) = r(A)$$

$$r(A) = r(A:b) < n$$

- 只有唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A:b) = n$

2.
$$r(A) \neq r(A:b) \Leftrightarrow r(A) < r(A:b)$$

总结

定理 方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow Ax = b \text{ 的}$$

解有如下情形：

1. $r(A:b) = r(A)$

- 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A:b) < n$
- 只有唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A:b) = n$

2. $r(A) \neq r(A:b) \Leftrightarrow r(A) < r(A:b)$

总结

定理 方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow Ax = b \text{ 的}$$

解有如下情形：

1. 有解 $\Leftrightarrow r(A:b) = r(A)$

- 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A:b) < n$

- 只有唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A:b) = n$

2. $r(A) \neq r(A:b) \Leftrightarrow r(A) < r(A:b)$

总结

定理 方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow Ax = b \text{ 的}$$

解有如下情形：

1. 有解 $\Leftrightarrow r(A:b) = r(A)$
 - 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A:b) < n$
 - 只有唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A:b) = n$
2. 无解 $\Leftrightarrow r(A) \neq r(A:b) \Leftrightarrow r(A) < r(A:b)$

总结

定理 方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow Ax = b \text{ 的}$$

解有如下情形:

1. 有解 $\Leftrightarrow r(A:b) = r(A)$
 - 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A:b) < n$
 - 只有唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A:b) = n$
2. 无解 $\Leftrightarrow r(A) \neq r(A:b) \Leftrightarrow r(A) < r(A:b)$

注

- $r(A:b) = r(A)$ 的值, 相当于方程组中“独立”方程个数; 此时

总结

定理 方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow Ax = b \text{ 的}$$

解有如下情形：

1. 有解 $\Leftrightarrow r(A:b) = r(A)$
 - 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A:b) < n$
 - 只有唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A:b) = n$
2. 无解 $\Leftrightarrow r(A) \neq r(A:b) \Leftrightarrow r(A) < r(A:b)$

注

- $r(A:b) = r(A)$ 的值，相当于方程组中“独立”方程个数；此时
- $n - r(A)$ 为自由变量的个数

练习 1 求解

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

练习 1 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right)$$

练习 1 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1}$$

练习 1 求解

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right)$$

练习 1 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-2r_2}$$

练习 1 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ \qquad\qquad\qquad 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 & 7 \end{array} \right)$$

练习 1 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[\frac{1}{7} \times r_4]{\frac{1}{6} \times r_3}$$

练习 1 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[\frac{1}{7} \times r_4]{\frac{1}{6} \times r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

练习 1 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[\frac{1}{7} \times r_4]{\frac{1}{6} \times r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_4-r_3} \end{aligned}$$

练习 1 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[\frac{1}{7} \times r_4]{\frac{1}{6} \times r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_4-r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

练习 1 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[\frac{1}{7} \times r_4]{\frac{1}{6} \times r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_4-r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_1-r_3]{r_2+r_3} \end{aligned}$$

练习 1 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[\frac{1}{7} \times r_4]{\frac{1}{6} \times r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_4-r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_1-r_3]{r_2+r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

练习 1 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[\frac{1}{7} \times r_4]{\frac{1}{6} \times r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_4-r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_1-r_3]{r_2+r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_1-r_2} \end{aligned}$$

练习 1 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[\frac{1}{7} \times r_4]{\frac{1}{6} \times r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_4-r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_1-r_3]{r_2+r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_1-r_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

练习1 求解

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 9 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[\frac{1}{7} \times r_4]{\frac{1}{6} \times r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_1-r_3]{r_4-r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_1-r_3]{r_2+r_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_1-r_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

练习2 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

练习2 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- 可见 $r(A) = r(A:b) = 3 < 5$ ，有无穷多的解，

练习2 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- 可见 $r(A) = r(A:b) = 3 < 5$ ，有无穷多的解，含 $5 - 3 = 2$ 个自由变量

练习2 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- 可见 $r(A) = r(A:b) = 3 < 5$ ，有无穷多的解，含 $5 - 3 = 2$ 个自由变量
- 由既约阶梯形矩阵可知，原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_5 = -2 \\ x_3 - x_5 = 2 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

练习2 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- 可见 $r(A) = r(A:b) = 3 < 5$ ，有无穷多的解，含 $5 - 3 = 2$ 个自由变量
- 由既约阶梯形矩阵可知，原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2 - 2x_2 - 2x_5 \\ x_3 = 2 + x_5 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

练习2 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- 可见 $r(A) = r(A:b) = 3 < 5$ ，有无穷多的解，含 $5 - 3 = 2$ 个自由变量
- 由既约阶梯形矩阵可知，原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = -2 \\ x_3 - x_5 = 2 \\ x_4 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2 - 2x_2 - 2x_5 \\ x_3 = 2 + x_5 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

所以通解是

$$\begin{cases} x_1 = \\ x_2 = \\ x_3 = \\ x_4 = \\ x_5 = \end{cases}$$

练习2 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- 可见 $r(A) = r(A:b) = 3 < 5$, 有无穷多的解, 含 $5 - 3 = 2$ 个自由变量
- 由既约阶梯形矩阵可知, 原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = -2 \\ x_3 - x_5 = 2 \\ x_4 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2 - 2x_2 - 2x_5 \\ x_3 = 2 + x_5 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

所以通解是

$$\begin{cases} x_1 = \\ x_2 = c_1 \\ x_3 = \\ x_4 = \\ x_5 = c_2 \end{cases} \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数})$$

练习2 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- 可见 $r(A) = r(A:b) = 3 < 5$, 有无穷多的解, 含 $5 - 3 = 2$ 个自由变量
- 由既约阶梯形矩阵可知, 原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = -2 \\ x_3 - x_5 = 2 \\ x_4 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2 - 2x_2 - 2x_5 \\ x_3 = 2 + x_5 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

所以通解是

$$\begin{cases} x_1 = -2 - 2c_1 - 2c_2 \\ x_2 = c_1 \\ x_3 = \\ x_4 = \\ x_5 = c_2 \end{cases} \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数})$$

练习2 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- 可见 $r(A) = r(A:b) = 3 < 5$, 有无穷多的解, 含 $5 - 3 = 2$ 个自由变量
- 由既约阶梯形矩阵可知, 原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = -2 \\ x_3 - x_5 = 2 \\ x_4 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2 - 2x_2 - 2x_5 \\ x_3 = 2 + x_5 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

所以通解是

$$\begin{cases} x_1 = -2 - 2c_1 - 2c_2 \\ x_2 = c_1 \\ x_3 = 2 + c_2 \\ x_4 = \\ x_5 = c_2 \end{cases} \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数})$$

练习2 求解
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- 可见 $r(A) = r(A:b) = 3 < 5$, 有无穷多的解, 含 $5 - 3 = 2$ 个自由变量
- 由既约阶梯形矩阵可知, 原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = -2 \\ x_3 - x_5 = 2 \\ x_4 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2 - 2x_2 - 2x_5 \\ x_3 = 2 + x_5 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

所以通解是

$$\begin{cases} x_1 = -2 - 2c_1 - 2c_2 \\ x_2 = c_1 \\ x_3 = 2 + c_2 \\ x_4 = 1 \\ x_5 = c_2 \end{cases} \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数})$$

例 1 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有无穷解、唯一解, 及无解?

例 1 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有无穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{array} \right)$$

例 1 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases} \quad \text{有无穷解、唯一解, 及无解?}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4-3r_1}$$

例 1 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases} \quad \text{有无穷解、唯一解, 及无解?}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4-3r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{array} \right)$$

例 1 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases} \quad \text{有无穷解、唯一解, 及无解?}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4-3r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{array} \right)$$
$$\xrightarrow[r_4+r_2]{r_3+r_2}$$

例 1 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases} \quad \text{有无穷解、唯一解, 及无解?}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4-3r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4+r_2]{r_3+r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

例 2 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有无穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array} \right)$$

例 2 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有无穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 1$ 时
- 当 $a = 1$ 时

例 2 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有无穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 1$ 时
- 当 $a = 1$ 时

例 2 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有无穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 1$ 时 (b 为任意数), $r(A) = r(A:b) = 4$,
- 当 $a = 1$ 时

例 2 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有无穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 1$ 时 (b 为任意数), $r(A) = r(A:b) = 4$, 有唯一解;
- 当 $a = 1$ 时

例 2 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有无穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 1$ 时 (b 为任意数), $r(A) = r(A:b) = 4$, 有唯一解;
- 当 $a = 1$ 时

例 2 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases} \quad \text{有无穷解、唯一解, 及无解?}$$

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & -2 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & -1 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 1$ 时 (b 为任意数), $r(A) = r(A:b) = 4$, 有唯一解;
- 当 $a = 1$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

例 2 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有无穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-3 & -2 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & -1 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 1$ 时 (b 为任意数), $r(A) = r(A:b) = 4$, 有唯一解;
- 当 $a = 1$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- $a = 1, b = -1$ 时
- $a = 1, b \neq -1$ 时

例 2 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有无穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-3 & -2 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & -1 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 1$ 时 (b 为任意数), $r(A) = r(A:b) = 4$, 有唯一解;
- 当 $a = 1$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- $a = 1, b = -1$ 时
- $a = 1, b \neq -1$ 时

例 2 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有无穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-3 & -2 & b \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & -1 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 1$ 时 (b 为任意数), $r(A) = r(A:b) = 4$, 有唯一解;
- 当 $a = 1$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- $a = 1, b = -1$ 时, $r(A) = r(A:b) = 2 < 4$,
- $a = 1, b \neq -1$ 时

例 2 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有无穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-3 & -2 & b \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & -1 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 1$ 时 (b 为任意数), $r(A) = r(A:b) = 4$, 有唯一解;
- 当 $a = 1$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- $a = 1, b = -1$ 时, $r(A) = r(A:b) = 2 < 4$, 有无穷多解
- $a = 1, b \neq -1$ 时

例 2 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有无穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-3 & -2 & b \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & -1 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 1$ 时 (b 为任意数), $r(A) = r(A:b) = 4$, 有唯一解;
- 当 $a = 1$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- $a = 1, b = -1$ 时, $r(A) = r(A:b) = 2 < 4$, 有无穷多解
- $a = 1, b \neq -1$ 时

例 2 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有无穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-3 & -2 & b \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & -1 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 1$ 时 (b 为任意数), $r(A) = r(A:b) = 4$, 有唯一解;
- 当 $a = 1$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- $a = 1, b = -1$ 时, $r(A) = r(A:b) = 2 < 4$, 有无穷多解
- $a = 1, b \neq -1$ 时, $r(A) = 2 < 3 = r(A:b)$,

例 2 讨论 a, b 取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有无穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-3 & -2 & b \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & -1 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 1$ 时 (b 为任意数), $r(A) = r(A:b) = 4$, 有唯一解;
- 当 $a = 1$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- $a = 1, b = -1$ 时, $r(A) = r(A:b) = 2 < 4$, 有无穷多解
- $a = 1, b \neq -1$ 时, $r(A) = 2 < 3 = r(A:b)$, 无解

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无
穷解、唯一解, 及无解?

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无
穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right)$$

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}$$

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无
穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ & & & \\ & & & \end{array} \right)$$

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right)$$

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right)$$

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{r_3-2r_2}$$

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & a-7 & b+3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & a-7 & b+3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

- 当 $a \neq 7$ 时
- 当 $a = 7$ 时

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & b \\ 3 & 4 & a & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & b-2 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right)$$
$$\xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & b-2 \\ 0 & 0 & a-7 & b+3 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 7$ 时
- 当 $a = 7$ 时

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a-7 & b+3 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 7$ 时 (b 为任意数), $r(A:b) = r(A) = 3$,
- 当 $a = 7$ 时

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & b \\ 3 & 4 & a & -3 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & b+3 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & b+3 \\ 0 & 0 & a-7 & b+3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

- 当 $a \neq 7$ 时 (b 为任意数), $r(A:b) = r(A) = 3$, 有唯一解;
- 当 $a = 7$ 时

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & a-7 & b+3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

- 当 $a \neq 7$ 时 (b 为任意数), $r(A:b) = r(A) = 3$, 有唯一解;
- 当 $a = 7$ 时

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & a-7 & b+3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

- 当 $a \neq 7$ 时 (b 为任意数), $r(A:b) = r(A) = 3$, 有唯一解;
- 当 $a = 7$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & b+3 \end{array} \right)$$

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & a-7 & b+3 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 7$ 时 (b 为任意数), $r(A:b) = r(A) = 3$, 有唯一解;
- 当 $a = 7$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & b+3 \end{array} \right)$$

- $a = 7, b = -3$ 时
- $a = 7, b \neq -3$ 时

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & a-7 & b+3 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 7$ 时 (b 为任意数), $r(A:b) = r(A) = 3$, 有唯一解;
- 当 $a = 7$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & b+3 \end{array} \right)$$

- $a = 7, b = -3$ 时
- $a = 7, b \neq -3$ 时

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a-7 & b+3 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 7$ 时 (b 为任意数), $r(A:b) = r(A) = 3$, 有唯一解;
- 当 $a = 7$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & b+3 \end{array} \right)$$

- $a = 7, b = -3$ 时, $r(A:b) = r(A) = 2 < 3$,
- $a = 7, b \neq -3$ 时

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a-7 & b+3 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 7$ 时 (b 为任意数), $r(A:b) = r(A) = 3$, 有唯一解;
- 当 $a = 7$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & b+3 \end{array} \right)$$

- $a = 7, b = -3$ 时, $r(A:b) = r(A) = 2 < 3$, 有无穷多解
- $a = 7, b \neq -3$ 时

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & a-7 & b+3 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 7$ 时 (b 为任意数), $r(A:b) = r(A) = 3$, 有唯一解;
- 当 $a = 7$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & b+3 \end{array} \right)$$

- $a = 7, b = -3$ 时, $r(A:b) = r(A) = 2 < 3$, 有无穷多解
- $a = 7, b \neq -3$ 时

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a-7 & b+3 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 7$ 时 (b 为任意数), $r(A:b) = r(A) = 3$, 有唯一解;
- 当 $a = 7$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & b+3 \end{array} \right)$$

- $a = 7, b = -3$ 时, $r(A:b) = r(A) = 2 < 3$, 有无穷多解
- $a = 7, b \neq -3$ 时

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a-7 & b+3 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 7$ 时 (b 为任意数), $r(A:b) = r(A) = 3$, 有唯一解;
- 当 $a = 7$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & b+3 \end{array} \right)$$

- $a = 7, b = -3$ 时, $r(A:b) = r(A) = 2 < 3$, 有无穷多解
- $a = 7, b \neq -3$ 时, $r(A:b) = 3 \neq 2 = r(A)$,

例 3 讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有无

穷解、唯一解, 及无解?

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & a & b \end{array} \right) \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & a-9 & b-3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r_3-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a-7 & b+3 \end{array} \right)$$

- 当 $a \neq 7$ 时 (b 为任意数), $r(A:b) = r(A) = 3$, 有唯一解;
- 当 $a = 7$ 时

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & b+3 \end{array} \right)$$

- $a = 7, b = -3$ 时, $r(A:b) = r(A) = 2 < 3$, 有无穷多解
- $a = 7, b \neq -3$ 时, $r(A:b) = 3 \neq 2 = r(A)$, 无解

线性方程组解的分类

- 一般线性方程组 $A_{m \times n}x = b$ (m 个方程, n 个未知量)

$Ax = b$	有无穷解	有唯一解	无解
	$r(A) = r(A:b) < n$	$r(A) = r(A:b) = n$	$r(A) < r(A:b)$

线性方程组解的分类

- 一般线性方程组 $A_{m \times n}x = b$ (m 个方程, n 个未知量)

$Ax = b$	有无穷解	有唯一解	无解
	$r(A) = r(A:b) < n$	$r(A) = r(A:b) = n$	$r(A) < r(A:b)$

- 齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = 0$, 一定有解 (至少有零解)

线性方程组解的分类

- 一般线性方程组 $A_{m \times n}x = b$ (m 个方程, n 个未知量)

$Ax = b$	有无穷解	有唯一解	无解
	$r(A) = r(A:b) < n$	$r(A) = r(A:b) = n$	$r(A) < r(A:b)$

- 齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = 0$, 一定有解 (至少有零解)

$Ax = 0$	有无穷解	有唯一解 (零解)

线性方程组解的分类

- 一般线性方程组 $A_{m \times n}x = b$ (m 个方程, n 个未知量)

$Ax = b$	有无穷解	有唯一解	无解
	$r(A) = r(A:b) < n$	$r(A) = r(A:b) = n$	$r(A) < r(A:b)$

- 齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = 0$, 一定有解 (至少有零解)

$Ax = 0$	有无穷解	有唯一解 (零解)
	$r(A) < n$	

线性方程组解的分类

- 一般线性方程组 $A_{m \times n}x = b$ (m 个方程, n 个未知量)

$Ax = b$	有无穷解	有唯一解	无解
	$r(A) = r(A:b) < n$	$r(A) = r(A:b) = n$	$r(A) < r(A:b)$

- 齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = 0$, 一定有解 (至少有零解)

$Ax = 0$	有无穷解	有唯一解 (零解)
	$r(A) < n$	$r(A) = n$

例 解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

例 解齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 8 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -9 & 7 & 0 \end{array} \right)$$

例 解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 8 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -9 & 7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - r_1 \\ r_3 - 3r_1 \\ r_4 - r_1 \end{array}}$$

例 解齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 8 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -9 & 7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{array}{l} r_2 - r_1 \\ r_3 - 3r_1 \end{array}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ & 2 & -7 & 4 & 0 \\ & -4 & -7 & 4 & 0 \\ & 2 & -10 & 8 & 0 \end{array} \right)$$

例 解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 8 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -9 & 7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{array}{l} r_2 - r_1 \\ r_3 - 3r_1 \end{array}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -17 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -14 & 8 & 0 \end{array} \right)$$

例 解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 8 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -9 & 7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{array}{l} r_2 - r_1 \\ r_3 - 3r_1 \end{array}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -14 & 8 & 0 \end{array} \right)$$

例 解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 8 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -9 & 7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{array}{l} r_2 - r_1 \\ r_3 - 3r_1 \end{array}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -14 & 8 & 0 \end{array} \right)$$

例 解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 8 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -9 & 7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_1]{r_2-r_1, r_3-3r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -14 & 8 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2}$$

例 解齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$(A:b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 8 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -9 & 7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_1]{r_2-r_1, r_3-3r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -14 & 8 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

例 解齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 8 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -9 & 7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_1]{r_2-r_1, r_3-3r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -14 & 8 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_2} \end{aligned}$$

例 解齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 8 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -9 & 7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_1]{r_2-r_1, r_3-3r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -14 & 8 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -7/2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

例 解齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 8 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -9 & 7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_1]{r_2-r_1, r_3-3r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -14 & 8 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -7/2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1+r_2} \end{aligned}$$

例 解齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$\begin{aligned} (A:b) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 8 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -9 & 7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-r_1]{r_2-r_1, r_3-3r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -14 & 8 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -7 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\frac{1}{2} \times r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -7/2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1+r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -7/2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

例 解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -7/2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

例 解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -7/2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

所以原方程组等价于

例

解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -7/2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

所以原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + \frac{3}{2}x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 - \frac{7}{2}x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

例

解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -7/2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

所以原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + \frac{3}{2}x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 - \frac{7}{2}x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2}x_3 - x_4 \\ x_2 = \frac{7}{2}x_3 - 2x_4 \end{cases}$$

例

解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -7/2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

所以原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + \frac{3}{2}x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 - \frac{7}{2}x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2}x_3 - x_4 \\ x_2 = \frac{7}{2}x_3 - 2x_4 \end{cases}$$

$$\text{所以} \begin{cases} x_3 = c_1 \\ x_4 = c_2 \end{cases}$$

例 解齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -7/2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

所以原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + \frac{3}{2}x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 - \frac{7}{2}x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2}x_3 - x_4 \\ x_2 = \frac{7}{2}x_3 - 2x_4 \end{cases}$$

所以
$$\begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2}C_1 - C_2 \\ x_3 = C_1 \\ x_4 = C_2 \end{cases}$$

例

解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -7/2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

所以原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + \frac{3}{2}x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 - \frac{7}{2}x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2}x_3 - x_4 \\ x_2 = \frac{7}{2}x_3 - 2x_4 \end{cases}$$

所以

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2}c_1 - c_2 \\ x_2 = \frac{7}{2}c_1 - 2c_2 \\ x_3 = c_1 \\ x_4 = c_2 \end{cases}$$

例

解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$(A:b) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -7/2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

所以原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + \frac{3}{2}x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 - \frac{7}{2}x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2}x_3 - x_4 \\ x_2 = \frac{7}{2}x_3 - 2x_4 \end{cases}$$

$$\text{所以} \begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2}c_1 - c_2 \\ x_2 = \frac{7}{2}c_1 - 2c_2 \\ x_3 = c_1 \\ x_4 = c_2 \end{cases}$$

(注 自由变量个数 = $2 = 4 - r(A)$)