

§8.5 多元复合函数与隐函数的求导法

2016-2017 学年 II

教学要求



Outline of §8.5

1. 多元复合函数的求导法

2. 隐函数的求导法

We are here now...

1. 多元复合函数的求导法

2. 隐函数的求导法

二元复合函数求导

设有二元函数 $z = f(u, v)$

二元复合函数求导

设有二元函数 $z = f(u, v)$


- 设 $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$

问 $\frac{dz}{dt} = ?$

二元复合函数求导

设有二元函数 $z = f(u, v)$

- 设 $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$




问 $\frac{dz}{dt} = ?$

二元复合函数求导

设有二元函数 $z = f(u, v)$

- 设 $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$



问 $\frac{dz}{dt} = ?$


- 设 $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 则 $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$

问 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} = ?$

二元复合函数求导


设有二元函数 $z = f(u, v)$

- 设 $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$



问 $\frac{dz}{dt} = ?$

- 设 $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 则 $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$




问 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} = ?$

二元复合函数求导


设有二元函数 $z = f(u, v)$

- 设 $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$



问 $\frac{dz}{dt} = ?$

- 设 $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 则 $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$




问 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} = ?$

二元复合函数求导


设有二元函数 $z = f(u, v)$

- 设 $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$



问 $\frac{dz}{dt} = ?$

- 设 $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 则 $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$



问 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} = ?$

二元复合函数求导公式——中间变量是一元函数


公式 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$
的全导数

$$\frac{dz}{dt} =$$

二元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

公式 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$
的全导数


$$\frac{dz}{dt} =$$



二元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

公式 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$
的全导数


$$\frac{dz}{dt} =$$



二元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

公式 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$
的全导数


$$\frac{dz}{dt} =$$



二元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

公式 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$
的全导数


$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt}$$



二元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

公式 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$
的全导数


$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt}$$



二元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

公式 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$
的全导数

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt}$$



例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= \end{aligned}$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= (uv)'_u \cdot\end{aligned}$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t +\end{aligned}$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot\end{aligned}$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\ &= \end{aligned}$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\ &= v.\end{aligned}$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\ &= v \cdot (-e^{-t}) +\end{aligned}$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\ &= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot\end{aligned}$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\ &= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\ &= \end{aligned}$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&=\end{aligned}$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&= e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&= e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

解法二

$$\because z = uv =$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&= e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

解法二

$$\because z = uv = e^{-t} \cdot \sin t$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&= e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

解法二

$$\begin{aligned}\because z &= uv = e^{-t} \cdot \sin t \\ \therefore \frac{dz}{dt} &= \frac{d}{dt}(e^{-t} \sin t) =\end{aligned}$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&= e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

解法二

$$\begin{aligned}\because z &= uv = e^{-t} \cdot \sin t \\ \therefore \frac{dz}{dt} &= \frac{d}{dt}(e^{-t} \sin t) = (e^{-t})'_t \cdot \sin t +\end{aligned}$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&= e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

解法二

$$\begin{aligned}\because z &= uv = e^{-t} \cdot \sin t \\ \therefore \frac{dz}{dt} &= \frac{d}{dt}(e^{-t} \sin t) = (e^{-t})'_t \cdot \sin t + e^{-t} \cdot (\sin t)'_t\end{aligned}$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&= e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

解法二

$$\begin{aligned}\because z &= uv = e^{-t} \cdot \sin t \\ \therefore \frac{dz}{dt} &= \frac{d}{dt}(e^{-t} \sin t) = (e^{-t})'_t \cdot \sin t + e^{-t} \cdot (\sin t)'_t \\&= (-e^{-t}) \cdot \sin t + e^{-t} \cdot \cos t\end{aligned}$$

例 设 $z = uv$, 而 $u = e^{-t}$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&= e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

解法二

$$\begin{aligned}\because z &= uv = e^{-t} \cdot \sin t \\ \therefore \frac{dz}{dt} &= \frac{d}{dt}(e^{-t} \sin t) = (e^{-t})'_t \cdot \sin t + e^{-t} \cdot (\sin t)'_t \\&= (-e^{-t}) \cdot \sin t + e^{-t} \cdot \cos t = e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

例 设 $z = \frac{y}{x}$, 而 $x = e^t$, $y = 1 - e^{2t}$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$


解

$$\frac{dz}{dt} =$$

例 设 $z = \frac{y}{x}$, 而 $x = e^t$, $y = 1 - e^{2t}$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解


$$\frac{dz}{dt} =$$



例 设 $z = \frac{y}{x}$, 而 $x = e^t$, $y = 1 - e^{2t}$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解


$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} =$$



例 设 $z = \frac{y}{x}$, 而 $x = e^t$, $y = 1 - e^{2t}$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解


$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot$$



例 设 $z = \frac{y}{x}$, 而 $x = e^t$, $y = 1 - e^{2t}$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解


$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t +$$



例 设 $z = \frac{y}{x}$, 而 $x = e^t$, $y = 1 - e^{2t}$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解


$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot$$



例 设 $z = \frac{y}{x}$, 而 $x = e^t$, $y = 1 - e^{2t}$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解


$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot (1 - e^{2t})'_t \\ &= \end{aligned}$$



例 设 $z = \frac{y}{x}$, 而 $x = e^t$, $y = 1 - e^{2t}$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解


$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot (1 - e^{2t})'_t \\ &= -\frac{y}{x^2} \cdot\end{aligned}$$



例 设 $z = \frac{y}{x}$, 而 $x = e^t$, $y = 1 - e^{2t}$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解


$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot (1 - e^{2t})'_t \\ &= -\frac{y}{x^2} \cdot e^t +\end{aligned}$$



例 设 $z = \frac{y}{x}$, 而 $x = e^t$, $y = 1 - e^{2t}$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解


$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot (1 - e^{2t})'_t \\ &= -\frac{y}{x^2} \cdot e^t + \frac{1}{x} \cdot\end{aligned}$$



例 设 $z = \frac{y}{x}$, 而 $x = e^t$, $y = 1 - e^{2t}$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解


$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot (1 - e^{2t})'_t \\ &= -\frac{y}{x^2} \cdot e^t + \frac{1}{x} \cdot (-2e^{2t}) =\end{aligned}$$



例 设 $z = \frac{y}{x}$, 而 $x = e^t$, $y = 1 - e^{2t}$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解


$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot (1 - e^{2t})'_t \\ &= -\frac{y}{x^2} \cdot e^t + \frac{1}{x} \cdot (-2e^{2t}) = -\frac{1 - e^{2t}}{e^{2t}} \cdot e^t +\end{aligned}$$



例 设 $z = \frac{y}{x}$, 而 $x = e^t$, $y = 1 - e^{2t}$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解


$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot (1 - e^{2t})'_t \\ &= -\frac{y}{x^2} \cdot e^t + \frac{1}{x} \cdot (-2e^{2t}) = -\frac{1 - e^{2t}}{e^{2t}} \cdot e^t + \frac{1}{e^t} \cdot (-2e^{2t}) \\ &= \end{aligned}$$



例 设 $z = \frac{y}{x}$, 而 $x = e^t$, $y = 1 - e^{2t}$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$

解

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot (1 - e^{2t})'_t \\ &= -\frac{y}{x^2} \cdot e^t + \frac{1}{x} \cdot (-2e^{2t}) = -\frac{1 - e^{2t}}{e^{2t}} \cdot e^t + \frac{1}{e^t} \cdot (-2e^{2t}) \\ &= -e^{-t} - e^t\end{aligned}$$



三元复合函数求导公式——中间变量是一元函数


公式 设 $z = f(u, v, w)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, $w = \omega(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$ 的全导数

$$\frac{dz}{dt} =$$

三元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

公式 设 $z = f(u, v, w)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, $w = \omega(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$ 的全导数


$$\frac{dz}{dt} =$$



三元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

公式 设 $z = f(u, v, w)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, $w = \omega(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$ 的全导数


$$\frac{dz}{dt} =$$



三元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

公式 设 $z = f(u, v, w)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, $w = \omega(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$ 的全导数


$$\frac{dz}{dt} =$$



三元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

公式 设 $z = f(u, v, w)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, $w = \omega(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$ 的全导数


$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt}$$



三元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

公式 设 $z = f(u, v, w)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, $w = \omega(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$ 的全导数


$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} + \frac{\partial z}{\partial w} \cdot \frac{dw}{dt}$$



三元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

公式 设 $z = f(u, v, w)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, $w = \omega(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$ 的全导数


$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} + \frac{\partial z}{\partial w} \cdot \frac{dw}{dt}$$



三元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

公式 设 $z = f(u, v, w)$, $u = \varphi(t)$, $v = \psi(t)$, $w = \omega(t)$, 则 $z = f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$ 的全导数

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} + \frac{\partial z}{\partial w} \cdot \frac{dw}{dt}$$



二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数

公式 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$,

二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数

公式 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 则复合函数

$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

的偏导数是:

$$\frac{\partial z}{\partial x} =$$

$$, \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数

公式 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 则复合函数


$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

的偏导数是:

$$\frac{\partial z}{\partial x} =$$

$$, \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

图示



二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数

公式 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 则复合函数


$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

的偏导数是:

$$\frac{\partial z}{\partial x} =$$

$$, \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

图示



二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数

公式 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 则复合函数


$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

的偏导数是:

$$\frac{\partial z}{\partial x} =$$

$$, \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

图示



二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数


公式 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 则复合函数

$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

的偏导数是:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

图示



二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数


公式 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 则复合函数

$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

的偏导数是:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

图示



二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数


公式 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 则复合函数

$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

的偏导数是:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} +$$

图示



二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数


公式 设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 则复合函数

$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

的偏导数是:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

图示



例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解
$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$
$$=$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解
$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解
$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x +\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解
$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解
$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\ &= \end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解
$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\ &= 2e^{2u} \sin v.\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解
$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\ &= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y +\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解
$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\ &= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解
$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= \end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2).\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y +\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= \end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y +\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= \end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot x^3 +\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot x^3 + e^{2u} \cos v \cdot 2y.\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot x^3 + e^{2u} \cos v \cdot 2y \\&= \end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot x^3 + e^{2u} \cos v \cdot 2y \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot x^3 + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2y\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot x^3 + e^{2u} \cos v \cdot 2y \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot x^3 +\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2y + e^{2x^3y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot x^3 + e^{2u} \cos v \cdot 2y \\&= 2e^{2x^3y} \sin(x^2 + y^2) \cdot x^3 + e^{2x^3y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2y\end{aligned}$$

例 设 $z = e^{2u} \sin v$, $u = x^3 y$, $v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解
$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot x^3 + e^{2u} \cos v \cdot 2y \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot x^3 + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2y\end{aligned}$$

We are here now...

1. 多元复合函数的求导法

2. 隐函数的求导法

隐函数的求导法 I

公式 设 $y = f(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$,

隐函数的求导法 I

公式 设 $y = f(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$,

隐函数的求导法 I

公式 设 $y = f(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} =$$

隐函数的求导法 I

公式 设 $y = f(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{F_x}{F_y}$$

隐函数的求导法 I

公式 设 $y = f(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{F_x}{F_y}$$

证明 $\because F(x, y(x)) = 0$

隐函数的求导法 I

公式 设 $y = f(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{F_x}{F_y}$$

证明 $\because F(x, y(x)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) =$$


隐函数的求导法 I

公式 设 $y = f(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{F_x}{F_y}$$

证明 $\because F(x, y(x)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) =$$




隐函数的求导法 I

公式 设 $y = f(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{F_x}{F_y}$$

证明 $\because F(x, y(x)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) =$$




隐函数的求导法 I

公式 设 $y = f(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{F_x}{F_y}$$

证明 $\because F(x, y(x)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) =$$




隐函数的求导法 I

公式 设 $y = f(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{F_x}{F_y}$$

证明 $\because F(x, y(x)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) = F_x +$$




隐函数的求导法 I

公式 设 $y = f(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

证明 $\because F(x, y(x)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx}F(x, y(x)) = F_x + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$



隐函数的求导法 I


公式 设 $y = f(x)$ 满足 $F(x, y) = 0$, 即 $F(x, y(x)) = 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

证明 $\because F(x, y(x)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx}F(x, y(x)) = F_x + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$



例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一

$$F(x, y) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + e^{x+y} - 1 = 0$

$$F(x, y) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + e^{x+y} - 1 = 0$, 令 $F(x, y) = xy + e^{x+y} - 1$,
 $F(x, y) = 0$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + e^{x+y} - 1 = 0$, 令 $F(x, y) = xy + e^{x+y} - 1$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + e^{x+y} - 1)'_x}{(xy + e^{x+y} - 1)'_y} =$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + e^{x+y} - 1 = 0$, 令 $F(x, y) = xy + e^{x+y} - 1$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + e^{x+y} - 1)'_x}{(xy + e^{x+y} - 1)'_y} = -\frac{y + e^{x+y}}{x + e^{x+y}}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + e^{x+y} - 1 = 0$, 令 $F(x, y) = xy + e^{x+y} - 1$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + e^{x+y} - 1)'_x}{(xy + e^{x+y} - 1)'_y} = -\frac{y + e^{x+y}}{x + e^{x+y}}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + e^{x+y} - 1 = 0$, 令 $F(x, y) = xy + e^{x+y} - 1$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + e^{x+y} - 1)'_x}{(xy + e^{x+y} - 1)'_y} = -\frac{y + e^{x+y}}{x + e^{x+y}}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + e^{x+y} - 1 = 0$, 令 $F(x, y) = xy + e^{x+y} - 1$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + e^{x+y} - 1)'_x}{(xy + e^{x+y} - 1)'_y} = -\frac{y + e^{x+y}}{x + e^{x+y}}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + e^{x+y} - 1 = 0$, 令 $F(x, y) = xy + e^{x+y} - 1$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + e^{x+y} - 1)'_x}{(xy + e^{x+y} - 1)'_y} = -\frac{y + e^{x+y}}{x + e^{x+y}}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + e^{x+y} - 1 = 0$, 令 $F(x, y) = xy + e^{x+y} - 1$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + e^{x+y} - 1)'_x}{(xy + e^{x+y} - 1)'_y} = -\frac{y + e^{x+y}}{x + e^{x+y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + e^{x+y(x)} - 1 = 0$,

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + e^{x+y} - 1 = 0$, 令 $F(x, y) = xy + e^{x+y} - 1$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + e^{x+y} - 1)'_x}{(xy + e^{x+y} - 1)'_y} = -\frac{y + e^{x+y}}{x + e^{x+y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + e^{x+y(x)} - 1 = 0$, 所以

$$0 = (xy(x) + e^{x+y(x)} - 1)'_x$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + e^{x+y} - 1 = 0$, 令 $F(x, y) = xy + e^{x+y} - 1$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + e^{x+y} - 1)'_x}{(xy + e^{x+y} - 1)'_y} = -\frac{y + e^{x+y}}{x + e^{x+y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + e^{x+y(x)} - 1 = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (xy(x) + e^{x+y(x)} - 1)'_x \\ &= (xy(x))'_x + (e^{x+y(x)})'_x \\ &= \end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + e^{x+y} - 1 = 0$, 令 $F(x, y) = xy + e^{x+y} - 1$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + e^{x+y} - 1)'_x}{(xy + e^{x+y} - 1)'_y} = -\frac{y + e^{x+y}}{x + e^{x+y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + e^{x+y(x)} - 1 = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (xy(x) + e^{x+y(x)} - 1)'_x \\ &= (xy(x))'_x + (e^{x+y(x)})'_x \\ &= y + xy' + \end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + e^{x+y} - 1 = 0$, 令 $F(x, y) = xy + e^{x+y} - 1$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + e^{x+y} - 1)'_x}{(xy + e^{x+y} - 1)'_y} = -\frac{y + e^{x+y}}{x + e^{x+y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + e^{x+y(x)} - 1 = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (xy(x) + e^{x+y(x)} - 1)'_x \\ &= (xy(x))'_x + (e^{x+y(x)})'_x \\ &= y + xy' + e^{x+y(x)} \cdot (1 + y') \end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + e^{x+y} - 1 = 0$, 令 $F(x, y) = xy + e^{x+y} - 1$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + e^{x+y} - 1)'_x}{(xy + e^{x+y} - 1)'_y} = -\frac{y + e^{x+y}}{x + e^{x+y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + e^{x+y(x)} - 1 = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (xy(x) + e^{x+y(x)} - 1)'_x \\ &= (xy(x))'_x + (e^{x+y(x)})'_x \\ &= y + xy' + e^{x+y(x)} \cdot (1 + y') \\ &= (y + e^{x+y}) + \end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + e^{x+y} - 1 = 0$, 令 $F(x, y) = xy + e^{x+y} - 1$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + e^{x+y} - 1)'_x}{(xy + e^{x+y} - 1)'_y} = -\frac{y + e^{x+y}}{x + e^{x+y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + e^{x+y(x)} - 1 = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (xy(x) + e^{x+y(x)} - 1)'_x \\ &= (xy(x))'_x + (e^{x+y(x)})'_x \\ &= y + xy' + e^{x+y(x)} \cdot (1 + y') \\ &= (y + e^{x+y}) + y'(x + e^{x+y}) \end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy = 1 - e^{x+y}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + e^{x+y} - 1 = 0$, 令 $F(x, y) = xy + e^{x+y} - 1$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + e^{x+y} - 1)'_x}{(xy + e^{x+y} - 1)'_y} = -\frac{y + e^{x+y}}{x + e^{x+y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + e^{x+y(x)} - 1 = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (xy(x) + e^{x+y(x)} - 1)'_x \\ &= (xy(x))'_x + (e^{x+y(x)})'_x \\ &= y + xy' + e^{x+y(x)} \cdot (1 + y') \\ &= (y + e^{x+y}) + y'(x + e^{x+y}) \end{aligned}$$

$$\text{所以 } y' = -\frac{y + e^{x+y}}{x + e^{x+y}}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一

$$F(x, y) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$

$$F(x, y) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$, 令 $F(x, y) = xy + \ln y - \ln x$,
 $F(x, y) = 0$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$, 令 $F(x, y) = xy + \ln y - \ln x$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + \ln y - \ln x)'_x}{(xy + \ln y - \ln x)'_y} =$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$, 令 $F(x, y) = xy + \ln y - \ln x$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + \ln y - \ln x)'_x}{(xy + \ln y - \ln x)'_y} = -\frac{y - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{y}}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$, 令 $F(x, y) = xy + \ln y - \ln x$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + \ln y - \ln x)'_x}{(xy + \ln y - \ln x)'_y} = -\frac{y}{x}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$, 令 $F(x, y) = xy + \ln y - \ln x$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + \ln y - \ln x)'_x}{(xy + \ln y - \ln x)'_y} = -\frac{y - \frac{1}{x}}{y}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$, 令 $F(x, y) = xy + \ln y - \ln x$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + \ln y - \ln x)'_x}{(xy + \ln y - \ln x)'_y} = -\frac{y - \frac{1}{x}}{x}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$, 令 $F(x, y) = xy + \ln y - \ln x$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + \ln y - \ln x)'_x}{(xy + \ln y - \ln x)'_y} = -\frac{y - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{y}}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$, 令 $F(x, y) = xy + \ln y - \ln x$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + \ln y - \ln x)'_x}{(xy + \ln y - \ln x)'_y} = -\frac{y - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + \ln y(x) - \ln x = 0$,

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$, 令 $F(x, y) = xy + \ln y - \ln x$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + \ln y - \ln x)'_x}{(xy + \ln y - \ln x)'_y} = -\frac{y - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + \ln y(x) - \ln x = 0$, 所以

$$0 = (xy(x) + \ln y(x) - \ln x)'_x$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$, 令 $F(x, y) = xy + \ln y - \ln x$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + \ln y - \ln x)'_x}{(xy + \ln y - \ln x)'_y} = -\frac{y - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + \ln y(x) - \ln x = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (xy(x) + \ln y(x) - \ln x)'_x = (xy(x))'_x + (\ln y(x))'_x - (\ln x)'_x \\ &= \end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$, 令 $F(x, y) = xy + \ln y - \ln x$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + \ln y - \ln x)'_x}{(xy + \ln y - \ln x)'_y} = -\frac{y - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + \ln y(x) - \ln x = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (xy(x) + \ln y(x) - \ln x)'_x = (xy(x))'_x + (\ln y(x))'_x - (\ln x)'_x \\ &= y + xy' \end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$, 令 $F(x, y) = xy + \ln y - \ln x$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + \ln y - \ln x)'_x}{(xy + \ln y - \ln x)'_y} = -\frac{y - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + \ln y(x) - \ln x = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (xy(x) + \ln y(x) - \ln x)'_x = (xy(x))'_x + (\ln y(x))'_x - (\ln x)'_x \\ &= y + xy' + \frac{y'}{y} \end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$, 令 $F(x, y) = xy + \ln y - \ln x$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + \ln y - \ln x)'_x}{(xy + \ln y - \ln x)'_y} = -\frac{y - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + \ln y(x) - \ln x = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (xy(x) + \ln y(x) - \ln x)'_x = (xy(x))'_x + (\ln y(x))'_x - (\ln x)'_x \\ &= y + xy' + \frac{y'}{y} - \frac{1}{x} \end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$, 令 $F(x, y) = xy + \ln y - \ln x$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + \ln y - \ln x)'_x}{(xy + \ln y - \ln x)'_y} = -\frac{y - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + \ln y(x) - \ln x = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (xy(x) + \ln y(x) - \ln x)'_x = (xy(x))'_x + (\ln y(x))'_x - (\ln x)'_x \\ &= y + xy' + \frac{y'}{y} - \frac{1}{x} \\ &= \left(y - \frac{1}{x}\right) + \end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$, 令 $F(x, y) = xy + \ln y - \ln x$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + \ln y - \ln x)'_x}{(xy + \ln y - \ln x)'_y} = -\frac{y - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + \ln y(x) - \ln x = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (xy(x) + \ln y(x) - \ln x)'_x = (xy(x))'_x + (\ln y(x))'_x - (\ln x)'_x \\ &= y + xy' + \frac{y'}{y} - \frac{1}{x} \\ &= \left(y - \frac{1}{x}\right) + y'\left(x + \frac{1}{y}\right) \end{aligned}$$

例 设 $y = f(x)$ 满足 $xy + \ln y = \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意 $xy + \ln y - \ln x = 0$, 令 $F(x, y) = xy + \ln y - \ln x$, 则 $F(x, y) = 0$, 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(xy + \ln y - \ln x)'_x}{(xy + \ln y - \ln x)'_y} = -\frac{y - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{y}}$$

方法二 注意 $xy(x) + \ln y(x) - \ln x = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (xy(x) + \ln y(x) - \ln x)'_x = (xy(x))'_x + (\ln y(x))'_x - (\ln x)'_x \\ &= y + xy' + \frac{y'}{y} - \frac{1}{x} \\ &= \left(y - \frac{1}{x}\right) + y'\left(x + \frac{1}{y}\right) \end{aligned}$$

$$\text{所以 } y' = -\frac{y - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{y}}$$

隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$,

隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$,

隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$,

则
$$\frac{\partial z}{\partial x} = \quad , \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$,

则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$,

则
$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

证明 $\because F(x, y, z(x, y)) = 0$

隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$,

则
$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

证明 $\because F(x, y, z(x, y)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) =$$


隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$,

则
$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

证明 $\because F(x, y, z(x, y)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) =$$




隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

证明 $\because F(x, y, z(x, y)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) =$$




隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

证明 $\because F(x, y, z(x, y)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) =$$




隐函数的求导法 II

公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

证明 $\because F(x, y, z(x, y)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) = F_x + F_z \cdot \frac{\partial z}{\partial x}$$



隐函数的求导法 II


公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

证明 $\because F(x, y, z(x, y)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) = F_x + F_z \cdot \frac{\partial z}{\partial x}$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z},$$



隐函数的求导法 II


公式 设 $z = f(x, y)$ 满足 $F(x, y, z) = 0$, 即 $F(x, y, z(x, y)) = 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

证明 $\because F(x, y, z(x, y)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) = F_x + F_z \cdot \frac{\partial z}{\partial x}$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \text{同理} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$



例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$F(x, y, z) = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, $F(x, y, z) = 0$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z}$$

=

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z}$$

$$= -\frac{1 + z}{1 - e^z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z}$$

$$= -\frac{1}{1 - e^z}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{\quad}{0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{\quad}{\quad}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{\quad}{0 + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{\quad}{\quad}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x}{0 + 0 + 1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + 0}{0 + 0 + 1}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z}{0 + 0 + x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + 0 - 0}{0 + 0 + x - e^z}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + 0 - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 1 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 1}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 1 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 1 + 0 - 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x + y + xz = e^z - 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 1 + 0 - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1}{x - e^z}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$F(x, y, z) = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, $F(x, y, z) = 0$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z}$$

=

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z}$$

=

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z}$$

$$= -\frac{2x}{-2 - e^z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z}$$

$$= \frac{2y}{-2 - e^z}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{\quad}{0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{\quad}{\quad}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{\quad}{0 + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{\quad}{\quad}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 - 2}{0 + 0 - 2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{0 + 2 - 0}{0 + 0 - 2}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 - 2 - e^z}{-2 - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{0 + 2 - 0 - 0}{-2 - e^z}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 - 2 - e^z}{0 + 0 - 2 - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 - 2 - e^z}{0 + 0 - 2 - e^z}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{2x}{0 + 0 - 2 - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{2y}{0 + 0 - 2 - e^z}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{2x + 0}{0 + 0 - 2 - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 - 2 - e^z}{0 + 0 - 2 - e^z}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{2x + 0 + 0}{0 + 0 - 2 - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 - 2 - e^z}{0 + 0 - 2 - e^z}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{2x + 0 + 0 - 0}{0 + 0 - 2 - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 - 2 - e^z}{0 + 0 - 2 - e^z}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{2x + 0 + 0 - 0}{0 + 0 - 2 - e^z} = -\frac{2x}{-2 - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 - 2 - e^z}{0 + 0 - 2 - e^z}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{2x + 0 + 0 - 0}{0 + 0 - 2 - e^z} = -\frac{2x}{-2 - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{0}{0 + 0 - 2 - e^z}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{2x + 0 + 0 - 0}{0 + 0 - 2 - e^z} = -\frac{2x}{-2 - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{0 + 2y}{0 + 0 - 2 - e^z}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{2x + 0 + 0 - 0}{0 + 0 - 2 - e^z} = -\frac{2x}{-2 - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{0 + 2y + 0}{0 + 0 - 2 - e^z}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{2x + 0 + 0 - 0}{0 + 0 - 2 - e^z} = -\frac{2x}{-2 - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{0 + 2y + 0 - 0}{0 + 0 - 2 - e^z}\end{aligned}$$

例 设 $z = f(x, y)$ 满足 $x^2 + y^2 - 2z = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z - e^z$, 则 $F(x, y, z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_x}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{2x + 0 + 0 - 0}{0 + 0 - 2 - e^z} = -\frac{2x}{-2 - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_y}{(x^2 + y^2 - 2z - e^z)'_z} \\ &= -\frac{0 + 2y + 0 - 0}{0 + 0 - 2 - e^z} = -\frac{2y}{-2 - e^z}\end{aligned}$$