

第 03 周作业解答

练习 1. 设 $\vec{u} = \vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}$, $\vec{v} = -\vec{a} + 3\vec{b} + \vec{c}$. 试用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示 $2\vec{u} - 3\vec{v}$.

解

$$2\vec{u} - 3\vec{v} = 2(\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}) - 3(-\vec{a} + 3\vec{b} + \vec{c}) = 5\vec{a} - 11\vec{b} + \vec{c}$$

练习 2. 把 $\triangle ABC$ 的 BC 边四等分, 设等分点依次为 D_1, D_2, D_3 . 试以 $\overrightarrow{AB} = \vec{c}, \overrightarrow{BC} = \vec{a}$ 表示向量 $\overrightarrow{D_1A}, \overrightarrow{D_2A}$ 和 $\overrightarrow{D_3A}$.

解

$$\begin{aligned}\overrightarrow{D_1A} &= \overrightarrow{D_1B} + \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{BD_1} - \overrightarrow{AB} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AB} = -\frac{1}{4}\vec{a} - \vec{c}, \\ \overrightarrow{D_2A} &= \overrightarrow{D_2B} + \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{BD_2} - \overrightarrow{AB} = -\frac{2}{4}\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AB} = -\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{c}, \\ \overrightarrow{D_3A} &= \overrightarrow{D_3B} + \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{BD_3} - \overrightarrow{AB} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AB} = -\frac{3}{4}\vec{a} - \vec{c}.\end{aligned}$$

练习 3. 已知两点 $A(1, -3, 7)$ 和 $B(-2, 5, 1)$. 求 \overrightarrow{AB} 坐标, 求模长 $|\overrightarrow{AB}|$, 求 \overrightarrow{AB} 的方向余弦, 求出 \overrightarrow{AB} 与 x, y, z 轴的夹角 α, β, γ (精确到小数点后一位). (需要用到计算器, 一些在线科学计算器, 如 <http://web2.0calc.com/>, 可能会帮到你)

解

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (-3, 8, -6) \\ |\overrightarrow{AB}| &= \sqrt{(-3)^2 + 8^2 + (-6)^2} = \sqrt{109} \\ (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) &= \frac{1}{|\overrightarrow{AB}|} \overrightarrow{AB} = \left(\frac{-3}{\sqrt{109}}, \frac{8}{\sqrt{109}}, \frac{-6}{\sqrt{109}} \right) \\ \alpha &= \cos^{-1}\left(\frac{-3}{\sqrt{109}}\right) \approx 106.7^\circ \\ \beta &= \cos^{-1}\left(\frac{8}{\sqrt{109}}\right) \approx 40.0^\circ \\ \gamma &= \cos^{-1}\left(\frac{-6}{\sqrt{109}}\right) \approx 125.1^\circ\end{aligned}$$

练习 4. 求点 (x, y, z) 关于 (1) 各坐标面; (2) 各坐标轴; (3) 坐标原点的对称点的坐标.

	关于 xoy 面	关于 $yo z$ 面	关于 zox 面	关于 x 轴	关于 y 轴	关于 z 轴	关于坐标原点
解	(x, y, z)	$(x, y, -z)$	$(-x, y, z)$	$(x, -y, z)$	$(x, -y, -z)$	$(-x, y, -z)$	$(-x, -y, -z)$

练习 5. 求出在 y 轴上的点 M , 其到点 $A(1, -3, 7)$ 和到点 $B(5, 7, -5)$ 的距离相等.

解设点 M 坐标为 $(0, y, 0)$, 则 $\overrightarrow{MA} = (1, -3-y, 7)$, $\overrightarrow{MB} = (5, 7-y, -5)$ 。所以

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{MA}| &= |\overrightarrow{MB}| &\Rightarrow 1 + (3+y)^2 + 7^2 &= 5^2 + (7-y)^2 + 5^2 \\ &&\Rightarrow y &= 2 \end{aligned}$$

所以点 M 坐标为 $(0, 2, 0)$ 。

练习 6. 设向量 \overrightarrow{AB} 在 x, y, z 轴上的投影分别是 4, -4, 7。假设点 B 为 $(2, -1, 7)$, 求出 A 点坐标。

解设点 A 坐标为 (x, y, z) , 则

$$\overrightarrow{AB} = (2-x, -1-y, 7-z) = (4, -4, 7),$$

所以

$$x = -2, y = 3, z = 0$$

练习 7. 设空间中三个点 $C(1, -1, 2)$, $A(3, 3, 1)$, $B(3, 1, 3)$ 。令 $\vec{a} = \overrightarrow{CA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{CB}$, θ 为 \vec{a} 和 \vec{b} 的夹角。求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$, θ , $\text{Prj}_{\vec{b}} \vec{a}$, $\vec{a} \times \vec{b}$ 及三角形 $\triangle ABC$ 的面积。

解 1. $\vec{a} = \overrightarrow{CA} = (2, 4, -1)$, $\vec{b} = \overrightarrow{CB} = (2, 2, 1)$

2. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 2 + 4 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 = 11$

3. $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{11}{3\sqrt{21}}$, 所以 $\theta = \arccos \frac{11}{3\sqrt{21}} = 36.9^\circ$

4. $\text{Prj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{11}{3}$

5.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 4 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \vec{k} = 6\vec{i} - 4\vec{j} - 4\vec{k} = (6, -4, -4)$$

6. $\triangle ABC$ 的面积 $= \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}| = \frac{1}{2} \sqrt{6^2 + (-4)^2 + (-4)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{68} = \sqrt{17}$

练习 8. 设 $\vec{c} = 2\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{d} = k\vec{a} + \vec{b}$ 。假设 $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$, 且 \vec{a} 和 \vec{b} 夹角 $\theta = \frac{1}{3}\pi$ 。试问:

1. k 为何值时, $\vec{c} \perp \vec{d}$?

2. k 为何值时, 以 \vec{c} , \vec{d} 为邻边的三角形面积为 6?

解 1. $\vec{c} \perp \vec{d}$ 当且仅当 $\vec{c} \cdot \vec{d} = 0$, 而

$$\begin{aligned} \vec{c} \cdot \vec{d} &= (2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (k\vec{a} + \vec{b}) = 2k\vec{a} \cdot \vec{a} + (2+k)\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} = 2k|\vec{a}|^2 + (2+k)|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \theta + |\vec{b}|^2 \\ &= 2k + (2+k) + 4 = 3k + 6 \end{aligned}$$

所以 $3k + 6 = 0$, $k = -2$ 。

2. 三角形面积 $= \frac{1}{2} |\vec{c} \times \vec{d}| = 6$, 所以 $|\vec{c} \times \vec{d}| = 12$ 。而

$$\begin{aligned} \vec{c} \times \vec{d} &= (2\vec{a} + \vec{b}) \times (k\vec{a} + \vec{b}) = 2k\vec{a} \times \vec{a} + 2\vec{a} \times \vec{b} + k\vec{b} \times \vec{a} + \vec{b} \times \vec{b} = (2-k)\vec{a} \times \vec{b}, \\ |\vec{c} \times \vec{d}| &= |(2-k)\vec{a} \times \vec{b}| = |2-k| \cdot |\vec{a} \times \vec{b}| = |2-k| \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \theta = |2-k| \cdot \sqrt{3}. \end{aligned}$$

所以 $|2-k| \cdot \sqrt{3} = 12$, $k = 2 \pm 4\sqrt{3}$ 。

练习 9. 设有三个向量 $\vec{a} = (2, -3, 1)$, $\vec{b} = (1, -2, 3)$ 和 $\vec{c} = (2, 1, 2)$ 。

1. 求向量 $\vec{a} \times \vec{b}$ 。

2. 假设向量 \vec{r} 与 \vec{a} 、 \vec{b} 都垂直, 且 $\text{Prj}_{\vec{c}}\vec{r} = 14$ 。求 \vec{r} 。

解 1.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \vec{k} = -7\vec{i} - 5\vec{j} - \vec{k} = (-7, -5, -1)$$

2. \vec{r} 平行于 $\vec{a} \times \vec{b}$, 可以设 $\vec{r} = (-7k, -5k, -k)$ 。

3.

$$14 = \text{Prj}_{\vec{c}}\vec{r} = \frac{\vec{c} \cdot \vec{r}}{|\vec{c}|} = \frac{-14k - 5k - 2k}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = -7k$$

所以 $k = -2$, $\vec{r} = (14, 10, 2)$ 。