

提要


1. 二元函数的

- 梯度
- 方向导数

2. 三元函数的


- 梯度
- 方向导数

梯度




定义 设 $f(x, y)$ 在平面区域 D 内具有一阶连续偏导数, 对于每一点 $p_0(x_0, y_0)$,

梯度




定义 设 $f(x, y)$ 在平面区域 D 内具有一阶连续偏导数, 对于每一点 $p_0(x_0, y_0)$,

梯度



定义 设 $f(x, y)$ 在平面区域 D 内具有一阶连续偏导数, 对于每一点 $p_0(x_0, y_0)$,

梯度




定义 设 $f(x, y)$ 在平面区域 D 内具有一阶连续偏导数, 对于每一点 $p_0(x_0, y_0)$, 定义向量

$$(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)),$$

称为 $f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处的**梯度**, 记为

$$\text{grad } f(x_0, y_0) \quad \text{或} \quad \nabla f(x_0, y_0)$$

梯度



定义 设 $f(x, y)$ 在平面区域 D 内具有一阶连续偏导数, 对于每一点 $p_0(x_0, y_0)$, 定义向量


$$(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)),$$

称为 $f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处的**梯度**, 记为

$$\text{grad } f(x_0, y_0) \quad \text{或} \quad \nabla f(x_0, y_0)$$

例 设 $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$, 求 ∇f

梯度



定义 设 $f(x, y)$ 在平面区域 D 内具有一阶连续偏导数, 对于每一点 $p_0(x_0, y_0)$, 定义向量

$$(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)),$$


称为 $f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处的**梯度**, 记为

$$\text{grad } f(x_0, y_0) \quad \text{或} \quad \nabla f(x_0, y_0)$$

例 设 $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$, 求 ∇f

解 $\nabla f = (f_x, f_y) = (\quad , \quad)$

梯度



定义 设 $f(x, y)$ 在平面区域 D 内具有一阶连续偏导数, 对于每一点 $p_0(x_0, y_0)$, 定义向量

$$(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)),$$


称为 $f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处的**梯度**, 记为

$$\text{grad } f(x_0, y_0) \quad \text{或} \quad \nabla f(x_0, y_0)$$

例 设 $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$, 求 ∇f

解 $\nabla f = (f_x, f_y) = \left(\frac{x}{2}, \quad \right)$

梯度



定义 设 $f(x, y)$ 在平面区域 D 内具有一阶连续偏导数, 对于每一点 $p_0(x_0, y_0)$, 定义向量

$$(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)),$$

称为 $f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处的**梯度**, 记为


$$\text{grad } f(x_0, y_0) \quad \text{或} \quad \nabla f(x_0, y_0)$$

例 设 $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$, 求 ∇f


解 $\nabla f = (f_x, f_y) = (\frac{x}{2}, 2y)$

例 设 $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$, 则 $\nabla f(x, y) = (\frac{x}{2}, 2y)$


例 设 $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$, 则 $\nabla f(x, y) = (\frac{x}{2}, 2y)$




例 设 $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$, 则 $\nabla f(x, y) = (\frac{x}{2}, 2y)$



例 设 $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$, 则 $\nabla f(x, y) = (\frac{x}{2}, 2y)$




例 设 $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$, 则 $\nabla f(x, y) = (\frac{x}{2}, 2y)$



- 梯度 ∇f 是一个向量场


例 设 $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$, 则 $\nabla f(x, y) = (\frac{x}{2}, 2y)$




- 梯度 ∇f 是一个向量场
- 反过来, 向量场并不总是某个函数的梯度!

例 向量场 $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$, 不是任何函数的梯度


例 向量场 $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$, 不是任何函数的梯度




例 向量场 $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$, 不是任何函数的梯度



例 向量场 $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$, 不是任何函数的梯度




例 向量场 $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$, 不是任何函数的梯度



证明 若 $F(x, y) = (y, -\sin(xy)) = \nabla f = (f_x, f_y)$, 则


例 向量场 $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$, 不是任何函数的梯度



证明 若 $F(x, y) = (y, -\sin(xy)) = \nabla f = (f_x, f_y)$, 则

$$f_x = y, \quad f_y = -\sin(xy)$$

例 向量场 $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$, 不是任何函数的梯度




证明 若 $F(x, y) = (y, -\sin(xy)) = \nabla f = (f_x, f_y)$, 则

$$f_x = y, \quad f_y = -\sin(xy)$$

$$f_{xy} = \quad, \quad f_{yx} =$$

例 向量场 $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$, 不是任何函数的梯度




证明 若 $F(x, y) = (y, -\sin(xy)) = \nabla f = (f_x, f_y)$, 则

$$f_x = y, \quad f_y = -\sin(xy)$$

$$f_{xy} = 1, \quad f_{yx} =$$

例 向量场 $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$, 不是任何函数的梯度




证明 若 $F(x, y) = (y, -\sin(xy)) = \nabla f = (f_x, f_y)$, 则

$$f_x = y, \quad f_y = -\sin(xy)$$

$$f_{xy} = 1, \quad f_{yx} = -y \cos(xy)$$

例 向量场 $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$, 不是任何函数的梯度




证明 若 $F(x, y) = (y, -\sin(xy)) = \nabla f = (f_x, f_y)$, 则

$$f_x = y, \quad f_y = -\sin(xy)$$

$$f_{xy} = 1, \quad f_{yx} = -y \cos(xy) \Rightarrow f_{xy} \neq f_{yx}$$

例 向量场 $F(x, y) = (y, -\sin(xy))$, 不是任何函数的梯度




证明 若 $F(x, y) = (y, -\sin(xy)) = \nabla f = (f_x, f_y)$, 则

$$f_x = y, \quad f_y = -\sin(xy)$$


$$f_{xy} = 1, \quad f_{yx} = -y \cos(xy) \Rightarrow f_{xy} \neq f_{yx}$$

不可能


方向导数




方向导数




方向导数



方向导数




方向导数



$z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} :=$$


方向导数



$z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} :=$$


方向导数



$z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} : =$$


方向导数



$z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} := \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t}$$


方向导数



$z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} := \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t}$$

方向导数




$z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} := \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t}$$

$$f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha)$$


方向导数



$z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的变化率，即方向导数：

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} &:= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t} \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) \end{aligned}$$

方向导数




$z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 \mathbf{l} 的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}} \right|_{(x_0, y_0)} := \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t}$$

$$= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha)$$

$$= f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \sin \alpha$$

方向导数



$z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的变化率，即方向导数：


$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} := \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t}$$

$$= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha)$$

$$= f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \sin \alpha$$

$$= \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{e}_l$$

方向导数



$z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的变化率，即方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} := \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t}$$


$$= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha)$$

$$= f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \sin \alpha$$

$$= \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{e}_l = |\nabla f| \cos \theta$$


- $z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 ℓ 的方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_\ell = |\nabla f| \cos \theta$$




- $z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的**方向导数**：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_l = |\nabla f| \cos \theta$$




例 求 $z = xe^{2y}$ 在点 $p(1, 0)$ 处，往点 $q(2, -1)$ 方向上的方向导数。



- $z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_l = |\nabla f| \cos \theta$$



例 求 $z = xe^{2y}$ 在点 $p(1, 0)$ 处，往点 $q(2, -1)$ 方向上的方向导数。


解 1. 方向 $l = \overrightarrow{pq} = (\quad)$ ，对应单位向量 $e_l = (\quad)$

2. 计算梯度

$$\nabla z = (z_x, z_y) =$$


3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(1, 0)} = \nabla z(1, 0) \cdot e_l =$$



- $z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_l = |\nabla f| \cos \theta$$



例 求 $z = xe^{2y}$ 在点 $p(1, 0)$ 处，往点 $q(2, -1)$ 方向上的方向导数。


解 1. 方向 $l = \overrightarrow{pq} = (1, -1)$ ，对应单位向量 $e_l = (\quad)$

2. 计算梯度

$$\nabla z = (z_x, z_y) =$$


3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(1, 0)} = \nabla z(1, 0) \cdot e_l =$$



- $z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_l = |\nabla f| \cos \theta$$



例 求 $z = xe^{2y}$ 在点 $p(1, 0)$ 处，往点 $q(2, -1)$ 方向上的方向导数。


解 1. 方向 $l = \overrightarrow{pq} = (1, -1)$ ，对应单位向量 $e_l = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$

2. 计算梯度

$$\nabla z = (z_x, z_y) =$$


3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(1, 0)} = \nabla z(1, 0) \cdot e_l =$$



- $z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_l = |\nabla f| \cos \theta$$



例 求 $z = xe^{2y}$ 在点 $p(1, 0)$ 处，往点 $q(2, -1)$ 方向上的方向导数。


解 1. 方向 $l = \overrightarrow{pq} = (1, -1)$ ，对应单位向量 $e_l = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$

2. 计算梯度

$$\nabla z = (z_x, z_y) = (e^{2y}, 2xe^{2y})$$


3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(1, 0)} = \nabla z(1, 0) \cdot e_l =$$



- $z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_l = |\nabla f| \cos \theta$$



例 求 $z = xe^{2y}$ 在点 $p(1, 0)$ 处，往点 $q(2, -1)$ 方向上的方向导数。


解 1. 方向 $l = \overrightarrow{pq} = (1, -1)$ ，对应单位向量 $e_l = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$

2. 计算梯度

$$\nabla z = (z_x, z_y) = (e^{2y}, 2xe^{2y})$$


3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(1, 0)} = \nabla z(1, 0) \cdot e_l = (1, 2) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$



- $z = f(x, y)$ 在点 $p_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的方向导数：

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_l = |\nabla f| \cos \theta$$



例 求 $z = xe^{2y}$ 在点 $p(1, 0)$ 处，往点 $q(2, -1)$ 方向上的方向导数。


解 1. 方向 $l = \overrightarrow{pq} = (1, -1)$ ，对应单位向量 $e_l = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$

2. 计算梯度


$$\nabla z = (z_x, z_y) = (e^{2y}, 2xe^{2y})$$

3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(1, 0)} = \nabla z(1, 0) \cdot e_l = (1, 2) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$




- $$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$$




- $$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$$

假设 $\nabla f \neq 0$,




- $$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$$

假设 $\nabla f \neq 0$, 令 $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$



- $\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$

假设 $\nabla f \neq 0$, 令 $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$




- 当 $\theta = 0$ 时,

- 当 $\theta = \pi$ 时,

- 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时,

- $\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$

假设 $\nabla f \neq 0$, 令 $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$




- 当 $\theta = 0$ 时, $e_\ell = \vec{n}$,

- 当 $\theta = \pi$ 时,

- 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时,

- $$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$$

假设 $\nabla f \neq 0$, 令 $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$



- 当 $\theta = 0$ 时, $e_\ell = \vec{n}$, 并且方向导数达到最大值:


$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| > 0,$$

- 当 $\theta = \pi$ 时,

- 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时,

- $\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$

假设 $\nabla f \neq 0$, 令 $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$



- 当 $\theta = 0$ 时, $e_\ell = \vec{n}$, 并且方向导数达到最大值:


$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| > 0, \text{ 说明沿梯度方向, 函数增速最快}$$

- 当 $\theta = \pi$ 时,

- 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时,

- $\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$

假设 $\nabla f \neq 0$, 令 $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$



- 当 $\theta = 0$ 时, $e_\ell = \vec{n}$, 并且方向导数达到最大值:


$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| > 0, \text{ 说明沿梯度方向, 函数增速最快}$$

- 当 $\theta = \pi$ 时, $e_\ell = -\vec{n}$,

- 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时,

- $$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$$

假设 $\nabla f \neq 0$, 令 $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$



- 当 $\theta = 0$ 时, $e_\ell = \vec{n}$, 并且方向导数达到最大值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| > 0, \text{ 说明沿梯度方向, 函数增速最快}$$


- 当 $\theta = \pi$ 时, $e_\ell = -\vec{n}$, 并且方向导数达到最小值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = -|\nabla f(x_0, y_0)| < 0,$$

- 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时,

- $$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$$

假设 $\nabla f \neq 0$, 令 $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$



- 当 $\theta = 0$ 时, $e_\ell = \vec{n}$, 并且方向导数达到最大值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| > 0, \text{ 说明沿梯度方向, 函数增速最快}$$


- 当 $\theta = \pi$ 时, $e_\ell = -\vec{n}$, 并且方向导数达到最小值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = -|\nabla f(x_0, y_0)| < 0, \text{ 说明沿梯度反方向, 函数减速最快}$$

- 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时,

- $$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$$

假设 $\nabla f \neq 0$, 令 $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$



- 当 $\theta = 0$ 时, $e_\ell = \vec{n}$, 并且方向导数达到最大值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| > 0, \text{ 说明沿梯度方向, 函数增速最快}$$


- 当 $\theta = \pi$ 时, $e_\ell = -\vec{n}$, 并且方向导数达到最小值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = -|\nabla f(x_0, y_0)| < 0, \text{ 说明沿梯度反方向, 函数减速最快}$$

- 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $e_\ell \perp \vec{n}$,

- $$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$$

假设 $\nabla f \neq 0$, 令 $\vec{n} := \frac{1}{|\nabla f|} \nabla f$



- 当 $\theta = 0$ 时, $e_\ell = \vec{n}$, 并且方向导数达到最大值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| > 0, \text{ 说明沿梯度方向, 函数增速最快}$$


- 当 $\theta = \pi$ 时, $e_\ell = -\vec{n}$, 并且方向导数达到最小值:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = -|\nabla f(x_0, y_0)| < 0, \text{ 说明沿梯度反方向, 函数减速最快}$$


- 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $e_\ell \perp \vec{n}$, 并且方向导数为零: $\left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0)} = 0$.

例 函数 $z = x^2 - y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？

例 函数 $z = x^2 - y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？




例 函数 $z = x^2 - y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



解 梯度 $\nabla z = (2x, -2y)$,


例 函数 $z = x^2 - y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



解 梯度 $\nabla z = (2x, -2y)$,

- 沿方向 $\nabla z(0, 1) = (\quad)$ 增加最快
- 沿方向 $-\nabla z(0, 1) = (\quad)$ 减少最快


例 函数 $z = x^2 - y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



解 梯度 $\nabla z = (2x, -2y)$ ，所以在点 $(0, 1)$ 时，

- 沿方向 $\nabla z(0, 1) = (0, -2)$ 增加最快
- 沿方向 $-\nabla z(0, 1) = (0, 2)$ 减少最快


例 函数 $z = x^2 - y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



解 梯度 $\nabla z = (2x, -2y)$ ，所以在点 $(0, 1)$ 时，

- 沿方向 $\nabla z(0, 1) = (0, -2)$ 增加最快
- 沿方向 $-\nabla z(0, 1) = (0, 2)$ 减少最快


例 函数 $z = x^2 - y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



解 梯度 $\nabla z = (2x, -2y)$ ，所以在点 $(0, 1)$ 时，

- 沿方向 $\nabla z(0, 1) = (0, -2)$ 增加最快
- 沿方向 $-\nabla z(0, 1) = (0, 2)$ 减少最快


例 函数 $z = x^2 - y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



解 梯度 $\nabla z = (2x, -2y)$ ，所以在点 $(0, 1)$ 时，

- 沿方向 $\nabla z(0, 1) = (0, -2)$ 增加最快
- 沿方向 $-\nabla z(0, 1) = (0, 2)$ 减少最快


例 函数 $z = x^2 - y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



解 梯度 $\nabla z = (2x, -2y)$ ，所以在点 $(0, 1)$ 时，

- 沿方向 $\nabla z(0, 1) = (0, -2)$ 增加最快
- 沿方向 $-\nabla z(0, 1) = (0, 2)$ 减少最快


例 函数 $z = x^2 - y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



解 梯度 $\nabla z = (2x, -2y)$ ，所以在点 $(0, 1)$ 时，

- 沿方向 $\nabla z(0, 1) = (0, -2)$ 增加最快
- 沿方向 $-\nabla z(0, 1) = (0, 2)$ 减少最快

例 函数 $z = x^2 - y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处沿什么方向，其增加、减少的速度最大？



解 梯度 $\nabla z = (2x, -2y)$ ，所以在点 $(0, 1)$ 时，

- 沿方向 $\nabla z(0, 1) = (0, -2)$ 增加最快
- 沿方向 $-\nabla z(0, 1) = (0, 2)$ 减少最快

三元函数梯度

- 三元函数 $z = f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的梯度:

三元函数梯度

- 三元函数 $z = f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的梯度:

$$\left(f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0) \right)$$

三元函数梯度

- 三元函数 $z = f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的梯度:

$$\begin{aligned} & f_x(x_0, y_0, z_0) \vec{i} + f_y(x_0, y_0, z_0) \vec{j} + f_z(x_0, y_0, z_0) \vec{k} \\ &= \left(f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0) \right) \end{aligned}$$

三元函数梯度

- 三元函数 $z = f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的梯度:

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} f(x_0, y_0, z_0) &\stackrel{\text{或}}{=} \nabla f(x_0, y_0, z_0) \\&= f_x(x_0, y_0, z_0) \vec{i} + f_y(x_0, y_0, z_0) \vec{j} + f_z(x_0, y_0, z_0) \vec{k} \\&= \left(f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0) \right)\end{aligned}$$

三元函数梯度

- 三元函数 $z = f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的梯度:

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} f(x_0, y_0, z_0) &\stackrel{\text{或}}{=} \nabla f(x_0, y_0, z_0) \\&= f_x(x_0, y_0, z_0) \vec{i} + f_y(x_0, y_0, z_0) \vec{j} + f_z(x_0, y_0, z_0) \vec{k} \\&= \left(f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0) \right)\end{aligned}$$

例 设 $f(x, y, z) = e^{xy} \sin z$, 计算 ∇f 。

三元函数梯度

- 三元函数 $z = f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的梯度:

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} f(x_0, y_0, z_0) &\stackrel{\text{或}}{=} \nabla f(x_0, y_0, z_0) \\&= f_x(x_0, y_0, z_0) \vec{i} + f_y(x_0, y_0, z_0) \vec{j} + f_z(x_0, y_0, z_0) \vec{k} \\&= \left(f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0) \right)\end{aligned}$$

例 设 $f(x, y, z) = e^{xy} \sin z$, 计算 ∇f 。

解 f 的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (\quad \quad \quad)$$

三元函数梯度

- 三元函数 $z = f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的梯度:

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} f(x_0, y_0, z_0) &\stackrel{\text{或}}{=} \nabla f(x_0, y_0, z_0) \\&= f_x(x_0, y_0, z_0) \vec{i} + f_y(x_0, y_0, z_0) \vec{j} + f_z(x_0, y_0, z_0) \vec{k} \\&= \left(f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0) \right)\end{aligned}$$

例 设 $f(x, y, z) = e^{xy} \sin z$, 计算 ∇f 。

解 f 的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (ye^{xy} \sin z, \quad \quad \quad)$$

三元函数梯度

- 三元函数 $z = f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的梯度:

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} f(x_0, y_0, z_0) &\stackrel{\text{或}}{=} \nabla f(x_0, y_0, z_0) \\&= f_x(x_0, y_0, z_0) \vec{i} + f_y(x_0, y_0, z_0) \vec{j} + f_z(x_0, y_0, z_0) \vec{k} \\&= \left(f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0) \right)\end{aligned}$$

例 设 $f(x, y, z) = e^{xy} \sin z$, 计算 ∇f 。

解 f 的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (ye^{xy} \sin z, xe^{xy} \sin z, \quad)$$

三元函数梯度

- 三元函数 $z = f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的梯度:

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} f(x_0, y_0, z_0) &\stackrel{\text{或}}{=} \nabla f(x_0, y_0, z_0) \\&= f_x(x_0, y_0, z_0) \vec{i} + f_y(x_0, y_0, z_0) \vec{j} + f_z(x_0, y_0, z_0) \vec{k} \\&= \left(f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0) \right)\end{aligned}$$

例 设 $f(x, y, z) = e^{xy} \sin z$, 计算 ∇f 。

解 f 的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (ye^{xy} \sin z, xe^{xy} \sin z, e^{xy} \cos z)$$

当 $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 时, 则函数在点 (x_0, y_0, z_0) 处,

当 $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 时, 则函数在点 (x_0, y_0, z_0) 处,

- 沿梯度方向, 增加速度最快,
- 沿梯度反方向, 减少速度最快,
- 梯度垂直方向, 其改变率为零

当 $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 时, 则函数在点 (x_0, y_0, z_0) 处,

- 沿梯度方向, 增加速度最快, 达到 $|\nabla f(x_0, y_0, z_0)|$
- 沿梯度反方向, 减少速度最快,
- 梯度垂直方向, 其改变率为零

当 $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 时, 则函数在点 (x_0, y_0, z_0) 处,

- 沿梯度方向, 增加速度最快, 达到 $|\nabla f(x_0, y_0, z_0)|$
- 沿梯度反方向, 减少速度最快, 达到 $-|\nabla f(x_0, y_0, z_0)|$
- 梯度垂直方向, 其改变率为零

例 设 $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$, $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问: f 在 p_0 点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

例 设 $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$, $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问: f 在 p_0 点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1. f 的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (\quad \quad \quad)$$

例 设 $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$, $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问: f 在 p_0 点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1. f 的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, \quad \quad \quad)$$

例 设 $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$, $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问: f 在 p_0 点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1. f 的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

例 设 $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$, $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问: f 在 p_0 点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1. f 的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

例 设 $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$, $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问: f 在 p_0 点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1. f 的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

所以 $\nabla f(0.5, 0.5, 1) =$

例 设 $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$, $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问: f 在 p_0 点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1. f 的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

$$\text{所以 } \nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$$

例 设 $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$, $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问: f 在 p_0 点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1. f 的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

所以 $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$

2. 函数沿梯度方向 $\nabla f(0.5, 0.5, 1)$, 增加速度最大, 达到 $|\nabla f(x_0, y_0)|$

例 设 $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$, $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问: f 在 p_0 点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1. f 的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

所以 $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$

2. 函数沿梯度方向 $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$, 增加速度最大, 达到 $|\nabla f(x_0, y_0)|$

例 设 $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$, $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问: f 在 p_0 点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1. f 的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

所以 $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$

2. 函数沿梯度方向 $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$, 增加速度最大, 达到 $|\nabla f(x_0, y_0)| = \sqrt{1.5}$

例 设 $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$, $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问: f 在 p_0 点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1. f 的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

所以 $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$

2. 函数沿梯度方向 $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$, 增加速度最大, 达到 $|\nabla f(x_0, y_0)| = \sqrt{1.5}$

3. 函数沿梯度反方向 $-\nabla f(0.5, 0.5, 1)$, 减少速度最大, 达到 $-|\nabla f(x_0, y_0)|$

例 设 $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$, $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问: f 在 p_0 点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1. f 的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

所以 $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$

2. 函数沿梯度方向 $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$, 增加速度最大, 达到 $|\nabla f(x_0, y_0)| = \sqrt{1.5}$

3. 函数沿梯度反方向 $-\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (0.5, -0.5, -1)$, 减少速度最大, 达到 $-\nabla f(x_0, y_0)|$

例 设 $f(x, y, z) = -x^3 + xy^2 + z$, $p_0(0.5, 0.5, 1)$ 。问: f 在 p_0 点沿什么方向变化最快, 变化率是多少?

解 1. f 的梯度是

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) = (-3x^2 + y^2, 2xy, 1)$$

所以 $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$

2. 函数沿梯度方向 $\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (-0.5, 0.5, 1)$, 增加速度最大, 达到 $|\nabla f(x_0, y_0)| = \sqrt{1.5}$

3. 函数沿梯度反方向 $-\nabla f(0.5, 0.5, 1) = (0.5, -0.5, -1)$, 减少速度最大, 达到 $-|\nabla f(x_0, y_0)| = -\sqrt{1.5}$

设三元函数 $f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的一个邻域内有定义, 设 ℓ 是从 p_0 出发的射线, 方向向量为

$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

设三元函数 $f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的一个邻域内有定义, 设 ℓ 是从 p_0 出发的射线, 方向向量为

$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则 $f(x, y, z)$ 在点 p_0 处沿方向 ℓ 的变化率, 即方向导数, 为

设三元函数 $f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的一个邻域内有定义, 设 ℓ 是从 p_0 出发的射线, 方向向量为

$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则 $f(x, y, z)$ 在点 p_0 处沿方向 ℓ 的变化率, 即方向导数, 为

$$\frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t}$$

设三元函数 $f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的一个邻域内有定义, 设 l 是从 p_0 出发的射线, 方向向量为

$$e_l = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则 $f(x, y, z)$ 在点 p_0 处沿方向 l 的变化率, 即方向导数, 为

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t}$$

设三元函数 $f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的一个邻域内有定义, 设 ℓ 是从 p_0 出发的射线, 方向向量为

$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则 $f(x, y, z)$ 在点 p_0 处沿方向 ℓ 的变化率, 即方向导数, 为

$$\begin{aligned} & \left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} : \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} \end{aligned}$$

设三元函数 $f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的一个邻域内有定义, 设 ℓ 是从 p_0 出发的射线, 方向向量为

$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则 $f(x, y, z)$ 在点 p_0 处沿方向 ℓ 的变化率, 即方向导数, 为

$$\begin{aligned} & \left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} : \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} \\ & \quad f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) \end{aligned}$$

设三元函数 $f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的一个邻域内有定义, 设 ℓ 是从 p_0 出发的射线, 方向向量为

$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则 $f(x, y, z)$ 在点 p_0 处沿方向 ℓ 的变化率, 即方向导数, 为

$$\begin{aligned} & \left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} : \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) \end{aligned}$$

设三元函数 $f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的一个邻域内有定义, 设 ℓ 是从 p_0 出发的射线, 方向向量为

$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则 $f(x, y, z)$ 在点 p_0 处沿方向 ℓ 的变化率, 即方向导数, 为

$$\begin{aligned} & \left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} : \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) \\ &= f_x(x_0, y_0, z_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0, z_0) \cos \beta + f_z(x_0, y_0, z_0) \cos \gamma \end{aligned}$$

设三元函数 $f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的一个邻域内有定义, 设 ℓ 是从 p_0 出发的射线, 方向向量为

$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则 $f(x, y, z)$ 在点 p_0 处沿方向 ℓ 的变化率, 即方向导数, 为

$$\begin{aligned} & \left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} : \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) \\ &= f_x(x_0, y_0, z_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0, z_0) \cos \beta + f_z(x_0, y_0, z_0) \cos \gamma \\ &= \nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot e_\ell \end{aligned}$$

设三元函数 $f(x, y, z)$ 在点 $p_0(x_0, y_0, z_0)$ 的一个邻域内有定义, 设 ℓ 是从 p_0 出发的射线, 方向向量为


$$e_\ell = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$


则 $f(x, y, z)$ 在点 p_0 处沿方向 ℓ 的变化率, 即方向导数, 为

$$\begin{aligned} & \left. \frac{\partial f}{\partial \ell} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} : \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) \\ &= f_x(x_0, y_0, z_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0, z_0) \cos \beta + f_z(x_0, y_0, z_0) \cos \gamma \\ &= \nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot e_\ell = |\nabla f| \cos \theta \end{aligned}$$

其中 θ 是 $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$ 与 e_ℓ 的夹角

例 求 $u = xyz$ 在点 $p(5, 1, 2)$ 处，往点 $q(9, 4, 14)$ 方向上的方向导数。





例 求 $u = xyz$ 在点 $p(5, 1, 2)$ 处, 往点 $q(9, 4, 14)$ 方向上的方向导数。

解 1. 方向 $l = \overrightarrow{pq} = (\quad)$, 对应单位向量 $e_l = (\quad)$


2. 计算梯度

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) =$$

3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{(1,0)} = \nabla u(5, 1, 2) \cdot e_l =$$

例 求 $u = xyz$ 在点 $p(5, 1, 2)$ 处, 往点 $q(9, 4, 14)$ 方向上的方向导数。



解 1. 方向 $\ell = \overrightarrow{pq} = (4, 3, 12)$, 对应单位向量 $e_\ell = (\quad)$


2. 计算梯度

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) =$$

3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \ell} \right|_{(1,0)} = \nabla u(5, 1, 2) \cdot e_\ell =$$

例 求 $u = xyz$ 在点 $p(5, 1, 2)$ 处, 往点 $q(9, 4, 14)$ 方向上的方向导数。



解 1. 方向 $\ell = \overrightarrow{pq} = (4, 3, 12)$, 对应单位向量 $e_\ell = (\frac{4}{13}, \frac{3}{13}, \frac{12}{13})$


2. 计算梯度

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) =$$

3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \ell} \right|_{(1,0)} = \nabla u(5, 1, 2) \cdot e_\ell =$$

例 求 $u = xyz$ 在点 $p(5, 1, 2)$ 处, 往点 $q(9, 4, 14)$ 方向上的方向导数。



解 1. 方向 $\ell = \overrightarrow{pq} = (4, 3, 12)$, 对应单位向量 $e_\ell = (\frac{4}{13}, \frac{3}{13}, \frac{12}{13})$


2. 计算梯度

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (yz, xz, xy)$$

3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \ell} \right|_{(1,0)} = \nabla u(5, 1, 2) \cdot e_\ell =$$

例 求 $u = xyz$ 在点 $p(5, 1, 2)$ 处, 往点 $q(9, 4, 14)$ 方向上的方向导数。



解 1. 方向 $\ell = \overrightarrow{pq} = (4, 3, 12)$, 对应单位向量 $e_\ell = (\frac{4}{13}, \frac{3}{13}, \frac{12}{13})$


2. 计算梯度

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (yz, xz, xy)$$

3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \ell} \right|_{(1,0)} = \nabla u(5, 1, 2) \cdot e_\ell = (2, 10, 5) \cdot \left(\frac{4}{13}, \frac{3}{13}, \frac{12}{13} \right)$$

例 求 $u = xyz$ 在点 $p(5, 1, 2)$ 处, 往点 $q(9, 4, 14)$ 方向上的方向导数。



解 1. 方向 $\ell = \overrightarrow{pq} = (4, 3, 12)$, 对应单位向量 $e_\ell = (\frac{4}{13}, \frac{3}{13}, \frac{12}{13})$

2. 计算梯度

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (yz, xz, xy)$$

3. 方向导数

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \ell} \right|_{(1,0)} = \nabla u(5, 1, 2) \cdot e_\ell = (2, 10, 5) \cdot \left(\frac{4}{13}, \frac{3}{13}, \frac{12}{13} \right) = \frac{98}{13}$$

例 求 $u = xy^2z$ 在点 $p(1, -1, 2)$ 处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

例 求 $u = xy^2z$ 在点 $p(1, -1, 2)$ 处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

解 1. u 的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (\quad \quad \quad)$$

例 求 $u = xy^2z$ 在点 $p(1, -1, 2)$ 处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

解 1. u 的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, \quad \quad \quad)$$

例 求 $u = xy^2z$ 在点 $p(1, -1, 2)$ 处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

解 1. u 的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, \quad)$$

例 求 $u = xy^2z$ 在点 $p(1, -1, 2)$ 处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

解 1. u 的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

例 求 $u = xy^2z$ 在点 $p(1, -1, 2)$ 处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

解 1. u 的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向 $\nabla u(1, -1, 2) =$ 增加最快。

例 求 $u = xy^2z$ 在点 $p(1, -1, 2)$ 处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

解 1. u 的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向 $\nabla u(1, -1, 2) = (2, -4, 1)$ 增加最快。

例 求 $u = xy^2z$ 在点 $p(1, -1, 2)$ 处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

解 1. u 的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向 $\nabla u(1, -1, 2) = (2, -4, 1)$ 增加最快。

2. 梯度方向的单位化向量是 $e = \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u$,

例 求 $u = xy^2z$ 在点 $p(1, -1, 2)$ 处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

解 1. u 的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向 $\nabla u(1, -1, 2) = (2, -4, 1)$ 增加最快。

2. 梯度方向的单位化向量是 $e = \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u$ ，所以沿梯度方向的方向导数是

例 求 $u = xy^2z$ 在点 $p(1, -1, 2)$ 处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

解 1. u 的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向 $\nabla u(1, -1, 2) = (2, -4, 1)$ 增加最快。

2. 梯度方向的单位化向量是 $e = \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u$ ，所以沿梯度方向的方向导数是

$$\nabla u \cdot e \Big|_{(1, -1, 2)}$$

例 求 $u = xy^2z$ 在点 $p(1, -1, 2)$ 处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

解 1. u 的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向 $\nabla u(1, -1, 2) = (2, -4, 1)$ 增加最快。

2. 梯度方向的单位化向量是 $e = \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u$ ，所以沿梯度方向的方向导数是

$$\nabla u \cdot e|_{(1, -1, 2)} = \nabla u \cdot \left(\frac{1}{|\nabla u|} \nabla u \right) |_{(1, -1, 2)}$$

例 求 $u = xy^2z$ 在点 $p(1, -1, 2)$ 处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

解 1. u 的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向 $\nabla u(1, -1, 2) = (2, -4, 1)$ 增加最快。

2. 梯度方向的单位化向量是 $e = \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u$ ，所以沿梯度方向的方向导数是

$$\begin{aligned}\nabla u \cdot e|_{(1, -1, 2)} &= \nabla u \cdot \left(\frac{1}{|\nabla u|} \nabla u \right) |_{(1, -1, 2)} \\ &= |\nabla u|_{(1, -1, 2)}\end{aligned}$$

例 求 $u = xy^2z$ 在点 $p(1, -1, 2)$ 处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

解 1. u 的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向 $\nabla u(1, -1, 2) = (2, -4, 1)$ 增加最快。

2. 梯度方向的单位化向量是 $e = \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u$ ，所以沿梯度方向的方向导数是

$$\begin{aligned}\nabla u \cdot e|_{(1, -1, 2)} &= \nabla u \cdot \left(\frac{1}{|\nabla u|} \nabla u \right) |_{(1, -1, 2)} \\ &= |\nabla u|_{(1, -1, 2)} = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 1^2}\end{aligned}$$

例 求 $u = xy^2z$ 在点 $p(1, -1, 2)$ 处增加最快的方向，并求沿这个方向的方向导数。

解 1. u 的梯度是

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (y^2z, 2xyz, xy^2)$$

函数沿梯度方向 $\nabla u(1, -1, 2) = (2, -4, 1)$ 增加最快。

2. 梯度方向的单位化向量是 $e = \frac{1}{|\nabla u|} \nabla u$ ，所以沿梯度方向的方向导数是

$$\begin{aligned}\nabla u \cdot e|_{(1, -1, 2)} &= \nabla u \cdot \left(\frac{1}{|\nabla u|} \nabla u \right) |_{(1, -1, 2)} \\ &= |\nabla u|_{(1, -1, 2)} = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 1^2} = \sqrt{21}\end{aligned}$$