



# Outline

---

1. 变量分离的一阶微分方程
2. 可分离变量的一阶微分方程
3. 齐次微分方程
4. 一阶线性微分方程

# We are here now...

---

1. 变量分离的一阶微分方程
2. 可分离变量的一阶微分方程
3. 齐次微分方程
4. 一阶线性微分方程

变量已分离的一阶微分方程：

$$g(y)dy = f(x)dx$$

变量已分离的一阶微分方程：

$$g(y)dy = f(x)dx \quad \Leftrightarrow \quad g(y)\frac{dy}{dx} = f(x)$$

变量已分离的一阶微分方程：

$$g(y)dy = f(x)dx \quad \Leftrightarrow \quad g(y)\frac{dy}{dx} = f(x) \quad \Leftrightarrow \quad g(y)y' = f(x)$$

## 变量已分离的一阶微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$

---

计算通解的方法:

$$g(y)dy = f(x)dx \implies$$

## 变量已分离的一阶微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$

计算通解的方法:

$$g(y)dy = f(x)dx \implies \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

$\implies$



## 变量已分离的一阶微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$

计算通解的方法:

$$g(y)dy = f(x)dx \implies \int g(y)dy = \int f(x)dx$$
$$\implies$$

其中  $F(x)$ ,  $G(y)$  分别是  $f(x)$ ,  $g(y)$  的一个原函数,

## 变量已分离的一阶微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$

计算通解的方法:

$$g(y)dy = f(x)dx \implies \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

$$\implies G(y) + C_1 = F(x) + C_2$$

$$\implies$$

其中  $F(x)$ ,  $G(y)$  分别是  $f(x)$ ,  $g(y)$  的一个原函数,

## 变量已分离的一阶微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$

计算通解的方法:

$$g(y)dy = f(x)dx \implies \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

$$\implies G(y) + C_1 = F(x) + C_2$$

$$\implies G(y) = F(x) + C$$

其中  $F(x)$ ,  $G(y)$  分别是  $f(x)$ ,  $g(y)$  的一个原函数,  $C = C_2 - C_1$

## 变量已分离的一阶微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$

计算通解的方法:

$$g(y)dy = f(x)dx \implies \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

$$\implies G(y) + C_1 = F(x) + C_2$$

$$\implies G(y) = F(x) + C \quad (\text{不必写成 } y = y(x))$$

其中  $F(x)$ ,  $G(y)$  分别是  $f(x)$ ,  $g(y)$  的一个原函数,  $C = C_2 - C_1$

## 变量已分离的一阶微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$

---

计算通解的方法:

$$g(y)dy = f(x)dx \implies \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

$$\implies G(y) + C_1 = F(x) + C_2$$

$$\implies G(y) = F(x) + C \quad (\text{不必写成 } y = y(x))$$

其中  $F(x)$ ,  $G(y)$  分别是  $f(x)$ ,  $g(y)$  的一个原函数,  $C = C_2 - C_1$

---

验证:

## 变量已分离的一阶微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$

---

计算通解的方法:

$$g(y)dy = f(x)dx \implies \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

$$\implies G(y) + C_1 = F(x) + C_2$$

$$\implies G(y) = F(x) + C \quad (\text{不必写成 } y = y(x))$$

其中  $F(x)$ ,  $G(y)$  分别是  $f(x)$ ,  $g(y)$  的一个原函数,  $C = C_2 - C_1$

---

验证: 对关系式

$$G(y(x)) = F(x) + C$$

两边求  $x$  关于的导数:

## 变量已分离的一阶微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$

---

计算通解的方法:

$$g(y)dy = f(x)dx \implies \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

$$\implies G(y) + C_1 = F(x) + C_2$$

$$\implies G(y) = F(x) + C \quad (\text{不必写成 } y = y(x))$$

其中  $F(x)$ ,  $G(y)$  分别是  $f(x)$ ,  $g(y)$  的一个原函数,  $C = C_2 - C_1$

---

验证: 对关系式

$$G(y(x)) = F(x) + C$$

两边求  $x$  关于的导数:

$$G'(y) \cdot$$

## 变量已分离的一阶微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$

---

计算通解的方法:

$$g(y)dy = f(x)dx \implies \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

$$\implies G(y) + C_1 = F(x) + C_2$$

$$\implies G(y) = F(x) + C \quad (\text{不必写成 } y = y(x))$$

其中  $F(x)$ ,  $G(y)$  分别是  $f(x)$ ,  $g(y)$  的一个原函数,  $C = C_2 - C_1$

---

验证: 对关系式

$$G(y(x)) = F(x) + C$$

两边求  $x$  关于的导数:

$$G'(y) \cdot y'$$



## 变量已分离的一阶微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$

---

计算通解的方法:

$$g(y)dy = f(x)dx \implies \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

$$\implies G(y) + C_1 = F(x) + C_2$$

$$\implies G(y) = F(x) + C \quad (\text{不必写成 } y = y(x))$$

其中  $F(x)$ ,  $G(y)$  分别是  $f(x)$ ,  $g(y)$  的一个原函数,  $C = C_2 - C_1$

---

验证: 对关系式

$$G(y(x)) = F(x) + C$$

两边求  $x$  关于的导数:

$$G'(y) \cdot y' = F'(x)$$

## 变量已分离的一阶微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$

---

计算通解的方法:

$$g(y)dy = f(x)dx \implies \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

$$\implies G(y) + C_1 = F(x) + C_2$$

$$\implies G(y) = F(x) + C \quad (\text{不必写成 } y = y(x))$$

其中  $F(x)$ ,  $G(y)$  分别是  $f(x)$ ,  $g(y)$  的一个原函数,  $C = C_2 - C_1$

---

验证: 对关系式

$$G(y(x)) = F(x) + C$$

两边求  $x$  关于的导数:

$$G'(y) \cdot y' = F'(x) \implies g(y)y'$$

## 变量已分离的一阶微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$

---

计算通解的方法:

$$g(y)dy = f(x)dx \implies \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

$$\implies G(y) + C_1 = F(x) + C_2$$

$$\implies G(y) = F(x) + C \quad (\text{不必写成 } y = y(x))$$

其中  $F(x)$ ,  $G(y)$  分别是  $f(x)$ ,  $g(y)$  的一个原函数,  $C = C_2 - C_1$

---

验证: 对关系式

$$G(y(x)) = F(x) + C$$

两边求  $x$  关于的导数:

$$G'(y) \cdot y' = F'(x) \implies g(y)y' = f(x)$$

## 变量已分离的一阶微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$

计算通解的方法:

$$g(y)dy = f(x)dx \implies \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

$$\implies G(y) + C_1 = F(x) + C_2$$

$$\implies G(y) = F(x) + C \quad (\text{不必写成 } y = y(x))$$

其中  $F(x)$ ,  $G(y)$  分别是  $f(x)$ ,  $g(y)$  的一个原函数,  $C = C_2 - C_1$

验证: 对关系式

$$G(y(x)) = F(x) + C$$

两边求  $x$  关于的导数:

$$G'(y) \cdot y' = F'(x) \implies g(y)y' = f(x) \implies y' = \frac{f(x)}{g(y)}$$

## 变量已分离的一阶微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$

计算通解的方法:

$$g(y)dy = f(x)dx \implies \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

$$\implies G(y) + C_1 = F(x) + C_2$$

$$\implies G(y) = F(x) + C \quad (\text{不必写成 } y = y(x))$$

其中  $F(x)$ ,  $G(y)$  分别是  $f(x)$ ,  $g(y)$  的一个原函数,  $C = C_2 - C_1$

验证: 对关系式

$$G(y(x)) = F(x) + C$$

两边求  $x$  关于的导数:

$$G'(y) \cdot y' = F'(x) \implies g(y)y' = f(x) \implies y' = \frac{f(x)}{g(y)}$$

$$\implies dy = \frac{f(x)}{g(y)} dx$$

## 变量已分离的一阶微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$

计算通解的方法:

$$g(y)dy = f(x)dx \implies \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

$$\implies G(y) + C_1 = F(x) + C_2$$

$$\implies G(y) = F(x) + C \quad (\text{不必写成 } y = y(x))$$

其中  $F(x)$ ,  $G(y)$  分别是  $f(x)$ ,  $g(y)$  的一个原函数,  $C = C_2 - C_1$

验证: 对关系式

$$G(y(x)) = F(x) + C$$

两边求  $x$  关于的导数:

$$G'(y) \cdot y' = F'(x) \implies g(y)y' = f(x) \implies y' = \frac{f(x)}{g(y)}$$

$$\implies dy = \frac{f(x)}{g(y)}dx \implies g(y)dy = f(x)dx$$

例 求  $(y + 1)dy = e^x dx$  的通解

解

例 求  $(y + 1)dy = e^x dx$  的通解

解 两边积分

$$\int (y + 1)dy = \int e^x dx \quad \Rightarrow$$



例 求  $(y + 1)dy = e^x dx$  的通解

解 两边积分

$$\int (y + 1)dy = \int e^x dx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 +$$

例 求  $(y + 1)dy = e^x dx$  的通解

解 两边积分

$$\int (y + 1)dy = \int e^x dx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 + y +$$

例 求  $(y + 1)dy = e^x dx$  的通解

解 两边积分

$$\int (y + 1)dy = \int e^x dx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 + y + C_1 =$$

例 求  $(y + 1)dy = e^x dx$  的通解

解 两边积分

$$\int (y + 1)dy = \int e^x dx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 + y + C_1 = e^x +$$

例 求  $(y + 1)dy = e^x dx$  的通解

解 两边积分

$$\int (y + 1)dy = \int e^x dx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 + y + C_1 = e^x + C_2$$

例 求  $(y + 1)dy = e^x dx$  的通解

解 两边积分

$$\begin{aligned}\int (y + 1)dy &= \int e^x dx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 + y + C_1 = e^x + C_2 \\ &\xRightarrow{C=C_2-C_1} \frac{1}{2}y^2 + y = e^x + C\end{aligned}$$

例 求  $(y + 1)dy = e^x dx$  的通解

解 两边积分

$$\int (y + 1)dy = \int e^x dx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 + y + C_1 = e^x + C_2$$
$$\xRightarrow{C=C_2-C_1} \frac{1}{2}y^2 + y = e^x + C$$

例 求  $ydy = xdx$  的通解

解

例 求  $(y + 1)dy = e^x dx$  的通解

解 两边积分

$$\begin{aligned}\int (y + 1)dy &= \int e^x dx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 + y + C_1 = e^x + C_2 \\ &\xRightarrow{C=C_2-C_1} \frac{1}{2}y^2 + y = e^x + C\end{aligned}$$

例 求  $ydy = xdx$  的通解

解 两边积分

$$\int ydy = \int xdx \quad \Rightarrow$$



例 求  $(y + 1)dy = e^x dx$  的通解

解 两边积分

$$\begin{aligned}\int (y + 1)dy &= \int e^x dx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 + y + C_1 = e^x + C_2 \\ &\xRightarrow{C=C_2-C_1} \frac{1}{2}y^2 + y = e^x + C\end{aligned}$$

例 求  $ydy = xdx$  的通解

解 两边积分

$$\int ydy = \int xdx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 + C_1 =$$

例 求  $(y + 1)dy = e^x dx$  的通解

解 两边积分

$$\begin{aligned}\int (y + 1)dy &= \int e^x dx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 + y + C_1 = e^x + C_2 \\ &\xRightarrow{C=C_2-C_1} \frac{1}{2}y^2 + y = e^x + C\end{aligned}$$

例 求  $ydy = xdx$  的通解

解 两边积分

$$\begin{aligned}\int ydy &= \int xdx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 + C_1 = \frac{1}{2}x^2 + C_2 \\ &\Rightarrow\end{aligned}$$

例 求  $(y + 1)dy = e^x dx$  的通解

解 两边积分

$$\begin{aligned}\int (y + 1)dy &= \int e^x dx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 + y + C_1 = e^x + C_2 \\ &\xRightarrow{C=C_2-C_1} \frac{1}{2}y^2 + y = e^x + C\end{aligned}$$

例 求  $ydy = xdx$  的通解

解 两边积分

$$\begin{aligned}\int ydy &= \int xdx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 + C_1 = \frac{1}{2}x^2 + C_2 \\ &\Rightarrow y^2 = x^2 + 2(C_2 - C_1) \\ &\Rightarrow\end{aligned}$$

例 求  $(y + 1)dy = e^x dx$  的通解

解 两边积分

$$\begin{aligned}\int (y + 1)dy &= \int e^x dx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 + y + C_1 = e^x + C_2 \\ &\stackrel{C=C_2-C_1}{\Rightarrow} \quad \frac{1}{2}y^2 + y = e^x + C\end{aligned}$$

例 求  $ydy = xdx$  的通解

解 两边积分

$$\begin{aligned}\int ydy &= \int xdx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}y^2 + C_1 = \frac{1}{2}x^2 + C_2 \\ &\Rightarrow \quad y^2 = x^2 + 2(C_2 - C_1) \\ &\Rightarrow \quad y^2 = x^2 + C\end{aligned}$$

# We are here now...

---

1. 变量分离的一阶微分方程
2. 可分离变量的一阶微分方程
3. 齐次微分方程
4. 一阶线性微分方程

## 可分离变量的一阶微分方程: $\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$

---

计算通解的方法:

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y) \implies$$

## 可分离变量的一阶微分方程: $\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$

---

计算通解的方法:

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y) \implies dy = f(x) \cdot g(y) dx$$

$\implies$

## 可分离变量的一阶微分方程： $\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$

---

计算通解的方法：

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y) \implies dy = f(x) \cdot g(y) dx$$

$$\implies \frac{1}{g(y)} dy = f(x) dx$$

$$\implies$$



## 可分离变量的一阶微分方程: $\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$

---

计算通解的方法:

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y) \implies dy = f(x) \cdot g(y) dx$$

$$\implies \frac{1}{g(y)} dy = f(x) dx$$

$$\implies \int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx$$

例 求  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=1} = 3$  下的特解

解

例 求  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=1} = 3$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \implies$$

例 求  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=1} = 3$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \implies ydy = -xdx \implies$$

例 求  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=1} = 3$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \implies ydy = -xdx \implies \int ydy = \int -xdx$$
$$\implies$$

例 求  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=1} = 3$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} &\implies ydy = -xdx \implies \int ydy = \int -xdx \\ &\implies \frac{1}{2}y^2 =\end{aligned}$$

例 求  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=1} = 3$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} &\implies ydy = -xdx \implies \int ydy = \int -xdx \\ &\implies \frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2}x^2 +\end{aligned}$$

例 求  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=1} = 3$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \implies ydy = -xdx \implies \int ydy = \int -xdx$$

$$\implies \frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2}x^2 + C_1$$

$$\implies$$



例 求  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=1} = 3$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \implies ydy = -xdx \implies \int ydy = \int -xdx$$

$$\implies \frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2}x^2 + C_1$$

$$\implies x^2 + y^2 = 2C_1$$

例 求  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=1} = 3$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \implies ydy = -xdx \implies \int ydy = \int -xdx$$

$$\implies \frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2}x^2 + C_1$$

$$\implies x^2 + y^2 = 2C_1 = C$$

例 求  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=1} = 3$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \implies ydy = -xdx \implies \int ydy = \int -xdx$$

$$\implies \frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2}x^2 + C_1$$

$$\implies x^2 + y^2 = 2C_1 = C$$

所以

- 通解为  $x^2 + y^2 = C$  ( $C$  为任意常数)

例 求  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=1} = 3$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \implies ydy = -xdx \implies \int ydy = \int -xdx$$

$$\implies \frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2}x^2 + C_1$$

$$\implies x^2 + y^2 = 2C_1 = C$$

所以

- 通解为  $x^2 + y^2 = C$  ( $C$  为任意常数)
- 当  $x = 1$  时  $y = 3$ , 则

例 求  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=1} = 3$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \implies ydy = -xdx \implies \int ydy = \int -xdx$$

$$\implies \frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2}x^2 + C_1$$

$$\implies x^2 + y^2 = 2C_1 = C$$

所以

- 通解为  $x^2 + y^2 = C$  ( $C$  为任意常数)
- 当  $x = 1$  时  $y = 3$ , 则  $1^2 + 3^2 = C \implies$

例 求  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=1} = 3$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \implies ydy = -xdx \implies \int ydy = \int -xdx$$

$$\implies \frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2}x^2 + C_1$$

$$\implies x^2 + y^2 = 2C_1 = C$$

所以

- 通解为  $x^2 + y^2 = C$  ( $C$  为任意常数)
- 当  $x = 1$  时  $y = 3$ , 则  $1^2 + 3^2 = C \Rightarrow C = 10$

例 求  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$  的通解, 以及在初始条件  $y|_{x=1} = 3$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \implies ydy = -xdx \implies \int ydy = \int -xdx$$

$$\implies \frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2}x^2 + C_1$$

$$\implies x^2 + y^2 = 2C_1 = C$$

所以

- 通解为  $x^2 + y^2 = C$  ( $C$  为任意常数)
- 当  $x = 1$  时  $y = 3$ , 则  $1^2 + 3^2 = C \Rightarrow C = 10$   
所以特解是  $x^2 + y^2 = 10$

例 求  $y' = e^{2x-y}$  的通解及在初始条件  $y|_{x=0} = 0$  下的特解

解



例 求  $y' = e^{2x-y}$  的通解及在初始条件  $y|_{x=0} = 0$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = e^{2x} \cdot e^{-y} \implies$$

例 求  $y' = e^{2x-y}$  的通解及在初始条件  $y|_{x=0} = 0$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = e^{2x} \cdot e^{-y} \implies e^y dy = e^{2x} dx$$

$\implies$

例 求  $y' = e^{2x-y}$  的通解及在初始条件  $y|_{x=0} = 0$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = e^{2x} \cdot e^{-y} \implies e^y dy = e^{2x} dx$$

$$\implies \int e^y dy = \int e^{2x} dx$$

$$\implies$$

例 求  $y' = e^{2x-y}$  的通解及在初始条件  $y|_{x=0} = 0$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = e^{2x} \cdot e^{-y} \implies e^y dy = e^{2x} dx$$

$$\implies \int e^y dy = \int e^{2x} dx$$

$$\implies e^y = \frac{1}{2} e^{2x} + C$$

例 求  $y' = e^{2x-y}$  的通解及在初始条件  $y|_{x=0} = 0$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = e^{2x} \cdot e^{-y} \implies e^y dy = e^{2x} dx$$

$$\implies \int e^y dy = \int e^{2x} dx$$

$$\implies e^y = \frac{1}{2}e^{2x} + C$$

所以

- 通解为  $e^y = \frac{1}{2}e^{2x} + C$  ( $C$  为任意常数)

例 求  $y' = e^{2x-y}$  的通解及在初始条件  $y|_{x=0} = 0$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = e^{2x} \cdot e^{-y} \implies e^y dy = e^{2x} dx$$

$$\implies \int e^y dy = \int e^{2x} dx$$

$$\implies e^y = \frac{1}{2}e^{2x} + C$$

所以

- 通解为  $e^y = \frac{1}{2}e^{2x} + C$  ( $C$  为任意常数)
- 当  $x = 0$  时  $y = 0$ , 则

例 求  $y' = e^{2x-y}$  的通解及在初始条件  $y|_{x=0} = 0$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = e^{2x} \cdot e^{-y} \implies e^y dy = e^{2x} dx$$

$$\implies \int e^y dy = \int e^{2x} dx$$

$$\implies e^y = \frac{1}{2} e^{2x} + C$$

所以

- 通解为  $e^y = \frac{1}{2} e^{2x} + C$  ( $C$  为任意常数)
- 当  $x = 0$  时  $y = 0$ , 则  $1 = \frac{1}{2} + C \implies$

例 求  $y' = e^{2x-y}$  的通解及在初始条件  $y|_{x=0} = 0$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = e^{2x} \cdot e^{-y} \implies e^y dy = e^{2x} dx$$

$$\implies \int e^y dy = \int e^{2x} dx$$

$$\implies e^y = \frac{1}{2} e^{2x} + C$$

所以

- 通解为  $e^y = \frac{1}{2} e^{2x} + C$  ( $C$  为任意常数)
- 当  $x = 0$  时  $y = 0$ , 则  $1 = \frac{1}{2} + C \implies C = \frac{1}{2}$



例 求  $y' = e^{2x-y}$  的通解及在初始条件  $y|_{x=0} = 0$  下的特解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = e^{2x} \cdot e^{-y} \implies e^y dy = e^{2x} dx$$

$$\implies \int e^y dy = \int e^{2x} dx$$

$$\implies e^y = \frac{1}{2}e^{2x} + C$$

所以

- 通解为  $e^y = \frac{1}{2}e^{2x} + C$  ( $C$  为任意常数)
- 当  $x = 0$  时  $y = 0$ , 则  $1 = \frac{1}{2} + C \implies C = \frac{1}{2}$   
所以特解是  $e^y = \frac{1}{2}e^{2x} + \frac{1}{2}$

例 求  $y' = -\frac{y}{x}$  的通解

解

例 求  $y' = -\frac{y}{x}$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \implies$$

例 求  $y' = -\frac{y}{x}$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \implies \frac{1}{y} dy = -\frac{1}{x} dx \implies$$

例 求  $y' = -\frac{y}{x}$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \implies \frac{1}{y} dy = -\frac{1}{x} dx \implies \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx$$
$$\implies$$

例 求  $y' = -\frac{y}{x}$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \implies \frac{1}{y} dy = -\frac{1}{x} dx \implies \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx$$

$$\implies \ln |y| = -\ln |x| + C_1$$

$$\implies$$

例 求  $y' = -\frac{y}{x}$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \implies \frac{1}{y} dy = -\frac{1}{x} dx \implies \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx$$

$$\implies \ln |y| = -\ln |x| + C_1$$

$$\implies \ln |xy| = C_1$$

$$\implies$$

例 求  $y' = -\frac{y}{x}$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \implies \frac{1}{y} dy = -\frac{1}{x} dx \implies \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx$$

$$\implies \ln |y| = -\ln |x| + C_1$$

$$\implies \ln |xy| = C_1$$

$$\implies |xy| = e^{C_1}$$

$$\implies$$



例 求  $y' = -\frac{y}{x}$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \implies \frac{1}{y}dy = -\frac{1}{x}dx \implies \int \frac{1}{y}dy = \int -\frac{1}{x}dx$$

$$\implies \ln |y| = -\ln |x| + C_1$$

$$\implies \ln |xy| = C_1$$

$$\implies |xy| = e^{C_1}$$

$$\implies xy = \pm e^{C_1} =$$

例 求  $y' = -\frac{y}{x}$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \implies \frac{1}{y} dy = -\frac{1}{x} dx \implies \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx$$

$$\implies \ln |y| = -\ln |x| + C_1$$

$$\implies \ln |xy| = C_1$$

$$\implies |xy| = e^{C_1}$$

$$\implies xy = \pm e^{C_1} = C$$

例 求  $y' = -\frac{y}{x}$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \implies \frac{1}{y} dy = -\frac{1}{x} dx \implies \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx$$

$$\implies \ln |y| = -\ln |x| + C_1$$

$$\implies \ln |xy| = C_1$$

$$\implies |xy| = e^{C_1}$$

$$\implies xy = \pm e^{C_1} = C$$

所以通解就是

$$xy = C$$

例 求  $y' = 2xy - 6x$  的通解

解

例 求  $y' = 2xy - 6x$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = 2x(y - 3) \implies$$

例 求  $y' = 2xy - 6x$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = 2x(y - 3) \implies \frac{1}{y - 3} dy = 2x dx$$

例 求  $y' = 2xy - 6x$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = 2x(y - 3) \implies \int \frac{1}{y - 3} dy = \int 2x dx$$
$$\implies$$

例 求  $y' = 2xy - 6x$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} = 2x(y - 3) &\implies \int \frac{1}{y-3} dy = \int 2x dx \\ &\implies \ln |y - 3| =\end{aligned}$$



例 求  $y' = 2xy - 6x$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = 2x(y - 3) \implies \int \frac{1}{y-3} dy = \int 2x dx$$

$$\implies \ln |y - 3| = x^2 + C_1$$

$$\implies$$

例 求  $y' = 2xy - 6x$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = 2x(y - 3) \implies \int \frac{1}{y-3} dy = \int 2x dx$$

$$\implies \ln |y - 3| = x^2 + C_1$$

$$\implies |y - 3| = e^{x^2 + C_1} =$$

例 求  $y' = 2xy - 6x$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = 2x(y - 3) \implies \int \frac{1}{y-3} dy = \int 2x dx$$

$$\implies \ln |y - 3| = x^2 + C_1$$

$$\implies |y - 3| = e^{x^2 + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{x^2}$$

$$\implies$$

例 求  $y' = 2xy - 6x$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = 2x(y - 3) \implies \int \frac{1}{y-3} dy = \int 2x dx$$

$$\implies \ln |y - 3| = x^2 + C_1$$

$$\implies |y - 3| = e^{x^2 + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{x^2}$$

$$\implies y - 3 = \pm e^{C_1} \cdot e^{x^2} =$$

例 求  $y' = 2xy - 6x$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = 2x(y - 3) \implies \int \frac{1}{y-3} dy = \int 2x dx$$

$$\implies \ln |y - 3| = x^2 + C_1$$

$$\implies |y - 3| = e^{x^2 + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{x^2}$$

$$\implies y - 3 = \pm e^{C_1} \cdot e^{x^2} = C e^{x^2}$$

$$\implies$$

例 求  $y' = 2xy - 6x$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = 2x(y - 3) \implies \int \frac{1}{y-3} dy = \int 2x dx$$

$$\implies \ln |y - 3| = x^2 + C_1$$

$$\implies |y - 3| = e^{x^2 + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{x^2}$$

$$\implies y - 3 = \pm e^{C_1} \cdot e^{x^2} = C e^{x^2}$$

$$\implies y = C \cdot e^{x^2} + 3$$

例 求  $y' = 2xy - 6x$  的通解

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} = 2x(y - 3) \implies \int \frac{1}{y-3} dy = \int 2x dx$$

$$\implies \ln |y - 3| = x^2 + C_1$$

$$\implies |y - 3| = e^{x^2 + C_1} = e^{C_1} \cdot e^{x^2}$$

$$\implies y - 3 = \pm e^{C_1} \cdot e^{x^2} = C e^{x^2}$$

$$\implies y = C \cdot e^{x^2} + 3$$

所以通解就是

$$y = C \cdot e^{x^2} + 3$$

例 求  $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$  的通解，其中  $p(x)$  是已知函数。

解



例 求  $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$  的通解，其中  $p(x)$  是已知函数。

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \implies$$

例 求  $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$  的通解, 其中  $p(x)$  是已知函数。

解 这是可分离变量微分方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{y}dy = -p(x)dx$$

**例** 求  $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$  的通解，其中  $p(x)$  是已知函数。

**解** 这是可分离变量微分方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 &\implies \int \frac{1}{y} dy = \int -p(x) dx \\ &\implies\end{aligned}$$

例 求  $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$  的通解, 其中  $p(x)$  是已知函数。

解 这是可分离变量微分方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 &\implies \int \frac{1}{y} dy = \int -p(x) dx \\ &\implies \ln |y| =\end{aligned}$$

**例** 求  $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$  的通解, 其中  $p(x)$  是已知函数。

**解** 这是可分离变量微分方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 &\implies \int \frac{1}{y} dy = \int -p(x) dx \\ &\implies \ln |y| = -P(x) + C_1 \\ &\implies\end{aligned}$$

其中  $P(x)$  是  $p(x)$  的一个原函数。

**例** 求  $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$  的通解, 其中  $p(x)$  是已知函数。

**解** 这是可分离变量微分方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 &\implies \int \frac{1}{y} dy = \int -p(x) dx \\ &\implies \ln |y| = -P(x) + C_1 \\ &\implies |y| = e^{-P(x)+C_1} =\end{aligned}$$

其中  $P(x)$  是  $p(x)$  的一个原函数。

**例** 求  $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$  的通解, 其中  $p(x)$  是已知函数。

**解** 这是可分离变量微分方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 &\implies \int \frac{1}{y} dy = \int -p(x) dx \\ &\implies \ln |y| = -P(x) + C_1 \\ &\implies |y| = e^{-P(x)+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{-P(x)} \\ &\implies\end{aligned}$$

其中  $P(x)$  是  $p(x)$  的一个原函数。

**例** 求  $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$  的通解, 其中  $p(x)$  是已知函数。

**解** 这是可分离变量微分方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 &\implies \int \frac{1}{y} dy = \int -p(x) dx \\ &\implies \ln |y| = -P(x) + C_1 \\ &\implies |y| = e^{-P(x)+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{-P(x)} \\ &\implies y = \pm e^{C_1} \cdot e^{-P(x)} =\end{aligned}$$

其中  $P(x)$  是  $p(x)$  的一个原函数。



**例** 求  $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$  的通解, 其中  $p(x)$  是已知函数。

**解** 这是可分离变量微分方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 &\implies \int \frac{1}{y} dy = \int -p(x) dx \\ &\implies \ln |y| = -P(x) + C_1 \\ &\implies |y| = e^{-P(x)+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{-P(x)} \\ &\implies y = \pm e^{C_1} \cdot e^{-P(x)} = Ce^{-P(x)}\end{aligned}$$

其中  $P(x)$  是  $p(x)$  的一个原函数。

例 求  $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$  的通解, 其中  $p(x)$  是已知函数。

解 这是可分离变量微分方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 &\implies \int \frac{1}{y} dy = \int -p(x) dx \\ &\implies \ln |y| = -P(x) + C_1 \\ &\implies |y| = e^{-P(x)+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{-P(x)} \\ &\implies y = \pm e^{C_1} \cdot e^{-P(x)} = Ce^{-P(x)}\end{aligned}$$

其中  $P(x)$  是  $p(x)$  的一个原函数。

例 求  $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$  的通解, 其中  $p(x)$  是已知函数。

解 这是可分离变量微分方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 &\implies \int \frac{1}{y} dy = \int -p(x) dx \\ &\implies \ln |y| = -P(x) + C_1 \\ &\implies |y| = e^{-P(x)+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{-P(x)} \\ &\implies y = \pm e^{C_1} \cdot e^{-P(x)} = Ce^{-P(x)}\end{aligned}$$

其中  $P(x)$  是  $p(x)$  的一个原函数。所以通解就是

$$y = Ce^{-P(x)}$$

**例** 求  $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$  的通解, 其中  $p(x)$  是已知函数。

**解** 这是可分离变量微分方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 &\implies \int \frac{1}{y} dy = \int -p(x) dx \\ &\implies \ln |y| = -P(x) + C_1 \\ &\implies |y| = e^{-P(x)+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{-P(x)} \\ &\implies y = \pm e^{C_1} \cdot e^{-P(x)} = Ce^{-P(x)}\end{aligned}$$

其中  $P(x)$  是  $p(x)$  的一个原函数。所以通解就是

$$y = Ce^{-P(x)}$$

**注** 上述的通解也写作

$$y = Ce^{-\int p(x) dx}$$

**例** 求  $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$  的通解, 其中  $p(x)$  是已知函数。

**解** 这是可分离变量微分方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 &\implies \int \frac{1}{y} dy = \int -p(x) dx \\ &\implies \ln |y| = -P(x) + C_1 \\ &\implies |y| = e^{-P(x)+C_1} = e^{C_1} \cdot e^{-P(x)} \\ &\implies y = \pm e^{C_1} \cdot e^{-P(x)} = Ce^{-P(x)}\end{aligned}$$

其中  $P(x)$  是  $p(x)$  的一个原函数。所以通解就是

$$y = Ce^{-P(x)}$$

**注** 上述的通解也写作

$$y = Ce^{-\int p(x) dx}$$

这里  $\int p(x) dx$  仅表示  $p(x)$  的一个原函数, 不含积分常数。

# We are here now...

---

1. 变量分离的一阶微分方程
2. 可分离变量的一阶微分方程
3. 齐次微分方程
4. 一阶线性微分方程

# 齐次微分方程: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$

---

计算通解步骤:

## 1. 作变量代换

# 齐次微分方程: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$

---

计算通解步骤:

1. 作变量代换  $u = u(x) = \frac{y(x)}{x}$ ,

并代入原方程:



# 齐次微分方程: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$

---

计算通解步骤:

1. 作变量代换  $u = u(x) = \frac{y(x)}{x}$ ,

并代入原方程:

$$= f(u)$$

# 齐次微分方程: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$

---

计算通解步骤:

1. 作变量代换  $u = u(x) = \frac{y(x)}{x}$ ,  $y = xu$ , 并代入原方程:

$$= f(u)$$

# 齐次微分方程: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$

---

计算通解步骤:

1. 作变量代换  $u = u(x) = \frac{y(x)}{x}$ ,  $y = xu$ , 并代入原方程:

$$\frac{d}{dx}(xu) = f(u) \implies$$

# 齐次微分方程: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$

---

计算通解步骤:

1. 作变量代换  $u = u(x) = \frac{y(x)}{x}$ ,  $y = xu$ , 并代入原方程:

$$\frac{d}{dx}(xu) = f(u) \implies u + x \frac{du}{dx}$$

# 齐次微分方程: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$

---

计算通解步骤:

1. 作变量代换  $u = u(x) = \frac{y(x)}{x}$ ,  $y = xu$ , 并代入原方程:

$$\frac{d}{dx}(xu) = f(u) \implies u + x \frac{du}{dx} = f(u)$$

# 齐次微分方程: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$

---

计算通解步骤:

1. 作变量代换  $u = u(x) = \frac{y(x)}{x}$ ,  $y = xu$ , 并代入原方程:

$$\frac{d}{dx}(xu) = f(u) \implies u + x \frac{du}{dx} = f(u) \implies x \frac{du}{dx} = f(u) - u$$

# 齐次微分方程: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$

计算通解步骤:

1. 作变量代换  $u = u(x) = \frac{y(x)}{x}$ ,  $y = xu$ , 并代入原方程:

$$\frac{d}{dx}(xu) = f(u) \implies u + x \frac{du}{dx} = f(u) \implies x \frac{du}{dx} = f(u) - u$$

2. 分离变量:

# 齐次微分方程: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$

计算通解步骤:

1. 作变量代换  $u = u(x) = \frac{y(x)}{x}$ ,  $y = xu$ , 并代入原方程:

$$\frac{d}{dx}(xu) = f(u) \implies u + x \frac{du}{dx} = f(u) \implies x \frac{du}{dx} = f(u) - u$$

2. 分离变量:

$$\frac{du}{f(u) - u} = \frac{dx}{x}$$



# 齐次微分方程: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$

计算通解步骤:

1. 作变量代换  $u = u(x) = \frac{y(x)}{x}$ ,  $y = xu$ , 并代入原方程:

$$\frac{d}{dx}(xu) = f(u) \implies u + x \frac{du}{dx} = f(u) \implies x \frac{du}{dx} = f(u) - u$$

2. 分离变量:

$$\frac{du}{f(u) - u} = \frac{dx}{x} \implies \int \frac{du}{f(u) - u} = \int \frac{dx}{x}$$

# 齐次微分方程: $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$

计算通解步骤:

1. 作变量代换  $u = u(x) = \frac{y(x)}{x}$ ,  $y = xu$ , 并代入原方程:

$$\frac{d}{dx}(xu) = f(u) \implies u + x \frac{du}{dx} = f(u) \implies x \frac{du}{dx} = f(u) - u$$

2. 分离变量:

$$\frac{du}{f(u) - u} = \frac{dx}{x} \implies \int \frac{du}{f(u) - u} = \int \frac{dx}{x}$$

3. 还原变量: 求出积分后, 将  $\frac{y}{x}$  代替  $u$

# We are here now...

---

1. 变量分离的一阶微分方程
2. 可分离变量的一阶微分方程
3. 齐次微分方程
4. 一阶线性微分方程

- 一阶线性微分方程形的标准形式：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

- 一阶线性微分方程形的标准形式：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

其中  $p(x)$ ,  $q(x)$  是已知函数,  $y = y(x)$  是未知函数。

- 一阶线性微分方程形的标准形式：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

其中  $p(x)$ ,  $q(x)$  是已知函数,  $y = y(x)$  是未知函数。

例

	是否一阶线性?	$p(x)$	$q(x)$
$y' = y^2 + \sin x$			
$y' = y \sin x + e^x$			
$y' = \frac{2y}{x+1}$			

- 一阶线性微分方程形的标准形式：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

其中  $p(x)$ ,  $q(x)$  是已知函数,  $y = y(x)$  是未知函数。

例

	是否一阶线性?	$p(x)$	$q(x)$
$y' = y^2 + \sin x$	×		
$y' = y \sin x + e^x$			
$y' = \frac{2y}{x+1}$			

- 一阶线性微分方程形的标准形式：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

其中  $p(x)$ ,  $q(x)$  是已知函数,  $y = y(x)$  是未知函数。

例

	是否一阶线性?	$p(x)$	$q(x)$
$y' = y^2 + \sin x$	×		
$y' = y \sin x + e^x$	✓		
$y' = \frac{2y}{x+1}$			



- 一阶线性微分方程形的标准形式：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

其中  $p(x)$ ,  $q(x)$  是已知函数,  $y = y(x)$  是未知函数。

例

	是否一阶线性?	$p(x)$	$q(x)$
$y' = y^2 + \sin x$	×		
$y' = y \sin x + e^x$	✓	$-\sin x$	
$y' = \frac{2y}{x+1}$			

- 一阶线性微分方程形的标准形式：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

其中  $p(x)$ ,  $q(x)$  是已知函数,  $y = y(x)$  是未知函数。

例

	是否一阶线性?	$p(x)$	$q(x)$
$y' = y^2 + \sin x$	×		
$y' = y \sin x + e^x$	✓	$-\sin x$	$e^x$
$y' = \frac{2y}{x+1}$			

- 一阶线性微分方程形的标准形式：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

其中  $p(x)$ ,  $q(x)$  是已知函数,  $y = y(x)$  是未知函数。

例

	是否一阶线性?	$p(x)$	$q(x)$
$y' = y^2 + \sin x$	×		
$y' = y \sin x + e^x$	✓	$-\sin x$	$e^x$
$y' = \frac{2y}{x+1}$	✓		

- 一阶线性微分方程形的标准形式：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

其中  $p(x)$ ,  $q(x)$  是已知函数,  $y = y(x)$  是未知函数。

例

	是否一阶线性?	$p(x)$	$q(x)$
$y' = y^2 + \sin x$	×		
$y' = y \sin x + e^x$	✓	$-\sin x$	$e^x$
$y' = \frac{2y}{x+1}$	✓	$-\frac{2}{x+1}$	

- 一阶线性微分方程形的标准形式：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

其中  $p(x)$ ,  $q(x)$  是已知函数,  $y = y(x)$  是未知函数。

例

	是否一阶线性?	$p(x)$	$q(x)$
$y' = y^2 + \sin x$	×		
$y' = y \sin x + e^x$	✓	$-\sin x$	$e^x$
$y' = \frac{2y}{x+1}$	✓	$-\frac{2}{x+1}$	0

- 一阶线性微分方程形的标准形式：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

其中  $p(x)$ ,  $q(x)$  是已知函数,  $y = y(x)$  是未知函数。

例

	是否一阶线性?	$p(x)$	$q(x)$
$y' = y^2 + \sin x$	×		
$y' = y \sin x + e^x$	✓	$-\sin x$	$e^x$
$y' = \frac{2y}{x+1}$	✓	$-\frac{2}{x+1}$	0

- 当  $q(x) \equiv 0$  时,

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$$

- 一阶线性微分方程形的标准形式：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

其中  $p(x)$ ,  $q(x)$  是已知函数,  $y = y(x)$  是未知函数。

例

	是否一阶线性?	$p(x)$	$q(x)$
$y' = y^2 + \sin x$	×		
$y' = y \sin x + e^x$	✓	$-\sin x$	$e^x$
$y' = \frac{2y}{x+1}$	✓	$-\frac{2}{x+1}$	0

- 当  $q(x) \equiv 0$  时,

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$$

称为一阶齐次线性微分方程

- 一阶线性微分方程形的标准形式：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

其中  $p(x)$ ,  $q(x)$  是已知函数,  $y = y(x)$  是未知函数。

例

	是否一阶线性?	$p(x)$	$q(x)$
$y' = y^2 + \sin x$	×		
$y' = y \sin x + e^x$	✓	$-\sin x$	$e^x$
$y' = \frac{2y}{x+1}$	✓ (齐次)	$-\frac{2}{x+1}$	0

- 当  $q(x) \equiv 0$  时,

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$$

称为一阶齐次线性微分方程



# 求解一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$

---

利用常数变易法求解，步骤：

## 求解一阶线性微分方程： $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$

---

利用常数变易法求解，步骤：

1. 求解齐次部分：

2. 常数变易：

# 求解一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$

---

利用常数变易法求解，步骤：

1. 求解齐次部分：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$$

2. 常数变易：

# 求解一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$

利用常数变易法求解，步骤：

1. 求解齐次部分：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{y} = -p(x)dx$$

2. 常数变易：

# 求解一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$

利用常数变易法求解, 步骤:

1. 求解齐次部分:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -p(x)dx$$

2. 常数变易:

## 求解一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$

利用常数变易法求解, 步骤:

1. 求解齐次部分:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -p(x)dx \Rightarrow y = Ce^{\int -p(x)dx}$$

2. 常数变易:

## 求解一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$

利用常数变易法求解, 步骤:

1. 求解齐次部分:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -p(x)dx \Rightarrow y = Ce^{\int -p(x)dx}$$

2. 常数变易: 假设  $y = u(x)e^{\int -p(x)dx}$

## 求解一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$

利用常数变易法求解, 步骤:

1. 求解齐次部分:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -p(x)dx \Rightarrow y = Ce^{\int -p(x)dx}$$

2. 常数变易: 假设  $y = u(x)e^{\int -p(x)dx}$ , 代入原方程:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x) \Rightarrow$$



# 求解一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$

利用常数变易法求解, 步骤:

1. 求解齐次部分:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -p(x)dx \Rightarrow y = Ce^{\int -p(x)dx}$$

2. 常数变易: 假设  $y = u(x)e^{\int -p(x)dx}$ , 代入原方程:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x) \Rightarrow (u(x)e^{\int -p(x)dx})' +$$

# 求解一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$

利用常数变易法求解, 步骤:

1. 求解齐次部分:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -p(x)dx \Rightarrow y = Ce^{\int -p(x)dx}$$

2. 常数变易: 假设  $y = u(x)e^{\int -p(x)dx}$ , 代入原方程:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x) \Rightarrow \left(u(x)e^{\int -p(x)dx}\right)' + p(x)u(x)e^{\int -p(x)dx}$$

# 求解一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$

利用常数变易法求解, 步骤:

1. 求解齐次部分:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -p(x)dx \Rightarrow y = Ce^{\int -p(x)dx}$$

2. 常数变易: 假设  $y = u(x)e^{\int -p(x)dx}$ , 代入原方程:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x) \Rightarrow \left(u(x)e^{\int -p(x)dx}\right)' + p(x)u(x)e^{\int -p(x)dx} = q(x)$$
$$\Rightarrow$$

# 求解一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$

利用常数变易法求解, 步骤:

1. 求解齐次部分:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -p(x)dx \Rightarrow y = Ce^{\int -p(x)dx}$$

2. 常数变易: 假设  $y = u(x)e^{\int -p(x)dx}$ , 代入原方程:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + p(x)y &= q(x) \Rightarrow \left(u(x)e^{\int -p(x)dx}\right)' + p(x)u(x)e^{\int -p(x)dx} = q(x) \\ &\Rightarrow u'(x)e^{-\int p(x)dx} = q(x)\end{aligned}$$

# 求解一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$

利用常数变易法求解, 步骤:

1. 求解齐次部分:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -p(x)dx \Rightarrow y = Ce^{\int -p(x)dx}$$

2. 常数变易: 假设  $y = u(x)e^{\int -p(x)dx}$ , 代入原方程:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x) &\Rightarrow \left(u(x)e^{\int -p(x)dx}\right)' + p(x)u(x)e^{\int -p(x)dx} = q(x) \\ &\Rightarrow u'(x) = q(x)e^{\int p(x)dx} \end{aligned}$$

# 求解一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$

利用常数变易法求解, 步骤:

1. 求解齐次部分:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -p(x)dx \Rightarrow y = Ce^{\int -p(x)dx}$$

2. 常数变易: 假设  $y = u(x)e^{\int -p(x)dx}$ , 代入原方程:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + p(x)y &= q(x) \Rightarrow \left(u(x)e^{\int -p(x)dx}\right)' + p(x)u(x)e^{\int -p(x)dx} = q(x) \\ &\Rightarrow u'(x) = q(x)e^{\int p(x)dx} \\ &\Rightarrow u(x) = \int [q(x)e^{\int p(x)dx}] dx + C\end{aligned}$$

## 求解一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$

利用常数变易法求解, 步骤:

1. 求解齐次部分:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -p(x)dx \Rightarrow y = Ce^{\int -p(x)dx}$$

2. 常数变易: 假设  $y = u(x)e^{\int -p(x)dx}$ , 代入原方程:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x) \Rightarrow (u(x)e^{\int -p(x)dx})' + p(x)u(x)e^{\int -p(x)dx} = q(x)$$

$$\Rightarrow u'(x) = q(x)e^{\int p(x)dx}$$

$$\Rightarrow u(x) = \int [q(x)e^{\int p(x)dx}] dx + C$$

$$\therefore y = u(x)e^{\int -p(x)dx} = \left( \int [q(x)e^{\int p(x)dx}] dx + C \right) e^{\int -p(x)dx}$$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

解



例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

2. 常数变易:

**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解** 1. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0$$

2. 常数变易:

**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 \Rightarrow \frac{1}{y} dy = \frac{2}{x+1} dx$$

**2.** 常数变易:

**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x+1} dx$$

**2.** 常数变易:

**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x+1} dx \Rightarrow \ln |y| =$$

**2.** 常数变易:

**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x+1} dx \Rightarrow \ln |y| = 2 \ln |x+1| + C_1$$

**2.** 常数变易:

**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x+1} dx \Rightarrow \ln |y| = 2 \ln |x+1| + C_1 \\ &\Rightarrow y = C(x+1)^2\end{aligned}$$

**2.** 常数变易:

**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x+1} dx \Rightarrow \ln |y| = 2 \ln |x+1| + C_1 \\ &\Rightarrow y = C(x+1)^2\end{aligned}$$

**2.** 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot (x+1)^2$



**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x+1} dx \Rightarrow \ln|y| = 2 \ln|x+1| + C_1 \\ &\Rightarrow y = C(x+1)^2\end{aligned}$$

**2.** 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot (x+1)^2$ ，代入原方程

$$\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$$

$\Rightarrow$

**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x+1} dx \Rightarrow \ln |y| = 2 \ln |x+1| + C_1 \\ &\Rightarrow y = C(x+1)^2\end{aligned}$$

**2.** 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot (x+1)^2$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ &\Rightarrow [u \cdot (x+1)^2]' -\end{aligned}$$

**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x+1} dx \Rightarrow \ln|y| = 2 \ln|x+1| + C_1 \\ &\Rightarrow y = C(x+1)^2\end{aligned}$$

**2.** 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot (x+1)^2$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow [u \cdot (x+1)^2]' - \frac{2}{x+1} \cdot u \cdot (x+1)^2 &= (x+1)^{\frac{5}{2}}\end{aligned}$$

**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x+1} dx \Rightarrow \ln |y| = 2 \ln |x+1| + C_1 \\ &\Rightarrow y = C(x+1)^2\end{aligned}$$

**2.** 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot (x+1)^2$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow [u \cdot (x+1)^2]' - \frac{2}{x+1} \cdot u \cdot (x+1)^2 &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow\end{aligned}$$

**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x+1} dx \Rightarrow \ln |y| = 2 \ln |x+1| + C_1 \\ &\Rightarrow y = C(x+1)^2\end{aligned}$$

**2.** 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot (x+1)^2$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow [u \cdot (x+1)^2]' - \frac{2}{x+1} \cdot u \cdot (x+1)^2 &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow u' \cdot (x+1)^2 &= (x+1)^{\frac{5}{2}}\end{aligned}$$

**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x+1} dx \Rightarrow \ln|y| = 2 \ln|x+1| + C_1 \\ &\Rightarrow y = C(x+1)^2\end{aligned}$$

**2.** 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot (x+1)^2$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow [u \cdot (x+1)^2]' - \frac{2}{x+1} \cdot u \cdot (x+1)^2 &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow u' \cdot (x+1)^2 &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \Rightarrow u' = (x+1)^{\frac{1}{2}} \\ &\Rightarrow\end{aligned}$$

**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x+1} dx \Rightarrow \ln|y| = 2 \ln|x+1| + C_1 \\ &\Rightarrow y = C(x+1)^2\end{aligned}$$

**2.** 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot (x+1)^2$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow [u \cdot (x+1)^2]' - \frac{2}{x+1} \cdot u \cdot (x+1)^2 &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow u' \cdot (x+1)^2 &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \Rightarrow u' = (x+1)^{\frac{1}{2}} \\ \Rightarrow u(x) &= \int (x+1)^{\frac{1}{2}} dx =\end{aligned}$$

**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x+1} dx \Rightarrow \ln|y| = 2 \ln|x+1| + C_1 \\ &\Rightarrow y = C(x+1)^2\end{aligned}$$

**2.** 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot (x+1)^2$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow [u \cdot (x+1)^2]' - \frac{2}{x+1} \cdot u \cdot (x+1)^2 &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow u' \cdot (x+1)^2 &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \Rightarrow u' = (x+1)^{\frac{1}{2}} \\ \Rightarrow u(x) &= \int (x+1)^{\frac{1}{2}} dx = (x+1)^{\frac{3}{2}}\end{aligned}$$



**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x+1} dx \Rightarrow \ln|y| = 2 \ln|x+1| + C_1 \\ &\Rightarrow y = C(x+1)^2\end{aligned}$$

**2.** 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot (x+1)^2$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow [u \cdot (x+1)^2]' - \frac{2}{x+1} \cdot u \cdot (x+1)^2 &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow u' \cdot (x+1)^2 &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \Rightarrow u' = (x+1)^{\frac{1}{2}} \\ \Rightarrow u(x) &= \int (x+1)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}}\end{aligned}$$

**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x+1} dx \Rightarrow \ln|y| = 2 \ln|x+1| + C_1 \\ &\Rightarrow y = C(x+1)^2\end{aligned}$$

**2.** 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot (x+1)^2$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow [u \cdot (x+1)^2]' - \frac{2}{x+1} \cdot u \cdot (x+1)^2 &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow u' \cdot (x+1)^2 &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \Rightarrow u' = (x+1)^{\frac{1}{2}} \\ \Rightarrow u(x) &= \int (x+1)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} + C\end{aligned}$$

**例** 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$  的通解

**解 1.** 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x+1} dx \Rightarrow \ln|y| = 2\ln|x+1| + C_1 \\ &\Rightarrow y = C(x+1)^2\end{aligned}$$

**2.** 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot (x+1)^2$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow [u \cdot (x+1)^2]' - \frac{2}{x+1} \cdot u \cdot (x+1)^2 &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \\ \Rightarrow u' \cdot (x+1)^2 &= (x+1)^{\frac{5}{2}} \Rightarrow u' = (x+1)^{\frac{1}{2}} \\ \Rightarrow u(x) &= \int (x+1)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} + C\end{aligned}$$

因此  $y = u(x) \cdot (x+1)^2 = \left[ \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} + C \right] (x+1)^2$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

2. 常数变易:

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = 0$$

2. 常数变易:

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = 0 \Rightarrow \frac{1}{y}dy = \frac{1}{x}dx$$

2. 常数变易:

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx$$

2. 常数变易:



例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| =$$

2. 常数变易:

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| = \ln |x| + C_1$$

2. 常数变易:

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| = \ln |x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = Cx\end{aligned}$$

2. 常数变易:

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| = \ln |x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = Cx\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot x$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| = \ln |x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = Cx\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot x$ ，代入原方程

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$$

$\Rightarrow$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| = \ln |x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = Cx\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= \ln x \\ \Rightarrow (u \cdot x)' -\end{aligned}$$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| = \ln |x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = Cx\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= \ln x \\ \Rightarrow (u \cdot x)' - \frac{1}{x} \cdot u \cdot x &= \ln x\end{aligned}$$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| = \ln |x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = Cx\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= \ln x \\ \Rightarrow (u \cdot x)' - \frac{1}{x} \cdot u \cdot x &= \ln x \\ \Rightarrow\end{aligned}$$



例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| = \ln |x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = Cx\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= \ln x \\ \Rightarrow (u \cdot x)' - \frac{1}{x} \cdot u \cdot x &= \ln x \\ \Rightarrow u' \cdot x &= \ln x \\ \Rightarrow\end{aligned}$$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| = \ln |x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = Cx\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= \ln x \\ \Rightarrow (u \cdot x)' - \frac{1}{x} \cdot u \cdot x &= \ln x \\ \Rightarrow u' \cdot x &= \ln x \\ \Rightarrow u(x) &= \int \frac{1}{x} \ln x dx =\end{aligned}$$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| = \ln |x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = Cx\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= \ln x \\ \Rightarrow (u \cdot x)' - \frac{1}{x} \cdot u \cdot x &= \ln x \\ \Rightarrow u' \cdot x &= \ln x \\ \Rightarrow u(x) &= \int \frac{1}{x} \ln x dx = \int \ln x d \ln x =\end{aligned}$$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| = \ln |x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = Cx\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= \ln x \\ \Rightarrow (u \cdot x)' - \frac{1}{x} \cdot u \cdot x &= \ln x \\ \Rightarrow u' \cdot x &= \ln x \\ \Rightarrow u(x) &= \int \frac{1}{x} \ln x dx = \int \ln x d \ln x = \frac{1}{2} (\ln x)^2 + C\end{aligned}$$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| = \ln |x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = Cx\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= \ln x \\ \Rightarrow (u \cdot x)' - \frac{1}{x} \cdot u \cdot x &= \ln x \\ \Rightarrow u' \cdot x &= \ln x \\ \Rightarrow u(x) &= \int \frac{1}{x} \ln x dx = \int \ln x d \ln x = \frac{1}{2} (\ln x)^2 + C\end{aligned}$$

因此  $y = u(x) \cdot x =$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \ln x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| = \ln |x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = Cx\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y &= \ln x \\ \Rightarrow (u \cdot x)' - \frac{1}{x} \cdot u \cdot x &= \ln x \\ \Rightarrow u' \cdot x &= \ln x \\ \Rightarrow u(x) &= \int \frac{1}{x} \ln x dx = \int \ln x d \ln x = \frac{1}{2} (\ln x)^2 + C\end{aligned}$$

因此  $y = u(x) \cdot x = \left[ \frac{1}{2} (\ln x)^2 + C \right] x$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

2. 常数变易:



例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} - y = 0$$

2. 常数变易:

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} - y = 0 \Rightarrow \frac{1}{y} dy = dx$$

2. 常数变易:

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} - y = 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int dx$$

2. 常数变易:

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} - y = 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int dx \Rightarrow \ln |y| =$$

2. 常数变易:

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} - y = 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int dx \Rightarrow \ln |y| = x + C_1$$

2. 常数变易:

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int dx \Rightarrow \ln |y| = x + C_1 \\ &\Rightarrow y = Ce^x\end{aligned}$$

2. 常数变易:

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int dx \Rightarrow \ln |y| = x + C_1 \\ &\Rightarrow y = Ce^x\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot e^x$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int dx \Rightarrow \ln |y| = x + C_1 \\ &\Rightarrow y = Ce^x\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot e^x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y &= e^x \sin x \\ &\Rightarrow\end{aligned}$$



例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int dx \Rightarrow \ln |y| = x + C_1 \\ &\Rightarrow y = Ce^x\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot e^x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y &= e^x \sin x \\ &\Rightarrow (u(x) \cdot e^x)' -\end{aligned}$$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int dx \Rightarrow \ln |y| = x + C_1 \\ &\Rightarrow y = Ce^x\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot e^x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y &= e^x \sin x \\ &\Rightarrow (u(x) \cdot e^x)' - u(x) \cdot e^x\end{aligned}$$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int dx \Rightarrow \ln |y| = x + C_1 \\ &\Rightarrow y = Ce^x\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot e^x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y &= e^x \sin x \\ \Rightarrow (u(x) \cdot e^x)' - u(x) \cdot e^x &= e^x \sin x \\ \Rightarrow\end{aligned}$$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int dx \Rightarrow \ln |y| = x + C_1 \\ &\Rightarrow y = Ce^x\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot e^x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y &= e^x \sin x \\ \Rightarrow (u(x) \cdot e^x)' - u(x) \cdot e^x &= e^x \sin x \\ \Rightarrow u' &= \sin x \\ \Rightarrow\end{aligned}$$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int dx \Rightarrow \ln |y| = x + C_1 \\ &\Rightarrow y = Ce^x\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot e^x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y &= e^x \sin x \\ &\Rightarrow (u(x) \cdot e^x)' - u(x) \cdot e^x = e^x \sin x \\ &\Rightarrow u' = \sin x \\ &\Rightarrow u(x) = \int \sin x dx =\end{aligned}$$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int dx \Rightarrow \ln |y| = x + C_1 \\ &\Rightarrow y = Ce^x\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot e^x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y &= e^x \sin x \\ \Rightarrow (u(x) \cdot e^x)' - u(x) \cdot e^x &= e^x \sin x \\ \Rightarrow u' &= \sin x \\ \Rightarrow u(x) &= \int \sin x dx = -\cos x + C\end{aligned}$$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int dx \Rightarrow \ln |y| = x + C_1 \\ &\Rightarrow y = Ce^x\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot e^x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y &= e^x \sin x \\ &\Rightarrow (u(x) \cdot e^x)' - u(x) \cdot e^x = e^x \sin x \\ &\Rightarrow u' = \sin x \\ &\Rightarrow u(x) = \int \sin x dx = -\cos x + C\end{aligned}$$

因此  $y = u(x) \cdot e^x =$

例 求微分方程  $\frac{dy}{dx} - y = e^x \sin x$  的通解

解 1. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int dx \Rightarrow \ln |y| = x + C_1 \\ &\Rightarrow y = Ce^x\end{aligned}$$

2. 常数变易：假设  $y = u(x) \cdot e^x$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} - y &= e^x \sin x \\ &\Rightarrow (u(x) \cdot e^x)' - u(x) \cdot e^x = e^x \sin x \\ &\Rightarrow u' = \sin x \\ &\Rightarrow u(x) = \int \sin x dx = -\cos x + C\end{aligned}$$

因此  $y = u(x) \cdot e^x = (-\cos x + C)e^x$



例 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解

**例** 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

**解 1.** 化为标准形式

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

例 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

2. 先求解齐次部分

3. 常数变易：

例 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

2. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 \Rightarrow$$

3. 常数变易:

例 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

2. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 \Rightarrow \frac{1}{y}dy = -\frac{1}{x}dx$$

3. 常数变易:

例 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式  $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$

2. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx \Rightarrow$$

3. 常数变易:

例 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

2. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln|y| =$$

3. 常数变易:

例 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

2. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| = -\ln |x| + C_1$$

$\Rightarrow$

3. 常数变易:



例 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

2. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = \frac{C}{x}\end{aligned}$$

3. 常数变易:

例 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

2. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = \frac{C}{x}\end{aligned}$$

3. 常数变易：假设  $y = \frac{u(x)}{x}$

例 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式  $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$

2. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + C_1$$
$$\Rightarrow y = \frac{C}{x}$$

3. 常数变易：假设  $y = \frac{u(x)}{x}$ ，代入原方程

例 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

2. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = \frac{C}{x}\end{aligned}$$

3. 常数变易：假设  $y = \frac{u(x)}{x}$ ，代入原方程

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow$$

例 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式  $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$

2. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + C_1$$
$$\Rightarrow y = \frac{C}{x}$$

3. 常数变易：假设  $y = \frac{u(x)}{x}$ ，代入原方程

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow \left(\frac{u}{x}\right)' +$$

例 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式  $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$

2. 先求解齐次部分

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 \Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + C_1$$
$$\Rightarrow y = \frac{C}{x}$$

3. 常数变易：假设  $y = \frac{u(x)}{x}$ ，代入原方程

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow \left(\frac{u}{x}\right)' + \frac{1}{x} \cdot \frac{u}{x}$$

例 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

2. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = \frac{C}{x}\end{aligned}$$

3. 常数变易：假设  $y = \frac{u(x)}{x}$ ，代入原方程

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow \left(\frac{u}{x}\right)' + \frac{1}{x} \cdot \frac{u}{x} = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow$$

例 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

2. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = \frac{C}{x}\end{aligned}$$

3. 常数变易：假设  $y = \frac{u(x)}{x}$ ，代入原方程

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow \left(\frac{u}{x}\right)' + \frac{1}{x} \cdot \frac{u}{x} = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow \frac{u'}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

$\Rightarrow$



例 求  $x^2y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

2. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = \frac{C}{x}\end{aligned}$$

3. 常数变易：假设  $y = \frac{u(x)}{x}$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2} &\Rightarrow \left(\frac{u}{x}\right)' + \frac{1}{x} \cdot \frac{u}{x} = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow \frac{u'}{x} = -\frac{1}{x^2} \\ &\Rightarrow u(x) = \int -\frac{1}{x} dx =\end{aligned}$$

例 求  $x^2 y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

2. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| = -\ln |x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = \frac{C}{x}\end{aligned}$$

3. 常数变易：假设  $y = \frac{u(x)}{x}$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2} &\Rightarrow \left(\frac{u}{x}\right)' + \frac{1}{x} \cdot \frac{u}{x} = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow \frac{u'}{x} = -\frac{1}{x^2} \\ &\Rightarrow u(x) = \int -\frac{1}{x} dx = -\ln |x| + C\end{aligned}$$

例 求  $x^2 y' + xy + 1 = 0$  的满足初始条件  $y(2) = 1$  的特解。

解 1. 化为标准形式

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

2. 先求解齐次部分

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 &\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int -\frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln |y| = -\ln |x| + C_1 \\ &\Rightarrow y = \frac{C}{x}\end{aligned}$$

3. 常数变易：假设  $y = \frac{u(x)}{x}$ ，代入原方程

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x^2} &\Rightarrow \left(\frac{u}{x}\right)' + \frac{1}{x} \cdot \frac{u}{x} = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow \frac{u'}{x} = -\frac{1}{x^2} \\ &\Rightarrow u(x) = \int -\frac{1}{x} dx = -\ln |x| + C\end{aligned}$$

因此  $y = \frac{1}{x}(-\ln |x| + C)$

⋮  
⋮

因此  $y = \frac{1}{x}(-\ln|x| + C)$

4.  $y(2) = 1 \Rightarrow$

⋮  
⋮

因此  $y = \frac{1}{x}(-\ln|x| + C)$

4.  $y(2) = 1 \Rightarrow 1 =$

⋮  
⋮

因此  $y = \frac{1}{x}(-\ln|x| + C)$

$$4. y(2) = 1 \Rightarrow 1 = \frac{1}{2}(-\ln 2 + C)$$

⋮  
⋮

因此  $y = \frac{1}{x}(-\ln|x| + C)$

$$4. y(2) = 1 \Rightarrow 1 = \frac{1}{2}(-\ln 2 + C) \Rightarrow C = 2 + \ln 2$$

⋮  
⋮

因此  $y = \frac{1}{x}(-\ln|x| + C)$

4.  $y(2) = 1 \Rightarrow 1 = \frac{1}{2}(-\ln 2 + C) \Rightarrow C = 2 + \ln 2$ 。所以



⋮  
⋮

因此  $y = \frac{1}{x}(-\ln|x| + C)$

4.  $y(2) = 1 \Rightarrow 1 = \frac{1}{2}(-\ln 2 + C) \Rightarrow C = 2 + \ln 2$ 。所以

$$y = \frac{u(x)}{x} =$$

⋮  
⋮

因此  $y = \frac{1}{x}(-\ln|x| + C)$

4.  $y(2) = 1 \Rightarrow 1 = \frac{1}{2}(-\ln 2 + C) \Rightarrow C = 2 + \ln 2$ 。所以

$$y = \frac{u(x)}{x} = \frac{1}{x}(-\ln|x| + 2 + \ln 2)$$

例 求微分方程  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$  的通解

解

例 求微分方程  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$  的通解

解 1. 转化为一阶线性微分方程：

$$(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$$

2. 求解齐次部分

3. 常数变易：

**例** 求微分方程  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$  的通解

**解 1.** 转化为一阶线性微分方程：

$$(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{y^2 - 6x}$$

**2.** 求解齐次部分

**3.** 常数变易：

**例** 求微分方程  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$  的通解

**解 1.** 转化为一阶线性微分方程：

$$\begin{aligned}(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0 &\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{y^2 - 6x} \\ &\Rightarrow \frac{dx}{dy} = -\frac{y^2 - 6x}{2y}\end{aligned}$$

**2.** 求解齐次部分

**3.** 常数变易：

**例** 求微分方程  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$  的通解

**解 1.** 转化为一阶线性微分方程：

$$\begin{aligned}(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0 &\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{y^2 - 6x} \\ &\Rightarrow \frac{dx}{dy} = -\frac{y^2 - 6x}{2y} = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{y}x\end{aligned}$$

**2.** 求解齐次部分

**3.** 常数变易：

**例** 求微分方程  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$  的通解

**解 1.** 转化为一阶线性微分方程：

$$\begin{aligned}(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y &= 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{y^2 - 6x} \\ \Rightarrow \quad \frac{dx}{dy} &= -\frac{y^2 - 6x}{2y} = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{y}x \\ \Rightarrow \quad \frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x &= -\frac{1}{2}y\end{aligned}$$

**2.** 求解齐次部分

**3.** 常数变易：



例 求微分方程  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$  的通解

解 1. 转化为一阶线性微分方程：

$$\begin{aligned}(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y &= 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{y^2 - 6x} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} &= -\frac{y^2 - 6x}{2y} = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{y}x \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x &= -\frac{1}{2}y\end{aligned}$$

2. 求解齐次部分  $\frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = 0$

3. 常数变易：

**例** 求微分方程  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$  的通解

**解 1.** 转化为一阶线性微分方程：

$$\begin{aligned}(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y &= 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{y^2 - 6x} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} &= -\frac{y^2 - 6x}{2y} = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{y}x \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x &= -\frac{1}{2}y\end{aligned}$$

**2.** 求解齐次部分  $\frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = 0 \Rightarrow x = Cy^3$

**3.** 常数变易：

例 求微分方程  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$  的通解

解 1. 转化为一阶线性微分方程:

$$\begin{aligned}(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y &= 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{y^2 - 6x} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} &= -\frac{y^2 - 6x}{2y} = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{y}x \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x &= -\frac{1}{2}y\end{aligned}$$

2. 求解齐次部分  $\frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = 0 \Rightarrow x = Cy^3$

3. 常数变易: 假设  $x = u(y) \cdot y^3$

例 求微分方程  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$  的通解

解 1. 转化为一阶线性微分方程:

$$\begin{aligned}(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y &= 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{y^2 - 6x} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} &= -\frac{y^2 - 6x}{2y} = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{y}x \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x &= -\frac{1}{2}y\end{aligned}$$

2. 求解齐次部分  $\frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = 0 \Rightarrow x = Cy^3$

3. 常数变易: 假设  $x = u(y) \cdot y^3$ , 代入方程

$$\frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = -\frac{1}{2}y$$

例 求微分方程  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$  的通解

解 1. 转化为一阶线性微分方程:

$$\begin{aligned}(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y &= 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{y^2 - 6x} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} &= -\frac{y^2 - 6x}{2y} = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{y}x \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x &= -\frac{1}{2}y\end{aligned}$$

2. 求解齐次部分  $\frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = 0 \Rightarrow x = Cy^3$

3. 常数变易: 假设  $x = u(y) \cdot y^3$ , 代入方程

$$\frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = -\frac{1}{2}y \Rightarrow u' = -\frac{1}{2}y^{-2}$$

例 求微分方程  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$  的通解

解 1. 转化为一阶线性微分方程:

$$\begin{aligned}(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y &= 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{y^2 - 6x} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} &= -\frac{y^2 - 6x}{2y} = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{y}x \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x &= -\frac{1}{2}y\end{aligned}$$

2. 求解齐次部分  $\frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = 0 \Rightarrow x = Cy^3$

3. 常数变易: 假设  $x = u(y) \cdot y^3$ , 代入方程

$$\frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = -\frac{1}{2}y \Rightarrow u' = -\frac{1}{2}y^{-2} \Rightarrow u = \frac{1}{2}y^{-1} + C$$

例 求微分方程  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$  的通解

解 1. 转化为一阶线性微分方程：

$$\begin{aligned}(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y &= 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{y^2 - 6x} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} &= -\frac{y^2 - 6x}{2y} = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{y}x \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x &= -\frac{1}{2}y\end{aligned}$$

2. 求解齐次部分  $\frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = 0 \Rightarrow x = Cy^3$

3. 常数变易：假设  $x = u(y) \cdot y^3$ ，代入方程

$$\frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = -\frac{1}{2}y \Rightarrow u' = -\frac{1}{2}y^{-2} \Rightarrow u = \frac{1}{2}y^{-1} + C$$

因此  $x = uy^3 =$

**例** 求微分方程  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$  的通解

**解 1.** 转化为一阶线性微分方程：

$$\begin{aligned}(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y &= 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{y^2 - 6x} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} &= -\frac{y^2 - 6x}{2y} = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{y}x \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x &= -\frac{1}{2}y\end{aligned}$$

**2.** 求解齐次部分  $\frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = 0 \Rightarrow x = Cy^3$

**3.** 常数变易：假设  $x = u(y) \cdot y^3$ ，代入方程

$$\frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = -\frac{1}{2}y \Rightarrow u' = -\frac{1}{2}y^{-2} \Rightarrow u = \frac{1}{2}y^{-1} + C$$

因此  $x = uy^3 = \left[\frac{1}{2}y^{-1} + C\right]y^3$



**例** 求微分方程  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$  的通解

**解 1.** 转化为一阶线性微分方程：

$$\begin{aligned}(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y &= 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{y^2 - 6x} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} &= -\frac{y^2 - 6x}{2y} = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{y}x \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x &= -\frac{1}{2}y\end{aligned}$$

**2.** 求解齐次部分  $\frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = 0 \Rightarrow x = Cy^3$

**3.** 常数变易：假设  $x = u(y) \cdot y^3$ ，代入方程

$$\frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = -\frac{1}{2}y \Rightarrow u' = -\frac{1}{2}y^{-2} \Rightarrow u = \frac{1}{2}y^{-1} + C$$

因此  $x = uy^3 = \left[\frac{1}{2}y^{-1} + C\right]y^3 = \frac{1}{2}y^2 + Cy^3$