## 第 06 周作业解答

**练习 1.** 判断 3 阶方阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix}$  是否可逆,若可逆,求出逆矩阵。

解 1. 计算行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\frac{r_1 - 2r_2}{r_3 - r_2}} \begin{vmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = 14 \neq 0$$

所以 A 可逆。

2. 计算伴随矩阵:

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{pmatrix}$$

3. 所以逆矩阵为

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^* = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} -2 & 14 & 4 \\ 3 & -7 & 1 \\ 5 & -7 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/7 & 1 & 4/14 \\ 3/14 & -1/2 & 1/14 \\ 5/14 & -1/2 & -3/14 \end{pmatrix}$$

**练习 2.** 判断 2 阶方阵  $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$  是否可逆,若可逆,求出逆矩阵。

**解** 1. 计算行列式:  $|A| = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = 1 \neq 0$  所以可逆。 2. 计算伴随矩阵:  $A^* = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 。

3. 所以逆矩阵为:  $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^* = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 

**练习 3.** 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$  及  $AB = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 6 & -9 & 3 \end{pmatrix}$ ,求出矩阵 B。

解由题意知:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 6 & -9 & 3 \end{pmatrix}$$

所以

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 6 & -9 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 6 & -9 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -8 & 1 \\ 4 & -5 & 1 \end{pmatrix}$$

**练习 4.** 假设 n 阶方阵 A 满足  $A^2 - 3A - 5I = O$ ,证明 A + I 可逆,并求  $(A + I)^{-1}$ 。

解因为

$$A^2 - 3A - 5I = O \implies A^2 - 3A - 4I = I \implies (A+I)(A-4I) = I$$

所以 A + I 可逆, 且  $(A + I)^{-1} = A - 4I$ 。

**练习 5.** 假设 n 阶方阵 A, B 的乘积 AB 可逆, 问能否断定 A, B 皆可逆, 为什么?

解注意到

$$|A| \cdot |B| = |AB| \neq 0$$

所以  $|A| \neq 0$  且  $|B| \neq 0$ , 即 A, B 皆可逆。

**练习 6.** 将 4 阶方阵 M 作如下分块

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{1} & -\frac{1}{0} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{1} & 0 & -\frac{1}{1} & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ I & -A \end{pmatrix}$$

请按此分块方式计算  $M^2$ 。

解

$$M^2 = \begin{pmatrix} A & O \\ I & -A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ I & -A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA + OI & AO + O(-A) \\ IA + (-A)I & IO + (-A)(-A) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^2 & O \\ O & A^2 \end{pmatrix}$$

而

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

所以

$$M = \begin{pmatrix} I & O \\ O & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**练习 7.** 将矩阵 A, B 作如下分块

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & 2I \\ 3 & A_2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & O \\ -I & B_2 \end{pmatrix},$$

请按此分块方式计算乘积 AB。

解

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 & 2I \\ 3 & A_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & O \\ -I & B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1B_1 + 2I(-I) & A_1O + 2IB_2 \\ 3B_1 + A_2(-I) & 3O + A_2B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1B_1 - 2I & 2B_2 \\ 3B_1 - A_2 & A_2B_2 \end{pmatrix}$$

其中

$$A_1B_1 - 2I = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 7 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 35 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad A_2B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix}$$

所以

$$M = \begin{pmatrix} 8 & 35 & 2 & 8 \\ 0 & -2 & 4 & 10 \\ 5 & 21 & 7 & 4 \end{pmatrix}$$