



# Outline

---

1. 隐函数的求导法：一个方程的情形
2. 隐函数的求导法：方程组的情形
3. 隐函数定理

# We are here now...

---

1. 隐函数的求导法：一个方程的情形

2. 隐函数的求导法：方程组的情形

3. 隐函数定理

# 隐函数的求导法 I

---

公式 设  $y = F(x)$  满足  $F(x, y) = 0$ ,

# 隐函数的求导法 I

---

公式 设  $y = F(x)$  满足  $F(x, y) = 0$ , 即  $F(x, y(x)) = 0$ ,

# 隐函数的求导法 I

---

公式 设  $y = F(x)$  满足  $F(x, y) = 0$ , 即  $F(x, y(x)) = 0$ , 则

$$\frac{dy}{dx} =$$

# 隐函数的求导法 I

公式 设  $y = F(x)$  满足  $F(x, y) = 0$ , 即  $F(x, y(x)) = 0$ , 则

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{F_x}{F_y}$$

# 隐函数的求导法 I

公式 设  $y = F(x)$  满足  $F(x, y) = 0$ , 即  $F(x, y(x)) = 0$ , 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$



# 隐函数的求导法 I

公式 设  $y = F(x)$  满足  $F(x, y) = 0$ , 即  $F(x, y(x)) = 0$ , 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

证明  $\because F(x, y(x)) = 0$

# 隐函数的求导法 I

公式 设  $y = F(x)$  满足  $F(x, y) = 0$ , 即  $F(x, y(x)) = 0$ , 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

证明  $\because F(x, y(x)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) =$$

# 隐函数的求导法 I


**公式** 设  $y = F(x)$  满足  $F(x, y) = 0$ , 即  $F(x, y(x)) = 0$ , 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

**证明**

$$\because F(x, y(x)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) =$$




# 隐函数的求导法 I

**公式** 设  $y = F(x)$  满足  $F(x, y) = 0$ , 即  $F(x, y(x)) = 0$ , 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

**证明**  $\because F(x, y(x)) = 0$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) =$$



# 隐函数的求导法 I


**公式** 设  $y = F(x)$  满足  $F(x, y) = 0$ , 即  $F(x, y(x)) = 0$ , 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

**证明**

$$\because F(x, y(x)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) = F_x +$$



# 隐函数的求导法 I


**公式** 设  $y = F(x)$  满足  $F(x, y) = 0$ , 即  $F(x, y(x)) = 0$ , 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

**证明**

$$\because F(x, y(x)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) = F_x + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$



# 隐函数的求导法 I

**公式** 设  $y = F(x)$  满足  $F(x, y) = 0$ , 即  $F(x, y(x)) = 0$ , 则


$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

**证明**

$$\because F(x, y(x)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dx} F(x, y(x)) = F_x + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$



例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$



例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

方法一

$$F(x, y) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意  $\sin y + e^x - xy^2 = 0$

$$F(x, y) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意  $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ , 令  $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$ ,  
 $F(x, y) = 0$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意  $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ , 令  $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$ , 则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} =$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意  $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ , 令  $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$ , 则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{\quad}{\quad}$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意  $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ , 令  $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$ , 则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意  $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ , 令  $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$ , 则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意  $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ , 令  $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$ , 则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二



例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意  $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ , 令  $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$ , 则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二 注意  $\sin y(x) + e^x - xy(x)^2 = 0$ ,

例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意  $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ , 令  $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$ , 则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二 注意  $\sin y(x) + e^x - xy(x)^2 = 0$ , 所以

$$0 = (\sin y(x) + e^x - xy(x)^2)'_x$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意  $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ , 令  $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$ , 则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二 注意  $\sin y(x) + e^x - xy(x)^2 = 0$ , 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (\sin y(x) + e^x - xy(x)^2)'_x \\ &= (\sin y(x))'_x + (e^x)'_x - (xy(x)^2)'_x \end{aligned}$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意  $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ , 令  $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$ , 则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二 注意  $\sin y(x) + e^x - xy(x)^2 = 0$ , 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (\sin y(x) + e^x - xy(x)^2)'_x \\ &= (\sin y(x))'_x + (e^x)'_x - (xy(x)^2)'_x \\ &= \cos y \cdot y' \end{aligned}$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意  $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ , 令  $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$ , 则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二 注意  $\sin y(x) + e^x - xy(x)^2 = 0$ , 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (\sin y(x) + e^x - xy(x)^2)'_x \\ &= (\sin y(x))'_x + (e^x)'_x - (xy(x)^2)'_x \\ &= \cos y \cdot y' + e^x \end{aligned}$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意  $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ , 令  $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$ , 则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二 注意  $\sin y(x) + e^x - xy(x)^2 = 0$ , 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (\sin y(x) + e^x - xy(x)^2)'_x \\ &= (\sin y(x))'_x + (e^x)'_x - (xy(x)^2)'_x \\ &= \cos y \cdot y' + e^x - y^2 - 2xy \cdot y' \end{aligned}$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意  $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ , 令  $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$ , 则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二 注意  $\sin y(x) + e^x - xy(x)^2 = 0$ , 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (\sin y(x) + e^x - xy(x)^2)'_x \\ &= (\sin y(x))'_x + (e^x)'_x - (xy(x)^2)'_x \\ &= \cos y \cdot y' + e^x - y^2 - 2xy \cdot y' \\ &= e^x - y^2 + (\cos y - 2xy)y' \end{aligned}$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\sin y + e^x = xy^2$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

方法一 注意  $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ , 令  $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$ , 则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\sin y + e^x - xy^2)'_x}{(\sin y + e^x - xy^2)'_y} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$

方法二 注意  $\sin y(x) + e^x - xy(x)^2 = 0$ , 所以

$$\begin{aligned} 0 &= (\sin y(x) + e^x - xy(x)^2)'_x \\ &= (\sin y(x))'_x + (e^x)'_x - (xy(x)^2)'_x \\ &= \cos y \cdot y' + e^x - y^2 - 2xy \cdot y' \\ &= e^x - y^2 + (\cos y - 2xy)y' \end{aligned}$$

$$\text{所以 } y' = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy}$$



例 设  $y = f(x)$  满足  $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

解

$$F(x, y) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

解 注意  $\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4 = 0$

$$F(x, y) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

解 注意  $\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4 = 0$ , 令

$$F(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4$$

$$F(x, y) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} =$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

解 注意  $\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4 = 0$ , 令

$$F(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4$$

则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_x}{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_y}$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

解 注意  $\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4 = 0$ , 令

$$F(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4$$

则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_x}{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_y}$$

$$= -\frac{2x}{3y + 2x}$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

解 注意  $\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4 = 0$ , 令

$$F(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4$$

则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_x}{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_y} \\ &= -\frac{\frac{2x}{x^2 + y^2} + 3y}{\frac{2y}{x^2 + y^2} + 3x}\end{aligned}$$

例 设  $y = f(x)$  满足  $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

解 注意  $\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4 = 0$ , 令

$$F(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4$$

则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_x}{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_y} \\ &= -\frac{\frac{2x}{x^2+y^2} + 3y}{\frac{2y}{x^2+y^2} + 3x}\end{aligned}$$



例 设  $y = f(x)$  满足  $\ln(x^2 + y^2) + 3xy = 4$ , 求  $\frac{dy}{dx}$

解 注意  $\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4 = 0$ , 令

$$F(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4$$

则  $F(x, y) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_x}{(\ln(x^2 + y^2) + 3xy - 4)'_y} \\&= -\frac{\frac{2x}{x^2+y^2} + 3y}{\frac{2y}{x^2+y^2} + 3x} \\&= -\frac{2x + 3x^2y + 3y^3}{2y + 3xy^2 + 3x^3}\end{aligned}$$

## 隐函数的求导法 II

---

公式 设  $z = f(x, y)$  满足  $F(x, y, z) = 0$ ,

## 隐函数的求导法 II

---

公式 设  $z = f(x, y)$  满足  $F(x, y, z) = 0$ , 即  $F(x, y, z(x, y)) = 0$ ,

## 隐函数的求导法 II

公式 设  $z = f(x, y)$  满足  $F(x, y, z) = 0$ , 即  $F(x, y, z(x, y)) = 0$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \quad , \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

## 隐函数的求导法 II

公式 设  $z = f(x, y)$  满足  $F(x, y, z) = 0$ , 即  $F(x, y, z(x, y)) = 0$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

## 隐函数的求导法 II

公式 设  $z = f(x, y)$  满足  $F(x, y, z) = 0$ , 即  $F(x, y, z(x, y)) = 0$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

## 隐函数的求导法 II

公式 设  $z = f(x, y)$  满足  $F(x, y, z) = 0$ , 即  $F(x, y, z(x, y)) = 0$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

## 隐函数的求导法 II

**公式** 设  $z = f(x, y)$  满足  $F(x, y, z) = 0$ , 即  $F(x, y, z(x, y)) = 0$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

**证明**  $\because F(x, y, z(x, y)) = 0$



## 隐函数的求导法 II

**公式** 设  $z = f(x, y)$  满足  $F(x, y, z) = 0$ , 即  $F(x, y, z(x, y)) = 0$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

**证明**

$$\because F(x, y, z(x, y)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) =$$

## 隐函数的求导法 II


**公式** 设  $z = f(x, y)$  满足  $F(x, y, z) = 0$ , 即  $F(x, y, z(x, y)) = 0$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

**证明**

$$\because F(x, y, z(x, y)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) =$$



## 隐函数的求导法 II


**公式** 设  $z = f(x, y)$  满足  $F(x, y, z) = 0$ , 即  $F(x, y, z(x, y)) = 0$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

**证明**

$$\because F(x, y, z(x, y)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) =$$



## 隐函数的求导法 II


**公式** 设  $z = f(x, y)$  满足  $F(x, y, z) = 0$ , 即  $F(x, y, z(x, y)) = 0$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

**证明**

$$\because F(x, y, z(x, y)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) = F_x + F_z \cdot \frac{\partial z}{\partial x}$$



## 隐函数的求导法 II

**公式** 设  $z = f(x, y)$  满足  $F(x, y, z) = 0$ , 即  $F(x, y, z(x, y)) = 0$ , 则


$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

**证明**

$$\because F(x, y, z(x, y)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) = F_x + F_z \cdot \frac{\partial z}{\partial x}$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z},$$



## 隐函数的求导法 II

**公式** 设  $z = f(x, y)$  满足  $F(x, y, z) = 0$ , 即  $F(x, y, z(x, y)) = 0$ , 则


$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

**证明**

$$\because F(x, y, z(x, y)) = 0$$

$$\therefore 0 = \frac{\partial}{\partial x} F(x, y, z(x, y)) = F_x + F_z \cdot \frac{\partial z}{\partial x}$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \text{同理} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$



例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$F(x, y, z) = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$



例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ ,  $F(x, y, z) = 0$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z}$$

$$= -\frac{1 + z}{1 - e^z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z}$$

$$= -\frac{1}{1 - e^z}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{\quad}{0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{\quad}{\quad}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{\quad}{0 + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{\quad}{\quad}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x}{0 + 0 + 1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + 0}{0 + 0 + 1}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z}{0 + 0 + x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + 0 - 0}{0 + 0 + x - e^z}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z}$$

$$= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z}$$

$$= -\frac{1 + 0 + 0 - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}$$



例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z}$$

$$= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z}$$

$$= -\frac{0 + 1 + 0 - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 1 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 1 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 0 + x - e^z + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$



例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 1}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 1 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 1 + 0 - 0}{0 + 0 + x - e^z + 0}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $x + y + xz = e^z - 1$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = x + y + xz - e^z + 1$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_x}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{1 + 0 + z - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1 + z}{x - e^z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + y + xz - e^z + 1)'_y}{(x + y + xz - e^z + 1)'_z} \\ &= -\frac{0 + 1 + 0 - 0 + 0}{0 + 0 + x - e^z + 0} = -\frac{1}{x - e^z}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解

$$F(x, y, z) = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$ ,

$$F(x, y, z) = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$ , 则

$F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z}$$

=



例 设  $z = f(x, y)$  满足  $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$ , 则

$F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{-1 - 3}{-3} = \frac{4}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 - 3}{-3} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$ , 则

$F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{-1}{-6 \cos(x + 2y - 3z)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2}{-6 \cos(x + 2y - 3z)}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$ , 则

$F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{-\cos(x + 2y - 3z) + 1}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{-\cos(x + 2y - 3z) + 2}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$ , 则

$F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z)}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z)}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$ , 则

$F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z) - 1}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z) - 1}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$ , 则

$F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z) - 1}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z) - 1}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$ , 则

$F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z) - 1}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z) - 1}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$ , 则

$F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z) - 1}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{4 \cos(x + 2y - 3z)}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$



例 设  $z = f(x, y)$  满足  $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

解 令  $F(x, y, z) = 2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z$ , 则

$F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_x}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{2 \cos(x + 2y - 3z) - 1}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_y}{(2 \sin(x + 2y - 3z) - x - 2y + 3z)'_z} \\ &= -\frac{4 \cos(x + 2y - 3z) - 2}{-6 \cos(x + 2y - 3z) + 3}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ , 求  $dz$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ , 求  $dz$

解

$$\frac{\partial z}{\partial x} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} =$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ , 求  $dz$

解 令  $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$ , 则  $F(x, y, z) = 0$

$$\frac{\partial z}{\partial x} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} =$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ , 求  $dz$

解 令  $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ , 求  $dz$

解 令  $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_x}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_y}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ , 求  $dz$

解 令  $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_x}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z}$$
$$= -\frac{-1 + e^{z-y-x}}{1 + e^{z-y-x}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_y}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1 + e^{z-y-x}}{1 + e^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ , 求  $dz$

解 令  $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_x}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{1}{1 + xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_y}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1 + xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$



例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ , 求  $dz$

解 令  $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_x}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{-1}{1 + xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_y}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1}{1 + xe^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ , 求  $dz$

解 令  $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_x}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{-1 + e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_y}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1 + e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ , 求  $dz$

解 令  $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_x}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{-1 + e^{z-y-x} - xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_y}{(z-y-x+xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1 + e^{z-y-x} - xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ , 求  $dz$

解 令  $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_x}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{-1 + e^{z-y-x} - xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} = \frac{1 + (x-1)e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_y}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1 + e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ , 求  $dz$

解 令  $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_x}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{-1 + e^{z-y-x} - xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} = \frac{1 + (x-1)e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_y}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1 + e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ , 求  $dz$

解 令  $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_x}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{-1 + e^{z-y-x} - xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} = \frac{1 + (x-1)e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_y}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1}{1 + xe^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ , 求  $dz$

解 令  $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_x}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} \\ &= -\frac{-1 + e^{z-y-x} - xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} = \frac{1 + (x-1)e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_y}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1 - xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ , 求  $dz$

解 令  $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_x}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} \\&= -\frac{-1 + e^{z-y-x} - xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} = \frac{1 + (x-1)e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_y}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1 - xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} = 1\end{aligned}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy =$$



例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ , 求  $dz$

解 令  $F(x, y, z) = z - y - x + xe^{z-y-x}$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_x}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} \\&= -\frac{-1 + e^{z-y-x} - xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} = \frac{1 + (x-1)e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_y}{(z - y - x + xe^{z-y-x})'_z} = -\frac{-1 - xe^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} = 1\end{aligned}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = -\frac{1 + (x-1)e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} dx + dy$$

例 设  $\Phi(u, v)$  具有连续偏导数, 函数  $z = z(x, y)$  满足  $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ , 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

例 设  $\Phi(u, v)$  具有连续偏导数, 函数  $z = z(x, y)$  满足  $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ , 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令  $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$ , 则

例 设  $\Phi(u, v)$  具有连续偏导数, 函数  $z = z(x, y)$  满足  $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ , 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令  $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} =$$

例 设  $\Phi(u, v)$  具有连续偏导数, 函数  $z = z(x, y)$  满足  $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ , 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令  $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设  $\Phi(u, v)$  具有连续偏导数, 函数  $z = z(x, y)$  满足  $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ , 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令  $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$ , 则

$$F_x =$$

$$F_y =$$

$$F_z =$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设  $\Phi(u, v)$  具有连续偏导数, 函数  $z = z(x, y)$  满足  $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ , 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令  $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$ , 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x$$

$$F_y =$$

$$F_z =$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设  $\Phi(u, v)$  具有连续偏导数, 函数  $z = z(x, y)$  满足  $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ , 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令  $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$ , 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c\Phi_u$$

$$F_y =$$

$$F_z =$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$



例 设  $\Phi(u, v)$  具有连续偏导数, 函数  $z = z(x, y)$  满足  $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ , 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令  $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$ , 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c \Phi_u$$

$$F_y = \Phi_u \cdot u_y + \Phi_v \cdot v_y$$

$$F_z =$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设  $\Phi(u, v)$  具有连续偏导数, 函数  $z = z(x, y)$  满足  $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ , 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令  $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$ , 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c\Phi_u$$

$$F_y = \Phi_u \cdot u_y + \Phi_v \cdot v_y = c\Phi_v$$

$$F_z =$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设  $\Phi(u, v)$  具有连续偏导数, 函数  $z = z(x, y)$  满足  $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ , 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令  $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$ , 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c\Phi_u$$

$$F_y = \Phi_u \cdot u_y + \Phi_v \cdot v_y = c\Phi_v$$

$$F_z = \Phi_u \cdot u_z + \Phi_v \cdot v_z$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设  $\Phi(u, v)$  具有连续偏导数, 函数  $z = z(x, y)$  满足  $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ , 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令  $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$ , 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c\Phi_u$$

$$F_y = \Phi_u \cdot u_y + \Phi_v \cdot v_y = c\Phi_v$$

$$F_z = \Phi_u \cdot u_z + \Phi_v \cdot v_z = -a\Phi_u - b\Phi_v$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设  $\Phi(u, v)$  具有连续偏导数, 函数  $z = z(x, y)$  满足  $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ , 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令  $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$ , 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c\Phi_u$$

$$F_y = \Phi_u \cdot u_y + \Phi_v \cdot v_y = c\Phi_v$$

$$F_z = \Phi_u \cdot u_z + \Phi_v \cdot v_z = -a\Phi_u - b\Phi_v$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{c\Phi_u}{a\Phi_u + b\Phi_v}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设  $\Phi(u, v)$  具有连续偏导数, 函数  $z = z(x, y)$  满足  $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ , 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令  $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$ , 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c\Phi_u$$

$$F_y = \Phi_u \cdot u_y + \Phi_v \cdot v_y = c\Phi_v$$

$$F_z = \Phi_u \cdot u_z + \Phi_v \cdot v_z = -a\Phi_u - b\Phi_v$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{c\Phi_u}{a\Phi_u + b\Phi_v}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{c\Phi_v}{a\Phi_u + b\Phi_v}$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} =$$

例 设  $\Phi(u, v)$  具有连续偏导数, 函数  $z = z(x, y)$  满足  $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ , 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令  $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$ , 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c\Phi_u$$

$$F_y = \Phi_u \cdot u_y + \Phi_v \cdot v_y = c\Phi_v$$

$$F_z = \Phi_u \cdot u_z + \Phi_v \cdot v_z = -a\Phi_u - b\Phi_v$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{c\Phi_u}{a\Phi_u + b\Phi_v}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{c\Phi_v}{a\Phi_u + b\Phi_v}$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{ac\Phi_u}{a\Phi_u + b\Phi_v} + \frac{bc\Phi_v}{a\Phi_u + b\Phi_v}$$

例 设  $\Phi(u, v)$  具有连续偏导数, 函数  $z = z(x, y)$  满足  $\Phi(cx - az, cy - bz) = 0$ , 证明:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

解 令  $F(x, y, z) = \Phi(cx - az, cy - bz)$ , 则

$$F_x = \Phi_u \cdot u_x + \Phi_v \cdot v_x = c\Phi_u$$

$$F_y = \Phi_u \cdot u_y + \Phi_v \cdot v_y = c\Phi_v$$

$$F_z = \Phi_u \cdot u_z + \Phi_v \cdot v_z = -a\Phi_u - b\Phi_v$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{c\Phi_u}{a\Phi_u + b\Phi_v}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{c\Phi_v}{a\Phi_u + b\Phi_v}$$

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{ac\Phi_u}{a\Phi_u + b\Phi_v} + \frac{bc\Phi_v}{a\Phi_u + b\Phi_v} = c$$



例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解  $F(x, y, z) = x + ye^z - z$ , 则  $F(x, y, z) = 0$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解  $F(x, y, z) = x + ye^z - z$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解  $F(x, y, z) = x + ye^z - z$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} =$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解  $F(x, y, z) = x + ye^z - z$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解  $F(x, y, z) = x + ye^z - z$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{e^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{e^z}{e^z - 1}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left( -\frac{1}{e^z - 1} \right) = \frac{e^z}{(e^z - 1)^2}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解  $F(x, y, z) = x + ye^z - z$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解  $F(x, y, z) = x + ye^z - z$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} =$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$



例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解  $F(x, y, z) = x + ye^z - z$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解  $F(x, y, z) = x + ye^z - z$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{e^z}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解  $F(x, y, z) = x + ye^z - z$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{e^z}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \left( -\frac{1}{ye^z - 1} \right)'_y$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解  $F(x, y, z) = x + ye^z - z$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{e^z}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \left( -\frac{1}{ye^z - 1} \right)'_y = \frac{(ye^z - 1)'_y}{(ye^z - 1)^2}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解  $F(x, y, z) = x + ye^z - z$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{e^z}{ye^z - 1}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \left( -\frac{1}{ye^z - 1} \right)'_y = \frac{(ye^z - 1)'_y}{(ye^z - 1)^2} \\ &= \frac{e^z + y(e^z)'_y}{(ye^z - 1)^2}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解  $F(x, y, z) = x + ye^z - z$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{e^z}{ye^z - 1}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \left( -\frac{1}{ye^z - 1} \right)'_y = \frac{(ye^z - 1)'_y}{(ye^z - 1)^2} \\ &= \frac{e^z + y(e^z)'_y}{(ye^z - 1)^2} = \frac{e^z + ye^z \cdot \frac{\partial z}{\partial y}}{(ye^z - 1)^2}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解  $F(x, y, z) = x + ye^z - z$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{e^z}{ye^z - 1}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \left( -\frac{1}{ye^z - 1} \right)'_y = \frac{(ye^z - 1)'_y}{(ye^z - 1)^2} \\ &= \frac{e^z + y(e^z)'_y}{(ye^z - 1)^2} = \frac{e^z + ye^z \cdot \frac{\partial z}{\partial y}}{(ye^z - 1)^2} = \frac{e^z + ye^z \cdot \left( -\frac{e^z}{ye^z - 1} \right)}{(ye^z - 1)^2}\end{aligned}$$

例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解  $F(x, y, z) = x + ye^z - z$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{e^z}{ye^z - 1}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \left( -\frac{1}{ye^z - 1} \right)'_y = \frac{(ye^z - 1)'_y}{(ye^z - 1)^2} \\ &= \frac{e^z + y(e^z)'_y}{(ye^z - 1)^2} = \frac{e^z + ye^z \cdot \frac{\partial z}{\partial y}}{(ye^z - 1)^2} = \frac{e^z + ye^z \cdot \left( -\frac{e^z}{ye^z - 1} \right)}{(ye^z - 1)^2} \\ &= \frac{-e^z}{(ye^z - 1)^3}\end{aligned}$$



例 设  $z = f(x, y)$  满足  $z = x + ye^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解  $F(x, y, z) = x + ye^z - z$ , 则  $F(x, y, z) = 0$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_x}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{1}{ye^z - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{(x + ye^z - z)_y}{(x + ye^z - z)_z} = -\frac{e^z}{ye^z - 1}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \left( -\frac{1}{ye^z - 1} \right)'_y = \frac{(ye^z - 1)'_y}{(ye^z - 1)^2} \\&= \frac{e^z + y(e^z)'_y}{(ye^z - 1)^2} = \frac{e^z + ye^z \cdot \frac{\partial z}{\partial y}}{(ye^z - 1)^2} = \frac{e^z + ye^z \cdot \left( -\frac{e^z}{ye^z - 1} \right)}{(ye^z - 1)^2} \\&= \frac{-e^z}{(ye^z - 1)^3} = \frac{e^z}{(1 + x - z)^3}\end{aligned}$$

# We are here now...

---

1. 隐函数的求导法：一个方程的情形

2. 隐函数的求导法：方程组的情形

3. 隐函数定理

# 回顾：二元线性方程组的求解

---

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法解：

## 回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{22} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{12} \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去  $y$ ，得：

## 回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{22} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{12} \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去  $y$ ，得：

## 回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{22} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{12} \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去  $y$ ，得：

## 回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{22} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{12} \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去  $y$ ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

## 回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去  $y$ ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$



## 回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{21} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{11} \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去  $y$ ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$ ，消去  $x$ ，得：

## 回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{21} \\ a_{21}a_{11}x + a_{22}a_{11}y = a_{11}b_2 & (2) \times a_{11} \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去  $y$ ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$ ，消去  $x$ ，得：

## 回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{21} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{11} \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去  $y$ ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$ ，消去  $x$ ，得：

## 回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{21} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{11} \end{cases}$$

用消元法解：

$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$ ，消去  $y$ ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$ ，消去  $x$ ，得：

$$y = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

## 回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法解：

(1)  $\times a_{22}$  - (2)  $\times a_{12}$ ，消去  $y$ ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

(2)  $\times a_{11}$  - (1)  $\times a_{21}$ ，消去  $x$ ，得：

$$y = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

## 回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法解：

(1)  $\times a_{22}$  - (2)  $\times a_{12}$ ，消去  $y$ ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

(2)  $\times a_{11}$  - (1)  $\times a_{21}$ ，消去  $x$ ，得：

$$y = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

## 回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法解：

(1)  $\times a_{22}$  - (2)  $\times a_{12}$ ，消去  $y$ ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

(2)  $\times a_{11}$  - (1)  $\times a_{21}$ ，消去  $x$ ，得：

$$y = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

## 回顾：二元线性方程组的求解

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法解：

(1)  $\times a_{22}$  - (2)  $\times a_{12}$ ，消去  $y$ ，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

(2)  $\times a_{11}$  - (1)  $\times a_{21}$ ，消去  $x$ ，得：

$$y = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$



公式：

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

---

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1.  $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \quad , \quad y =$

2.  $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad , \quad y =$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \text{---} \quad , \quad y =$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad , \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \text{---}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \text{---}$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \text{---}, \quad y = \text{---}$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = -\frac{1}{1}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = -$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad, \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = -\frac{1}{1}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{1}{1}$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad, \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \bar{1}$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad, \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1}$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad, \quad y =$$



公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1}$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad, \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad, \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \text{---}, \quad y =$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-17}{-17} = 1, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-8}{-17} = \frac{8}{17}$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-17}{3}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-10}{3}$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{1}{3}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-1}{3}$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{21}{3}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-3}{3}$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{21}{3}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-9}{3}$$



公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{21}{3} = 7, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-9}{3}$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

练习 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

$$1. \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

$$2. \begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{21}{3} = 7, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-9}{3} = -3$$

# 方程组的隐函数求导公式

---

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

# 方程组的隐函数求导公式

假设函数  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

# 方程组的隐函数求导公式

假设函数  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial y}$  ?

# 方程组的隐函数求导公式

假设函数  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial y}$  ?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}}$$

# 方程组的隐函数求导公式

假设函数  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

**问题：**如何计算  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial y}$  ?

**求解如下：**

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$

# 方程组的隐函数求导公式

假设函数  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial y}$  ?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$



# 方程组的隐函数求导公式

假设函数  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial y}$  ?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = -F_x \\ G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = -G_x \end{cases}$$

# 方程组的隐函数求导公式

假设函数  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial y}$  ?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = -F_x \\ G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = -G_x \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_x = \underline{\hspace{2cm}}, \quad v_x = \underline{\hspace{2cm}}$$

# 方程组的隐函数求导公式

假设函数  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

**问题：**如何计算  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial y}$  ?

**求解如下：**

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = -F_x \\ G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = -G_x \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_x = \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_x = \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

# 方程组的隐函数求导公式

假设函数  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial y}$  ?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xrightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = -F_x \\ G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = -G_x \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_x = \frac{\begin{vmatrix} -F_x & F_v \\ -G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_x = \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

# 方程组的隐函数求导公式

假设函数  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial y}$  ?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = -F_x \\ G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = -G_x \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_x = \frac{\begin{vmatrix} -F_x & F_v \\ -G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_x = \frac{\begin{vmatrix} F_u & -F_x \\ G_u & -G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

# 方程组的隐函数求导公式

假设函数  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial y}$  ?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = -F_x \\ G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = -G_x \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_x = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_x = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

# 方程组的隐函数求导公式

假设函数  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial y}$  ?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = -F_x \\ G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = -G_x \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$
$$= - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}$$

# 方程组的隐函数求导公式

假设函数  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0. \end{cases}$$

问题：如何计算  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial y}$  ?

求解如下：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = -F_x \\ G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = -G_x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow u_x &= -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, & v_x &= -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} \\ &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)} & &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)} \end{aligned}$$



$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = -F_y \\ G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = -G_y \end{cases}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = -F_y \\ G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = -G_y \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_y = \underline{\hspace{2cm}}, \quad v_y = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = -F_y \\ G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = -G_y \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_y = \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_y = \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = -F_y \\ G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = -G_y \end{cases} \\
 \Rightarrow u_y &= \frac{\begin{vmatrix} -F_y & F_v \\ -G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, & v_y &= \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = -F_y \\ G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = -G_y \end{cases} \\
 \Rightarrow u_y = &\frac{\begin{vmatrix} -F_y & F_v \\ -G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, & v_y = &\frac{\begin{vmatrix} F_u & -F_y \\ G_u & -G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}
 \end{aligned}$$



$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = -F_y \\ G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = -G_y \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_y = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_y = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = -F_y \\ G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = -G_y \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_y = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_y = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)}$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = -F_y \\ G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = -G_y \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_y = - \frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_y = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$= - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)} \quad = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)}$$

总结 设  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$$

总结 设  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

总结 设  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \begin{matrix} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \\ \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \end{matrix}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

总结 设  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

总结 设  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \begin{matrix} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \\ \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \end{matrix} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \\ F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0 \end{cases}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$



总结 设  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \begin{aligned} &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \end{cases} \\ &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

所以

$$u_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$v_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

总结 设  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \begin{aligned} &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \end{cases} \\ &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

所以

$$u_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$u_y = - \frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$v_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

$$v_y = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

总结 设  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \begin{aligned} &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \end{cases} \\ &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} u_x &= - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}, & v_x &= - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} \\ u_y &= - \frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, & v_y &= - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} \end{aligned}$$

总结 设  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \begin{matrix} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \\ \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \end{matrix} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \\ F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0 \end{cases}$$

所以

$$u_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}, \quad v_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)}$$

$$u_y = - \frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad v_y = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

总结 设  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \begin{matrix} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \\ \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \end{matrix} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \\ \\ F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0 \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} u_x &= - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}, & v_x &= - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)} \\ u_y &= - \frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)}, & v_y &= - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} \end{aligned}$$

总结 设  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0 \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$

$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0 \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0 \end{cases}$$

所以

$$u_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}, \quad v_x = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)}$$

$$u_y = - \frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)}, \quad v_y = - \frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} = - \frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)}$$

例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \begin{matrix} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \\ \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \end{matrix}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$



例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \begin{matrix} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \\ \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \end{matrix}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases}$$

$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \end{cases}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix}$$

$$u_x =$$

$$v_x =$$

$$u_y =$$

$$v_y =$$

例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$

$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

所以  $J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix}$

$$u_x = \frac{\begin{vmatrix} \quad & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_x = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & \quad \\ e^u - \cos v & \quad \end{vmatrix}}{J}$$

$$u_y = \frac{\begin{vmatrix} \quad & u \cos v \\ e^u - \cos v & \quad \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_y = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & \quad \\ \quad & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$

$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

所以  $J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix}$

$$u_x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_x = \frac{\begin{vmatrix} \phantom{1} & \phantom{u \cos v} \\ \phantom{0} & \phantom{u \sin v} \end{vmatrix}}{J}$$

$$u_y = \frac{\begin{vmatrix} \phantom{1} & \phantom{u \cos v} \\ \phantom{0} & \phantom{u \sin v} \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_y = \frac{\begin{vmatrix} \phantom{1} & \phantom{u \cos v} \\ \phantom{0} & \phantom{u \sin v} \end{vmatrix}}{J}$$



例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \begin{aligned} &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases} \\ &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix}$$

$$u_x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_x = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{J}$$

$$u_y = \frac{\begin{vmatrix} \phantom{1} & u \cos v \\ \phantom{0} & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_y = \frac{\begin{vmatrix} \phantom{e^u + \sin v} & 1 \\ \phantom{e^u - \cos v} & 0 \end{vmatrix}}{J}$$

例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \begin{aligned} &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases} \\ &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix}$$

$$u_x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_x = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{J}$$

$$u_y = \frac{\begin{vmatrix} 0 & u \cos v \\ 1 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_y = \frac{\begin{vmatrix} \phantom{e^u + \sin v} & \phantom{1} \\ \phantom{e^u - \cos v} & \phantom{0} \end{vmatrix}}{J}$$

例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \begin{aligned} &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases} \\ &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix}$$

$$u_x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_x = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{J}$$

$$u_y = \frac{\begin{vmatrix} 0 & u \cos v \\ 1 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_y = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 0 \\ e^u - \cos v & 1 \end{vmatrix}}{J}$$

例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix} = ue^u(\sin v - \cos v) + u$$

$$u_x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_x = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{J}$$

$$u_y = \frac{\begin{vmatrix} 0 & u \cos v \\ 1 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}$$

$$v_y = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 0 \\ e^u - \cos v & 1 \end{vmatrix}}{J}$$

例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$
$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix} = ue^u(\sin v - \cos v) + u$$

$$u_x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J} = \frac{\sin v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1}, \quad v_x = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{J}$$

$$u_y = \frac{\begin{vmatrix} 0 & u \cos v \\ 1 & u \sin v \end{vmatrix}}{J}, \quad v_y = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 0 \\ e^u - \cos v & 1 \end{vmatrix}}{J}$$

例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \begin{aligned} &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases} \\ &\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix} = ue^u(\sin v - \cos v) + u$$

$$u_x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J} = \frac{\sin v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1}, \quad v_x = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{J} = \frac{-e^u + \cos v}{ue^u(\sin v - \cos v) + u}$$

$$u_y = \frac{\begin{vmatrix} 0 & u \cos v \\ 1 & u \sin v \end{vmatrix}}{J} \quad v_y = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 0 \\ e^u - \cos v & 1 \end{vmatrix}}{J}$$

例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$

$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix} = ue^u(\sin v - \cos v) + u$$

$$u_x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J} = \frac{\sin v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1}, \quad v_x = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{J} = \frac{-e^u + \cos v}{ue^u(\sin v - \cos v) + u}$$

$$u_y = \frac{\begin{vmatrix} 0 & u \cos v \\ 1 & u \sin v \end{vmatrix}}{J} = \frac{-\cos v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1}, \quad v_y = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 0 \\ e^u - \cos v & 1 \end{vmatrix}}{J}$$

例 设  $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ , 求  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$

解

$$\begin{cases} e^u + u \sin v = x \\ e^u - u \cos v = y \end{cases} \xRightarrow{\frac{\partial}{\partial x}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_x + u \cos v \cdot v_x = 1 \\ (e^u - \cos v)u_x + u \sin v \cdot v_x = 0 \end{cases}$$

$$\xRightarrow{\frac{\partial}{\partial y}} \begin{cases} (e^u + \sin v)u_y + u \cos v \cdot v_y = 0 \\ (e^u - \cos v)u_y + u \sin v \cdot v_y = 1 \end{cases}$$

$$\text{所以 } J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix} = ue^u(\sin v - \cos v) + u$$

$$u_x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{J} = \frac{\sin v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1}, \quad v_x = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{J} = \frac{-e^u + \cos v}{ue^u(\sin v - \cos v) + u}$$

$$u_y = \frac{\begin{vmatrix} 0 & u \cos v \\ 1 & u \sin v \end{vmatrix}}{J} = \frac{-\cos v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1}, \quad v_y = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 0 \\ e^u - \cos v & 1 \end{vmatrix}}{J} = \frac{e^u + \sin v}{ue^u(\sin v - \cos v) + u}$$



# We are here now...

---

1. 隐函数的求导法：一个方程的情形

2. 隐函数的求导法：方程组的情形

3. 隐函数定理

假设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，其零点集  $\{f = 0\}$  是平面上点集。

- $\{f = 0\}$  的形状通常是一条曲线，为什么？
- 如何求曲线  $\{f = 0\}$  上每一点处的切线？

假设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，其零点集  $\{f = 0\}$  是平面上点集。

- $\{f = 0\}$  的形状通常是一条曲线，为什么？
- 如何求曲线  $\{f = 0\}$  上每一点处的切线？


隐函数定理将会解决这些问题

设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，考察零点集  $\{f = 0\}$ ：

$$f(x, y) = (3x^2 - y^2)^2 y^2 - (x^2 + y^2)^4$$


$$f(x, y) = (x^2 + y^2 + y)^2 - (x^2 + y^2)$$

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$




设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，考察零点集  $\{f = 0\}$ ：

$$f(x, y) = (3x^2 - y^2)^2 y^2 - (x^2 + y^2)^4$$



$$f(x, y) = (x^2 + y^2 + y)^2 - (x^2 + y^2)$$


$$f(x, y) = x^2 + y^2$$



设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，考察零点集  $\{f = 0\}$ ：


$$f(x, y) = (3x^2 - y^2)^2 y^2 - (x^2 + y^2)^4$$

$f = 0$




$$f(x, y) = (x^2 + y^2 + y)^2 - (x^2 + y^2)$$

$f = 0$




$$f(x, y) = x^2 + y^2$$




设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，考察零点集  $\{f = 0\}$ ：


$$f(x, y) = (3x^2 - y^2)^2 y^2 - (x^2 + y^2)^4$$



$$f(x, y) = (x^2 + y^2 + y)^2 - (x^2 + y^2)$$




$$f(x, y) = x^2 + y^2$$




设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，考察零点集  $\{f = 0\}$ ：


$$f(x, y) = (3x^2 - y^2)^2 y^2 - (x^2 + y^2)^4$$



$$f(x, y) = (x^2 + y^2 + y)^2 - (x^2 + y^2)$$




$$f(x, y) = x^2 + y^2$$






设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，考察零点集  $\{f = 0\}$ ：


$$f(x, y) = (3x^2 - y^2)^2 y^2 - (x^2 + y^2)^4$$



$$f(x, y) = (x^2 + y^2 + y)^2 - (x^2 + y^2)$$




$$f(x, y) = x^2 + y^2$$




设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，考察零点集  $\{f = 0\}$ ：


$$f(x, y) = (3x^2 - y^2)^2 y^2 - (x^2 + y^2)^4$$



$$f(x, y) = (x^2 + y^2 + y)^2 - (x^2 + y^2)$$




$$f(x, y) = x^2 + y^2$$




设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，考察零点集  $\{f = 0\}$ ：


$$f(x, y) = (3x^2 - y^2)^2 y^2 - (x^2 + y^2)^4$$



$$f(x, y) = (x^2 + y^2 + y)^2 - (x^2 + y^2)$$




$$f(x, y) = x^2 + y^2$$




设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，考察零点集  $\{f = 0\}$ ：


$$f(x, y) = (3x^2 - y^2)^2 y^2 - (x^2 + y^2)^4$$



$$f(x, y) = (x^2 + y^2 + y)^2 - (x^2 + y^2)$$




$$f(x, y) = x^2 + y^2$$




设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，考察零点集  $\{f = 0\}$ ：


$$f(x, y) = (3x^2 - y^2)^2 y^2 - (x^2 + y^2)^4$$



$$f(x, y) = (x^2 + y^2 + y)^2 - (x^2 + y^2)$$




$$f(x, y) = x^2 + y^2$$




- $(0, 0)$  处  
 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ ，不存在切线

设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，考察零点集  $\{f = 0\}$ ：


$$f(x, y) = (3x^2 - y^2)^2 y^2 - (x^2 + y^2)^4$$



$$f(x, y) = (x^2 + y^2 + y)^2 - (x^2 + y^2)$$






$$f(x, y) = x^2 + y^2$$






- $(0, 0)$  处  
 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ ，不存在切线
- 其他点处偏导数不全为零，在附近是光滑曲线

设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，考察零点集  $\{f = 0\}$ ：



- $(0, 0)$  处  
 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ ，不存在切线
- 其他点处偏导数不全为零，在附近是光滑曲线




设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，考察零点集  $\{f = 0\}$ ：



- $(0, 0)$  处  
 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ ，不存在切线
- 其他点处偏导数不全为零，在附近是光滑曲线






设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，考察零点集  $\{f = 0\}$ ：



- $(0, 0)$  处  
 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ ，不存在切线
- 其他点处偏导数不全为零，在附近是光滑曲线


设  $f(x, y)$  是光滑的二元函数，考察零点集  $\{f = 0\}$ ：



- $(0, 0)$  处  
 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ ，不存在切线
- 其他点处偏导数不全为零，在附近是光滑曲线


隐函数定理 1.1 设  $f(x, y)$  在点  $p_1(x_1, y_1)$  附近有定义，具有连续偏导；  
 $f(x_1, y_1) = 0$ ；

零点集  $\{f = 0\}$  在  $p_1$  附近的形状



隐函数定理 1.1 设  $f(x, y)$  在点  $p_1(x_1, y_1)$  附近有定义，具有连续偏导；  
 $f(x_1, y_1) = 0$ ； $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 。


零点集  $\{f = 0\}$  在  $p_1$  附近的形状



隐函数定理 1.1 设  $f(x, y)$  在点  $p_1(x_1, y_1)$  附近有定义，具有连续偏导；  
 $f(x_1, y_1) = 0$ ； $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 。则存在

- 区间  $I_1 = (x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon)$  和  $J_1 = (y_1 - \delta, y_1 + \delta)$ ,

零点集  $\{f = 0\}$  在  $p_1$  附近的形状




**隐函数定理 1.1** 设  $f(x, y)$  在点  $p_1(x_1, y_1)$  附近有定义，具有连续偏导；  
 $f(x_1, y_1) = 0$ ； $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 。则存在

- 区间  $I_1 = (x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon)$  和  $J_1 = (y_1 - \delta, y_1 + \delta)$ ,

$$\{f = 0\} \cap (I_1 \times J_1) =$$

零点集  $\{f = 0\}$  在  $p_1$  附近的形状




**隐函数定理 1.1** 设  $f(x, y)$  在点  $p_1(x_1, y_1)$  附近有定义，具有连续偏导；  
 $f(x_1, y_1) = 0$ ； $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 。则存在

- 区间  $I_1 = (x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon)$  和  $J_1 = (y_1 - \delta, y_1 + \delta)$ ,
- 函数  $\varphi : I_1 \rightarrow J_1$ ,  $y = \varphi(x)$ , 且具有连续导数

$$\{f = 0\} \cap (I_1 \times J_1) =$$

零点集  $\{f = 0\}$  在  $p_1$  附近的形状




**隐函数定理 1.1** 设  $f(x, y)$  在点  $p_1(x_1, y_1)$  附近有定义, 具有连续偏导;  
 $f(x_1, y_1) = 0$ ;  $f_y(x_1, y_1) \neq 0$ 。则存在

- 区间  $I_1 = (x_1 - \varepsilon, x_1 + \varepsilon)$  和  $J_1 = (y_1 - \delta, y_1 + \delta)$ ,
- 函数  $\varphi : I_1 \rightarrow J_1$ ,  $y = \varphi(x)$ , 且具有连续导数

使得

$$\{f = 0\} \cap (I_1 \times J_1) = \text{Graph}(\varphi).$$


零点集  $\{f = 0\}$  在  $p_1$  附近的形状





隐函数定理 1.2 设  $f(x, y)$  在点  $p_2(x_2, y_2)$  附近有定义，具有连续偏导；  
 $f(x_2, y_2) = 0$ ； $f_x(x_2, y_2) \neq 0$ 。


零点集  $\{f = 0\}$  在  $p_1$  附近的形状



隐函数定理 1.2 设  $f(x, y)$  在点  $p_2(x_2, y_2)$  附近有定义, 具有连续偏导;  
 $f(x_2, y_2) = 0$ ;  $f_x(x_2, y_2) \neq 0$ 。则存在

- 区间  $I_2 = (x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon)$  和  $J_2 = (y_2 - \delta, y_2 + \delta)$ ,

零点集  $\{f = 0\}$  在  $p_1$  附近的形状




隐函数定理 1.2 设  $f(x, y)$  在点  $p_2(x_2, y_2)$  附近有定义，具有连续偏导；  
 $f(x_2, y_2) = 0$ ； $f_x(x_2, y_2) \neq 0$ 。则存在

- 区间  $I_2 = (x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon)$  和  $J_2 = (y_2 - \delta, y_2 + \delta)$ ,

$$\{f = 0\} \cap (J_2 \times I_2) =$$

零点集  $\{f = 0\}$  在  $p_1$  附近的形状




**隐函数定理 1.2** 设  $f(x, y)$  在点  $p_2(x_2, y_2)$  附近有定义，具有连续偏导；  
 $f(x_2, y_2) = 0$ ； $f_x(x_2, y_2) \neq 0$ 。则存在

- 区间  $I_2 = (x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon)$  和  $J_2 = (y_2 - \delta, y_2 + \delta)$ ,
- 函数  $\psi : J_2 \rightarrow I_2$ ,  $x = \psi(y)$ , 且具有连续导数

$$\{f = 0\} \cap (J_2 \times I_2) =$$

零点集  $\{f = 0\}$  在  $p_1$  附近的形状




**隐函数定理 1.2** 设  $f(x, y)$  在点  $p_2(x_2, y_2)$  附近有定义, 具有连续偏导;  
 $f(x_2, y_2) = 0$ ;  $f_x(x_2, y_2) \neq 0$ 。则存在

- 区间  $I_2 = (x_2 - \varepsilon, x_2 + \varepsilon)$  和  $J_2 = (y_2 - \delta, y_2 + \delta)$ ,
- 函数  $\psi : J_2 \rightarrow I_2$ ,  $x = \psi(y)$ , 且具有连续导数

使得


$$\{f = 0\} \cap (J_2 \times I_2) = \text{Graph}(\psi).$$

零点集  $\{f = 0\}$  在  $p_1$  附近的形状




$$f(x, y) = (3x^2 - y^2)^2 y^2 - (x^2 + y^2)^4$$

$$f = 0$$




$$f(x, y) = (x^2 + y^2 + y)^2 - (x^2 + y^2)$$


$$f = 0$$




$$f(x, y) = (3x^2 - y^2)^2 y^2 - (x^2 + y^2)^4$$




$$f(x, y) = (x^2 + y^2 + y)^2 - (x^2 + y^2)$$



$$f(x, y) = (3x^2 - y^2)^2 y^2 - (x^2 + y^2)^4$$




$$f(x, y) = (x^2 + y^2 + y)^2 - (x^2 + y^2)$$




- 在  $p$  点附近,  $\{f = 0\}$  是函数  $y = \varphi(x)$  的图形



$$f(x, y) = (3x^2 - y^2)^2 y^2 - (x^2 + y^2)^4$$



$$f(x, y) = (x^2 + y^2 + y)^2 - (x^2 + y^2)$$



- 在  $p$  点附近,  $\{f = 0\}$  是函数  $y = \varphi(x)$  的图形
- 在  $q$  点附近,  $\{f = 0\}$  是函数  $x = \psi(y)$  的图形

- 设  $f(x, y)$  是二元函数, 其零点集  $\{f = 0\}$  是平面上的点集。

- 设  $f(x, y)$  是二元函数, 其零点集  $\{f = 0\}$  是平面上的点集。
- 由隐函数定理可知: 只要偏导数  $f_x, f_y$  不全为零, 则  $\{f = 0\}$  是光滑曲线,

- 设  $f(x, y)$  是二元函数, 其零点集  $\{f = 0\}$  是平面上的点集。
- 由隐函数定理可知: 只要偏导数  $f_x, f_y$  不全为零, 则  $\{f = 0\}$  是光滑曲线, 并且局部上是光滑一元函数  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像。

- 设  $f(x, y)$  是二元函数, 其零点集  $\{f = 0\}$  是平面上的点集。
- 由隐函数定理可知: 只要偏导数  $f_x, f_y$  不全为零, 则  $\{f = 0\}$  是光滑曲线, 并且局部上是光滑一元函数  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像。
- 此时,  $\{f = 0\}$  的切线, 就是  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像的斜率:

- 设  $f(x, y)$  是二元函数, 其零点集  $\{f = 0\}$  是平面上的点集。
- 由隐函数定理可知: 只要偏导数  $f_x, f_y$  不全为零, 则  $\{f = 0\}$  是光滑曲线, 并且局部上是光滑一元函数  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像。
- 此时,  $\{f = 0\}$  的切线, 就是  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像的斜率:
  - $y = \varphi(x)$  图像的斜率是
  - $x = \psi(y)$  图像的斜率是

- 设  $f(x, y)$  是二元函数, 其零点集  $\{f = 0\}$  是平面上的点集。
- 由隐函数定理可知: 只要偏导数  $f_x, f_y$  不全为零, 则  $\{f = 0\}$  是光滑曲线, 并且局部上是光滑一元函数  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像。
- 此时,  $\{f = 0\}$  的切线, 就是  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像的斜率:
  - $y = \varphi(x)$  图像的斜率是  $\varphi'(x)$
  - $x = \psi(y)$  图像的斜率是

- 设  $f(x, y)$  是二元函数，其零点集  $\{f = 0\}$  是平面上的点集。
- 由隐函数定理可知：只要偏导数  $f_x, f_y$  不全为零，则  $\{f = 0\}$  是光滑曲线，并且局部上是光滑一元函数  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像。
- 此时， $\{f = 0\}$  的切线，就是  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像的斜率：
  - $y = \varphi(x)$  图像的斜率是  $\varphi'(x) = -\frac{f_x}{f_y}$
  - $x = \psi(y)$  图像的斜率是



- 设  $f(x, y)$  是二元函数，其零点集  $\{f = 0\}$  是平面上的点集。
- 由隐函数定理可知：只要偏导数  $f_x, f_y$  不全为零，则  $\{f = 0\}$  是光滑曲线，并且局部上是光滑一元函数  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像。
- 此时， $\{f = 0\}$  的切线，就是  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像的斜率：
  - $y = \varphi(x)$  图像的斜率是  $\varphi'(x) = -\frac{f_x}{f_y}$ ，所以切线平行于  $(f_y, -f_x)$
  - $x = \psi(y)$  图像的斜率是

- 设  $f(x, y)$  是二元函数, 其零点集  $\{f = 0\}$  是平面上的点集。
- 由隐函数定理可知: 只要偏导数  $f_x, f_y$  不全为零, 则  $\{f = 0\}$  是光滑曲线, 并且局部上是光滑一元函数  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像。
- 此时,  $\{f = 0\}$  的切线, 就是  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像的斜率:
  - $y = \varphi(x)$  图像的斜率是  $\varphi'(x) = -\frac{f_x}{f_y}$ , 所以切线平行于  $(f_y, -f_x)$
  - $x = \psi(y)$  图像的斜率是  $\frac{1}{\psi'(y)}$

- 设  $f(x, y)$  是二元函数, 其零点集  $\{f = 0\}$  是平面上的点集。
- 由隐函数定理可知: 只要偏导数  $f_x, f_y$  不全为零, 则  $\{f = 0\}$  是光滑曲线, 并且局部上是光滑一元函数  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像。
- 此时,  $\{f = 0\}$  的切线, 就是  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像的斜率:
  - $y = \varphi(x)$  图像的斜率是  $\varphi'(x) = -\frac{f_x}{f_y}$ , 所以切线平行于  $(f_y, -f_x)$
  - $x = \psi(y)$  图像的斜率是  $\frac{1}{\psi'(y)} = -\frac{f_x}{f_y}$

- 设  $f(x, y)$  是二元函数, 其零点集  $\{f = 0\}$  是平面上的点集。
- 由隐函数定理可知: 只要偏导数  $f_x, f_y$  不全为零, 则  $\{f = 0\}$  是光滑曲线, 并且局部上是光滑一元函数  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像。
- 此时,  $\{f = 0\}$  的切线, 就是  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像的斜率:
  - $y = \varphi(x)$  图像的斜率是  $\varphi'(x) = -\frac{f_x}{f_y}$ , 所以切线平行于  $(f_y, -f_x)$
  - $x = \psi(y)$  图像的斜率是  $\frac{1}{\psi'(y)} = -\frac{f_x}{f_y}$ , 所以切线平行于  $(f_y, -f_x)$

- 设  $f(x, y)$  是二元函数, 其零点集  $\{f = 0\}$  是平面上的点集。
- 由隐函数定理可知: 只要偏导数  $f_x, f_y$  不全为零, 则  $\{f = 0\}$  是光滑曲线, 并且局部上是光滑一元函数  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像。
- 此时,  $\{f = 0\}$  的切线, 就是  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像的斜率:
  - $y = \varphi(x)$  图像的斜率是  $\varphi'(x) = -\frac{f_x}{f_y}$ , 所以切线平行于  $(f_y, -f_x)$
  - $x = \psi(y)$  图像的斜率是  $\frac{1}{\psi'(y)} = -\frac{f_x}{f_y}$ , 所以切线平行于  $(f_y, -f_x)$
- 总结: 若  $f_x, f_y$  不全为零, 则光滑曲线  $\{f = 0\}$  上的切线平行于向量  $(f_y, -f_x)$

- 设  $f(x, y)$  是二元函数, 其零点集  $\{f = 0\}$  是平面上的点集。
- 由隐函数定理可知: 只要偏导数  $f_x, f_y$  不全为零, 则  $\{f = 0\}$  是光滑曲线, 并且局部上是光滑一元函数  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像。
- 此时,  $\{f = 0\}$  的切线, 就是  $y = \varphi(x)$  或  $x = \psi(y)$  的图像的斜率:
  - $y = \varphi(x)$  图像的斜率是  $\varphi'(x) = -\frac{f_x}{f_y}$ , 所以切线平行于  $(f_y, -f_x)$
  - $x = \psi(y)$  图像的斜率是  $\frac{1}{\psi'(y)} = -\frac{f_x}{f_y}$ , 所以切线平行于  $(f_y, -f_x)$
- 总结: 若  $f_x, f_y$  不全为零, 则光滑曲线  $\{f = 0\}$  上的切线平行于向量  $(f_y, -f_x)$

---

**定理** 设  $f(x, y)$  具有连续偏导数,  $p(x_0, y_0)$  满足  $f(x_0, y_0) = 0$ , 且偏导数  $f_x(x_0, y_0)$  和  $f_y(x_0, y_0)$  不全为零。则

- 点集  $\{f = 0\}$  在  $p$  点附近是光滑曲线;
- 曲线  $\{f = 0\}$  在  $p$  点处的切线平行于向量  $(f_y, -f_x)$ 。

设  $f(x, y, z)$  是三元函数, 其零点集  $\{f = 0\}$  是空间中的点集。

设  $f(x, y, z)$  是三元函数, 其零点集  $\{f = 0\}$  是空间中的点集。只要偏导数  $f_x, f_y, f_z$  不全为零, 则  $\{f = 0\}$  是光滑曲面,



设  $f(x, y, z)$  是三元函数, 其零点集  $\{f = 0\}$  是空间中的点集。只要偏导数  $f_x, f_y, f_z$  不全为零, 则  $\{f = 0\}$  是光滑曲面, 并且局部上是光滑二元函数的图像。

设  $f(x, y, z)$  是三元函数，其零点集  $\{f = 0\}$  是空间中的点集。只要偏导数  $f_x, f_y, f_z$  不全为零，则  $\{f = 0\}$  是光滑曲面，并且局部上是光滑二元函数的图像。

---

准确来说，就是如下的隐函数定理：

## 隐函数定理 2.1

设  $f(x, y, z)$  是三元函数，其零点集  $\{f = 0\}$  是空间中的点集。只要偏导数  $f_x, f_y, f_z$  不全为零，则  $\{f = 0\}$  是光滑曲面，并且局部上是光滑二元函数的图像。

---

准确来说，就是如下的隐函数定理：

**隐函数定理 2.1** 设  $f(x, y, z)$  在点  $p(x_0, y_0, z_0)$  附近有定义，具有连续偏导； $f(x_0, y_0, z_0) = 0$ ； $f_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。

设  $f(x, y, z)$  是三元函数，其零点集  $\{f = 0\}$  是空间中的点集。只要偏导数  $f_x, f_y, f_z$  不全为零，则  $\{f = 0\}$  是光滑曲面，并且局部上是光滑二元函数的图像。

---

准确来说，就是如下的隐函数定理：

**隐函数定理 2.1** 设  $f(x, y, z)$  在点  $p(x_0, y_0, z_0)$  附近有定义，具有连续偏导； $f(x_0, y_0, z_0) = 0$ ； $f_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。则存在

- 区间

$$I_1 = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon), \quad I_2 = (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon), \quad J = (z_0 - \delta, z_0 + \delta),$$

设  $f(x, y, z)$  是三元函数，其零点集  $\{f = 0\}$  是空间中的点集。只要偏导数  $f_x, f_y, f_z$  不全为零，则  $\{f = 0\}$  是光滑曲面，并且局部上是光滑二元函数的图像。

---

准确来说，就是如下的隐函数定理：

**隐函数定理 2.1** 设  $f(x, y, z)$  在点  $p(x_0, y_0, z_0)$  附近有定义，具有连续偏导； $f(x_0, y_0, z_0) = 0$ ； $f_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。则存在

- 区间

$$I_1 = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon), \quad I_2 = (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon), \quad J = (z_0 - \delta, z_0 + \delta),$$

$$\{f = 0\} \cap (I_1 \times I_2 \times J) =$$

设  $f(x, y, z)$  是三元函数，其零点集  $\{f = 0\}$  是空间中的点集。只要偏导数  $f_x, f_y, f_z$  不全为零，则  $\{f = 0\}$  是光滑曲面，并且局部上是光滑二元函数的图像。

---

准确来说，就是如下的隐函数定理：

**隐函数定理 2.1** 设  $f(x, y, z)$  在点  $p(x_0, y_0, z_0)$  附近有定义，具有连续偏导； $f(x_0, y_0, z_0) = 0$ ； $f_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。则存在

- 区间

$$I_1 = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon), \quad I_2 = (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon), \quad J = (z_0 - \delta, z_0 + \delta),$$

- 函数  $\varphi : I_1 \times I_2 \rightarrow J$ ,  $z = \varphi(x, y)$ ，且具有连续偏导数

$$\{f = 0\} \cap (I_1 \times I_2 \times J) =$$

设  $f(x, y, z)$  是三元函数，其零点集  $\{f = 0\}$  是空间中的点集。只要偏导数  $f_x, f_y, f_z$  不全为零，则  $\{f = 0\}$  是光滑曲面，并且局部上是光滑二元函数的图像。

---

准确来说，就是如下的隐函数定理：

**隐函数定理 2.1** 设  $f(x, y, z)$  在点  $p(x_0, y_0, z_0)$  附近有定义，具有连续偏导； $f(x_0, y_0, z_0) = 0$ ； $f_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。则存在

- 区间

$$I_1 = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon), \quad I_2 = (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon), \quad J = (z_0 - \delta, z_0 + \delta),$$

- 函数  $\varphi : I_1 \times I_2 \rightarrow J$ ,  $z = \varphi(x, y)$ ，且具有连续偏导数

使得

$$\{f = 0\} \cap (I_1 \times I_2 \times J) = \text{Graph}(\varphi).$$

设  $f(x, y, z)$  是三元函数，其零点集  $\{f = 0\}$  是空间中的点集。只要偏导数  $f_x, f_y, f_z$  不全为零，则  $\{f = 0\}$  是光滑曲面，并且局部上是光滑二元函数的图像。

---

准确来说，就是如下的隐函数定理：

**隐函数定理 2.2** 设  $f(x, y, z)$  在点  $p(x_0, y_0, z_0)$  附近有定义，具有连续偏导； $f(x_0, y_0, z_0) = 0$ ； $f_y(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。则存在

- 区间

$$I_1 = ( \quad ), \quad I_2 = ( \quad ), \quad J = ( \quad ),$$

- 函数  $\varphi : I_1 \times I_2 \rightarrow J$ ,  $\quad$ ，且具有连续偏导数

使得

$$\{f = 0\} \cap (I_1 \times I_2 \times J) = \text{Graph}(\varphi).$$



设  $f(x, y, z)$  是三元函数，其零点集  $\{f = 0\}$  是空间中的点集。只要偏导数  $f_x, f_y, f_z$  不全为零，则  $\{f = 0\}$  是光滑曲面，并且局部上是光滑二元函数的图像。

---

准确来说，就是如下的隐函数定理：

**隐函数定理 2.2** 设  $f(x, y, z)$  在点  $p(x_0, y_0, z_0)$  附近有定义，具有连续偏导； $f(x_0, y_0, z_0) = 0$ ； $f_y(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。则存在

- 区间

$$I_1 = ( \quad ), \quad I_2 = ( \quad ), \quad J = ( \quad ),$$

- 函数  $\varphi : I_1 \times I_2 \rightarrow J$ ,  $y = \varphi(x, z)$ ，且具有连续偏导数

使得

$$\{f = 0\} \cap (I_1 \times I_2 \times J) = \text{Graph}(\varphi).$$

设  $f(x, y, z)$  是三元函数，其零点集  $\{f = 0\}$  是空间中的点集。只要偏导数  $f_x, f_y, f_z$  不全为零，则  $\{f = 0\}$  是光滑曲面，并且局部上是光滑二元函数的图像。

---

准确来说，就是如下的隐函数定理：

**隐函数定理 2.2** 设  $f(x, y, z)$  在点  $p(x_0, y_0, z_0)$  附近有定义，具有连续偏导； $f(x_0, y_0, z_0) = 0$ ； $f_y(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。则存在

- 区间

$$I_1 = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon), \quad I_2 = (z_0 - \varepsilon, z_0 + \varepsilon), \quad J = (y_0 - \delta, y_0 + \delta),$$

- 函数  $\varphi : I_1 \times I_2 \rightarrow J$ ,  $y = \varphi(x, z)$ ，且具有连续偏导数

使得

$$\{f = 0\} \cap (I_1 \times I_2 \times J) = \text{Graph}(\varphi).$$

设  $f(x, y, z)$  是三元函数，其零点集  $\{f = 0\}$  是空间中的点集。只要偏导数  $f_x, f_y, f_z$  不全为零，则  $\{f = 0\}$  是光滑曲面，并且局部上是光滑二元函数的图像。

---

准确来说，就是如下的隐函数定理：

**隐函数定理 2.3** 设  $f(x, y, z)$  在点  $p(x_0, y_0, z_0)$  附近有定义，具有连续偏导； $f(x_0, y_0, z_0) = 0$ ； $f_x(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。则存在

- 区间

$$I_1 = ( \quad ), \quad I_2 = ( \quad ), \quad J = ( \quad ),$$

- 函数  $\varphi : I_1 \times I_2 \rightarrow J$ ,  $\quad$ ，且具有连续偏导数

使得

$$\{f = 0\} \cap (I_1 \times I_2 \times J) = \text{Graph}(\varphi).$$

设  $f(x, y, z)$  是三元函数，其零点集  $\{f = 0\}$  是空间中的点集。只要偏导数  $f_x, f_y, f_z$  不全为零，则  $\{f = 0\}$  是光滑曲面，并且局部上是光滑二元函数的图像。

---

准确来说，就是如下的隐函数定理：

**隐函数定理 2.3** 设  $f(x, y, z)$  在点  $p(x_0, y_0, z_0)$  附近有定义，具有连续偏导； $f(x_0, y_0, z_0) = 0$ ； $f_x(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。则存在

- 区间

$$I_1 = ( \quad ), \quad I_2 = ( \quad ), \quad J = ( \quad ),$$

- 函数  $\varphi : I_1 \times I_2 \rightarrow J$ ,  $x = \varphi(y, z)$ ，且具有连续偏导数

使得

$$\{f = 0\} \cap (I_1 \times I_2 \times J) = \text{Graph}(\varphi).$$

设  $f(x, y, z)$  是三元函数，其零点集  $\{f = 0\}$  是空间中的点集。只要偏导数  $f_x, f_y, f_z$  不全为零，则  $\{f = 0\}$  是光滑曲面，并且局部上是光滑二元函数的图像。

---

准确来说，就是如下的隐函数定理：

**隐函数定理 2.3** 设  $f(x, y, z)$  在点  $p(x_0, y_0, z_0)$  附近有定义，具有连续偏导； $f(x_0, y_0, z_0) = 0$ ； $f_x(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 。则存在

- 区间

$$I_1 = (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon), \quad I_2 = (z_0 - \varepsilon, z_0 + \varepsilon), \quad J = (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

- 函数  $\varphi : I_1 \times I_2 \rightarrow J$ ,  $x = \varphi(y, z)$ ，且具有连续偏导数

使得

$$\{f = 0\} \cap (I_1 \times I_2 \times J) = \text{Graph}(\varphi).$$

例 设  $f(x, y) = (2x^2 + y^2 + z^2 - 1)^3 - \frac{1}{10}x^2z^3 - y^2z^3$

- 求出  $\{f = 0\}$  上偏导数全为零的点（临界点）
- 在 CalcPlot3D 上画出曲面  $\{f = 0\}$
- 观察临界点附近是否光滑
- 观察曲面哪些部分可以表示成光滑二元函数  $z = \varphi(x, y)$ , 或  $y = \psi(x, z)$ , 或  $x = \gamma(y, z)$  的图形