





# 空间直线的参数方程

---


$$\vec{s} = (m, n, p)$$


$$\bullet M_0(x_0, y_0, z_0)$$

# 空间直线的参数方程




# 空间直线的参数方程




# 空间直线的参数方程

$$M \in L$$



# 空间直线的参数方程

$$\begin{aligned} M \in L \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s} \end{aligned}$$




# 空间直线的参数方程

$$M \in L$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s}$$

$$\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } \overrightarrow{M_0M} = t \vec{s}$$




# 空间直线的参数方程

$$M \in L$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s}$$

$$\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } \overrightarrow{M_0M} = t\vec{s}$$

$$\Leftrightarrow (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = t(m, n, p)$$





# 空间直线的参数方程


$$M \in L$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s}$$

$$\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } \overrightarrow{M_0M} = t\vec{s}$$

$$\Leftrightarrow (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = t(m, n, p)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - x_0 = tm \\ y - y_0 = tn \\ z - z_0 = tp \end{cases}$$



# 空间直线的参数方程

$$M \in L$$


$$\Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s}$$

$$\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } \overrightarrow{M_0M} = t\vec{s}$$

$$\Leftrightarrow (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = t(m, n, p)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - x_0 = tm \\ y - y_0 = tn \\ z - z_0 = tp \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 + tm \\ y = y_0 + tn \\ z = z_0 + tp \end{cases}$$




# 空间直线的对称式方程

$$M \in L$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s}$$

$$\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } \overrightarrow{M_0M} = t \vec{s}$$

$$\Leftrightarrow (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = t(m, n, p)$$



# 空间直线的对称式方程


$$M \in L$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s}$$

$$\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } \overrightarrow{M_0M} = t \vec{s}$$

$$\Leftrightarrow (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = t(m, n, p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$



# 空间直线的对称式方程


$$M \in L$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s}$$

$$\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } \overrightarrow{M_0M} = t \vec{s}$$

$$\Leftrightarrow (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = t(m, n, p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$



注 1 若  $m = 0$ , 则  $\frac{x-x_0}{0} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$  表示

# 空间直线的对称式方程


$$M \in L$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s}$$

$$\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } \overrightarrow{M_0M} = t \vec{s}$$

$$\Leftrightarrow (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = t(m, n, p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$



注 1 若  $m = 0$ , 则  $\frac{x-x_0}{0} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$  表示

$$x = x_0 \quad \text{且}$$

# 空间直线的对称式方程


$$M \in L$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s}$$

$$\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } \overrightarrow{M_0M} = t \vec{s}$$

$$\Leftrightarrow (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = t(m, n, p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$



注 1 若  $m = 0$ , 则  $\frac{x-x_0}{0} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$  表示

$$x = x_0 \quad \text{且} \quad \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

# 空间直线的对称式方程


$$M \in L$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{s}$$

$$\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } \overrightarrow{M_0M} = t \vec{s}$$

$$\Leftrightarrow (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = t(m, n, p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$




**注 1** 若  $m = 0$ , 则  $\frac{x-x_0}{0} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$  表示

$$x = x_0 \quad \text{且} \quad \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$


**注 2** 一般地, 点向式用作表示, 参数式用作具体计算




例 设直线过点  $M_1(x_1, y_1, z_1)$  和  $M_2(x_2, y_2, z_2)$ , 求直线方程。



例 设直线过点  $M_1(x_1, y_1, z_1)$  和  $M_2(x_2, y_2, z_2)$ , 求直线方程。




**例** 设直线过点  $M_1(x_1, y_1, z_1)$  和  $M_2(x_2, y_2, z_2)$ , 求直线方程。



**解** 取方向向量为

$$\vec{s} = \overrightarrow{M_1M_2} = ( \quad , \quad , \quad )$$


**例** 设直线过点  $M_1(x_1, y_1, z_1)$  和  $M_2(x_2, y_2, z_2)$ , 求直线方程。



**解** 取方向向量为

$$\vec{s} = \overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

**例** 设直线过点  $M_1(x_1, y_1, z_1)$  和  $M_2(x_2, y_2, z_2)$ , 求直线方程。




**解** 取方向向量为

$$\vec{s} = \overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

所以直线方程为

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

**例** 设直线过点  $M_1(x_1, y_1, z_1)$  和  $M_2(x_2, y_2, z_2)$ , 求直线方程。



**解** 取方向向量为

$$\vec{s} = \overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$


所以直线方程为

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$


或等价地,

$$\frac{x - x_2}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_2}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_2}{z_2 - z_1}$$

**例** 求过点  $M_0(2, 1, 3)$  且与直线  $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$  垂直相交的直线的方程。




**例** 求过点  $M_0(2, 1, 3)$  且与直线  $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$  垂直相交的直线的方程。



**解** 设垂足为  $M(x, y, z)$ , 则



**例** 求过点  $M_0(2, 1, 3)$  且与直线  $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$  垂直相交的直线的方程。




**解** 设垂足为  $M(x, y, z)$ , 则

$$M \in L \Rightarrow$$

$$\overrightarrow{M_0M} \perp L \Rightarrow$$

**例** 求过点  $M_0(2, 1, 3)$  且与直线  $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$  垂直相交的直线的方程。




**解** 设垂足为  $M(x, y, z)$ , 则

$$M \in L \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + tm \\ y = y_0 + tn \\ z = z_0 + tp \end{cases}$$

$$\overrightarrow{M_0M} \perp L \Rightarrow$$

**例** 求过点  $M_0(2, 1, 3)$  且与直线  $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$  垂直相交的直线的方程。




**解** 设垂足为  $M(x, y, z)$ , 则

$$M \in L \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + tm = -1 + 3t \\ y = y_0 + tn \\ z = z_0 + tp \end{cases}$$

$$\overrightarrow{M_0M} \perp L \Rightarrow$$

**例** 求过点  $M_0(2, 1, 3)$  且与直线  $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$  垂直相交的直线的方程。




**解** 设垂足为  $M(x, y, z)$ , 则

$$M \in L \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + tm = -1 + 3t \\ y = y_0 + tn = 1 + 2t \\ z = z_0 + tp \end{cases}$$

$$\overrightarrow{M_0M} \perp L \Rightarrow$$

**例** 求过点  $M_0(2, 1, 3)$  且与直线  $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$  垂直相交的直线的方程。




**解** 设垂足为  $M(x, y, z)$ , 则

$$M \in L \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + tm = -1 + 3t \\ y = y_0 + tn = 1 + 2t \\ z = z_0 + tp = -t \end{cases}$$

$$\overrightarrow{M_0M} \perp L \Rightarrow$$

**例** 求过点  $M_0(2, 1, 3)$  且与直线  $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$  垂直相交的直线的方程。




**解** 设垂足为  $M(x, y, z)$ , 则

$$M \in L \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + tm = -1 + 3t \\ y = y_0 + tn = 1 + 2t \\ z = z_0 + tp = -t \end{cases}$$

$$\overrightarrow{M_0M} \perp L \Rightarrow 0 = \overrightarrow{M_0M} \cdot (3, 2, -1)$$

**例** 求过点  $M_0(2, 1, 3)$  且与直线  $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$  垂直相交的直线的方程。




**解** 设垂足为  $M(x, y, z)$ , 则

$$M \in L \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + tm = -1 + 3t \\ y = y_0 + tn = 1 + 2t \\ z = z_0 + tp = -t \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{M_0M} \perp L \Rightarrow 0 &= \overrightarrow{M_0M} \cdot (3, 2, -1) \\ &= (-3 + 3t) \quad (2t) \quad (-t - 3) \end{aligned}$$

**例** 求过点  $M_0(2, 1, 3)$  且与直线  $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$  垂直相交的直线的方程。




**解** 设垂足为  $M(x, y, z)$ , 则

$$M \in L \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + tm = -1 + 3t \\ y = y_0 + tn = 1 + 2t \\ z = z_0 + tp = -t \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{M_0M} \perp L &\Rightarrow 0 = \overrightarrow{M_0M} \cdot (3, 2, -1) \\ &= (-3 + 3t) \cdot 3 + (2t) \cdot 2 + (-t - 3) \cdot (-1) \end{aligned}$$



**例** 求过点  $M_0(2, 1, 3)$  且与直线  $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$  垂直相交的直线的方程。




**解** 设垂足为  $M(x, y, z)$ , 则

$$M \in L \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + tm = -1 + 3t \\ y = y_0 + tn = 1 + 2t \\ z = z_0 + tp = -t \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{M_0M} \perp L &\Rightarrow 0 = \overrightarrow{M_0M} \cdot (3, 2, -1) \\ &= (-3 + 3t) \cdot 3 + (2t) \cdot 2 + (-t - 3) \cdot (-1) \\ &\Rightarrow t = 3/7 \end{aligned}$$

**例** 求过点  $M_0(2, 1, 3)$  且与直线  $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$  垂直相交的直线的方程。




**解** 设垂足为  $M(x, y, z)$ , 则

$$M \in L \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + tm = -1 + 3t \\ y = y_0 + tn = 1 + 2t \\ z = z_0 + tp = -t \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{M_0M} \perp L &\Rightarrow 0 = \overrightarrow{M_0M} \cdot (3, 2, -1) \\ &= (-3 + 3t) \cdot 3 + (2t) \cdot 2 + (-t - 3) \cdot (-1) \\ &\Rightarrow t = 3/7 \end{aligned}$$

所以交点为  $\overrightarrow{M_0M} = -\frac{6}{7}(2, -1, 4)$ , 直线方程为

**例** 求过点  $M_0(2, 1, 3)$  且与直线  $L: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$  垂直相交的直线的方程。




**解** 设垂足为  $M(x, y, z)$ , 则

$$M \in L \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + tm = -1 + 3t \\ y = y_0 + tn = 1 + 2t \\ z = z_0 + tp = -t \end{cases}$$


$$\begin{aligned} \overrightarrow{M_0M} \perp L &\Rightarrow 0 = \overrightarrow{M_0M} \cdot (3, 2, -1) \\ &= (-3 + 3t) \cdot 3 + (2t) \cdot 2 + (-t - 3) \cdot (-1) \\ &\Rightarrow t = 3/7 \end{aligned}$$

所以交点为  $\overrightarrow{M_0M} = -\frac{6}{7}(2, -1, 4)$ , 直线方程为  $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}$ .

例 求直线  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$  与平面  $2x + y + z - 6 = 0$  的交点。




例 求直线  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$  与平面  $2x + y + z - 6 = 0$  的交点。



解 直线上点的坐标为

$$\begin{cases} x = x_0 + tm \\ y = y_0 + tn \\ z = z_0 + tp \end{cases}$$


例 求直线  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$  与平面  $2x + y + z - 6 = 0$  的交点。



解 直线上点的坐标为

$$\begin{cases} x = x_0 + tm = 2 + t \\ y = y_0 + tn \\ z = z_0 + tp \end{cases}$$


例 求直线  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$  与平面  $2x + y + z - 6 = 0$  的交点。



解 直线上点的坐标为

$$\begin{cases} x = x_0 + tm = 2 + t \\ y = y_0 + tn = 3 + t \\ z = z_0 + tp \end{cases}$$

例 求直线  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$  与平面  $2x + y + z - 6 = 0$  的交点。




解 直线上点的坐标为

$$\begin{cases} x = x_0 + tm = 2 + t \\ y = y_0 + tn = 3 + t \\ z = z_0 + tp = 4 + 2t \end{cases}$$



例 求直线  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$  与平面  $2x + y + z - 6 = 0$  的交点。




解 直线上点的坐标为

$$\begin{cases} x = x_0 + tm = 2 + t \\ y = y_0 + tn = 3 + t \\ z = z_0 + tp = 4 + 2t \end{cases}$$

代入平面方程，得：

$$2(2 + t) + (3 + t) + (4 + 2t) - 6 = 0$$

例 求直线  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$  与平面  $2x + y + z - 6 = 0$  的交点。




解 直线上点的坐标为

$$\begin{cases} x = x_0 + tm = 2 + t \\ y = y_0 + tn = 3 + t \\ z = z_0 + tp = 4 + 2t \end{cases}$$

代入平面方程，得：

$$2(2 + t) + (3 + t) + (4 + 2t) - 6 = 0 \Rightarrow t = -1$$

例 求直线  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$  与平面  $2x + y + z - 6 = 0$  的交点。



解 直线上点的坐标为


$$\begin{cases} x = x_0 + tm = 2 + t \\ y = y_0 + tn = 3 + t \\ z = z_0 + tp = 4 + 2t \end{cases}$$

代入平面方程，得：


$$2(2 + t) + (3 + t) + (4 + 2t) - 6 = 0 \Rightarrow t = -1$$

所以交点为  $(1, 2, 2)$ 。

**例** 设直线  $L$  过点  $M_0(-3, 2, 5)$ , 且与两平面  $x - 4z = 3$  和  $2x - y - 5z = 1$  的交线平行, 并  $L$  方程。




例 设直线  $L$  过点  $M_0(-3, 2, 5)$ , 且与两平面  $x - 4z = 3$  和  $2x - y - 5z = 1$  的交线平行, 并  $L$  方程。



**例** 设直线  $L$  过点  $M_0(-3, 2, 5)$ , 且与两平面  $x - 4z = 3$  和  $2x - y - 5z = 1$  的交线平行, 并  $L$  方程。

**解 1.** 取方向向量


$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \vec{n}_1 & \vec{n}_2 & \end{vmatrix}$$



**例** 设直线  $L$  过点  $M_0(-3, 2, 5)$ , 且与两平面  $x - 4z = 3$  和  $2x - y - 5z = 1$  的交线平行, 并  $L$  方程。

**解 1.** 取方向向量


$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix}$$



**例** 设直线  $L$  过点  $M_0(-3, 2, 5)$ , 且与两平面  $x - 4z = 3$  和  $2x - y - 5z = 1$  的交线平行, 并  $L$  方程。

**解 1.** 取方向向量

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix}$$








**例** 设直线  $L$  过点  $M_0(-3, 2, 5)$ , 且与两平面  $x - 4z = 3$  和  $2x - y - 5z = 1$  的交线平行, 并  $L$  方程。

**解 1.** 取方向向量


$$\begin{aligned}\vec{s} &= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \vec{k}\end{aligned}$$



**例** 设直线  $L$  过点  $M_0(-3, 2, 5)$ , 且与两平面  $x - 4z = 3$  和  $2x - y - 5z = 1$  的交线平行, 并  $L$  方程。

**解 1.** 取方向向量


$$\begin{aligned}\vec{s} &= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \vec{k}\end{aligned}$$



**例** 设直线  $L$  过点  $M_0(-3, 2, 5)$ , 且与两平面  $x - 4z = 3$  和  $2x - y - 5z = 1$  的交线平行, 并  $L$  方程。

**解 1.** 取方向向量


$$\begin{aligned}\vec{s} &= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \vec{k}\end{aligned}$$



**例** 设直线  $L$  过点  $M_0(-3, 2, 5)$ , 且与两平面  $x - 4z = 3$  和  $2x - y - 5z = 1$  的交线平行, 并  $L$  方程。

**解 1.** 取方向向量


$$\begin{aligned}\vec{s} &= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= -4\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}\end{aligned}$$




**例** 设直线  $L$  过点  $M_0(-3, 2, 5)$ , 且与两平面  $x - 4z = 3$  和  $2x - y - 5z = 1$  的交线平行, 并  $L$  方程。

**解 1.** 取方向向量

$$\begin{aligned}\vec{s} &= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= -4\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k} = (-4, -3, -1)\end{aligned}$$



**例** 设直线  $L$  过点  $M_0(-3, 2, 5)$ , 且与两平面  $x - 4z = 3$  和  $2x - y - 5z = 1$  的交线平行, 并  $L$  方程。



**解 1.** 取方向向量

$$\begin{aligned}\vec{s} &= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= -4\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k} = (-4, -3, -1)\end{aligned}$$

**1.** 点向式:

$$\frac{x+3}{-4} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-5}{-1}$$


# 空间直线的一般方程

---







# 空间直线的一般方程



# 空间直线的一般方程




# 空间直线的一般方程




性质  $L$  的方向向量可取为  $\vec{s} =$

# 空间直线的一般方程




性质  $L$  的方向向量可取为  $\vec{s} =$

# 空间直线的一般方程




性质  $L$  的方向向量可取为  $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$

# 空间直线的一般方程



性质  $L$  的方向向量可取为  $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$

# 空间直线的一般方程



性质  $L$  的方向向量可取为  $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix}$

例 求直线  $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y + z = 4 \end{cases}$  的一个方向向量，并求出点向式方程。



例 求直线  $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y + z = 4 \end{cases}$  的一个方向向量，并求出点向式方程。

解 1. 取方向向量

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$

2. 求直线上一点。

3. 点向式：

例 求直线  $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y + z = 4 \end{cases}$  的一个方向向量，并求出点向式方程。

解 1. 取方向向量

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix}$$

2. 求直线上一点。

3. 点向式：

例 求直线  $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y + z = 4 \end{cases}$  的一个方向向量，并求出点向式方程。

解 1. 取方向向量

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

2. 求直线上一点。

3. 点向式：

例 求直线  $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y + z = 4 \end{cases}$  的一个方向向量，并求出点向式方程。

解 1. 取方向向量

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

2. 求直线上一点。

3. 点向式：



例 求直线  $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y + z = 4 \end{cases}$  的一个方向向量，并求出点向式方程。

解 1. 取方向向量

$$\begin{aligned}\vec{s} &= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{k}\end{aligned}$$

2. 求直线上一点。

3. 点向式：

例 求直线  $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y + z = 4 \end{cases}$  的一个方向向量，并求出点向式方程。

解 1. 取方向向量

$$\begin{aligned}\vec{s} &= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{k}\end{aligned}$$

2. 求直线上一点。

3. 点向式：

例 求直线  $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y + z = 4 \end{cases}$  的一个方向向量，并求出点向式方程。

解 1. 取方向向量

$$\begin{aligned}\vec{s} &= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{k}\end{aligned}$$

2. 求直线上一点。

3. 点向式：



例 求直线  $\begin{cases} x-y+z=1 \\ 2x+y+z=4 \end{cases}$  的一个方向向量，并求出点向式方程。

解 1. 取方向向量

$$\begin{aligned}\vec{s} &= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= -2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}\end{aligned}$$

2. 求直线上一点。

3. 点向式：

例 求直线  $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y + z = 4 \end{cases}$  的一个方向向量，并求出点向式方程。

解 1. 取方向向量

$$\begin{aligned}\vec{s} &= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= -2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k} = (-2, 1, 3)\end{aligned}$$

2. 求直线上一点。

3. 点向式：

例 求直线  $\begin{cases} x-y+z=1 \\ 2x+y+z=4 \end{cases}$  的一个方向向量，并求出点向式方程。

解 1. 取方向向量

$$\begin{aligned}\vec{s} &= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= -2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k} = (-2, 1, 3)\end{aligned}$$

2. 求直线上一点。

不妨取  $x=0 \Rightarrow$

3. 点向式：

例 求直线  $\begin{cases} x-y+z=1 \\ 2x+y+z=4 \end{cases}$  的一个方向向量，并求出点向式方程。

解 1. 取方向向量

$$\begin{aligned}\vec{s} &= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= -2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k} = (-2, 1, 3)\end{aligned}$$

2. 求直线上一点。

$$\text{不妨取 } x=0 \Rightarrow \begin{cases} -y+z=1 \\ y+z=4 \end{cases}$$

3. 点向式:

例 求直线  $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y + z = 4 \end{cases}$  的一个方向向量，并求出点向式方程。

解 1. 取方向向量

$$\begin{aligned}\vec{s} &= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= -2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k} = (-2, 1, 3)\end{aligned}$$

2. 求直线上一点。

$$\text{不妨取 } x = 0 \Rightarrow \begin{cases} -y + z = 1 \\ y + z = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{3}{2} \\ z = \frac{5}{2} \end{cases}$$

3. 点向式:

例 求直线  $\begin{cases} x-y+z=1 \\ 2x+y+z=4 \end{cases}$  的一个方向向量，并求出点向式方程。

解 1. 取方向向量

$$\begin{aligned}\vec{s} &= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= -2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k} = (-2, 1, 3)\end{aligned}$$

2. 求直线上一点。


$$\text{不妨取 } x=0 \Rightarrow \begin{cases} -y+z=1 \\ y+z=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=\frac{3}{2} \\ z=\frac{5}{2} \end{cases}$$

3. 点向式:

$$\frac{x}{-2} = \frac{y-\frac{3}{2}}{1} = \frac{z-\frac{5}{2}}{3}$$


# 直线与直线的夹角

---



# 直线与直线的夹角


---






# 直线与直线的夹角

夹角  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且



# 直线与直线的夹角


夹角  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且



# 直线与直线的夹角

夹角  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且

$$\cos \varphi = \cos(\angle(\vec{s}_1, \vec{s}_2))$$




# 直线与直线的夹角

夹角  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且

$$\cos \varphi = \cos(\angle(\vec{s}_1, \vec{s}_2))$$

$$= \frac{\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|}$$




# 直线与直线的夹角

夹角  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且

$$\cos \varphi = \cos(\angle(\vec{s}_1, \vec{s}_2))$$

$$= \frac{\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|}$$




# 直线与直线的夹角

夹角  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且

$$\cos \varphi = \cos(\angle(\vec{s}_1, \vec{s}_2))$$


$$= \frac{\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|}$$



# 直线与直线的夹角

夹角  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且


$$\begin{aligned}\cos \varphi &= |\cos(\angle(\vec{s}_1, \vec{s}_2))| \\ &= \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|}\end{aligned}$$



# 直线与直线的夹角

夹角  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且


$$\begin{aligned}\cos \varphi &= |\cos(\angle(\vec{s}_1, \vec{s}_2))| \\ &= \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|}\end{aligned}$$






# 直线与平面的夹角

---




# 直线与平面的夹角

---




# 直线与平面的夹角




# 直线与平面的夹角

夹角  $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且




# 直线与平面的夹角

夹角  $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且




# 直线与平面的夹角

夹角  $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且



# 直线与平面的夹角


夹角  $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且  
 $\cos(\angle(\vec{n}, \vec{s}))$



# 直线与平面的夹角

夹角  $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且

$$\sin \varphi = \cos(\angle(\vec{n}, \vec{s}))$$






# 直线与平面的夹角

夹角  $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且

$$\sin \varphi = \cos(\angle(\vec{n}, \vec{s}))$$

$$= \frac{\vec{n} \cdot \vec{s}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|}$$




# 直线与平面的夹角

夹角  $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且

$$\sin \varphi = \cos(\angle(\vec{n}, \vec{s}))$$

$$= \frac{\vec{n} \cdot \vec{s}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|}$$




# 直线与平面的夹角

夹角  $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且

$$\sin \varphi = \cos(\angle(\vec{n}, \vec{s}))$$

$$= \frac{\vec{n} \cdot \vec{s}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|}$$




# 直线与平面的夹角

夹角  $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且

$$\sin \varphi = |\cos(\angle(\vec{n}, \vec{s}))|$$

$$= \frac{\vec{n} \cdot \vec{s}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|}$$




# 直线与平面的夹角

夹角  $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 且

$$\sin \varphi = |\cos(\angle(\vec{n}, \vec{s}))|$$

$$= \frac{|\vec{n} \cdot \vec{s}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|}$$




# 平面束及其方程

---




# 平面束及其方程



过定直线  $L$  的平面束

# 平面束及其方程




过定直线  $L$  的平面束

**问题** 给出平面束中的平面，  
其方程的通式




# 平面束及其方程



过直线  $L$  的平面  $\Pi$  的方程是什么？

# 平面束及其方程




则过直线  $L$  的平面  $\Pi$  的方程为

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

其中  $\lambda, \mu$  为（不全为零的）待定的常数。

# 平面束及其方程




则过直线  $L$  的平面  $\Pi$  的方程为

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

其中  $\lambda, \mu$  为（不全为零的）待定的常数。

# 平面束及其方程




则过直线  $L$  的平面  $\Pi$  的方程为

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

其中  $\lambda, \mu$  为（不全为零的）待定的常数。

# 平面束及其方程




则过直线  $L$  的平面  $\Pi$  的方程为

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

其中  $\lambda, \mu$  为（不全为零的）待定的常数。

# 平面束及其方程




则过直线  $L$  的平面  $\Pi$  的方程为

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

其中  $\lambda, \mu$  为（不全为零的）待定的常数。

# 平面束及其方程




则过直线  $L$  的平面  $\Pi$  的方程为

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

其中  $\lambda, \mu$  为（不全为零的）待定的常数。

# 平面束及其方程



则过直线  $L$  的平面  $\Pi$  的方程为


$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

$\Pi'$

其中  $\lambda, \mu$  为（不全为零的）待定的常数。



# 平面束及其方程



则过直线  $L$  的平面  $\Pi$  的方程为

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

$\Pi' = \Pi$

其中  $\lambda, \mu$  为（不全为零的）待定的常数。

例 求过点  $M(1, 2, 3)$  和直线  $\begin{cases} x - 4z = 3 \\ 2y - z = 0 \end{cases}$  的平面的方程。

利用平面束方程

例 求过点  $M(1, 2, 3)$  和直线  $\begin{cases} x - 4z = 3 \\ 2y - z = 0 \end{cases}$  的平面的方程。

利用平面束方程

解 1. 过直线  $\begin{cases} x - 4z - 3 = 0 \\ 2y - z = 0 \end{cases}$  的平面可设为

例 求过点  $M(1, 2, 3)$  和直线  $\begin{cases} x - 4z = 3 \\ 2y - z = 0 \end{cases}$  的平面的方程。

### 利用平面束方程

解 1. 过直线  $\begin{cases} x - 4z - 3 = 0 \\ 2y - z = 0 \end{cases}$  的平面可设为

$$\lambda(x - 4z - 3) + \mu(2y - z) = 0$$

其中  $\lambda$  和  $\mu$  是待定的常数。

例 求过点  $M(1, 2, 3)$  和直线  $\begin{cases} x - 4z = 3 \\ 2y - z = 0 \end{cases}$  的平面的方程。

### 利用平面束方程

解 1. 过直线  $\begin{cases} x - 4z - 3 = 0 \\ 2y - z = 0 \end{cases}$  的平面可设为

$$\lambda(x - 4z - 3) + \mu(2y - z) = 0$$

其中  $\lambda$  和  $\mu$  是待定的常数。

2. 因为  $M(1, 2, 3)$  在平面上, 所以  $(1, 2, 3)$  满足平面方程:

$$\lambda(1 - 4 \cdot 3 - 3) + \mu(2 \cdot 2 - 3) = 0$$

例 求过点  $M(1, 2, 3)$  和直线  $\begin{cases} x - 4z = 3 \\ 2y - z = 0 \end{cases}$  的平面的方程。

### 利用平面束方程

解 1. 过直线  $\begin{cases} x - 4z - 3 = 0 \\ 2y - z = 0 \end{cases}$  的平面可设为

$$\lambda(x - 4z - 3) + \mu(2y - z) = 0$$

其中  $\lambda$  和  $\mu$  是待定的常数。

2. 因为  $M(1, 2, 3)$  在平面上, 所以  $(1, 2, 3)$  满足平面方程:

$$\lambda(1 - 4 \cdot 3 - 3) + \mu(2 \cdot 2 - 3) = 0 \quad \Rightarrow \quad -14\lambda + \mu = 0$$

例 求过点  $M(1, 2, 3)$  和直线  $\begin{cases} x - 4z = 3 \\ 2y - z = 0 \end{cases}$  的平面的方程。

### 利用平面束方程

解 1. 过直线  $\begin{cases} x - 4z - 3 = 0 \\ 2y - z = 0 \end{cases}$  的平面可设为

$$\lambda(x - 4z - 3) + \mu(2y - z) = 0$$

其中  $\lambda$  和  $\mu$  是待定的常数。

2. 因为  $M(1, 2, 3)$  在平面上, 所以  $(1, 2, 3)$  满足平面方程:

$$\lambda(1 - 4 \cdot 3 - 3) + \mu(2 \cdot 2 - 3) = 0 \Rightarrow -14\lambda + \mu = 0$$

不妨取  $\lambda = 1, \mu = 14$ 。

例 求过点  $M(1, 2, 3)$  和直线  $\begin{cases} x - 4z = 3 \\ 2y - z = 0 \end{cases}$  的平面的方程。

### 利用平面束方程

解 1. 过直线  $\begin{cases} x - 4z - 3 = 0 \\ 2y - z = 0 \end{cases}$  的平面可设为

$$\lambda(x - 4z - 3) + \mu(2y - z) = 0$$

其中  $\lambda$  和  $\mu$  是待定的常数。

2. 因为  $M(1, 2, 3)$  在平面上, 所以  $(1, 2, 3)$  满足平面方程:


$$\lambda(1 - 4 \cdot 3 - 3) + \mu(2 \cdot 2 - 3) = 0 \quad \Rightarrow \quad -14\lambda + \mu = 0$$

不妨取  $\lambda = 1, \mu = 14$ 。所以平面方程是


$$x + 28y - 18z - 3 = 0.$$




## 平面束方程应用：求投影直线方程




## 平面束方程应用：求投影直线方程



## 平面束方程应用：求投影直线方程




## 平面束方程应用：求投影直线方程



解：

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。

## 平面束方程应用：求投影直线方程




解:

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ , 可设  $\Pi'$  方程为

$$\lambda(x + y - z - 1) + \mu(x - y + z + 1) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

## 平面束方程应用：求投影直线方程




解:

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ ，可设  $\Pi'$  方程为

$$\lambda(x + y - z - 1) + \mu(x - y + z + 1) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

## 平面束方程应用：求投影直线方程




解：

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ ，可设  $\Pi'$  方程为

$$\lambda(x + y - z - 1) + \mu(x - y + z + 1) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

2.  $\vec{n}' \perp \vec{n} \Rightarrow \vec{n}' \cdot \vec{n} = \quad \quad \quad = 0$

## 平面束方程应用：求投影直线方程



解:


1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ , 可设  $\Pi'$  方程为

$$\lambda(x + y - z - 1) + \mu(x - y + z + 1) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

2.  $\vec{n}' \perp \vec{n} \Rightarrow \vec{n}' \cdot \vec{n} =$  = 0



## 平面束方程应用：求投影直线方程




1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ ，可设  $\Pi'$  方程为

$$\lambda(x + y - z - 1) + \mu(x - y + z + 1) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

2.  $\vec{n}' \perp \vec{n} \Rightarrow \vec{n}' \cdot \vec{n} =$  = 0

## 平面束方程应用：求投影直线方程




1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ ，可设  $\Pi'$  方程为

$$\lambda(x + y - z - 1) + \mu(x - y + z + 1) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

2.  $\vec{n}' \perp \vec{n} \Rightarrow \vec{n}' \cdot \vec{n} = 1 \cdot (\lambda + \mu) + 1 \cdot (\lambda - \mu) + 1 \cdot (-\lambda + \mu) = 0$

## 平面束方程应用：求投影直线方程




解:

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ , 可设  $\Pi'$  方程为

$$\lambda(x + y - z - 1) + \mu(x - y + z + 1) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \vec{n}' \perp \vec{n} &\Rightarrow \vec{n}' \cdot \vec{n} = 1 \cdot (\lambda + \mu) + 1 \cdot (\lambda - \mu) + 1 \cdot (-\lambda + \mu) = 0 \\ &\Rightarrow \lambda + \mu = 0 \end{aligned}$$

## 平面束方程应用：求投影直线方程




解:

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ , 可设  $\Pi'$  方程为

$$\lambda(x + y - z - 1) + \mu(x - y + z + 1) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \vec{n}' \perp \vec{n} &\Rightarrow \vec{n}' \cdot \vec{n} = 1 \cdot (\lambda + \mu) + 1 \cdot (\lambda - \mu) + 1 \cdot (-\lambda + \mu) = 0 \\ &\Rightarrow \lambda + \mu = 0 \quad \text{不妨取} \quad \lambda = 1, \mu = -1 \end{aligned}$$

## 平面束方程应用：求投影直线方程



解:

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ , 可设  $\Pi'$  方程为


$$\lambda(x + y - z - 1) + \mu(x - y + z + 1) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

$$2. \quad \vec{n}' \perp \vec{n} \Rightarrow \vec{n}' \cdot \vec{n} = 1 \cdot (\lambda + \mu) + 1 \cdot (\lambda - \mu) + 1 \cdot (-\lambda + \mu) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda + \mu = 0 \quad \text{不妨取} \quad \lambda = 1, \mu = -1$$

$$\Rightarrow \Pi' \text{ 的方程: } y - z - 1 = 0$$

## 平面束方程应用：求投影直线方程



解：

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ ，可设  $\Pi'$  方程为


$$\lambda(x + y - z - 1) + \mu(x - y + z + 1) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$


$$2. \quad \vec{n}' \perp \vec{n} \Rightarrow \vec{n}' \cdot \vec{n} = 1 \cdot (\lambda + \mu) + 1 \cdot (\lambda - \mu) + 1 \cdot (-\lambda + \mu) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda + \mu = 0 \quad \text{不妨取} \quad \lambda = 1, \mu = -1$$

$$\Rightarrow \Pi' \text{ 的方程: } y - z - 1 = 0$$

$$3. \text{ 投影直线 } L' \text{ 的方程是 } \begin{cases} y - z - 1 = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$






解:

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。






解:

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ , 可设  $\Pi'$  方程为


$$\lambda(2x - 4y + z) + \mu(3x - y - 2z - 9) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$



解:

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ , 可设  $\Pi'$  方程为

$$\lambda(2x - 4y + z) + \mu(3x - y - 2z - 9) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$




解:

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ , 可设  $\Pi'$  方程为

$$\lambda(2x - 4y + z) + \mu(3x - y - 2z - 9) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

2.  $\vec{n}' \perp \vec{n} \Rightarrow 0 = \vec{n}' \cdot \vec{n}$




解:

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ , 可设  $\Pi'$  方程为

$$\lambda(2x - 4y + z) + \mu(3x - y - 2z - 9) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

2.  $\vec{n}' \perp \vec{n} \Rightarrow 0 = \vec{n}' \cdot \vec{n}$




解:

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ , 可设  $\Pi'$  方程为

$$\lambda(2x - 4y + z) + \mu(3x - y - 2z - 9) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

2.  $\vec{n}' \perp \vec{n} \Rightarrow 0 = \vec{n}' \cdot \vec{n}$




解:

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ ，可设  $\Pi'$  方程为

$$\lambda(2x - 4y + z) + \mu(3x - y - 2z - 9) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

2.  $\vec{n}' \perp \vec{n} \Rightarrow 0 = \vec{n}' \cdot \vec{n}$

$$= 4 \cdot (2\lambda + 3\mu) + (-1) \cdot (-4\lambda - \mu) + 1 \cdot (\lambda - 2\mu)$$



解:


1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ , 可设  $\Pi'$  方程为

$$\lambda(2x - 4y + z) + \mu(3x - y - 2z - 9) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

2.  $\vec{n}' \perp \vec{n} \Rightarrow 0 = \vec{n}' \cdot \vec{n}$

$$= 4 \cdot (2\lambda + 3\mu) + (-1) \cdot (-4\lambda - \mu) + 1 \cdot (\lambda - 2\mu)$$

$$\Rightarrow 13\lambda + 11\mu = 0$$



解:

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ , 可设  $\Pi'$  方程为


$$\lambda(2x - 4y + z) + \mu(3x - y - 2z - 9) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

2.  $\vec{n}' \perp \vec{n} \Rightarrow 0 = \vec{n}' \cdot \vec{n}$

$$= 4 \cdot (2\lambda + 3\mu) + (-1) \cdot (-4\lambda - \mu) + 1 \cdot (\lambda - 2\mu)$$

$$\Rightarrow 13\lambda + 11\mu = 0 \quad \text{不妨取 } \lambda = 11, \mu = -13$$





解:

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ , 可设  $\Pi'$  方程为


$$\lambda(2x - 4y + z) + \mu(3x - y - 2z - 9) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

2.  $\vec{n}' \perp \vec{n} \Rightarrow 0 = \vec{n}' \cdot \vec{n}$

$$= 4 \cdot (2\lambda + 3\mu) + (-1) \cdot (-4\lambda - \mu) + 1 \cdot (\lambda - 2\mu)$$

$$\Rightarrow 13\lambda + 11\mu = 0 \quad \text{不妨取} \quad \lambda = 11, \mu = -13$$

$$\Rightarrow \Pi' \text{ 的方程: } y - z - 1 = 0$$



解:

1. 记  $\Pi'$  为  $L$  和  $L'$  张成平面。由于  $\Pi'$  过  $L$ , 可设  $\Pi'$  方程为

$$\lambda(2x - 4y + z) + \mu(3x - y - 2z - 9) = 0 \quad (\text{其中 } \lambda, \mu \text{ 待定})$$

2.  $\vec{n}' \perp \vec{n} \Rightarrow 0 = \vec{n}' \cdot \vec{n}$

$$= 4 \cdot (2\lambda + 3\mu) + (-1) \cdot (-4\lambda - \mu) + 1 \cdot (\lambda - 2\mu)$$

$$\Rightarrow 13\lambda + 11\mu = 0 \quad \text{不妨取 } \lambda = 11, \mu = -13$$

$$\Rightarrow \Pi' \text{ 的方程: } y - z - 1 = 0$$

3. 投影直线  $L'$  的方程是  $\begin{cases} 17x + 31y - 37z - 117 = 0 \\ 4x - y + z - 1 = 0 \end{cases}$