

第 10 周作业解答

练习 1. 问 $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 是否能由向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ 线性表示? 若能, 写出其中一个线性组合的表达式。

解

$$\begin{aligned} (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \mid \beta) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 5 & 2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[r_5+r_1]{r_2-2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & -6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -8 & 4 & -16 \\ 0 & 3 & -1 & 6 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[\frac{1}{4} \times r_4]{r_2 \leftrightarrow r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & 1 & -6 \\ 0 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & -1 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow[r_5-3r_2]{r_3+3r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[-\frac{1}{4} \times r_5]{\frac{1}{4} \times r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_2-r_3]{r_4-r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1-2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

可见 $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$, 所以 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 并且从最后简化的阶梯型矩阵容易看出:

$$\beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2 + 0\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2.$$

练习 2. 问向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是否线性相关? 若线性相关, 写出它们的一个相关表达式。有唯一解、无穷多解、无解。并且有解时, 求出全部解。

解

$$\begin{aligned} (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3) &= \left(\begin{array}{ccc} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left(\begin{array}{ccc} -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4+3r_1]{r_2+3r_1} \left(\begin{array}{ccc} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\frac{1}{4} \times r_2} \left(\begin{array}{ccc} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-4r_2} \left(\begin{array}{ccc} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4-r_3} \left(\begin{array}{ccc} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

可见 $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 3 =$ 向量个数, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

练习 3. 根据参数 a 的取值, 讨论向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ a \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}$ 何时线性相关, 何时线性无关。

解作矩阵

$$A = (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3) = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & a & 0 \\ a & 0 & a \end{pmatrix},$$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关当且仅当 $|A| = 0$, 线性无关当且仅当 $|A| \neq 0$ 。计算行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & a & 0 \\ a & 0 & a \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1 - c_3} \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按第 3 行展开}} (-1)^{3+3} a \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & a \end{vmatrix} = 2a(a-2).$$

所以

- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关 $\Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow a = 0$ 或 $a = 2$
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 0$ 且 $a \neq 2$

练习 4. 设 α, β, γ 线性无关, 证明: $\alpha, \alpha + \beta, \alpha + \beta + \gamma$ 也是线性无关。

证明设

$$\begin{aligned} 0 &= k_1\alpha + k_2(\alpha + \beta) + k_3(\alpha + \beta + \gamma) \\ &= (k_1 + k_2 + k_3)\alpha + (k_2 + k_3)\beta + k_3\gamma \end{aligned}$$

因为 α, β, γ 线性无关, 所以

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

所以 $\alpha, \alpha + \beta, \alpha + \beta + \gamma$ 线性无关。