

### §3.2 向量与向量组的线性组合

数学系 梁卓滨

2017 - 2018 学年 I

# 向量

- $n$  维行向量

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

# 向量

- $n$  维行向量

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

即为：  $1 \times n$  的矩阵。

# 向量

- $n$  维行向量

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

即为：  $1 \times n$  的矩阵。 $a_i$  称为  $\alpha$  的第  $i$  个分量。

# 向量

- $n$  维行向量

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

即为:  $1 \times n$  的矩阵。 $a_i$  称为  $\alpha$  的第  $i$  个分量。

- $n$  维列向量

$$\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$$

# 向量

- $n$  维行向量

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

即为:  $1 \times n$  的矩阵。 $a_i$  称为  $\alpha$  的第  $i$  个分量。

- $n$  维列向量

$$\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$$

即为:  $n \times 1$  的矩阵。

# 向量

- $n$  维行向量

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

即为:  $1 \times n$  的矩阵。 $a_i$  称为  $\alpha$  的第  $i$  个分量。

- $n$  维列向量

$$\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$$

即为:  $n \times 1$  的矩阵。 $b_i$  称为  $\beta$  的第  $i$  个分量。

# 向量

- $n$  维行向量

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

即为:  $1 \times n$  的矩阵。 $a_i$  称为  $\alpha$  的第  $i$  个分量。

- $n$  维列向量

$$\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$$

即为:  $n \times 1$  的矩阵。 $b_i$  称为  $\beta$  的第  $i$  个分量。

- 行向量、列向量统称向量。



# 向量

- $n$  维行向量

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

即为:  $1 \times n$  的矩阵。 $a_i$  称为  $\alpha$  的第  $i$  个分量。

- $n$  维列向量

$$\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$$

即为:  $n \times 1$  的矩阵。 $b_i$  称为  $\beta$  的第  $i$  个分量。

- 行向量、列向量统称向量。

根据上下文判断“向量”是行向量，或列向量

# 向量

- $n$  维行向量

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

即为:  $1 \times n$  的矩阵。 $a_i$  称为  $\alpha$  的第  $i$  个分量。

- $n$  维列向量

$$\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$$

即为:  $n \times 1$  的矩阵。 $b_i$  称为  $\beta$  的第  $i$  个分量。

- 行向量、列向量统称向量。

根据上下文判断“向量”是行向量，或列向量

- 零向量  $O = (0, 0, \dots, 0)$

## 向量的线性运算

- 设  $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ ,  $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ ,  $k \in \mathbb{R}$ , 则

$$\alpha + \beta = \quad , \quad \alpha - \beta = \quad , \quad k\alpha =$$

## 向量的线性运算

• 设  $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ ,  $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ ,  $k \in \mathbb{R}$ , 则

$$\alpha + \beta = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}, \quad \alpha - \beta = \quad, \quad k\alpha =$$

## 向量的线性运算

• 设  $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ ,  $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ ,  $k \in \mathbb{R}$ , 则

$$\alpha + \beta = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}, \quad \alpha - \beta = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \\ \vdots \\ a_n - b_n \end{pmatrix}, \quad k\alpha =$$

## 向量的线性运算

• 设  $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ ,  $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ ,  $k \in \mathbb{R}$ , 则

$$\alpha + \beta = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}, \quad \alpha - \beta = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \\ \vdots \\ a_n - b_n \end{pmatrix}, \quad k\alpha = \begin{pmatrix} ka_1 \\ ka_2 \\ \vdots \\ ka_n \end{pmatrix}$$

## 向量的线性运算

- 设  $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ ,  $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ ,  $k \in \mathbb{R}$ , 则

$$\alpha + \beta = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}, \quad \alpha - \beta = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \\ \vdots \\ a_n - b_n \end{pmatrix}, \quad k\alpha = \begin{pmatrix} ka_1 \\ ka_2 \\ \vdots \\ ka_n \end{pmatrix}$$

- 行向量类似

# 线性组合问题

给定向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \dots, \alpha_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

及一向量  $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$



# 线性组合问题

给定向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \dots, \alpha_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

及一向量  $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$

问 是否存在数  $k_1, k_2, \dots, k_n$  使得:

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n?$$

# 线性组合问题

给定向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \dots, \alpha_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

及一向量  $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$

问 是否存在数  $k_1, k_2, \dots, k_n$  使得:

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n?$$

如果能, 则称  $\beta$  是向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  的线性组合。

## 线性组合问题

例 判断  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3.$$

• (1) 问

$$\begin{array}{cccc} \beta & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{array}$$

## 线性组合问题

例 判断  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3.$$

• (1) 问

$$\begin{matrix} \beta \\ \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix} \end{matrix} = \begin{matrix} \alpha_1 \\ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{matrix} + \begin{matrix} \alpha_2 \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{matrix} + \begin{matrix} \alpha_3 \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

## 线性组合问题

例 判断  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3.$$

• (1) 问

$$\begin{matrix} \beta \\ \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix} \end{matrix} = \begin{matrix} \alpha_1 \\ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{matrix} + \text{---} \begin{matrix} \alpha_2 \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{matrix} + \text{---} \begin{matrix} \alpha_3 \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

## 线性组合问题

例 判断  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3.$$

• (1) 问

$$\begin{matrix} \beta \\ \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix} \end{matrix} = \begin{matrix} \alpha_1 \\ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{matrix} + \begin{matrix} \alpha_2 \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{matrix} + \begin{matrix} \alpha_3 \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$\underline{2} \quad \quad \underline{-7} \quad \quad \underline{\quad}$

## 线性组合问题

例 判断  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3.$$

• (1) 问

$$\begin{matrix} \beta \\ \left( \begin{array}{c} 2 \\ -7 \\ 5 \end{array} \right) \end{matrix} = \begin{matrix} \alpha_1 \\ \left( \begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right) \end{matrix} + \begin{matrix} \alpha_2 \\ \left( \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right) \end{matrix} + \begin{matrix} \alpha_3 \\ \left( \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 2 \end{array} \right) \end{matrix}$$

$\underline{2} \quad \quad \underline{-7} \quad \quad \underline{\frac{5}{2}}$

## 线性组合问题

例 判断  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3.$$

• (1) 问

$$\begin{matrix} \beta \\ \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix} \end{matrix} = \begin{matrix} \alpha_1 \\ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{matrix} + \begin{matrix} \alpha_2 \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{matrix} + \begin{matrix} \alpha_3 \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$= \underline{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \underline{-7} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \underline{\frac{5}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$\text{所以 } \beta = 2\alpha_1 - 7\alpha_2 + \frac{5}{2}\alpha_3;$$



## 线性组合问题

例 判断  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3.$$

• (1) 问

$$\begin{matrix} \beta \\ \left( \begin{array}{c} 2 \\ -7 \\ 5 \end{array} \right) \end{matrix} = \begin{matrix} \alpha_1 \\ \left( \begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right) \end{matrix} + \begin{matrix} \alpha_2 \\ \left( \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right) \end{matrix} + \begin{matrix} \alpha_3 \\ \left( \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 2 \end{array} \right) \end{matrix}$$

$= \underline{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \underline{-7} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \underline{\frac{5}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

所以  $\beta = 2\alpha_1 - 7\alpha_2 + \frac{5}{2}\alpha_3$ ;  $\beta$  能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表出

## 线性组合问题

例 判断  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3.$$

• (1) 问

$$\begin{matrix} \beta & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix} & = \underline{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \underline{-7} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \underline{\frac{5}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

所以  $\beta = 2\alpha_1 - 7\alpha_2 + \frac{5}{2}\alpha_3$ ;  $\beta$  能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表出

• (2) 问

$$\begin{matrix} \beta & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

## 线性组合问题

例 判断  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3.$$

• (1) 问

$$\begin{matrix} \beta & & \alpha_1 & & \alpha_2 & & \alpha_3 \\ \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix} & = & \underline{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & + & \underline{-7} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & + & \underline{\frac{5}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

所以  $\beta = 2\alpha_1 - 7\alpha_2 + \frac{5}{2}\alpha_3$ ;  $\beta$  能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表出

• (2) 问

$$\begin{matrix} \beta & & \alpha_1 & & \alpha_2 & & \alpha_3 \\ \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix} & = & - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & + & - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} & + & - \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

## 线性组合问题

例 判断  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3.$$

• (1) 问

$$\begin{matrix} \beta & & \alpha_1 & & \alpha_2 & & \alpha_3 \\ \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix} & = & \underline{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & + & \underline{-7} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & + & \underline{\frac{5}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

所以  $\beta = 2\alpha_1 - 7\alpha_2 + \frac{5}{2}\alpha_3$ ;  $\beta$  能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表出

• (2) 问

$$\begin{matrix} \beta & & \alpha_1 & & \alpha_2 & & \alpha_3 \\ \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix} & \not= & \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & + & \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} & + & \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

## 线性组合问题

例 判断  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3.$$

• (1) 问

$$\begin{matrix} \beta & & \alpha_1 & & \alpha_2 & & \alpha_3 \\ \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix} & = & \underline{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & + & \underline{-7} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & + & \underline{\frac{5}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

所以  $\beta = 2\alpha_1 - 7\alpha_2 + \frac{5}{2}\alpha_3$ ;  $\beta$  能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表出

• (2) 问

$$\begin{matrix} \beta & & \alpha_1 & & \alpha_2 & & \alpha_3 \\ \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix} & \not= & \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & + & \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} & + & \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

所以  $\beta$  不能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表出!

## 线性组合问题

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ; 及  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ , 问

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + -\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + -\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

即:  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表出? 如果能, 线性表达式是什么?

## 线性组合问题

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ; 及  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ , 问

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + -\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + -\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

即:  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表出? 如果能, 线性表达式是什么?

### 问题

- 一般地, 如何判断  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表出?

## 线性组合问题

例 设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ; 及  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ , 问

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + -\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + -\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

即:  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表出? 如果能, 线性表达式是什么?

### 问题

- 一般地, 如何判断  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表出?
- 如果能线性表出, 如何求出  $k_1, k_2, \dots, k_n$  使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n = \beta?$$



# 线性表示问题与线性方程组求解问题的联系

问题是否存在数  $k_1, k_2, \dots, k_n$  使

$$\begin{matrix} \beta \\ \left( \begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{array} \right) \end{matrix} = k_1 \begin{matrix} \alpha_1 \\ \left( \begin{array}{c} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{array} \right) \end{matrix} + k_2 \begin{matrix} \alpha_2 \\ \left( \begin{array}{c} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{array} \right) \end{matrix} + \cdots + k_n \begin{matrix} \alpha_n \\ \left( \begin{array}{c} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{array} \right) \end{matrix}$$

## 线性表示问题与线性方程组求解问题的联系

问题是否存在数  $k_1, k_2, \dots, k_n$  使

$$\begin{matrix} \beta \\ \left( \begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{array} \right) \end{matrix} = k_1 \begin{matrix} \alpha_1 \\ \left( \begin{array}{c} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{array} \right) \end{matrix} + k_2 \begin{matrix} \alpha_2 \\ \left( \begin{array}{c} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{array} \right) \end{matrix} + \cdots + k_n \begin{matrix} \alpha_n \\ \left( \begin{array}{c} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{array} \right) \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix}$$

## 线性表示问题与线性方程组求解问题的联系

问题是否存在数  $k_1, k_2, \dots, k_n$  使

$$\begin{matrix} \beta \\ \left( \begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{array} \right) \end{matrix} = k_1 \begin{matrix} \alpha_1 \\ \left( \begin{array}{c} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{array} \right) \end{matrix} + k_2 \begin{matrix} \alpha_2 \\ \left( \begin{array}{c} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{array} \right) \end{matrix} + \cdots + k_n \begin{matrix} \alpha_n \\ \left( \begin{array}{c} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{array} \right) \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \alpha_1 \\ \left( \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{array} \right) \end{matrix} \left( \begin{array}{c} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{array} \right)$$

# 线性表示问题与线性方程组求解问题的联系

问题是否存在数  $k_1, k_2, \dots, k_n$  使

$$\begin{matrix} \beta \\ \left( \begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{array} \right) \end{matrix} = k_1 \begin{matrix} \alpha_1 \\ \left( \begin{array}{c} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{array} \right) \end{matrix} + k_2 \begin{matrix} \alpha_2 \\ \left( \begin{array}{c} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{array} \right) \end{matrix} + \cdots + k_n \begin{matrix} \alpha_n \\ \left( \begin{array}{c} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{array} \right) \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix}$$

# 线性表示问题与线性方程组求解问题的联系

问题是否存在数  $k_1, k_2, \dots, k_n$  使

$$\begin{matrix} \beta \\ \left( \begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{array} \right) \end{matrix} = k_1 \begin{matrix} \alpha_1 \\ \left( \begin{array}{c} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{array} \right) \end{matrix} + k_2 \begin{matrix} \alpha_2 \\ \left( \begin{array}{c} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{array} \right) \end{matrix} + \dots + k_n \begin{matrix} \alpha_n \\ \left( \begin{array}{c} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{array} \right) \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \\ \left( \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{array} \right) \end{matrix} \begin{matrix} \left( \begin{array}{c} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{array} \right) \end{matrix}$$

## 线性表示问题与线性方程组求解问题的联系

问题是否存在数  $k_1, k_2, \dots, k_n$  使

$$\begin{matrix} \beta \\ \left( \begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{array} \right) \end{matrix} = k_1 \begin{matrix} \alpha_1 \\ \left( \begin{array}{c} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{array} \right) \end{matrix} + k_2 \begin{matrix} \alpha_2 \\ \left( \begin{array}{c} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{array} \right) \end{matrix} + \dots + k_n \begin{matrix} \alpha_n \\ \left( \begin{array}{c} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{array} \right) \end{matrix}$$

等价于

$$\begin{matrix} \alpha_1 & \alpha_2 & & \alpha_n \\ \left( \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{array} \right) \end{matrix} \begin{matrix} \beta \\ \left( \begin{array}{c} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{array} \right) \end{matrix} = \begin{matrix} \beta \\ \left( \begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{array} \right) \end{matrix}$$

## 线性表示问题与线性方程组求解问题的联系

问题是否存在数  $k_1, k_2, \dots, k_n$  使

$$\begin{matrix} \beta \\ \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \end{matrix} = k_1 \begin{matrix} \alpha_1 \\ \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} \end{matrix} + k_2 \begin{matrix} \alpha_2 \\ \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} \end{matrix} + \dots + k_n \begin{matrix} \alpha_n \\ \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

等价于

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

# 线性表示问题与线性方程组求解问题的联系

问题是否存在数  $k_1, k_2, \dots, k_n$  使

$$\begin{matrix} \beta \\ \left( \begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{array} \right) \end{matrix} = k_1 \begin{matrix} \alpha_1 \\ \left( \begin{array}{c} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{array} \right) \end{matrix} + k_2 \begin{matrix} \alpha_2 \\ \left( \begin{array}{c} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{array} \right) \end{matrix} + \cdots + k_n \begin{matrix} \alpha_n \\ \left( \begin{array}{c} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{array} \right) \end{matrix}$$

等价于

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \Leftrightarrow Ax = \beta$$



# 线性表示问题与线性方程组求解问题的联系

问题是否存在数  $k_1, k_2, \dots, k_n$  使

$$\begin{matrix} \beta \\ \left( \begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{array} \right) \end{matrix} = k_1 \begin{matrix} \alpha_1 \\ \left( \begin{array}{c} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{array} \right) \end{matrix} + k_2 \begin{matrix} \alpha_2 \\ \left( \begin{array}{c} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{array} \right) \end{matrix} + \dots + k_n \begin{matrix} \alpha_n \\ \left( \begin{array}{c} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{array} \right) \end{matrix}$$

等价于

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \Leftrightarrow Ax = \beta$$

方程有解等价于

# 线性表示问题与线性方程组求解问题的联系

问题是否存在数  $k_1, k_2, \dots, k_n$  使

$$\begin{matrix} \beta \\ \left( \begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{array} \right) \end{matrix} = k_1 \begin{matrix} \alpha_1 \\ \left( \begin{array}{c} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{array} \right) \end{matrix} + k_2 \begin{matrix} \alpha_2 \\ \left( \begin{array}{c} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{array} \right) \end{matrix} + \dots + k_n \begin{matrix} \alpha_n \\ \left( \begin{array}{c} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{array} \right) \end{matrix}$$

等价于

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \Leftrightarrow Ax = \beta$$

方程有解等价于

$$r(A) = r(A:\beta)$$

# 线性表示问题与线性方程组求解问题的联系

问题是否存在数  $k_1, k_2, \dots, k_n$  使

$$\begin{matrix} \beta \\ \left( \begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{array} \right) \end{matrix} = k_1 \begin{matrix} \alpha_1 \\ \left( \begin{array}{c} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{array} \right) \end{matrix} + k_2 \begin{matrix} \alpha_2 \\ \left( \begin{array}{c} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{array} \right) \end{matrix} + \dots + k_n \begin{matrix} \alpha_n \\ \left( \begin{array}{c} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{array} \right) \end{matrix}$$

等价于

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \Leftrightarrow Ax = \beta$$

方程有解等价于

$$r(A) = r(A:\beta) \Leftrightarrow r(\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n) = r(\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n \beta)$$

# 初等行变换求线性表示问题——例 1

**例** 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right)$$

# 初等行变换求线性表示问题——例 1

**例** 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

## 初等行变换求线性表示问题——例 1

例 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) =$  ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) =$  ,

## 初等行变换求线性表示问题——例 1

例 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) =$  ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) =$  ,

## 初等行变换求线性表示问题——例 1

例 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 3$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) =$  ,



## 初等行变换求线性表示问题——例 1

例 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 3$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 3$ ,

## 初等行变换求线性表示问题——例 1

例 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 3$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 3$ , 成立

$$r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$$

## 初等行变换求线性表示问题——例 1

例 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 3$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 3$ , 成立

$$r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$$

$\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示。

## 初等行变换求线性表示问题——例 1

**例** 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 3$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 3$ , 成立

$$r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$$

$\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示。

## 初等行变换求线性表示问题——例 1

**例** 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} \alpha'_1 & & & \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 3$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 3$ , 成立

$$r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$$

$\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示。

## 初等行变换求线性表示问题——例 1

**例** 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} \alpha'_1 & \alpha'_2 & & \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 3$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 3$ , 成立

$$r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$$

$\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示。

## 初等行变换求线性表示问题——例 1

**例** 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{array}{ccc|c} \alpha'_1 & \alpha'_2 & \alpha'_3 & \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

• 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 3$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 3$ , 成立

$$r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$$

$\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示。

## 初等行变换求线性表示问题——例 1

**例** 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{array}{cccc} \alpha'_1 & \alpha'_2 & \alpha'_3 & \beta' \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

• 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 3$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 3$ , 成立

$$r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$$

$\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示。



## 初等行变换求线性表示问题——例 1

**例** 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{array}{cccc} \alpha'_1 & \alpha'_2 & \alpha'_3 & \beta' \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

- 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 3$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 3$ , 成立

$$r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$$

$\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示。

- 显然  $\beta' = \alpha'_1 - \alpha'_2 + \alpha'_3$ ,

## 初等行变换求线性表示问题——例 1

**例** 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{array}{cccc} \alpha'_1 & \alpha'_2 & \alpha'_3 & \beta' \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

- 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 3$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 3$ , 成立

$$r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$$

$\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示。

- 显然  $\beta' = \alpha'_1 - \alpha'_2 + \alpha'_3$ , 是否也有  $\beta = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$ ?

## 初等行变换求线性表示问题——例 1

**例** 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{array}{cccc} \alpha'_1 & \alpha'_2 & \alpha'_3 & \beta' \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

- 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 3$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 3$ , 成立

$$r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$$

$\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示。

- 显然  $\beta' = \alpha'_1 - \alpha'_2 + \alpha'_3$ , 是否也有  $\beta = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$ ?

是的

# 初等行变换求线性表示问题——例 1

**例** 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(1)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{array}{cccc} \alpha'_1 & \alpha'_2 & \alpha'_3 & \beta' \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

• 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 3$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 3$ , 成立

$$r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$$

$\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示。

• 显然  $\beta' = \alpha'_1 - \alpha'_2 + \alpha'_3$ , 是否也有  $\beta = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$ ?

是的

**注** 可证明: 作初等行变换不改变列与列之间的“线性关系”。

## 初等行变换求线性表示问题——例 2

**例** 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(2)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & 4 & 11 \end{array} \right)$$

## 初等行变换求线性表示问题——例 2

**例** 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(2)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & 4 & 11 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

## 初等行变换求线性表示问题——例 2

**例** 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(2)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & 4 & 11 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) =$  ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) =$  ,

## 初等行变换求线性表示问题——例 2

例 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(2)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & 4 & 11 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) =$  ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) =$  ,



## 初等行变换求线性表示问题——例 2

例 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(2)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & 4 & 11 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 2$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) =$  ,

## 初等行变换求线性表示问题——例 2

例 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(2)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & 4 & 11 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 2$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 3$ ,

## 初等行变换求线性表示问题——例 2

例 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(2)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & 4 & 11 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 2$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 3$ , 成立

$$r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) \neq r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$$

## 初等行变换求线性表示问题——例 2

例 判断  $\beta$  是否能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 若能, 写出线性表示等式。

(2)

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 | \beta) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & 4 & 11 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• 所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = 2$ ,  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 3$ , 成立

$$r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) \neq r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$$

$\beta$  不能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示。

# 初等行变换求线性表示问题——总结

**问题**  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表示？若能，写出线性表示等式。

**步骤**

# 初等行变换求线性表示问题——总结

**问题**  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表示？若能，写出线性表示等式。

**步骤** 作初等 **行** 变换：

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n \mid \beta)$$

# 初等行变换求线性表示问题——总结

**问题**  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表示？若能，写出线性表示等式。

**步骤** 作初等 **行** 变换：

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n \mid \beta) \xrightarrow{\text{初等行变换}}$$

# 初等行变换求线性表示问题——总结

**问题**  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表示？若能，写出线性表示等式。

**步骤** 作初等 **行** 变换：

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n | \beta) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (\alpha'_1 \ \alpha'_2 \ \cdots \ \alpha'_n | \beta') \begin{matrix} \text{(简化)} \\ \text{阶梯型矩阵} \end{matrix}$$



# 初等行变换求线性表示问题——总结

**问题**  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表示？若能，写出线性表示等式。

**步骤** 作初等 **行** 变换：

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n | \beta) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (\alpha'_1 \ \alpha'_2 \ \cdots \ \alpha'_n | \beta') \begin{matrix} \text{(简化)} \\ \text{阶梯型矩阵} \end{matrix}$$

1.

$$\beta \text{ 由 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性表示} \iff r(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = r(\alpha_1 \cdots \alpha_n \ \beta)$$

# 初等行变换求线性表示问题——总结

**问题**  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表示? 若能, 写出线性表示等式。

**步骤** 作初等 **行** 变换:

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n | \beta) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (\alpha'_1 \ \alpha'_2 \ \cdots \ \alpha'_n | \beta') \begin{matrix} \text{(简化)} \\ \text{阶梯型矩阵} \end{matrix}$$

1.

$$\beta \text{ 由 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性表示} \iff r(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = r(\alpha_1 \cdots \alpha_n \ \beta)$$

$$\Updownarrow$$

$$r(\alpha'_1 \cdots \alpha'_n) = r(\alpha'_1 \cdots \alpha'_n \ \beta')$$

# 初等行变换求线性表示问题——总结

**问题**  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表示？若能，写出线性表示等式。

**步骤** 作初等 **行** 变换：

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n | \beta) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (\alpha'_1 \ \alpha'_2 \ \cdots \ \alpha'_n | \beta') \begin{matrix} \text{(简化)} \\ \text{阶梯型矩阵} \end{matrix}$$

1.

$$\beta \text{ 由 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性表示} \iff r(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = r(\alpha_1 \cdots \alpha_n \ \beta)$$

$$\Updownarrow$$

$$r(\alpha'_1 \cdots \alpha'_n) = r(\alpha'_1 \cdots \alpha'_n \ \beta')$$

2. 行变换前后列与列的线性关系不变，即：

# 初等行变换求线性表示问题——总结

**问题**  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表示? 若能, 写出线性表示等式。

**步骤** 作初等 **行** 变换:

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n | \beta) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (\alpha'_1 \ \alpha'_2 \ \cdots \ \alpha'_n | \beta') \begin{matrix} \text{(简化)} \\ \text{阶梯型矩阵} \end{matrix}$$

1.

$$\beta \text{ 由 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性表示} \iff r(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = r(\alpha_1 \cdots \alpha_n \ \beta)$$

$$\Updownarrow$$

$$r(\alpha'_1 \cdots \alpha'_n) = r(\alpha'_1 \cdots \alpha'_n \ \beta')$$

2. 行变换前后列与列的线性关系不变, 即:

$$\beta' = k_1 \alpha'_1 + \cdots + k_n \alpha'_n \Rightarrow$$

# 初等行变换求线性表示问题——总结

**问题**  $\beta$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表示？若能，写出线性表示等式。

**步骤** 作初等 **行** 变换：

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n | \beta) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (\alpha'_1 \ \alpha'_2 \ \cdots \ \alpha'_n | \beta') \begin{matrix} \text{(简化)} \\ \text{阶梯型矩阵} \end{matrix}$$

1.

$$\beta \text{ 由 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性表示} \iff r(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = r(\alpha_1 \cdots \alpha_n \beta)$$

$$\Updownarrow$$

$$r(\alpha'_1 \cdots \alpha'_n) = r(\alpha'_1 \cdots \alpha'_n \beta')$$

2. 行变换前后列与列的线性关系不变，即：

$$\beta' = k_1 \alpha'_1 + \cdots + k_n \alpha'_n \Rightarrow \beta = k_1 \alpha_1 + \cdots + k_n \alpha_n$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right)$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_3 - r_1}$$



例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_3 - r_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right)$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_3 - r_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right)$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_3 - r_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right)$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_3 - r_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1) \times r_2}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_3 - r_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1) \times r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right)$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_3 - r_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1) \times r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4 + 6r_2]{r_3 + r_2}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & -1 & 2 & | & 3 \\ 1 & 1 & 0 & | & 0 \\ 2 & -2 & 1 & | & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & -1 & 2 & | & 3 \\ 0 & -1 & -3 & | & -2 \\ 0 & -6 & -5 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1) \times r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & -1 & -3 & | & -2 \\ 0 & -6 & -5 & | & 1 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4 + 6r_2]{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & 0 & -1 & | & -5 \\ 0 & 0 & 7 & | & -17 \end{pmatrix}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & -1 & 2 & | & 3 \\ 1 & 1 & 0 & | & 0 \\ 2 & -2 & 1 & | & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & -1 & 2 & | & 3 \\ 0 & -1 & -3 & | & -2 \\ 0 & -6 & -5 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1) \times r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & -1 & -3 & | & -2 \\ 0 & -6 & -5 & | & 1 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4 + 6r_2]{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & 0 & -5 & | & -5 \\ 0 & 0 & -5 & | & -5 \end{pmatrix}$$



例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & -1 & 2 & | & 3 \\ 1 & 1 & 0 & | & 0 \\ 2 & -2 & 1 & | & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & -1 & 2 & | & 3 \\ 0 & -1 & -3 & | & -2 \\ 0 & -6 & -5 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1) \times r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & -1 & -3 & | & -2 \\ 0 & -6 & -5 & | & 1 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4 + 6r_2]{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & 0 & -5 & | & -5 \\ 0 & 0 & -17 & | & -17 \end{pmatrix}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & -1 & 2 & | & 3 \\ 1 & 1 & 0 & | & 0 \\ 2 & -2 & 1 & | & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & -1 & 2 & | & 3 \\ 0 & -1 & -3 & | & -2 \\ 0 & -6 & -5 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1) \times r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & -1 & -3 & | & -2 \\ 0 & -6 & -5 & | & 1 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4 + 6r_2]{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & 0 & -5 & | & -5 \\ 0 & 0 & -17 & | & -17 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & -1 & 2 & | & 3 \\ 1 & 1 & 0 & | & 0 \\ 2 & -2 & 1 & | & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & -1 & 2 & | & 3 \\ 0 & -1 & -3 & | & -2 \\ 0 & -6 & -5 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1) \times r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & -1 & -3 & | & -2 \\ 0 & -6 & -5 & | & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4 + 6r_2]{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & 0 & -5 & | & -5 \\ 0 & 0 & -17 & | & -17 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 - r_3}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & -1 & 2 & | & 3 \\ 1 & 1 & 0 & | & 0 \\ 2 & -2 & 1 & | & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & -1 & 2 & | & 3 \\ 0 & -1 & -3 & | & -2 \\ 0 & -6 & -5 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1) \times r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & -1 & -3 & | & -2 \\ 0 & -6 & -5 & | & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4 + 6r_2]{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & 0 & -5 & | & -5 \\ 0 & 0 & -17 & | & -17 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & -3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-2r_1]{r_3-r_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1) \times r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+6r_2]{r_3+r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & -17 & -17 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4-r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_1-3r_3]{r_2-2r_3}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-2r_1]{r_3-r_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1) \times r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+6r_2]{r_3+r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & -17 & -17 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4-r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_1-3r_3]{r_2-2r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-2r_1]{r_3-r_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1) \times r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+6r_2]{r_3+r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & -17 & -17 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4-r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_1-3r_3]{r_2-2r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-2r_1]{r_3-r_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1) \times r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+6r_2]{r_3+r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & -17 & -17 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4-r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_1-3r_3]{r_2-2r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$



例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-2r_1]{r_3-r_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1) \times r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+6r_2]{r_3+r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & -17 & -17 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4-r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_1-3r_3]{r_2-2r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1-2r_2}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-2r_1]{r_3-r_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1) \times r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+6r_2]{r_3+r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & -17 & -17 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4-r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_1-3r_3]{r_2-2r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1-2r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-2r_1]{r_3-r_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1) \times r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+6r_2]{r_3+r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & -17 & -17 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4-r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_1-3r_3]{r_2-2r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1-2r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-2r_1]{r_3-r_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1) \times r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+6r_2]{r_3+r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & -17 & -17 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4-r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_1-3r_3]{r_2-2r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1-2r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$ ,

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-2r_1]{r_3-r_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1) \times r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+6r_2]{r_3+r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & -17 & -17 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4-r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_1-3r_3]{r_2-2r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1-2r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$ , 能线性表示

例  $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  线性表示?

解  $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4-2r_1]{r_3-r_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1) \times r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & -6 & -5 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4+6r_2]{r_3+r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & -17 & -17 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4-r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_1-3r_3]{r_2-2r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1-2r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

所以  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta)$ , 能线性表示, 且  $\beta = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{cccc} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \beta \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \end{array}$$



例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{cccc} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \beta \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) & \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} & & \end{array}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{cccc} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \beta \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) & \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \end{array}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{cccc}
 \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \beta \\
 \left( \begin{array}{ccc|c}
 2 & -1 & 4 & 1 \\
 -1 & 3 & 3 & 2 \\
 1 & -2 & 0 & -1 \\
 1 & 4 & 11 & 6
 \end{array} \right) & \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} & \left( \begin{array}{ccc|c}
 1 & -2 & 0 & -1 \\
 -1 & 3 & 3 & 2 \\
 2 & -1 & 4 & 1 \\
 1 & 4 & 11 & 6
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \xrightarrow{r_2 + r_1} \\
 r_3 - 2r_1 \\
 r_4 - r_1
 \end{array}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{cccc} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \beta \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) & \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \\ & & \xrightarrow{\substack{r_2+r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-r_1}} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{array} \right) \end{array}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{cccc} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \beta \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) & \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{array}{l} r_2 + r_1 \\ r_3 - 2r_1 \end{array}} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -5 & 4 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 7 \end{array} \right) \end{array}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{cccc} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \beta \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) & \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow[r_3 - 2r_1]{\substack{r_2 + r_1 \\ r_4 - r_1}} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \end{array} \right) \end{array}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{cccc} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \beta \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) & \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \\ & & \xrightarrow{\substack{r_2+r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-r_1}} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 7 \end{array} \right) \end{array}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{cccc} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \beta \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) & \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{array}{l} r_2 + r_1 \\ r_3 - 2r_1 \end{array}} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 7 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_4 - 6r_2]{r_3 - 3r_2} \end{array}$$



例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{c}
 \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta \\
 \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \\
 \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{array}{l} r_2 + r_1 \\ r_3 - 2r_1 \end{array}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 6r_2]{r_3 - 3r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 1 \end{array} \right)
 \end{array}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{cccc} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \beta \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) & \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{array}{l} r_2 + r_1 \\ r_3 - 2r_1 \end{array}} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 7 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_4 - 6r_2]{r_3 - 3r_2} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{cccc} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \beta \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) & \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{array}{l} r_2 + r_1 \\ r_3 - 2r_1 \end{array}} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 7 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_4 - 6r_2]{r_3 - 3r_2} & \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 1 \end{array} \right) \end{array}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{c}
 \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta \\
 \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \\
 \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{array}{l} r_2 + r_1 \\ r_3 - 2r_1 \end{array}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 6r_2]{r_3 - 3r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 1 \end{array} \right) \\
 \xrightarrow{-\frac{1}{5} \times r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 1 \end{array} \right)
 \end{array}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{c}
 \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta \\
 \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \\
 \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{array}{l} r_2 + r_1 \\ r_3 - 2r_1 \end{array}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 6r_2]{r_3 - 3r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 1 \end{array} \right) \\
 \xrightarrow{-\frac{1}{5} \times r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 1 \end{array} \right)
 \end{array}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{c}
 \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta \\
 \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \\
 \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{array}{l} r_2 + r_1 \\ r_3 - 2r_1 \end{array}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 6r_2]{r_3 - 3r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 1 \end{array} \right) \\
 \xrightarrow{-\frac{1}{5} \times r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4 + 7r_3}
 \end{array}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{c}
 \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta \\
 \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \\
 \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{array}{l} r_2 + r_1 \\ r_3 - 2r_1 \end{array}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 6r_2]{r_3 - 3r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 1 \end{array} \right) \\
 \xrightarrow{-\frac{1}{5} \times r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4 + 7r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)
 \end{array}$$

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{c}
 \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta \\
 \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \\
 \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{array}{l} r_2 + r_1 \\ r_3 - 2r_1 \end{array}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 6r_2]{r_3 - 3r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 1 \end{array} \right) \\
 \xrightarrow{-\frac{1}{5} \times r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4 + 7r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)
 \end{array}$$



例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{c}
 \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta \\
 \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \\
 \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{array}{l} r_2 + r_1 \\ r_3 - 2r_1 \end{array}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 6r_2]{r_3 - 3r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 1 \end{array} \right) \\
 \xrightarrow{-\frac{1}{5} \times r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4 + 7r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)
 \end{array}$$

可见  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 4 > 3 = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3)$ ,

例  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$  能否由  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$  线性表示?

解

$$\begin{array}{c}
 \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \beta \\
 \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 11 & 6 \end{array} \right) \\
 \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{array}{l} r_2 + r_1 \\ r_3 - 2r_1 \end{array}} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 - 6r_2]{r_3 - 3r_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 1 \end{array} \right) \\
 \xrightarrow{-\frac{1}{5} \times r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_4 + 7r_3} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)
 \end{array}$$

可见  $r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \beta) = 4 > 3 = r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3)$ , 所以不能线性表示。

# 向量组的线性组合

定义 设有两个向量组

$$(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

$$(B): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

# 向量组的线性组合

定义 设有两个向量组

$$(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

$$(B): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

如果中  $(A)$  中每一向量均可由  $(B)$  线性表示, 则称向量组  $(A)$  可由向量组  $(B)$  线性表示。

# 向量组的线性组合

定义 设有两个向量组

$$(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

$$(B): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

如果中  $(A)$  中每一向量均可由  $(B)$  线性表示, 则称向量组  $(A)$  可由向量组  $(B)$  线性表示。

---

例 向量组  $\alpha_1, \alpha_2$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性表示

## 向量组的线性组合

定义 设有两个向量组

$$(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

$$(B): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

如果中  $(A)$  中每一向量均可由  $(B)$  线性表示, 则称向量组  $(A)$  可由向量组  $(B)$  线性表示。

例 向量组  $\alpha_1, \alpha_2$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性表示

$$\Longrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 \\ \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 \end{cases}$$

## 向量组的线性组合

定义 设有两个向量组

$$(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

$$(B): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

如果中  $(A)$  中每一向量均可由  $(B)$  线性表示, 则称向量组  $(A)$  可由向量组  $(B)$  线性表示。

例 向量组  $\alpha_1, \alpha_2$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性表示

$$\Longrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 + a_{31}\beta_3 \\ \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 \end{cases}$$

## 向量组的线性组合

定义 设有两个向量组

$$(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

$$(B): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

如果中  $(A)$  中每一向量均可由  $(B)$  线性表示, 则称向量组  $(A)$  可由向量组  $(B)$  线性表示。

例 向量组  $\alpha_1, \alpha_2$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性表示

$$\Longrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 + a_{31}\beta_3 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 + a_{32}\beta_3 \end{cases}$$



# 向量组的线性组合

定义 设有两个向量组

$$(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

$$(B): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

如果中  $(A)$  中每一向量均可由  $(B)$  线性表示, 则称向量组  $(A)$  可由向量组  $(B)$  线性表示。

例 向量组  $\alpha_1, \alpha_2$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性表示

$$\implies \begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 + a_{31}\beta_3 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 + a_{32}\beta_3 \end{cases}$$

$$\implies (\alpha_1, \alpha_2) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

# 向量组的线性组合

定义 设有两个向量组

$$(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

$$(B): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

如果中  $(A)$  中每一向量均可由  $(B)$  线性表示, 则称向量组  $(A)$  可由向量组  $(B)$  线性表示。

例 向量组  $\alpha_1, \alpha_2$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性表示

$$\Longrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 + a_{31}\beta_3 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 + a_{32}\beta_3 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow (\alpha_1, \alpha_2) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

## 向量组的线性组合

定义 设有两个向量组

$$(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

$$(B): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

如果中  $(A)$  中每一向量均可由  $(B)$  线性表示, 则称向量组  $(A)$  可由向量组  $(B)$  线性表示。

例 向量组  $\alpha_1, \alpha_2$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性表示

$$\implies \begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 + a_{31}\beta_3 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 + a_{32}\beta_3 \end{cases}$$

$$\implies (\alpha_1, \alpha_2) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}}_A$$

## 向量组的线性组合

定义 设有两个向量组

$$(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

$$(B): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

如果中  $(A)$  中每一向量均可由  $(B)$  线性表示, 则称向量组  $(A)$  可由向量组  $(B)$  线性表示。

例 向量组  $\alpha_1, \alpha_2$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性表示

$$\Longrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 + a_{31}\beta_3 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 + a_{32}\beta_3 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow (\alpha_1, \alpha_2) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}}_A = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)A$$

**注 1** 一般地, 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 当且仅当存在矩阵  $A_{t \times s}$  满足:

**注 1** 一般地, 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 当且仅当存在矩阵  $A_{t \times s}$  满足:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)A$$

**注 1** 一般地, 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 当且仅当存在矩阵  $A_{t \times s}$  满足:

$$\begin{aligned}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)A \\ &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{ts} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

**注 1** 一般地, 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 当且仅当存在矩阵  $A_{t \times s}$  满足:

$$\begin{aligned}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)A \\ &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{ts} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

这时  $A$  的每一列表示线性组合的系数。



**注 1** 一般地, 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 当且仅当存在矩阵  $A_{t \times s}$  满足:

$$\begin{aligned}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)A \\ &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{ts} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

这时  $A$  的每一列表示线性组合的系数。例如,

$$\alpha_j = \beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_t$$

**注 1** 一般地, 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 当且仅当存在矩阵  $A_{t \times s}$  满足:

$$\begin{aligned}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)A \\&= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{ts} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

这时  $A$  的每一列表示线性组合的系数。例如,

$$\alpha_j = a_{1j}\beta_1 + a_{2j}\beta_2 + \cdots + a_{tj}\beta_t$$

其中的系数就是  $A$  的第  $j$  列  $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{sj} \end{pmatrix}$ 。

**注 1** 一般地, 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 当且仅当存在矩阵  $A_{t \times s}$  满足:

$$\begin{aligned}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)A \\ &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{ts} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

这时  $A$  的每一列表示线性组合的系数。例如,

$$\alpha_j = a_{1j}\beta_1 + a_{2j}\beta_2 + \cdots + a_{tj}\beta_t$$

其中的系数就是  $A$  的第  $j$  列  $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{sj} \end{pmatrix}$ 。

**注 2** 若上述向量均为列向量,

**注 1** 一般地, 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 当且仅当存在矩阵  $A_{t \times s}$  满足:

$$\underbrace{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)}_P = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)A$$
$$= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{ts} \end{pmatrix}$$

这时  $A$  的每一列表示线性组合的系数。例如,

$$\alpha_j = a_{1j}\beta_1 + a_{2j}\beta_2 + \cdots + a_{tj}\beta_t$$

其中的系数就是  $A$  的第  $j$  列  $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{sj} \end{pmatrix}$ 。

**注 2** 若上述向量均为列向量,

**注 1** 一般地, 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 当且仅当存在矩阵  $A_{t \times s}$  满足:

$$\underbrace{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)}_P = \underbrace{(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)}_Q A$$
$$= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{ts} \end{pmatrix}$$

这时  $A$  的每一列表示线性组合的系数。例如,

$$\alpha_j = a_{1j}\beta_1 + a_{2j}\beta_2 + \cdots + a_{tj}\beta_t$$

其中的系数就是  $A$  的第  $j$  列  $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{sj} \end{pmatrix}$ 。

**注 2** 若上述向量均为列向量,

**注 1** 一般地, 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示, 当且仅当存在矩阵  $A_{t \times s}$  满足:

$$\underbrace{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)}_P = \underbrace{(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)}_Q A$$
$$= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{ts} \end{pmatrix}$$

这时  $A$  的每一列表示线性组合的系数。例如,

$$\alpha_j = a_{1j}\beta_1 + a_{2j}\beta_2 + \cdots + a_{tj}\beta_t$$

其中的系数就是  $A$  的第  $j$  列  $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{sj} \end{pmatrix}$ 。

**注 2** 若上述向量均为列向量, 则上式正好表示矩阵乘积:  $P = QA$

**定理（向量组线性表示的传递性）** 假设向量组  $(A)$ ,  $(B)$ ,  $(C)$  满足： $(A)$  可由  $(B)$  线性表示， $(B)$  可由  $(C)$  线性表示，则  $(A)$  可由  $(C)$  线性表示。

**定理（向量组线性表示的传递性）** 假设向量组  $(A)$ ,  $(B)$ ,  $(C)$  满足： $(A)$  可由  $(B)$  线性表示， $(B)$  可由  $(C)$  线性表示，则  $(A)$  可由  $(C)$  线性表示。

**证明** 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示：

向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  可由向量组  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$  线性表示：



**定理（向量组线性表示的传递性）** 假设向量组  $(A)$ ,  $(B)$ ,  $(C)$  满足： $(A)$  可由  $(B)$  线性表示， $(B)$  可由  $(C)$  线性表示，则  $(A)$  可由  $(C)$  线性表示。

**证明** 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示：

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)A_{t \times s}.$$

向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  可由向量组  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$  线性表示：

**定理（向量组线性表示的传递性）** 假设向量组  $(A)$ ,  $(B)$ ,  $(C)$  满足： $(A)$  可由  $(B)$  线性表示， $(B)$  可由  $(C)$  线性表示，则  $(A)$  可由  $(C)$  线性表示。

**证明** 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示：

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)A_{t \times s}.$$

向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  可由向量组  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$  线性表示：

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k)B_{k \times t}.$$

**定理（向量组线性表示的传递性）** 假设向量组  $(A)$ ,  $(B)$ ,  $(C)$  满足： $(A)$  可由  $(B)$  线性表示， $(B)$  可由  $(C)$  线性表示，则  $(A)$  可由  $(C)$  线性表示。

**证明** 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示：

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)A_{t \times s}.$$

向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  可由向量组  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$  线性表示：

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k)B_{k \times t}.$$

将第 2 式代入第 1 式，可得

**定理（向量组线性表示的传递性）** 假设向量组  $(A)$ ,  $(B)$ ,  $(C)$  满足： $(A)$  可由  $(B)$  线性表示， $(B)$  可由  $(C)$  线性表示，则  $(A)$  可由  $(C)$  线性表示。

**证明** 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示：

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)A_{t \times s}.$$

向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  可由向量组  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$  线性表示：

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k)B_{k \times t}.$$

将第 2 式代入第 1 式，可得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k)B_{k \times t}A_{t \times s}$$

**定理（向量组线性表示的传递性）** 假设向量组  $(A)$ ,  $(B)$ ,  $(C)$  满足： $(A)$  可由  $(B)$  线性表示， $(B)$  可由  $(C)$  线性表示，则  $(A)$  可由  $(C)$  线性表示。

**证明** 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示：

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)A_{t \times s}.$$

向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  可由向量组  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$  线性表示：

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k)B_{k \times t}.$$

将第 2 式代入第 1 式，可得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k) \underbrace{B_{k \times t} A_{t \times s}}_{C_{k \times s}}$$

**定理（向量组线性表示的传递性）** 假设向量组  $(A)$ ,  $(B)$ ,  $(C)$  满足： $(A)$  可由  $(B)$  线性表示， $(B)$  可由  $(C)$  线性表示，则  $(A)$  可由  $(C)$  线性表示。

**证明** 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示：

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)A_{t \times s}.$$

向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  可由向量组  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$  线性表示：

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k)B_{k \times t}.$$

将第 2 式代入第 1 式，可得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k) \underbrace{B_{k \times t} A_{t \times s}}_{C_{k \times s}} = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k)C.$$

**定理（向量组线性表示的传递性）** 假设向量组  $(A)$ ,  $(B)$ ,  $(C)$  满足： $(A)$  可由  $(B)$  线性表示， $(B)$  可由  $(C)$  线性表示，则  $(A)$  可由  $(C)$  线性表示。

**证明** 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示：

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)A_{t \times s}.$$

向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  可由向量组  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$  线性表示：

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k)B_{k \times t}.$$

将第 2 式代入第 1 式，可得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k) \underbrace{B_{k \times t} A_{t \times s}}_{C_{k \times s}} = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k)C.$$

所以向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$  线性表示。

**定理（向量组线性表示的传递性）** 假设向量组  $(A)$ ,  $(B)$ ,  $(C)$  满足： $(A)$  可由  $(B)$  线性表示， $(B)$  可由  $(C)$  线性表示，则  $(A)$  可由  $(C)$  线性表示。

**证明** 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表示：

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)A_{t \times s}.$$

向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  可由向量组  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$  线性表示：

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k)B_{k \times t}.$$

将第 2 式代入第 1 式，可得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k) \underbrace{B_{k \times t} A_{t \times s}}_{C_{k \times s}} = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k)C.$$

所以向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$  线性表示。

（并且，线性组合的系数就是矩阵  $C$  的列。）



例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\alpha_1 =$$

$$\alpha_2 =$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\alpha_1 = a_{11}( \quad ) + a_{21}( \quad )$$

$$\alpha_2 =$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\alpha_1 = a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}($$

$$\alpha_2 =$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\alpha_1 = a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3)$$

$$\alpha_2 =$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= ( \quad )\gamma_1 + ( \quad )\gamma_2 + ( \quad )\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\alpha_2 =$$



例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + ( \quad )\gamma_2 + ( \quad )\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\alpha_2 =$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\alpha_2 =$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\alpha_2 =$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\alpha_2 = a_{12}(\quad) + a_{22}(\quad)$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\alpha_2 = a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}( \quad )$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\alpha_2 = a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3)$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= ( \quad )\gamma_1 + ( \quad )\gamma_2 + ( \quad )\gamma_3 \end{aligned}$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12})\gamma_1 + ( \quad )\gamma_2 + ( \quad )\gamma_3 \end{aligned}$$



例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12})\gamma_1 + (a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22})\gamma_2 + (a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32})\gamma_3 \end{aligned}$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12})\gamma_1 + (a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22})\gamma_2 + (a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32})\gamma_3 \end{aligned}$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{11}\gamma_1 + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12})\gamma_1 + (a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22})\gamma_2 + (a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32})\gamma_3 \end{aligned}$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{11}\gamma_1 + c_{21}\gamma_2 + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12})\gamma_1 + (a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22})\gamma_2 + (a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32})\gamma_3 \end{aligned}$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{11}\gamma_1 + c_{21}\gamma_2 + c_{31}\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12})\gamma_1 + (a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22})\gamma_2 + (a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32})\gamma_3 \end{aligned}$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{11}\gamma_1 + c_{21}\gamma_2 + c_{31}\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12})\gamma_1 + (a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22})\gamma_2 + (a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{12}\gamma_1 + \end{aligned}$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{11}\gamma_1 + c_{21}\gamma_2 + c_{31}\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12})\gamma_1 + (a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22})\gamma_2 + (a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{12}\gamma_1 + c_{22}\gamma_2 + \end{aligned}$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{11}\gamma_1 + c_{21}\gamma_2 + c_{31}\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12})\gamma_1 + (a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22})\gamma_2 + (a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{12}\gamma_1 + c_{22}\gamma_2 + c_{32}\gamma_3 \end{aligned}$$



例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{11}\gamma_1 + c_{21}\gamma_2 + c_{31}\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12})\gamma_1 + (a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22})\gamma_2 + (a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{12}\gamma_1 + c_{22}\gamma_2 + c_{32}\gamma_3 \end{aligned}$$

其中

$$(c_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} & a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12} \\ a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22} & a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22} \\ a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32} & a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32} \end{pmatrix}$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{11}\gamma_1 + c_{21}\gamma_2 + c_{31}\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12})\gamma_1 + (a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22})\gamma_2 + (a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{12}\gamma_1 + c_{22}\gamma_2 + c_{32}\gamma_3 \end{aligned}$$

其中

$$(c_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} & a_{11}b_{21} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{12} & a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22} \\ a_{11}b_{31} + a_{12}b_{32} & a_{21}b_{31} + a_{22}b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases} \Rightarrow (\alpha_1, \alpha_2) = (\beta_1, \beta_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{11}\gamma_1 + c_{21}\gamma_2 + c_{31}\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12})\gamma_1 + (a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22})\gamma_2 + (a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{12}\gamma_1 + c_{22}\gamma_2 + c_{32}\gamma_3 \end{aligned}$$

其中

$$(c_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} & a_{11}b_{21} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{12} & a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22} \\ a_{11}b_{31} + a_{12}b_{32} & a_{21}b_{31} + a_{22}b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases} \Rightarrow (\alpha_1, \alpha_2) = (\beta_1, \beta_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases} \Rightarrow (\beta_1, \beta_2) = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{11}\gamma_1 + c_{21}\gamma_2 + c_{31}\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12})\gamma_1 + (a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22})\gamma_2 + (a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{12}\gamma_1 + c_{22}\gamma_2 + c_{32}\gamma_3 \end{aligned}$$

其中

$$(c_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} & a_{11}b_{21} + a_{12}b_{22} \\ a_{11}b_{31} + a_{12}b_{32} & a_{21}b_{11} + a_{22}b_{12} \\ a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22} & a_{21}b_{31} + a_{22}b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases} \Rightarrow (\alpha_1, \alpha_2) = (\beta_1, \beta_2) \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}}_A$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases} \Rightarrow (\beta_1, \beta_2) = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{11}\gamma_1 + c_{21}\gamma_2 + c_{31}\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12})\gamma_1 + (a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22})\gamma_2 + (a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{12}\gamma_1 + c_{22}\gamma_2 + c_{32}\gamma_3 \end{aligned}$$

其中

$$(c_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} & a_{11}b_{21} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{12} & a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{12} & a_{31}b_{21} + a_{32}b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases} \Rightarrow (\alpha_1, \alpha_2) = (\beta_1, \beta_2) \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}}_A$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases} \Rightarrow (\beta_1, \beta_2) = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}}_B$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{11}\gamma_1 + c_{21}\gamma_2 + c_{31}\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12})\gamma_1 + (a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22})\gamma_2 + (a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{12}\gamma_1 + c_{22}\gamma_2 + c_{32}\gamma_3 \end{aligned}$$

其中

$$(c_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} & a_{11}b_{21} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{12} & a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22} \\ a_{11}b_{31} + a_{12}b_{32} & a_{21}b_{31} + a_{22}b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

例  $\left. \begin{array}{l} \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \beta_1, \beta_2 \text{ 线性表示} \\ \beta_1, \beta_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2 \text{ 由 } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \text{ 线性表示}$

具体地, 设

$$\begin{cases} \alpha_1 = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 \\ \alpha_2 = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 \end{cases} \Rightarrow (\alpha_1, \alpha_2) = (\beta_1, \beta_2) \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}}_A$$

$$\begin{cases} \beta_1 = b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3 \\ \beta_2 = b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3 \end{cases} \Rightarrow (\beta_1, \beta_2) = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}}_B$$

则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{21}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12})\gamma_1 + (a_{11}b_{21} + a_{21}b_{22})\gamma_2 + (a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{11}\gamma_1 + c_{21}\gamma_2 + c_{31}\gamma_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= a_{12}(b_{11}\gamma_1 + b_{21}\gamma_2 + b_{31}\gamma_3) + a_{22}(b_{12}\gamma_1 + b_{22}\gamma_2 + b_{32}\gamma_3) \\ &= (a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12})\gamma_1 + (a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22})\gamma_2 + (a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32})\gamma_3 \\ &= c_{12}\gamma_1 + c_{22}\gamma_2 + c_{32}\gamma_3 \end{aligned}$$

其中

$$(c_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} & a_{11}b_{21} + a_{12}b_{22} \\ a_{11}b_{21} + a_{21}b_{12} & a_{11}b_{31} + a_{21}b_{32} \\ a_{12}b_{11} + a_{22}b_{12} & a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22} \\ a_{12}b_{31} + a_{22}b_{32} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = BA$$

定义 设有两个向量组

$$(A): \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

$$(B): \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

如果  $(A)$  与  $(B)$  可相互线性表示, 则称向量组  $(A)$  与  $(B)$  等价。