

## §6.4 微积分基本定理

2016-2017 学年 II

# 教学要求

---



## Outline of §6.4

---

1. 变上限的定积分
2. 微积分基本定理：牛顿—莱布尼茨公式

We are here now...

---

## 1. 变上限的定积分

## 2. 微积分基本定理：牛顿—莱布尼茨公式

定义 假设  $f(x)$  是区间  $[a, b]$  上的连续函数

$$\int_a^x f(t)dt, \quad \forall x \in [a, b]$$

定义 假设  $f(x)$  是区间  $[a, b]$  上的连续函数

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad \forall x \in [a, b]$$

**定义** 假设  $f(x)$  是区间  $[a, b]$  上的连续函数, 称

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad \forall x \in [a, b]$$


为变上限的定积分。

**定义** 假设  $f(x)$  是区间  $[a, b]$  上的连续函数，称

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad \forall x \in [a, b]$$

为变上限的定积分。

几何意义：以“ $f(x) \geq 0$  情形”为例说明






**定义** 假设  $f(x)$  是区间  $[a, b]$  上的连续函数，称

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad \forall x \in [a, b]$$

为变上限的定积分。

几何意义：以“ $f(x) \geq 0$  情形”为例说明




**定义** 假设  $f(x)$  是区间  $[a, b]$  上的连续函数，称

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad \forall x \in [a, b]$$

为变上限的定积分。

几何意义：以“ $f(x) \geq 0$  情形”为例说明




**定义** 假设  $f(x)$  是区间  $[a, b]$  上的连续函数，称

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad \forall x \in [a, b]$$

为变上限的定积分。

几何意义：以 “ $f(x) \geq 0$  情形” 为例说明




**定义** 假设  $f(x)$  是区间  $[a, b]$  上的连续函数，称

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad \forall x \in [a, b]$$

为变上限的定积分。

几何意义：以 “ $f(x) \geq 0$  情形” 为例说明




**定义** 假设  $f(x)$  是区间  $[a, b]$  上的连续函数，称

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad \forall x \in [a, b]$$

为变上限的定积分。

几何意义：以“ $f(x) \geq 0$  情形”为例说明



$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt \quad \forall x \in [a, b]$$

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' =? \quad \forall x \in [a, b]$$

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$



微积分基本定理 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

微积分基本定理 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

微积分基本定理 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

---

证明

$$\Phi'(x) =$$

**微积分基本定理** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

---

**证明**

$$\Phi'(x) = \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x}$$

**微积分基本定理** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

---

**证明**

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x}$$


**微积分基本定理** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

**证明**

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x}$$




**微积分基本定理** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

**证明**

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x}$$




**微积分基本定理** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

**证明**

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x}$$






**微积分基本定理** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

**证明**

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x}$$




**微积分基本定理** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

**证明**

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x}$$




**微积分基本定理** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

**证明**

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x}$$




**微积分基本定理** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

**证明**




**微积分基本定理** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

**证明**



**微积分基本定理** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么


$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

**证明**

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} = f(x)$$

=




**微积分基本定理** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

**证明**

$$\begin{aligned}\Phi'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[ \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right] \\&= \end{aligned}$$




**微积分基本定理** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

**证明**

$$\begin{aligned}\Phi'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[ \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right] \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \\&= \end{aligned}$$






**微积分基本定理** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

**证明**

$$\begin{aligned}\Phi'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[ \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right] \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} (f(\xi) \Delta x)\end{aligned}$$




**微积分基本定理** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

**证明**

$$\begin{aligned}\Phi'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[ \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right] \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} (f(\xi) \Delta x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi)\end{aligned}$$




**微积分基本定理** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 那么

$$\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

也就是:  $\int_a^x f(t) dt$  是  $f(x)$  的一个原函数!

**证明**

$$\begin{aligned}\Phi'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[ \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right] \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} (f(\xi) \Delta x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = f(x)\end{aligned}$$



微积分基本定理  $\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$

---

微积分基本定理  $\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$

---

例  $\left[ \int_2^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}.$

微积分基本定理  $\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$

---

例  $\left[ \int_2^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{e^{-x} \sin(x^2)}.$

微积分基本定理  $\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$

---

例  $\left[ \int_2^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{e^{-x} \sin(x^2)}.$

例  $\left[ \int_x^0 e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}$

微积分基本定理  $\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$

---

例  $\left[ \int_2^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{e^{-x} \sin(x^2)}.$

例  $\left[ \int_x^0 e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}$

解

$$\left[ \int_x^0 e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \left[ - \int_0^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]'$$



微积分基本定理  $\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$

---

例  $\left[ \int_2^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{e^{-x} \sin(x^2)}.$

例  $\left[ \int_x^0 e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}$

解

$$\left[ \int_x^0 e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \left[ - \int_0^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = e^{-x} \sin(x^2).$$

微积分基本定理  $\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$

---

例  $\left[ \int_2^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{e^{-x} \sin(x^2)}.$

例  $\left[ \int_x^0 e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}$

解

$$\left[ \int_x^0 e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \left[ - \int_0^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = -e^{-x} \sin(x^2).$$

微积分基本定理  $\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$

---

例  $\left[ \int_2^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{e^{-x} \sin(x^2)}.$

例  $\left[ \int_x^0 e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}$

解

$$\left[ \int_x^0 e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \left[ - \int_0^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = -e^{-x} \sin(x^2).$$

例  $\left[ \int_x^{-2} e^{\sin t} dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}$

微积分基本定理  $\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$

---

例  $\left[ \int_2^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{e^{-x} \sin(x^2)}.$

例  $\left[ \int_x^0 e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}$

解

$$\left[ \int_x^0 e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \left[ - \int_0^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = -e^{-x} \sin(x^2).$$

例  $\left[ \int_x^{-2} e^{\sin t} dt \right]' = \underline{-e^{\sin x}}$

微积分基本定理  $\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$

---

例  $\left[ \int_2^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{e^{-x} \sin(x^2)}.$

例  $\left[ \int_x^0 e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}$

解

$$\left[ \int_x^0 e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \left[ - \int_0^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = -e^{-x} \sin(x^2).$$

例  $\left[ \int_x^{-2} e^{\sin t} dt \right]' = \underline{-e^{\sin x}}$

$$\therefore \left[ \int_x^{-2} e^{\sin t} dt \right]' = \left[ - \int_{-2}^x e^{\sin t} dt \right]'$$

微积分基本定理  $\Phi'(x) = \left[ \int_a^x f(t) dt \right]' = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$

---

例  $\left[ \int_2^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{e^{-x} \sin(x^2)}.$

例  $\left[ \int_x^0 e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}$

解

$$\left[ \int_x^0 e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = \left[ - \int_0^x e^{-t} \sin(t^2) dt \right]' = -e^{-x} \sin(x^2).$$

例  $\left[ \int_x^{-2} e^{\sin t} dt \right]' = \underline{-e^{\sin x}}$

$$\therefore \left[ \int_x^{-2} e^{\sin t} dt \right]' = \left[ - \int_{-2}^x e^{\sin t} dt \right]' = -e^{\sin x}.$$

注:

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' =$$

注:

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$



注:

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

注:

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}; \left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}.$$

注：

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}; \left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解：

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' =$$

注：

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}; \left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解：

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \cos(x^2).$$

注：

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}; \left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解：

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \cos(x^2) \cdot (x^2)'$$

注：

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}; \left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解：

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \cos(x^2) \cdot (x^2)' = 2x \cos(x^2)$$

注：

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}; \left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解：

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \cos(x^2) \cdot (x^2)' = 2x \cos(x^2)$$

$$\left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' =$$

注：

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}; \left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解：

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \cos(x^2) \cdot (x^2)' = 2x \cos(x^2)$$

$$\left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = - \left[ \int_{-1}^{2x} \sqrt{1+t^2} dt \right]' =$$



注：

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}; \left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解：

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \cos(x^2) \cdot (x^2)' = 2x \cos(x^2)$$

$$\left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = - \left[ \int_{-1}^{2x} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = \sqrt{1+4x^2}.$$

注：

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}; \left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解：

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \cos(x^2) \cdot (x^2)' = 2x \cos(x^2)$$

$$\left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = - \left[ \int_{-1}^{2x} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = \sqrt{1+4x^2} \cdot (2x)'$$

注：

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}; \left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解：

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \cos(x^2) \cdot (x^2)' = 2x \cos(x^2)$$

$$\left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = - \left[ \int_{-1}^{2x} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = - \sqrt{1+4x^2} \cdot (2x)'$$

注：

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}; \left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解：

$$\left[ \int_1^{x^2} \cos t dt \right]' = \cos(x^2) \cdot (x^2)' = 2x \cos(x^2)$$

$$\begin{aligned} \left[ \int_{2x}^{-1} \sqrt{1+t^2} dt \right]' &= - \left[ \int_{-1}^{2x} \sqrt{1+t^2} dt \right]' = - \sqrt{1+4x^2} \cdot (2x)' \\ &= -2\sqrt{1+4x^2} \end{aligned}$$

注:

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例  $\left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}};$

注:

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例  $\left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}};$

解 :

$$\left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]'$$

注:

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例  $\left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}};$

解:

$$\left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' = \left[ \int_{x^3}^0 \ln(1+t) dt + \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]'$$

注:

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例  $\left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}};$

解:

$$\begin{aligned} \left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' &= \left[ \int_{x^3}^0 \ln(1+t) dt + \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= \left[ - \int_0^{x^3} \ln(1+t) dt + \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \end{aligned}$$



注：

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例  $\left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}};$

解：

$$\begin{aligned} \left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' &= \left[ \int_{x^3}^0 \ln(1+t) dt + \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= \left[ - \int_0^{x^3} \ln(1+t) dt + \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= - \left[ \int_0^{x^3} \ln(1+t) dt \right]' + \left[ \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= \end{aligned}$$

注：

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例  $\left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}};$

解：

$$\begin{aligned} \left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' &= \left[ \int_{x^3}^0 \ln(1+t) dt + \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= \left[ - \int_0^{x^3} \ln(1+t) dt + \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= - \left[ \int_0^{x^3} \ln(1+t) dt \right]' + \left[ \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= -\ln(1+x^3). \end{aligned}$$

注:

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

例  $\left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}};$

解:

$$\begin{aligned} \left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' &= \left[ \int_{x^3}^0 \ln(1+t) dt + \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= \left[ - \int_0^{x^3} \ln(1+t) dt + \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= - \left[ \int_0^{x^3} \ln(1+t) dt \right]' + \left[ \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= - \ln(1+x^3) \cdot (x^3)' \end{aligned}$$

注:

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

例  $\left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}};$

解:

$$\begin{aligned} \left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' &= \left[ \int_{x^3}^0 \ln(1+t) dt + \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= \left[ - \int_0^{x^3} \ln(1+t) dt + \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= - \left[ \int_0^{x^3} \ln(1+t) dt \right]' + \left[ \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= - \ln(1+x^3) \cdot (x^3)' \ln(1+x^2). \end{aligned}$$

注：

$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例  $\left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}};$

解：

$$\begin{aligned} \left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' &= \left[ \int_{x^3}^0 \ln(1+t) dt + \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= \left[ - \int_0^{x^3} \ln(1+t) dt + \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= - \left[ \int_0^{x^3} \ln(1+t) dt \right]' + \left[ \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= - \ln(1+x^3) \cdot (x^3)' + \ln(1+x^2) \cdot (x^2)' \end{aligned}$$

注: 
$$\left[ \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

---

例  $\left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' = \underline{\hspace{2cm}};$

解:

$$\begin{aligned} \left[ \int_{x^3}^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' &= \left[ \int_{x^3}^0 \ln(1+t) dt + \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= \left[ - \int_0^{x^3} \ln(1+t) dt + \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= - \left[ \int_0^{x^3} \ln(1+t) dt \right]' + \left[ \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt \right]' \\ &= - \ln(1+x^3) \cdot (x^3)' + \ln(1+x^2) \cdot (x^2)' \\ &= -3x^2 \ln(1+x^3) + 2x \ln(1+x^2). \end{aligned}$$

We are here now...

---

1. 变上限的定积分

2. 微积分基本定理：牛顿—莱布尼茨公式

## 牛顿—莱布尼茨公式

$$\int_a^b f(x)dx =$$



## 牛顿—莱布尼茨公式

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

## 牛顿—莱布尼茨公式

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

## 牛顿—莱布尼茨公式

设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续,  $F(x)$  是  $f(x)$  任意一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

## 牛顿—莱布尼茨公式

设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续,  $F(x)$  是  $f(x)$  任意一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

---

证明:

## 牛顿—莱布尼茨公式

设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续,  $F(x)$  是  $f(x)$  任意一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

---

证明:

$\because \Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$  是  $f(x)$  的一个原函数

## 牛顿—莱布尼茨公式

设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续,  $F(x)$  是  $f(x)$  任意一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

---

证明:

$\therefore \Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$  是  $f(x)$  的一个原函数

$$\therefore F(x) = \Phi(x) + C$$

## 牛顿—莱布尼茨公式

设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续,  $F(x)$  是  $f(x)$  任意一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

证明:

$\therefore \Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$  是  $f(x)$  的一个原函数

$$\therefore F(x) = \Phi(x) + C$$

$$\therefore F(b) - F(a) = ( \quad ) - ( \quad )$$

## 牛顿—莱布尼茨公式

设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续,  $F(x)$  是  $f(x)$  任意一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

证明:

$\therefore \Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$  是  $f(x)$  的一个原函数

$$\therefore F(x) = \Phi(x) + C$$

$$\therefore F(b) - F(a) = (\Phi(b) + C) - ( \quad )$$



## 牛顿—莱布尼茨公式

设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续,  $F(x)$  是  $f(x)$  任意一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

---

证明:

$\therefore \Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$  是  $f(x)$  的一个原函数

$$\therefore F(x) = \Phi(x) + C$$

$$\therefore F(b) - F(a) = (\Phi(b) + C) - (\Phi(a) + C)$$

## 牛顿—莱布尼茨公式

设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续,  $F(x)$  是  $f(x)$  任意一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

证明:

$\therefore \Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$  是  $f(x)$  的一个原函数

$$\therefore F(x) = \Phi(x) + C$$

$$\begin{aligned}\therefore F(b) - F(a) &= (\Phi(b) + C) - (\Phi(a) + C) \\ &= \Phi(b) - \Phi(a)\end{aligned}$$

## 牛顿—莱布尼茨公式

设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续,  $F(x)$  是  $f(x)$  任意一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

证明:

$$\therefore \Phi(x) = \int_a^x f(t)dt \text{ 是 } f(x) \text{ 的一个原函数}$$

$$\therefore F(x) = \Phi(x) + C$$

$$\therefore F(b) - F(a) = (\Phi(b) + C) - (\Phi(a) + C)$$

$$= \Phi(b) - \Phi(a)$$

$$= \int_a^b f(t)dt - \int_a^a f(t)dt$$

## 牛顿—莱布尼茨公式

设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续,  $F(x)$  是  $f(x)$  任意一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

证明:

$\therefore \Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$  是  $f(x)$  的一个原函数

$$\therefore F(x) = \Phi(x) + C$$

$$\therefore F(b) - F(a) = (\Phi(b) + C) - (\Phi(a) + C)$$

$$= \Phi(b) - \Phi(a)$$

$$= \int_a^b f(t)dt - \int_a^a f(t)dt = \int_a^b f(t)dt$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

---

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

---

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx =$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

---

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}x^3$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

---

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^1$$



牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

---

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

---

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

---

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx =$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} =$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} =$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} =$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} =$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

---

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2}$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} =$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} =$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = -(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0)$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} =$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} =$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = -(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0) = 1$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} =$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} =$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

---

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = -(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0) = 1$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} =$$



牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

---

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = -(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0) = 1$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_1^{\sqrt{3}}$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} =$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = -(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0) = 1$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_1^{\sqrt{3}} = \arctan \sqrt{3} - \arctan 1$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} =$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = -(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0) = 1$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_1^{\sqrt{3}} = \arctan \sqrt{3} - \arctan 1 = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} =$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = -(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0) = 1$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_1^{\sqrt{3}} = \arctan \sqrt{3} - \arctan 1 = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} =$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = -(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0) = 1$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_1^{\sqrt{3}} = \arctan \sqrt{3} - \arctan 1 = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} = \ln |x|$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = -(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0) = 1$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_1^{\sqrt{3}} = \arctan \sqrt{3} - \arctan 1 = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} = \ln |x| \Big|_{-2}^{-1}$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = -(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0) = 1$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_1^{\sqrt{3}} = \arctan \sqrt{3} - \arctan 1 = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} = \ln |x| \Big|_{-2}^{-1} = \ln |-1| - \ln |-2|$$

牛顿—莱布尼茨公式  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$ .

例 计算定积分

$$\int_0^1 x^2 dx; \quad \int_0^{\pi/2} \sin x dx; \quad \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}; \quad \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$$

解

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = -(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0) = 1$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_1^{\sqrt{3}} = \arctan \sqrt{3} - \arctan 1 = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} = \ln |x| \Big|_{-2}^{-1} = \ln |-1| - \ln |-2| = -\ln 2$$



## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x - 5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x - 5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

提示：先求出  $\int (2x - 5)dx$ ,  $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ,  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x - 5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

提示：先求出  $\int (2x - 5)dx$ ,  $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ,  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

解

## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x-5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

提示：先求出  $\int (2x-5)dx$ ,  $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ,  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

解

$$\int_0^2 (2x-5)dx =$$

$$\int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx =$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$

## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x-5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

提示：先求出  $\int (2x-5)dx$ ,  $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ,  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

解

$$\int_0^2 (2x-5)dx = (x^2 - 5x)$$

$$\int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx =$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$

## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x-5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

提示：先求出  $\int (2x-5)dx$ ,  $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ,  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

解

$$\int_0^2 (2x-5)dx = (x^2 - 5x) \Big|_0^2$$

$$\int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx =$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$

## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x-5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

提示：先求出  $\int (2x-5)dx$ ,  $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ,  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

解

$$\int_0^2 (2x-5)dx = (x^2 - 5x) \Big|_0^2 = -6 - 0$$

$$\int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx =$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$

## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x-5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

提示：先求出  $\int (2x-5)dx$ ,  $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ,  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

解

$$\int_0^2 (2x-5)dx = (x^2 - 5x) \Big|_0^2 = -6 - 0 = -6$$

$$\int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx =$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$



## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x-5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

提示：先求出  $\int (2x-5)dx$ ,  $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ,  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

解

$$\int_0^2 (2x-5)dx = (x^2 - 5x)|_0^2 = -6 - 0 = -6$$

$$\int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \int_4^9 x^{-1/2}dx =$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$

## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x-5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

提示：先求出  $\int (2x-5)dx$ ,  $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ,  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

解

$$\int_0^2 (2x-5)dx = (x^2 - 5x) \Big|_0^2 = -6 - 0 = -6$$

$$\int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \int_4^9 x^{-1/2}dx = 2\sqrt{x}$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$

## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x-5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

提示：先求出  $\int (2x-5)dx$ ,  $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ,  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

解

$$\int_0^2 (2x-5)dx = (x^2 - 5x) \Big|_0^2 = -6 - 0 = -6$$

$$\int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \int_4^9 x^{-1/2}dx = 2\sqrt{x} \Big|_4^9$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$

## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x-5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

提示：先求出  $\int (2x-5)dx$ ,  $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ,  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

解

$$\int_0^2 (2x-5)dx = (x^2 - 5x) \Big|_0^2 = -6 - 0 = -6$$

$$\int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \int_4^9 x^{-1/2}dx = 2\sqrt{x} \Big|_4^9 = 2(3-2)$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$

## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x-5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

提示：先求出  $\int (2x-5)dx$ ,  $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ,  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

解

$$\int_0^2 (2x-5)dx = (x^2 - 5x)|_0^2 = -6 - 0 = -6$$

$$\int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \int_4^9 x^{-1/2}dx = 2\sqrt{x}|_4^9 = 2(3-2) = 2$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$

## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x-5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

提示：先求出  $\int (2x-5)dx$ ,  $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ,  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

解

$$\int_0^2 (2x-5)dx = (x^2 - 5x) \Big|_0^2 = -6 - 0 = -6$$

$$\int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \int_4^9 x^{-1/2}dx = 2\sqrt{x} \Big|_4^9 = 2(3-2) = 2$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x \Big|_0^{1/2}$$

## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x-5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

提示：先求出  $\int (2x-5)dx$ ,  $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ,  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

解

$$\int_0^2 (2x-5)dx = (x^2 - 5x) \Big|_0^2 = -6 - 0 = -6$$

$$\int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \int_4^9 x^{-1/2}dx = 2\sqrt{x} \Big|_4^9 = 2(3-2) = 2$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x \Big|_0^{1/2} = \arcsin \frac{1}{2} - \arcsin 0$$

## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x-5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

提示：先求出  $\int (2x-5)dx$ ,  $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ,  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

解

$$\int_0^2 (2x-5)dx = (x^2 - 5x) \Big|_0^2 = -6 - 0 = -6$$

$$\int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \int_4^9 x^{-1/2}dx = 2\sqrt{x} \Big|_4^9 = 2(3-2) = 2$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x \Big|_0^{1/2} = \arcsin \frac{1}{2} - \arcsin 0 = \frac{\pi}{6} - 0$$



## 练习 计算定积分

$$\int_0^2 (2x-5)dx; \quad \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx; \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

提示：先求出  $\int (2x-5)dx$ ,  $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ ,  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

解

$$\int_0^2 (2x-5)dx = (x^2 - 5x) \Big|_0^2 = -6 - 0 = -6$$

$$\int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \int_4^9 x^{-1/2}dx = 2\sqrt{x} \Big|_4^9 = 2(3-2) = 2$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x \Big|_0^{1/2} = \arcsin \frac{1}{2} - \arcsin 0 = \frac{\pi}{6} - 0 = \frac{\pi}{6}$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解  $\int_0^2 |1-x|dx$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解 
$$\int_0^2 |1-x|dx$$
$$= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解 
$$\int_0^2 |1-x|dx$$
$$= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx +$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解  $\int_0^2 |1-x|dx$

$$= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解  $\int_0^2 |1-x|dx$

$$= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx$$

$$= (x - \frac{1}{2}x^2)$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解  $\int_0^2 |1-x|dx$

$$= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx$$

$$= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right) + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)$$



例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解  $\int_0^2 |1-x|dx$

$$= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx$$

$$= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解  $\int_0^2 |1-x|dx$

$$= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx$$

$$= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_1^2$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解  $\int_0^2 |1-x|dx$

$$= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx$$

$$= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_1^2 = \left[\frac{1}{2} - 0\right] +$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解  $\int_0^2 |1-x|dx$

$$= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx$$

$$= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_1^2 = \left[\frac{1}{2} - 0\right] + \left[0 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right]$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解  $\int_0^2 |1-x|dx$

$$= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx$$

$$= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_1^2 = \left[\frac{1}{2} - 0\right] + \left[0 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] = 1$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解  $\int_0^2 |1-x|dx$

$$= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx$$

$$= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_1^2 = \left[\frac{1}{2} - 0\right] + \left[0 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] = 1$$

练习 计算定积分  $\int_0^3 |2-x|dx$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解  $\int_0^2 |1-x|dx$

$$= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx$$

$$= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_1^2 = \left[\frac{1}{2} - 0\right] + \left[0 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] = 1$$

练习 计算定积分  $\int_0^3 |2-x|dx$

解  $\int_0^3 |2-x|dx$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解  $\int_0^2 |1-x|dx$

$$= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx$$

$$= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_1^2 = \left[\frac{1}{2} - 0\right] + \left[0 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] = 1$$

练习 计算定积分  $\int_0^3 |2-x|dx$

解  $\int_0^3 |2-x|dx$

$$= \int_0^2 |2-x|dx + \int_2^3 |2-x|dx$$



例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解 
$$\begin{aligned} & \int_0^2 |1-x|dx \\ &= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx \\ &= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_1^2 = \left[\frac{1}{2} - 0\right] + \left[0 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] = 1 \end{aligned}$$

练习 计算定积分  $\int_0^3 |2-x|dx$

解 
$$\begin{aligned} & \int_0^3 |2-x|dx \\ &= \int_0^2 |2-x|dx + \int_2^3 |2-x|dx = \int_0^2 (2-x)dx + \end{aligned}$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解 
$$\begin{aligned} & \int_0^2 |1-x|dx \\ &= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx \\ &= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_1^2 = \left[\frac{1}{2} - 0\right] + \left[0 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] = 1 \end{aligned}$$

练习 计算定积分  $\int_0^3 |2-x|dx$

解 
$$\begin{aligned} & \int_0^3 |2-x|dx \\ &= \int_0^2 |2-x|dx + \int_2^3 |2-x|dx = \int_0^2 (2-x)dx + \int_2^3 (x-2)dx \end{aligned}$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解  $\int_0^2 |1-x|dx$

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx \\ &= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_1^2 = \left[\frac{1}{2} - 0\right] + \left[0 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] = 1 \end{aligned}$$

练习 计算定积分  $\int_0^3 |2-x|dx$

解  $\int_0^3 |2-x|dx$

$$\begin{aligned} &= \int_0^2 |2-x|dx + \int_2^3 |2-x|dx = \int_0^2 (2-x)dx + \int_2^3 (x-2)dx \\ &= \left(2x - \frac{1}{2}x^2\right) \end{aligned}$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解 
$$\begin{aligned} & \int_0^2 |1-x|dx \\ &= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx \\ &= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_1^2 = \left[\frac{1}{2} - 0\right] + \left[0 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] = 1 \end{aligned}$$

练习 计算定积分  $\int_0^3 |2-x|dx$

解 
$$\begin{aligned} & \int_0^3 |2-x|dx \\ &= \int_0^2 |2-x|dx + \int_2^3 |2-x|dx = \int_0^2 (2-x)dx + \int_2^3 (x-2)dx \\ &= \left(2x - \frac{1}{2}x^2\right) + \left(\frac{1}{2}x^2 - 2x\right) \end{aligned}$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解 
$$\begin{aligned} & \int_0^2 |1-x|dx \\ &= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx \\ &= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_1^2 = \left[\frac{1}{2} - 0\right] + \left[0 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] = 1 \end{aligned}$$

练习 计算定积分  $\int_0^3 |2-x|dx$

解 
$$\begin{aligned} & \int_0^3 |2-x|dx \\ &= \int_0^2 |2-x|dx + \int_2^3 |2-x|dx = \int_0^2 (2-x)dx + \int_2^3 (x-2)dx \\ &= \left(2x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^2 + \left(\frac{1}{2}x^2 - 2x\right)\Big|_2^3 \end{aligned}$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解 
$$\begin{aligned} & \int_0^2 |1-x|dx \\ &= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx \\ &= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_1^2 = \left[\frac{1}{2} - 0\right] + \left[0 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] = 1 \end{aligned}$$

练习 计算定积分  $\int_0^3 |2-x|dx$

解 
$$\begin{aligned} & \int_0^3 |2-x|dx \\ &= \int_0^2 |2-x|dx + \int_2^3 |2-x|dx = \int_0^2 (2-x)dx + \int_2^3 (x-2)dx \\ &= \left(2x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^2 + \left(\frac{1}{2}x^2 - 2x\right)\Big|_2^3 = [2 - 0] + \end{aligned}$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解 
$$\begin{aligned} & \int_0^2 |1-x|dx \\ &= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx \\ &= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_1^2 = \left[\frac{1}{2} - 0\right] + \left[0 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] = 1 \end{aligned}$$

练习 计算定积分  $\int_0^3 |2-x|dx$

解 
$$\begin{aligned} & \int_0^3 |2-x|dx \\ &= \int_0^2 |2-x|dx + \int_2^3 |2-x|dx = \int_0^2 (2-x)dx + \int_2^3 (x-2)dx \\ &= \left(2x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^2 + \left(\frac{1}{2}x^2 - 2x\right)\Big|_2^3 = [2 - 0] + \left[-\frac{3}{2} - (-2)\right] \end{aligned}$$

例 计算定积分  $\int_0^2 |1-x|dx$ .

解 
$$\begin{aligned} & \int_0^2 |1-x|dx \\ &= \int_0^1 |1-x|dx + \int_1^2 |1-x|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx \\ &= \left(x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_1^2 = \left[\frac{1}{2} - 0\right] + \left[0 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] = 1 \end{aligned}$$

练习 计算定积分  $\int_0^3 |2-x|dx$

解 
$$\begin{aligned} & \int_0^3 |2-x|dx \\ &= \int_0^2 |2-x|dx + \int_2^3 |2-x|dx = \int_0^2 (2-x)dx + \int_2^3 (x-2)dx \\ &= \left(2x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^2 + \left(\frac{1}{2}x^2 - 2x\right)\Big|_2^3 = [2 - 0] + \left[-\frac{3}{2} - (-2)\right] = \frac{5}{2} \end{aligned}$$