

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

的解是

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

的解是

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

的解是

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

的解是

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{D_2}{D}$$

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

的解是

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{D_2}{D}$$

注

• $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ 称为系数行列式

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

的解是

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{D_2}{D}$$

注

- $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ 称为系数行列式，上述公式隐含要求 $D \neq 0$

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

的解是

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} = \frac{D_2}{D}$$

注

- $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ 称为系数行列式，上述公式隐含要求 $D \neq 0$
- D_i : 将 D 的第 i 列换成常数项 $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$

三元线性方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$
 的解是

三元线性方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$
 的解是

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

三元线性方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$
 的解是

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{D_1}{D},$$

三元线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$ 的解是

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{D_1}{D},$$

系数行列式

三元线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$ 的解是

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

系数行列式

三元线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$ 的解是

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{D_2}{D}$$

系数行列式

三元线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$ 的解是

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{D_2}{D}$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

系数行列式

三元线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$ 的解是

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{D_2}{D}$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{D_3}{D}$$

系数行列式

对 n 元线性
方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

对 n 元线性
方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

对 n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

称 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 为系数行列式

对 n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

称 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 为系数行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & a_{1,j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j-1} & a_{2,j} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & a_{n,j} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

对 n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

称 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 为系数行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & b_1 & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j-1} & b_2 & a_{2j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & b_n & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

对 n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

称 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 为系数行列式

令 $D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & b_1 & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j-1} & b_2 & a_{2j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & b_n & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

克莱姆法则

定理（克莱姆法则） 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

当系数行列式 $D \neq 0$ 时，方程具有唯一解：

克莱姆法则

定理（克莱姆法则） 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

当系数行列式 $D \neq 0$ 时，方程具有唯一解：

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}$$

克莱姆法则

定理（克莱姆法则） 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

当系数行列式 $D \neq 0$ 时，方程具有唯一解：

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}$$

注 两个前提：(1) 未知元个数 = 方程个数；(2) 系数行列式 $D \neq 0$

克莱姆法则

定理（克莱姆法则） 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

当系数行列式 $D \neq 0$ 时，方程具有唯一解：

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}$$

注 两个前提：(1) 未知元个数 = 方程个数；(2) 系数行列式 $D \neq 0$

(3) 若 $D = 0$ ，则方程有无穷多解或无解（以后详说）

下面举例说明系数行列式 $D = 0$ 时，则方程有无穷多解或无解

下面举例说明系数行列式 $D = 0$ 时，则方程有无穷多解或无解

- $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}, D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$

- $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 0 \end{cases}, D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$

下面举例说明系数行列式 $D = 0$ 时，则方程有无穷多解或无解

- $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$, $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 实质上只有一条方程 $x + y = 1$, 显然有无穷多解。

- $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 0 \end{cases}$, $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$

下面举例说明系数行列式 $D = 0$ 时，则方程有无穷多解或无解

- $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$, $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 实质上只有一条方程 $x + y = 1$, 显然有无穷多解。
- $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 0 \end{cases}$, $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 方程组包含矛盾方程，显然无解。

例 解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = -2 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$

练习 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 90 \\ x_2 + x_3 = 86 \\ x_1 + x_3 = 80 \end{cases}$$

例 解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = -2 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$

提示 $D = -5, D_1 = -5, D_2 = -10, D_3 = -15$

练习 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 90 \\ x_2 + x_3 = 86 \\ x_1 + x_3 = 80 \end{cases}$$

例 解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = -2 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$

提示 $D = -5, D_1 = -5, D_2 = -10, D_3 = -15$

练习 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 90 \\ x_2 + x_3 = 86 \\ x_1 + x_3 = 80 \end{cases}$$

提示 $D = 2, D_1 = 84, D_2 = 96, D_3 = 76$

齐次线性方程组

定理 齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

当系数行列式 $D \neq 0$ 时, 仅有零解 ($x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$)

齐次线性方程组

定理 齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

当系数行列式 $D \neq 0$ 时, 仅有零解 ($x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$)

证明 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 显然是方程组的解

齐次线性方程组

定理 齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

当系数行列式 $D \neq 0$ 时, 仅有零解 ($x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$)

证明 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 显然是方程组的解

另一方面, 因为 $D \neq 0$, 所以方程组有唯一解 (克莱姆法则)

齐次线性方程组

定理 齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

当系数行列式 $D \neq 0$ 时, 仅有零解 ($x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$)

证明 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 显然是方程组的解

另一方面, 因为 $D \neq 0$, 所以方程组有唯一解 (克莱姆法则)

所以方程组除 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 外, 没有其他解

齐次线性方程组

定理 齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

当系数行列式 $D \neq 0$ 时, 仅有零解 ($x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$)

证明 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 显然是方程组的解

另一方面, 因为 $D \neq 0$, 所以方程组有唯一解 (克莱姆法则)

所以方程组除 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 外, 没有其他解

注

- 其实是充分必要条件: 仅有零解的充分必要条件是 $D \neq 0$

齐次线性方程组

定理 齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

当系数行列式 $D \neq 0$ 时, 仅有零解 ($x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$)

证明 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 显然是方程组的解

另一方面, 因为 $D \neq 0$, 所以方程组有唯一解 (克莱姆法则)

所以方程组除 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 外, 没有其他解

注

- 其实是充分必要条件: 仅有零解的充分必要条件是 $D \neq 0$
- 若 $D = 0$, 方程有无穷多的解

例子

例 齐次方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 = 0 \\ 2x_1 - 4x_2 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵 $D = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix}$

例子

例 齐次方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 = 0 \\ 2x_1 - 4x_2 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵 $D = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = 0$

例子

例 齐次方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 = 0 \\ 2x_1 - 4x_2 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵 $D = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = 0$, 所以有无穷多的解。

例子

例 齐次方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 = 0 \\ 2x_1 - 4x_2 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵 $D = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = 0$, 所以

有无穷多的解。事实上, 对任意的数 k , $\begin{cases} x_1 = 2k \\ x_2 = k \end{cases}$ 都是解。

例子

例 齐次方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 = 0 \\ 2x_1 - 4x_2 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵 $D = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = 0$, 所以

有无穷多的解。事实上, 对任意的数 k , $\begin{cases} x_1 = 2k \\ x_2 = k \end{cases}$ 都是解。

例 判断线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 5x_4 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 6x_4 = 0 \\ 5x_1 + 6x_2 + 8x_3 + 9x_4 = 0 \end{cases}$ 是否只有零解

解

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

解

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{vmatrix} \quad \underline{\underline{r_4 - r_3}}$$

解

$$\left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_4 - r_3}}} \left| \begin{array}{cccc} & & & \\ & & & \\ & & & \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right|$$

解

$$\left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_4 - r_3}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right|$$

解

$$\left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{array} \right| \xrightarrow{r_4 - r_3} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{r_3 - r_2}$$

解

$$\left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{array} \right| \xrightarrow{r_4 - r_3} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{r_3 - r_2} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right|$$

解

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4 - r_3} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

解

$$\left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_4 - r_3}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right|$$

$$\underline{\underline{r_2 - r_1}}$$

解

$$\begin{array}{c} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_4 - r_3}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \\ \\ \xrightarrow{\underline{\underline{r_2 - r_1}}} \left| \begin{array}{cccc} & & & \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ & & & \\ & & & \end{array} \right| \end{array}$$

解

$$\begin{array}{c} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_4 - r_3}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \\ \xrightarrow{\underline{\underline{r_2 - r_1}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \end{array}$$

解

$$\begin{array}{c} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_4 - r_3}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \\ \\ \xrightarrow{\underline{\underline{r_2 - r_1}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_1 - 2r_2}}} \end{array}$$

解

$$\begin{array}{c}
 \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_4 - r_3}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \\
 \\
 \xrightarrow{\underline{\underline{r_2 - r_1}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_1 - 2r_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right|
 \end{array}$$

解

$$\begin{array}{c} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_4 - r_3}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \\ \\ \xrightarrow{\underline{\underline{r_2 - r_1}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_1 - 2r_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \end{array}$$

解

$$\begin{array}{c} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_4 - r_3}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \\ \\ \xrightarrow{\underline{\underline{r_2 - r_1}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_1 - 2r_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \end{array}$$

解

$$\begin{array}{c}
 \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_4 - r_3}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \\
 \\
 \xrightarrow{\underline{\underline{r_2 - r_1}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_1 - 2r_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right|
 \end{array}$$

解

$$\begin{array}{c}
 \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_4 - r_3}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \\
 \\
 \xrightarrow{\underline{\underline{r_2 - r_1}}} \left| \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_1 - 2r_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \left| \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right|
 \end{array}$$

解

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{vmatrix} \xrightarrow{\underline{\underline{r_4 - r_3}}} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\underline{\underline{r_2 - r_1}}} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\underline{\underline{r_1 - 2r_2}}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{r_4 - 2r_2}}$$

解

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{vmatrix} \xrightarrow{\underline{\underline{r_4 - r_3}}} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\underline{\underline{r_2 - r_1}}} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\underline{\underline{r_1 - 2r_2}}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\underline{\underline{r_4 - 2r_2}}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

解

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4-r_3} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2-r_1} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_4-2r_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

解

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{vmatrix} \xrightarrow{\underline{\underline{r_4 - r_3}}} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\underline{\underline{r_2 - r_1}}} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\underline{\underline{r_1 - 2r_2}}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\underline{\underline{r_3 - r_2}}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\underline{\underline{r_4 - 2r_2}}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

解

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4-r_3} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2-r_1} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_4-2r_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

解

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4-r_3} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2-r_1} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_4-2r_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

解

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 9 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4-r_3} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \\ & \xrightarrow{r_2-r_1} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \\ & \xrightarrow{r_4-2r_2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \end{aligned}$$

所以齐次线性方程组有唯一解

练习 齐次线性方程组 $\begin{cases} kx_1 & & + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 & & - x_4 = 0 \\ (k+2)x_1 - x_2 & & + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + kx_4 = 0 \end{cases}$ 有非零解

的充分必要条件是 k 满足 _____

练习 齐次线性方程组 $\begin{cases} kx_1 & + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 & - x_4 = 0 \\ (k+2)x_1 - x_2 & + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + kx_4 = 0 \end{cases}$ 有非零解

的充分必要条件是 k 满足 _____

解

$$D = \begin{vmatrix} k & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ k+2 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & k \end{vmatrix}$$

练习 齐次线性方程组 $\begin{cases} kx_1 & + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 & - x_4 = 0 \\ (k+2)x_1 - x_2 & + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + kx_4 = 0 \end{cases}$ 有非零解

的充分必要条件是 k 满足 _____

解

$$D = \begin{vmatrix} k & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ k+2 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & k \end{vmatrix} = 3.$$

练习 齐次线性方程组 $\begin{cases} kx_1 & + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 & - x_4 = 0 \\ (k+2)x_1 - x_2 & + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + kx_4 = 0 \end{cases}$ 有非零解

的充分必要条件是 k 满足 _____

解

$$D = \begin{vmatrix} k & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ k+2 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & k \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ k+2 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

练习 齐次线性方程组 $\begin{cases} kx_1 & + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 & - x_4 = 0 \\ (k+2)x_1 - x_2 & + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + kx_4 = 0 \end{cases}$ 有非零解

的充分必要条件是 k 满足 _____

解

$$D = \begin{vmatrix} k & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ k+2 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & k \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ k+2 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{r_2 + r_1}}$$

练习 齐次线性方程组 $\begin{cases} kx_1 & + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 & - x_4 = 0 \\ (k+2)x_1 - x_2 & + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + kx_4 = 0 \end{cases}$ 有非零解

的充分必要条件是 k 满足 _____

解

$$D = \begin{vmatrix} k & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ k+2 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & k \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ k+2 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2+r_1} (-3) \cdot \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ & & \end{vmatrix}$$

练习 齐次线性方程组 $\begin{cases} kx_1 & + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 & - x_4 = 0 \\ (k+2)x_1 - x_2 & + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + kx_4 = 0 \end{cases}$ 有非零解

的充分必要条件是 k 满足 _____

解

$$D = \begin{vmatrix} k & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ k+2 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & k \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ k+2 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2+r_1} (-3) \cdot \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ k+1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

练习 齐次线性方程组 $\begin{cases} kx_1 & + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 & - x_4 = 0 \\ (k+2)x_1 - x_2 & + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + kx_4 = 0 \end{cases}$ 有非零解

的充分必要条件是 k 满足 _____

解

$$D = \begin{vmatrix} k & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ k+2 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & k \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ k+2 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3 - 4r_1]{r_2 + r_1} (-3) \cdot \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ k+1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

练习 齐次线性方程组 $\begin{cases} kx_1 & + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 & - x_4 = 0 \\ (k+2)x_1 - x_2 & + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + kx_4 = 0 \end{cases}$ 有非零解

的充分必要条件是 k 满足 _____

解

$$D = \begin{vmatrix} k & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ k+2 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & k \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ k+2 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3-4r_1]{r_2+r_1} (-3) \cdot \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ k+1 & 2 & 0 \\ -3k+2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

练习 齐次线性方程组 $\begin{cases} kx_1 & + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 & - x_4 = 0 \\ (k+2)x_1 - x_2 & + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + kx_4 = 0 \end{cases}$ 有非零解

的充分必要条件是 k 满足 _____

解

$$D = \begin{vmatrix} k & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ k+2 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & k \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ k+2 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3-4r_1]{r_2+r_1} (-3) \cdot \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ k+1 & 2 & 0 \\ -3k+2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} k+1 & 2 \\ -3k+2 & -1 \end{vmatrix}$$

练习 齐次线性方程组 $\begin{cases} kx_1 & + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 & - x_4 = 0 \\ (k+2)x_1 - x_2 & + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + kx_4 = 0 \end{cases}$ 有非零解

的充分必要条件是 k 满足 _____

解

$$D = \begin{vmatrix} k & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ k+2 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & k \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ k+2 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow[r_3 - 4r_1]{r_2 + r_1} (-3) \cdot \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ k+1 & 2 & 0 \\ -3k+2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} k+1 & 2 \\ -3k+2 & -1 \end{vmatrix} \\ & = -3(5k-5) \end{aligned}$$

练习 齐次线性方程组 $\begin{cases} kx_1 & + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 & - x_4 = 0 \\ (k+2)x_1 - x_2 & + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + kx_4 = 0 \end{cases}$ 有非零解

的充分必要条件是 k 满足 _____

解

$$D = \begin{vmatrix} k & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ k+2 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & k \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ k+2 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow[r_3-4r_1]{r_2+r_1} (-3) \cdot \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ k+1 & 2 & 0 \\ -3k+2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} k+1 & 2 \\ -3k+2 & -1 \end{vmatrix} \\ & = -3(5k-5) \end{aligned}$$

有非零解当且仅当 $D = 0$,

练习 齐次线性方程组 $\begin{cases} kx_1 & & + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 & & - x_4 = 0 \\ (k+2)x_1 - x_2 & & + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + kx_4 = 0 \end{cases}$ 有非零解

的充分必要条件是 k 满足 _____

解

$$D = \begin{vmatrix} k & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ k+2 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & k \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ k+2 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow[r_3 - 4r_1]{r_2 + r_1} (-3) \cdot \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ k+1 & 2 & 0 \\ -3k+2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} k+1 & 2 \\ -3k+2 & -1 \end{vmatrix} \\ & = -3(5k-5) \end{aligned}$$

有非零解当且仅当 $D = 0$, 当且仅当 $k = 1$