

## 第 9 章 c: 多元复合函数的求导法则

数学系 梁卓滨

2019-2020 学年 II

# Outline

# 二元复合函数求导

设有二元函数  $z = f(u, v)$

# 二元复合函数求导

设有二元函数  $z = f(u, v)$


- 设  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t))$

问  $\frac{dz}{dt} = ?$

# 二元复合函数求导

设有二元函数  $z = f(u, v)$

- 设  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t))$




问  $\frac{dz}{dt} = ?$

## 二元复合函数求导

设有二元函数  $z = f(u, v)$

- 设  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t))$



问  $\frac{dz}{dt} = ?$


- 设  $u = \varphi(x, y)$ ,  $v = \psi(x, y)$ , 则  $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$

问  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} = ?$

## 二元复合函数求导


设有二元函数  $z = f(u, v)$

- 设  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t))$



问  $\frac{dz}{dt} = ?$

- 设  $u = \varphi(x, y)$ ,  $v = \psi(x, y)$ , 则  $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$




问  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} = ?$

## 二元复合函数求导


设有二元函数  $z = f(u, v)$

- 设  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t))$



问  $\frac{dz}{dt} = ?$

- 设  $u = \varphi(x, y)$ ,  $v = \psi(x, y)$ , 则  $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$




问  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} = ?$



## 二元复合函数求导


设有二元函数  $z = f(u, v)$

- 设  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t))$



问  $\frac{dz}{dt} = ?$

- 设  $u = \varphi(x, y)$ ,  $v = \psi(x, y)$ , 则  $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$



问  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} = ?$

# 二元复合函数求导公式——中间变量是一元函数


**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t))$  的**全导数**

$$\frac{dz}{dt} =$$

# 二元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t))$  的**全导数**


$$\frac{dz}{dt} =$$



# 二元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t))$  的**全导数**


$$\frac{dz}{dt} =$$



# 二元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t))$  的全导数


$$\frac{dz}{dt} =$$



# 二元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t))$  的全导数


$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt}$$



## 二元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t))$  的全导数


$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt}$$



## 二元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t))$  的**全导数**

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt}$$





**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= \end{aligned}$$

**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= (uv)'_u \cdot\end{aligned}$$

**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t +\end{aligned}$$

**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot\end{aligned}$$

**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\ &= \end{aligned}$$

**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\ &= v.\end{aligned}$$

**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\ &= v \cdot (-e^{-t}) +\end{aligned}$$



**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\ &= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\ &= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot\end{aligned}$$

**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \end{aligned}$$

**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&=\end{aligned}$$

**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&= e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

例 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

解法一

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&= e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

解法二

$$\because z = uv =$$

**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&= e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

**解法二**

$$\because z = uv = e^{-t} \cdot \sin t$$

**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&= e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

**解法二**

$$\begin{aligned}\because z &= uv = e^{-t} \cdot \sin t \\ \therefore \frac{dz}{dt} &= \frac{d}{dt}(e^{-t} \sin t) =\end{aligned}$$

**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&= e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

**解法二**

$$\begin{aligned}\because z &= uv = e^{-t} \cdot \sin t \\ \therefore \frac{dz}{dt} &= \frac{d}{dt}(e^{-t} \sin t) = (e^{-t})'_t \cdot \sin t +\end{aligned}$$



**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&= e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

**解法二**

$$\begin{aligned}\because z &= uv = e^{-t} \cdot \sin t \\ \therefore \frac{dz}{dt} &= \frac{d}{dt}(e^{-t} \sin t) = (e^{-t})'_t \cdot \sin t + e^{-t} \cdot (\sin t)'_t\end{aligned}$$

**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&= e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

**解法二**

$$\begin{aligned}\because z &= uv = e^{-t} \cdot \sin t \\ \therefore \frac{dz}{dt} &= \frac{d}{dt}(e^{-t} \sin t) = (e^{-t})'_t \cdot \sin t + e^{-t} \cdot (\sin t)'_t \\&= (-e^{-t}) \cdot \sin t + e^{-t} \cdot \cos t\end{aligned}$$

**例** 设  $z = uv$ , 而  $u = e^{-t}$ ,  $v = \sin t$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$

**解法一**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} \\&= (uv)'_u \cdot (e^{-t})'_t + (uv)'_v \cdot (\sin t)'_t \\&= v \cdot (-e^{-t}) + u \cdot \cos t \\&= \sin t \cdot (-e^{-t}) + e^{-t} \cdot \cos t \\&= e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

**解法二**

$$\begin{aligned}\because z &= uv = e^{-t} \cdot \sin t \\ \therefore \frac{dz}{dt} &= \frac{d}{dt}(e^{-t} \sin t) = (e^{-t})'_t \cdot \sin t + e^{-t} \cdot (\sin t)'_t \\&= (-e^{-t}) \cdot \sin t + e^{-t} \cdot \cos t = e^{-t}(\cos t - \sin t)\end{aligned}$$

**例** 设  $z = \frac{y}{x}$ , 而  $x = e^t$ ,  $y = 1 - e^{2t}$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$ .


**解**

$$\frac{dz}{dt} =$$

**例** 设  $z = \frac{y}{x}$ , 而  $x = e^t$ ,  $y = 1 - e^{2t}$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$ .

**解**


$$\frac{dz}{dt} =$$



**例** 设  $z = \frac{y}{x}$ , 而  $x = e^t$ ,  $y = 1 - e^{2t}$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$ .

**解**


$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} =$$



**例** 设  $z = \frac{y}{x}$ , 而  $x = e^t$ ,  $y = 1 - e^{2t}$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$ .

**解**


$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x.$$



**例** 设  $z = \frac{y}{x}$ , 而  $x = e^t$ ,  $y = 1 - e^{2t}$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$ .

**解**

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t +$$






**例** 设  $z = \frac{y}{x}$ , 而  $x = e^t$ ,  $y = 1 - e^{2t}$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$ .

**解**


$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot$$



**例** 设  $z = \frac{y}{x}$ , 而  $x = e^t$ ,  $y = 1 - e^{2t}$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$ .

**解**


$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot (1 - e^{2t})'_t \\ &= \end{aligned}$$



**例** 设  $z = \frac{y}{x}$ , 而  $x = e^t$ ,  $y = 1 - e^{2t}$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$ .

**解**


$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot (1 - e^{2t})'_t \\ &= -\frac{y}{x^2}.\end{aligned}$$



**例** 设  $z = \frac{y}{x}$ , 而  $x = e^t$ ,  $y = 1 - e^{2t}$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$ .

**解**


$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot (1 - e^{2t})'_t \\ &= -\frac{y}{x^2} \cdot e^t +\end{aligned}$$



**例** 设  $z = \frac{y}{x}$ , 而  $x = e^t$ ,  $y = 1 - e^{2t}$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$ .

**解**


$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot (1 - e^{2t})'_t \\ &= -\frac{y}{x^2} \cdot e^t + \frac{1}{x} \cdot\end{aligned}$$



**例** 设  $z = \frac{y}{x}$ , 而  $x = e^t$ ,  $y = 1 - e^{2t}$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$ .

**解**


$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot (1 - e^{2t})'_t \\ &= -\frac{y}{x^2} \cdot e^t + \frac{1}{x} \cdot (-2e^{2t}) =\end{aligned}$$



**例** 设  $z = \frac{y}{x}$ , 而  $x = e^t$ ,  $y = 1 - e^{2t}$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$ .

**解**


$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot (1 - e^{2t})'_t \\ &= -\frac{y}{x^2} \cdot e^t + \frac{1}{x} \cdot (-2e^{2t}) = -\frac{1 - e^{2t}}{e^{2t}} \cdot e^t +\end{aligned}$$



**例** 设  $z = \frac{y}{x}$ , 而  $x = e^t$ ,  $y = 1 - e^{2t}$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$ .

**解**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot (1 - e^{2t})'_t \\ &= -\frac{y}{x^2} \cdot e^t + \frac{1}{x} \cdot (-2e^{2t}) = -\frac{1 - e^{2t}}{e^{2t}} \cdot e^t + \frac{1}{e^t} \cdot (-2e^{2t}) \\ &= \end{aligned}$$






**例** 设  $z = \frac{y}{x}$ , 而  $x = e^t$ ,  $y = 1 - e^{2t}$ , 求全导数  $\frac{dz}{dt}$ .

**解**

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \left(\frac{y}{x}\right)'_x \cdot (e^t)'_t + \left(\frac{y}{x}\right)'_y \cdot (1 - e^{2t})'_t \\&= -\frac{y}{x^2} \cdot e^t + \frac{1}{x} \cdot (-2e^{2t}) = -\frac{1 - e^{2t}}{e^{2t}} \cdot e^t + \frac{1}{e^t} \cdot (-2e^{2t}) \\&= -e^{-t} - e^t\end{aligned}$$



## 三元复合函数求导公式——中间变量是一元函数


**公式** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ ,  $w = \omega(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$  的 **全导数**

$$\frac{dz}{dt} =$$

## 三元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

**公式** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ ,  $w = \omega(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$  的**全导数**


$$\frac{dz}{dt} =$$



# 三元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

**公式** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ ,  $w = \omega(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$  的**全导数**


$$\frac{dz}{dt} =$$



# 三元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

**公式** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ ,  $w = \omega(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$  的**全导数**


$$\frac{dz}{dt} =$$



# 三元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

**公式** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ ,  $w = \omega(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$  的**全导数**


$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt}$$



# 三元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

**公式** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ ,  $w = \omega(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$  的**全导数**


$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} + \frac{\partial z}{\partial w} \cdot \frac{dw}{dt}$$



# 三元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

**公式** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ ,  $w = \omega(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$  的**全导数**

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} + \frac{\partial z}{\partial w} \cdot \frac{dw}{dt}$$






# 三元复合函数求导公式——中间变量是一元函数

**公式** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \varphi(t)$ ,  $v = \psi(t)$ ,  $w = \omega(t)$ , 则  $z = f(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))$  的**全导数**

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} + \frac{\partial z}{\partial w} \cdot \frac{dw}{dt}$$



# 二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数

公式 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = \varphi(x, y)$ ,  $v = \psi(x, y)$ ,

## 二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = \varphi(x, y)$ ,  $v = \psi(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

的偏导数是：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \quad , \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

## 二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数


**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = \varphi(x, y)$ ,  $v = \psi(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

的偏导数是:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \quad , \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

**图示**



## 二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = \varphi(x, y)$ ,  $v = \psi(x, y)$ , 则复合函数


$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

的偏导数是:

$$\frac{\partial z}{\partial x} =$$

$$, \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

**图示**



## 二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = \varphi(x, y)$ ,  $v = \psi(x, y)$ , 则复合函数


$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

的偏导数是:

$$\frac{\partial z}{\partial x} =$$

$$, \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

**图示**



## 二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数


**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = \varphi(x, y)$ ,  $v = \psi(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

的偏导数是:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

**图示**



## 二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数


**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = \varphi(x, y)$ ,  $v = \psi(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

的偏导数是:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

**图示**





## 二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数


**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = \varphi(x, y)$ ,  $v = \psi(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

的偏导数是:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} +$$

**图示**



## 二元复合函数求导公式——中间变量是多元函数


**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = \varphi(x, y)$ ,  $v = \psi(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

的偏导数是:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

**图示**



**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$
$$=$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x +\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\ &= \end{aligned}$$



**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\ &= 2e^{2u} \sin v.\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\ &= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y +\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x.\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= \end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2).\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y +\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$



**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= \end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y +\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= \end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot x^3 +\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot x^3 + e^{2u} \cos v \cdot 2y\end{aligned}$$



**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot x^3 + e^{2u} \cos v \cdot 2y \\&= \end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot x^3 + e^{2u} \cos v \cdot 2y \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2y + e^{2x^3y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot x^3 + e^{2u} \cos v \cdot 2y \\&= 2e^{2x^3y} \sin(x^2 + y^2) \cdot x^3 +\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot x^3 + e^{2u} \cos v \cdot 2y \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot x^3 + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2y\end{aligned}$$

**例** 设  $z = e^{2u} \sin v$ ,  $u = x^3 y$ ,  $v = x^2 + y^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$

**解**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_x + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_x \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot 3x^2 y + e^{2u} \cos v \cdot 2x \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot 3x^2 y + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\&= (e^{2u} \sin v)'_u \cdot (x^3 y)'_y + (e^{2u} \sin v)'_v \cdot (x^2 + y^2)'_y \\&= 2e^{2u} \sin v \cdot x^3 + e^{2u} \cos v \cdot 2y \\&= 2e^{2x^3 y} \sin(x^2 + y^2) \cdot x^3 + e^{2x^3 y} \cos(x^2 + y^2) \cdot 2y\end{aligned}$$

## 三元复合函数求导公式：举例

公式 设  $z = f(x, y, u)$ ,  $u = u(x, y)$ ,

## 三元复合函数求导公式：举例

**公式** 设  $z = f(x, y, u)$ ,  $u = u(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(x, y, u(x, y))$$

的偏导数是：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \quad , \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

## 三元复合函数求导公式：举例


**公式** 设  $z = f(x, y, u)$ ,  $u = u(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(x, y, u(x, y))$$

的偏导数是：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \quad , \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

**图示**





## 三元复合函数求导公式：举例


**公式** 设  $z = f(x, y, u)$ ,  $u = u(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(x, y, u(x, y))$$

的偏导数是：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y}$$

**图示**



## 三元复合函数求导公式：举例


**公式** 设  $z = f(x, y, u)$ ,  $u = u(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(x, y, u(x, y))$$

的偏导数是：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \quad , \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

**图示**



## 三元复合函数求导公式：举例


**公式** 设  $z = f(x, y, u)$ ,  $u = u(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(x, y, u(x, y))$$

的偏导数是：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y}$$

**图示**



## 三元复合函数求导公式：举例


**公式** 设  $z = f(x, y, u)$ ,  $u = u(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(x, y, u(x, y))$$

的偏导数是：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} =$$

**图示**



## 三元复合函数求导公式：举例


**公式** 设  $z = f(x, y, u)$ ,  $u = u(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(x, y, u(x, y))$$

的偏导数是：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} +$$

**图示**



## 三元复合函数求导公式：举例


**公式** 设  $z = f(x, y, u)$ ,  $u = u(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(x, y, u(x, y))$$

的偏导数是：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y}$$

**图示**



# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} =$$

$$z_{xy} =$$

$$z_{yy} =$$



# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = (z_x)'_x$$

$$z_{xy} =$$

$$z_{yy} =$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = (z_x)'_x = (z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x)'_x$$

$$z_{xy} =$$

$$z_{yy} =$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$\begin{aligned} z_{xx} &= (z_x)'_x = (z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x)'_x \\ &= (z_u)'_x \cdot u_x + z_u \cdot u_{xx} + (z_v)'_x \cdot v_x + z_v \cdot v_{xx} \end{aligned}$$

$$z_{xy} =$$

$$z_{yy} =$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$\begin{aligned} z_{xx} &= (z_x)'_x = (z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x)'_x \\ &= (z_u)'_x \cdot u_x + z_u \cdot u_{xx} + (z_v)'_x \cdot v_x + z_v \cdot v_{xx} \\ &= ( \quad ) \cdot u_x + z_u \cdot u_{xx} + ( \quad ) \cdot v_x + z_v \cdot v_{xx} \end{aligned}$$

$$z_{xy} =$$

$$z_{yy} =$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$\begin{aligned} z_{xx} &= (z_x)'_x = (z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x)'_x \\ &= (z_u)'_x \cdot u_x + z_u \cdot u_{xx} + (z_v)'_x \cdot v_x + z_v \cdot v_{xx} \\ &= (z_{uu} \cdot u_x + z_{uv} \cdot v_x) \cdot u_x + z_u \cdot u_{xx} + (z_{vu} \cdot u_x + z_{vv} \cdot v_x) \cdot v_x + z_v \cdot v_{xx} \end{aligned}$$

$$z_{xy} =$$

$$z_{yy} =$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$\begin{aligned} z_{xx} &= (z_x)'_x = (z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x)'_x \\ &= (z_u)'_x \cdot u_x + z_u \cdot u_{xx} + (z_v)'_x \cdot v_x + z_v \cdot v_{xx} \\ &= (z_{uu} \cdot u_x + z_{uv} \cdot v_x) \cdot u_x + z_u \cdot u_{xx} + (z_{vu} \cdot u_x + z_{vv} \cdot v_x) \cdot v_x + z_v \cdot v_{xx} \end{aligned}$$

$$z_{xy} =$$

$$z_{yy} =$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$\begin{aligned} z_{xx} &= (z_x)'_x = (z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x)'_x \\ &= (z_u)'_x \cdot u_x + z_u \cdot u_{xx} + (z_v)'_x \cdot v_x + z_v \cdot v_{xx} \\ &= (z_{uu} \cdot u_x + z_{uv} \cdot v_x) \cdot u_x + z_u \cdot u_{xx} + (z_{vu} \cdot u_x + z_{vv} \cdot v_x) \cdot v_x + z_v \cdot v_{xx} \\ &= z_{uu} u_x^2 + 2z_{uv} u_x v_x + z_{vv} v_x^2 + z_u u_{xx} + z_v v_{xx} \end{aligned}$$

$$z_{xy} =$$

$$z_{yy} =$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$\begin{aligned} z_{xx} &= (z_x)'_x = (z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x)'_x \\ &= (z_u)'_x \cdot u_x + z_u \cdot u_{xx} + (z_v)'_x \cdot v_x + z_v \cdot v_{xx} \\ &= (z_{uu} \cdot u_x + z_{uv} \cdot v_x) \cdot u_x + z_u \cdot u_{xx} + (z_{vu} \cdot u_x + z_{vv} \cdot v_x) \cdot v_x + z_v \cdot v_{xx} \\ &= z_{uu} u_x^2 + 2z_{uv} u_x v_x + z_{vv} v_x^2 + z_u u_{xx} + z_v v_{xx} \end{aligned}$$

$$z_{xy} = ?$$

$$z_{yy} = ?$$



# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = z_{uu}u_x^2 + 2z_{uv}u_xv_x + z_{vv}v_x^2 + z_uu_{xx} + z_vv_{xx}$$

$$z_{xy} =$$

$$z_{yy} = ?$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = z_{uu}u_x^2 + 2z_{uv}u_xv_x + z_{vv}v_x^2 + z_uu_{xx} + z_vv_{xx}$$

$$z_{xy} = (z_x)'_y$$

$$z_{yy} = ?$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = z_{uu}u_x^2 + 2z_{uv}u_xv_x + z_{vv}v_x^2 + z_uu_{xx} + z_vv_{xx}$$

$$z_{xy} = (z_x)'_y = (z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x)'_y$$

$$z_{yy} = ?$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = z_{uu}u_x^2 + 2z_{uv}u_xv_x + z_{vv}v_x^2 + z_u u_{xx} + z_v v_{xx}$$

$$\begin{aligned} z_{xy} &= (z_x)'_y = (z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x)'_y \\ &= (z_u)'_y \cdot u_x + z_u \cdot u_{xy} + (z_v)'_y \cdot v_x + z_v \cdot v_{xy} \end{aligned}$$

$$z_{yy} = ?$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = z_{uu}u_x^2 + 2z_{uv}u_xv_x + z_{vv}v_x^2 + z_uu_{xx} + z_vv_{xx}$$

$$\begin{aligned} z_{xy} &= (z_x)'_y = (z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x)'_y \\ &= (z_u)'_y \cdot u_x + z_u \cdot u_{xy} + (z_v)'_y \cdot v_x + z_v \cdot v_{xy} \\ &= ( \quad ) \cdot u_x + z_u \cdot u_{xy} + ( \quad ) \cdot v_x + z_v \cdot v_{xy} \end{aligned}$$

$$z_{yy} = ?$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = z_{uu}u_x^2 + 2z_{uv}u_xv_x + z_{vv}v_x^2 + z_uu_{xx} + z_vv_{xx}$$

$$\begin{aligned} z_{xy} &= (z_x)'_y = (z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x)'_y \\ &= (z_u)'_y \cdot u_x + z_u \cdot u_{xy} + (z_v)'_y \cdot v_x + z_v \cdot v_{xy} \\ &= (z_{uu} \cdot u_y + z_{uv} \cdot v_y) \cdot u_x + z_u \cdot u_{xy} + (z_{vu} \cdot u_y + z_{vv} \cdot v_y) \cdot v_x + z_v \cdot v_{xy} \end{aligned}$$

$$z_{yy} = ?$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = z_{uu}u_x^2 + 2z_{uv}u_xv_x + z_{vv}v_x^2 + z_uu_{xx} + z_vv_{xx}$$

$$\begin{aligned} z_{xy} &= (z_x)'_y = (z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x)'_y \\ &= (z_u)'_y \cdot u_x + z_u \cdot u_{xy} + (z_v)'_y \cdot v_x + z_v \cdot v_{xy} \\ &= (z_{uu} \cdot u_y + z_{uv} \cdot v_y) \cdot u_x + z_u \cdot u_{xy} + (z_{vu} \cdot u_y + z_{vv} \cdot v_y) \cdot v_x + z_v \cdot v_{xy} \end{aligned}$$

$$z_{yy} = ?$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = z_{uu}u_x^2 + 2z_{uv}u_xv_x + z_{vv}v_x^2 + z_uu_{xx} + z_vv_{xx}$$

$$\begin{aligned} z_{xy} &= (z_x)'_y = (z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x)'_y \\ &= (z_u)'_y \cdot u_x + z_u \cdot u_{xy} + (z_v)'_y \cdot v_x + z_v \cdot v_{xy} \\ &= (z_{uu} \cdot u_y + z_{uv} \cdot v_y) \cdot u_x + z_u \cdot u_{xy} + (z_{vu} \cdot u_y + z_{vv} \cdot v_y) \cdot v_x + z_v \cdot v_{xy} \\ &= z_{uu}u_xu_y + z_{uv}(u_xv_y + u_yv_x) + z_{vv}v_xv_y + z_uu_{xy} + z_vv_{xy} \end{aligned}$$

$$z_{yy} = ?$$



# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = z_{uu}u_x^2 + 2z_{uv}u_xv_x + z_{vv}v_x^2 + z_uu_{xx} + z_vv_{xx}$$

$$z_{xy} = z_{uu}u_xu_y + z_{uv}(u_xv_y + u_yv_x) + z_{vv}v_xv_y + z_uu_{xy} + z_vv_{xy}$$

$$z_{yy} =$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = z_{uu}u_x^2 + 2z_{uv}u_xv_x + z_{vv}v_x^2 + z_uu_{xx} + z_vv_{xx}$$

$$z_{xy} = z_{uu}u_xu_y + z_{uv}(u_xv_y + u_yv_x) + z_{vv}v_xv_y + z_uu_{xy} + z_vv_{xy}$$

$$z_{yy} = (z_y)'_y$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = z_{uu}u_x^2 + 2z_{uv}u_xv_x + z_{vv}v_x^2 + z_uu_{xx} + z_vv_{xx}$$

$$z_{xy} = z_{uu}u_xu_y + z_{uv}(u_xv_y + u_yv_x) + z_{vv}v_xv_y + z_uu_{xy} + z_vv_{xy}$$

$$z_{yy} = (z_y)'_y = (z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y)'_y$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = z_{uu}u_x^2 + 2z_{uv}u_xv_x + z_{vv}v_x^2 + z_uu_{xx} + z_vv_{xx}$$

$$z_{xy} = z_{uu}u_xu_y + z_{uv}(u_xv_y + u_yv_x) + z_{vv}v_xv_y + z_uu_{xy} + z_vv_{xy}$$

$$\begin{aligned} z_{yy} &= (z_y)'_y = (z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y)'_y \\ &= (z_u)'_y \cdot u_y + z_u \cdot u_{yy} + (z_v)'_y \cdot v_y + z_v \cdot v_{yy} \end{aligned}$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = z_{uu}u_x^2 + 2z_{uv}u_xv_x + z_{vv}v_x^2 + z_uu_{xx} + z_vv_{xx}$$

$$z_{xy} = z_{uu}u_xu_y + z_{uv}(u_xv_y + u_yv_x) + z_{vv}v_xv_y + z_uu_{xy} + z_vv_{xy}$$

$$\begin{aligned} z_{yy} &= (z_y)'_y = (z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y)'_y \\ &= (z_u)'_y \cdot u_y + z_u \cdot u_{yy} + (z_v)'_y \cdot v_y + z_v \cdot v_{yy} \\ &= ( \quad ) \cdot u_y + z_u \cdot u_{yy} + ( \quad ) \cdot v_y + z_v \cdot v_{yy} \end{aligned}$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = z_{uu}u_x^2 + 2z_{uv}u_xv_x + z_{vv}v_x^2 + z_uu_{xx} + z_vv_{xx}$$

$$z_{xy} = z_{uu}u_xu_y + z_{uv}(u_xv_y + u_yv_x) + z_{vv}v_xv_y + z_uu_{xy} + z_vv_{xy}$$

$$\begin{aligned} z_{yy} &= (z_y)'_y = (z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y)'_y \\ &= (z_u)'_y \cdot u_y + z_u \cdot u_{yy} + (z_v)'_y \cdot v_y + z_v \cdot v_{yy} \\ &= (z_{uu} \cdot u_y + z_{uv} \cdot v_y) \cdot u_y + z_u \cdot u_{yy} + (z_{uv} \cdot u_y + z_{vv} \cdot v_y) \cdot v_y + z_v \cdot v_{yy} \end{aligned}$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = z_{uu}u_x^2 + 2z_{uv}u_xv_x + z_{vv}v_x^2 + z_uu_{xx} + z_vv_{xx}$$

$$z_{xy} = z_{uu}u_xu_y + z_{uv}(u_xv_y + u_yv_x) + z_{vv}v_xv_y + z_uu_{xy} + z_vv_{xy}$$

$$\begin{aligned} z_{yy} &= (z_y)'_y = (z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y)'_y \\ &= (z_u)'_y \cdot u_y + z_u \cdot u_{yy} + (z_v)'_y \cdot v_y + z_v \cdot v_{yy} \\ &= (z_{uu} \cdot u_y + z_{uv} \cdot v_y) \cdot u_y + z_u \cdot u_{yy} + (z_{vu} \cdot u_y + z_{vv} \cdot v_y) \cdot v_y + z_v \cdot v_{yy} \end{aligned}$$

# 复合函数的高阶导数

**公式** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 则复合函数

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

的偏导数是:

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x,$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y,$$

$$z_{xx} = z_{uu}u_x^2 + 2z_{uv}u_xv_x + z_{vv}v_x^2 + z_uu_{xx} + z_vv_{xx}$$

$$z_{xy} = z_{uu}u_xu_y + z_{uv}(u_xv_y + u_yv_x) + z_{vv}v_xv_y + z_uu_{xy} + z_vv_{xy}$$

$$\begin{aligned} z_{yy} &= (z_y)'_y = (z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y)'_y \\ &= (z_u)'_y \cdot u_y + z_u \cdot u_{yy} + (z_v)'_y \cdot v_y + z_v \cdot v_{yy} \\ &= (z_{uu} \cdot u_y + z_{uv} \cdot v_y) \cdot u_y + z_u \cdot u_{yy} + (z_{vu} \cdot u_y + z_{vv} \cdot v_y) \cdot v_y + z_v \cdot v_{yy} \\ &= z_{uu}u_y^2 + 2z_{uv}u_yv_y + z_{vv}v_y^2 + z_uu_{yy} + z_vv_{yy} \end{aligned}$$



例 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**例** 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = xy^2$ ,  $v = x^2y$ , 则

**例** 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = xy^2$ ,  $v = x^2y$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} =$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

**例** 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = xy^2$ ,  $v = x^2y$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

**例** 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = xy^2$ ,  $v = x^2y$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x = f_u \cdot (xy^2)'_x + f_v \cdot (x^2y)'_x$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

**例** 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = xy^2$ ,  $v = x^2y$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x = f_u \cdot (xy^2)'_x + f_v \cdot (x^2y)'_x = y^2 f_u + 2xy f_v$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

**例** 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = xy^2$ ,  $v = x^2y$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x = f_u \cdot (xy^2)'_x + f_v \cdot (x^2y)'_x = y^2 f_u + 2xy f_v$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (y^2 f_u + 2xy f_v)$$

**例** 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = xy^2$ ,  $v = x^2y$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x = f_u \cdot (xy^2)'_x + f_v \cdot (x^2y)'_x = y^2 f_u + 2xy f_v$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (y^2 f_u + 2xy f_v) \\ &= (y^2)'_y \cdot f_u + y^2 \cdot (f_u)'_y + \end{aligned}$$



**例** 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = xy^2$ ,  $v = x^2y$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x = f_u \cdot (xy^2)'_x + f_v \cdot (x^2y)'_x = y^2 f_u + 2xy f_v$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (y^2 f_u + 2xy f_v) \\ &= (y^2)'_y \cdot f_u + y^2 \cdot (f_u)'_y + (2xy)'_y \cdot f_v + 2xy \cdot (f_v)'_y \end{aligned}$$

**例** 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = xy^2$ ,  $v = x^2y$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x = f_u \cdot (xy^2)'_x + f_v \cdot (x^2y)'_x = y^2 f_u + 2xy f_v$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (y^2 f_u + 2xy f_v) \\ &= (y^2)'_y \cdot f_u + y^2 \cdot (f_u)'_y + (2xy)'_y \cdot f_v + 2xy \cdot (f_v)'_y \\ &= 2y f_u + y^2 \cdot (f_u)'_y + 2x f_v + 2xy \cdot (f_v)'_y \end{aligned}$$

**例** 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = xy^2$ ,  $v = x^2y$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x = f_u \cdot (xy^2)'_x + f_v \cdot (x^2y)'_x = y^2 f_u + 2xy f_v$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (y^2 f_u + 2xy f_v) \\ &= (y^2)'_y \cdot f_u + y^2 \cdot (f_u)'_y + (2xy)'_y \cdot f_v + 2xy \cdot (f_v)'_y \\ &= 2y f_u + y^2 \cdot (f_{uu} \cdot u_y + f_{uv} \cdot v_y) + 2x f_v + 2xy \cdot ( \end{aligned}$$

**例** 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = xy^2$ ,  $v = x^2y$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x = f_u \cdot (xy^2)'_x + f_v \cdot (x^2y)'_x = y^2 f_u + 2xy f_v$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (y^2 f_u + 2xy f_v) \\ &= (y^2)'_y \cdot f_u + y^2 \cdot (f_u)'_y + (2xy)'_y \cdot f_v + 2xy \cdot (f_v)'_y \\ &= 2y f_u + y^2 \cdot (f_{uu} \cdot u_y + f_{uv} \cdot v_y) + 2x f_v + 2xy \cdot (f_{vu} \cdot u_y + f_{vv} \cdot v_y)\end{aligned}$$

**例** 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = xy^2$ ,  $v = x^2y$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x = f_u \cdot (xy^2)'_x + f_v \cdot (x^2y)'_x = y^2 f_u + 2xy f_v$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (y^2 f_u + 2xy f_v) \\&= (y^2)'_y \cdot f_u + y^2 \cdot (f_u)'_y + (2xy)'_y \cdot f_v + 2xy \cdot (f_v)'_y \\&= 2y f_u + y^2 \cdot (f_{uu} \cdot u_y + f_{uv} \cdot v_y) + 2x f_v + 2xy \cdot (f_{vu} \cdot u_y + f_{vv} \cdot v_y) \\&= 2y f_u + y^2 \cdot (2xy f_{uu} + x^2 f_{uv}) + 2x f_v + 2xy \cdot (\end{aligned}$$

**例** 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = xy^2$ ,  $v = x^2y$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x = f_u \cdot (xy^2)'_x + f_v \cdot (x^2y)'_x = y^2 f_u + 2xy f_v$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (y^2 f_u + 2xy f_v) \\&= (y^2)'_y \cdot f_u + y^2 \cdot (f_u)'_y + (2xy)'_y \cdot f_v + 2xy \cdot (f_v)'_y \\&= 2y f_u + y^2 \cdot (f_{uu} \cdot u_y + f_{uv} \cdot v_y) + 2x f_v + 2xy \cdot (f_{vu} \cdot u_y + f_{vv} \cdot v_y) \\&= 2y f_u + y^2 \cdot (2xy f_{uu} + x^2 f_{uv}) + 2x f_v + 2xy \cdot (2xy f_{vu} + x^2 f_{vv})\end{aligned}$$

**例** 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = xy^2$ ,  $v = x^2y$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x = f_u \cdot (xy^2)'_x + f_v \cdot (x^2y)'_x = y^2 f_u + 2xy f_v$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (y^2 f_u + 2xy f_v) \\&= (y^2)'_y \cdot f_u + y^2 \cdot (f_u)'_y + (2xy)'_y \cdot f_v + 2xy \cdot (f_v)'_y \\&= 2y f_u + y^2 \cdot (f_{uu} \cdot u_y + f_{uv} \cdot v_y) + 2x f_v + 2xy \cdot (f_{vu} \cdot u_y + f_{vv} \cdot v_y) \\&= 2y f_u + y^2 \cdot (2xy f_{uu} + x^2 f_{uv}) + 2x f_v + 2xy \cdot (2xy f_{vu} + x^2 f_{vv}) \\&= 2y f_u + 2x f_v + 2xy^3 f_{uu} + x^2 y^2 f_{uv} + 4x^2 y^2 f_{vu} + 2x^3 y f_{vv}\end{aligned}$$

**例** 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = xy^2$ ,  $v = x^2y$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x = f_u \cdot (xy^2)'_x + f_v \cdot (x^2y)'_x = y^2 f_u + 2xy f_v$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (y^2 f_u + 2xy f_v) \\&= (y^2)'_y \cdot f_u + y^2 \cdot (f_u)'_y + (2xy)'_y \cdot f_v + 2xy \cdot (f_v)'_y \\&= 2y f_u + y^2 \cdot (f_{uu} \cdot u_y + f_{uv} \cdot v_y) + 2x f_v + 2xy \cdot (f_{vu} \cdot u_y + f_{vv} \cdot v_y) \\&= 2y f_u + y^2 \cdot (2xy f_{uu} + x^2 f_{uv}) + 2x f_v + 2xy \cdot (2xy f_{vu} + x^2 f_{vv}) \\&= 2y f_u + 2x f_v + 2xy^3 f_{uu} + x^2 y^2 f_{uv} + 4x^2 y^2 f_{vu} + 2x^3 y f_{vv} \\&= 2y f_u + 2x f_v + 2xy^3 f_{uu} + 5x^2 y^2 f_{uv} + 2x^3 y f_{vv}\end{aligned}$$



**例** 设  $z = f(xy^2, x^2y)$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = xy^2$ ,  $v = x^2y$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x = f_u \cdot (xy^2)'_x + f_v \cdot (x^2y)'_x = y^2 f_u + 2xy f_v$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (y^2 f_u + 2xy f_v) \\&= (y^2)'_y \cdot f_u + y^2 \cdot (f_u)'_y + (2xy)'_y \cdot f_v + 2xy \cdot (f_v)'_y \\&= 2y f_u + y^2 \cdot (f_{uu} \cdot u_y + f_{uv} \cdot v_y) + 2x f_v + 2xy \cdot (f_{vu} \cdot u_y + f_{vv} \cdot v_y) \\&= 2y f_u + y^2 \cdot (2xy f_{uu} + x^2 f_{uv}) + 2x f_v + 2xy \cdot (2xy f_{vu} + x^2 f_{vv}) \\&= 2y f_u + 2x f_v + 2xy^3 f_{uu} + x^2 y^2 f_{uv} + 4x^2 y^2 f_{vu} + 2x^3 y f_{vv} \\&= 2y f_u + 2x f_v + 2xy^3 f_{uu} + 5x^2 y^2 f_{uv} + 2x^3 y f_{vv}\end{aligned}$$

**例** 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

例 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**例** 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \sin x$ ,  $v = \cos y$ ,  $w = e^{x+y}$ , 则

**例** 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \sin x$ ,  $v = \cos y$ ,  $w = e^{x+y}$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} =$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

**例** 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \sin x$ ,  $v = \cos y$ ,  $w = e^{x+y}$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x + f_w \cdot w_x$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

**例** 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \sin x$ ,  $v = \cos y$ ,  $w = e^{x+y}$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x + f_w \cdot w_x = f_u \cdot (\sin x)'_x + f_v \cdot 0 + f_w \cdot (e^{x+y})'_x$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

**例** 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \sin x$ ,  $v = \cos y$ ,  $w = e^{x+y}$ , 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x + f_w \cdot w_x = f_u \cdot (\sin x)'_x + f_v \cdot 0 + f_w \cdot (e^{x+y})'_x \\ &= \cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w\end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) =$$

**例** 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \sin x$ ,  $v = \cos y$ ,  $w = e^{x+y}$ , 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x + f_w \cdot w_x = f_u \cdot (\sin x)'_x + f_v \cdot 0 + f_w \cdot (e^{x+y})'_x \\ &= \cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w\end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (\cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w)$$



**例** 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \sin x$ ,  $v = \cos y$ ,  $w = e^{x+y}$ , 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x + f_w \cdot w_x = f_u \cdot (\sin x)'_x + f_v \cdot 0 + f_w \cdot (e^{x+y})'_x \\ &= \cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (\cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w) \\ &= \cos x \cdot (f_u)'_y +\end{aligned}$$

**例** 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \sin x$ ,  $v = \cos y$ ,  $w = e^{x+y}$ , 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x + f_w \cdot w_x = f_u \cdot (\sin x)'_x + f_v \cdot 0 + f_w \cdot (e^{x+y})'_x \\ &= \cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (\cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w) \\ &= \cos x \cdot (f_u)'_y + (e^{x+y})'_y \cdot f_w + e^{x+y} \cdot (f_w)'_y\end{aligned}$$

**例** 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \sin x$ ,  $v = \cos y$ ,  $w = e^{x+y}$ , 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x + f_w \cdot w_x = f_u \cdot (\sin x)'_x + f_v \cdot 0 + f_w \cdot (e^{x+y})'_x \\ &= \cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (\cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w) \\ &= \cos x \cdot (f_u)'_y + (e^{x+y})'_y \cdot f_w + e^{x+y} \cdot (f_w)'_y \\ &= \cos x \cdot ( \quad ) \\ &\quad + e^{x+y} f_w + e^{x+y} \cdot ( \quad )\end{aligned}$$

**例** 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \sin x$ ,  $v = \cos y$ ,  $w = e^{x+y}$ , 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x + f_w \cdot w_x = f_u \cdot (\sin x)'_x + f_v \cdot 0 + f_w \cdot (e^{x+y})'_x \\ &= \cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (\cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w) \\ &= \cos x \cdot (f_u)'_y + (e^{x+y})'_y \cdot f_w + e^{x+y} \cdot (f_w)'_y \\ &= \cos x \cdot (f_{uu} \cdot u_y + f_{uv} \cdot v_y + f_{uw} \cdot w_y) \\ &\quad + e^{x+y} f_w + e^{x+y} \cdot (\end{aligned}$$

**例** 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \sin x$ ,  $v = \cos y$ ,  $w = e^{x+y}$ , 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x + f_w \cdot w_x = f_u \cdot (\sin x)'_x + f_v \cdot 0 + f_w \cdot (e^{x+y})'_x \\ &= \cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (\cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w) \\ &= \cos x \cdot (f_u)'_y + (e^{x+y})'_y \cdot f_w + e^{x+y} \cdot (f_w)'_y \\ &= \cos x \cdot (f_{uu} \cdot u_y + f_{uv} \cdot v_y + f_{uw} \cdot w_y) \\ &\quad + e^{x+y} f_w + e^{x+y} \cdot (f_{wu} \cdot u_y + f_{wv} \cdot v_y + f_{ww} \cdot w_y)\end{aligned}$$

**例** 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \sin x$ ,  $v = \cos y$ ,  $w = e^{x+y}$ , 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x + f_w \cdot w_x = f_u \cdot (\sin x)'_x + f_v \cdot 0 + f_w \cdot (e^{x+y})'_x \\ &= \cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (\cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w) \\ &= \cos x \cdot (f_u)'_y + (e^{x+y})'_y \cdot f_w + e^{x+y} \cdot (f_w)'_y \\ &= \cos x \cdot (f_{uu} \cdot u_y + f_{uv} \cdot v_y + f_{uw} \cdot w_y) \\ &\quad + e^{x+y} f_w + e^{x+y} \cdot (f_{wu} \cdot u_y + f_{wv} \cdot v_y + f_{ww} \cdot w_y) \\ &= \cos x \cdot ( \quad ) \\ &\quad + e^{x+y} f_w + e^{x+y} \cdot ( \quad )\end{aligned}$$

**例** 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \sin x$ ,  $v = \cos y$ ,  $w = e^{x+y}$ , 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x + f_w \cdot w_x = f_u \cdot (\sin x)'_x + f_v \cdot 0 + f_w \cdot (e^{x+y})'_x \\ &= \cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (\cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w) \\ &= \cos x \cdot (f_u)'_y + (e^{x+y})'_y \cdot f_w + e^{x+y} \cdot (f_w)'_y \\ &= \cos x \cdot (f_{uu} \cdot u_y + f_{uv} \cdot v_y + f_{uw} \cdot w_y) \\ &\quad + e^{x+y} f_w + e^{x+y} \cdot (f_{wu} \cdot u_y + f_{wv} \cdot v_y + f_{ww} \cdot w_y) \\ &= \cos x \cdot (-\sin y \cdot f_{uv} + e^{x+y} f_{uw}) \\ &\quad + e^{x+y} f_w + e^{x+y} \cdot (\end{aligned}$$

**例** 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \sin x$ ,  $v = \cos y$ ,  $w = e^{x+y}$ , 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x + f_w \cdot w_x = f_u \cdot (\sin x)'_x + f_v \cdot 0 + f_w \cdot (e^{x+y})'_x \\ &= \cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (\cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w) \\ &= \cos x \cdot (f_u)'_y + (e^{x+y})'_y \cdot f_w + e^{x+y} \cdot (f_w)'_y \\ &= \cos x \cdot (f_{uu} \cdot u_y + f_{uv} \cdot v_y + f_{uw} \cdot w_y) \\ &\quad + e^{x+y} f_w + e^{x+y} \cdot (f_{wu} \cdot u_y + f_{wv} \cdot v_y + f_{ww} \cdot w_y) \\ &= \cos x \cdot (-\sin y \cdot f_{uv} + e^{x+y} f_{uw}) \\ &\quad + e^{x+y} f_w + e^{x+y} \cdot (-\sin y \cdot f_{wv} + e^{x+y} f_{ww})\end{aligned}$$



**例** 设  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

**解** 设  $z = f(u, v, w)$ ,  $u = \sin x$ ,  $v = \cos y$ ,  $w = e^{x+y}$ , 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x + f_w \cdot w_x = f_u \cdot (\sin x)'_x + f_v \cdot 0 + f_w \cdot (e^{x+y})'_x \\ &= \cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (\cos x \cdot f_u + e^{x+y} f_w) \\ &= \cos x \cdot (f_u)'_y + (e^{x+y})'_y \cdot f_w + e^{x+y} \cdot (f_w)'_y \\ &= \cos x \cdot (f_{uu} \cdot u_y + f_{uv} \cdot v_y + f_{uw} \cdot w_y) \\ &\quad + e^{x+y} f_w + e^{x+y} \cdot (f_{wu} \cdot u_y + f_{wv} \cdot v_y + f_{ww} \cdot w_y) \\ &= \cos x \cdot (-\sin y \cdot f_{uv} + e^{x+y} f_{uw}) \\ &\quad + e^{x+y} f_w + e^{x+y} \cdot (-\sin y \cdot f_{wv} + e^{x+y} f_{ww}) \\ &= e^{x+y} f_w - \cos x \sin y \cdot f_{uv} + \cos x e^{x+y} f_{uw} - \sin y e^{x+y} f_{wv} + e^{2x+2y} f_{ww}\end{aligned}$$