

工科数学分析

贺丹（东南大学）



3.5 多元复合函数的偏导数和全微分



3.5 多元复合函数的偏导数和全微分

本节主要内容：



3.5 多元复合函数的偏导数和全微分

本节主要内容：

- 复合函数的中间变量均为一元函数



3.5 多元复合函数的偏导数和全微分

本节主要内容：

- 复合函数的中间变量均为一元函数
- 复合函数的中间变量为多元函数



3.5 多元复合函数的偏导数和全微分

本节主要内容：

- 复合函数的中间变量均为一元函数
- 复合函数的中间变量为多元函数
- 一阶全微分形式不变性



复合函数的中间变量均为一元函数



复合函数的中间变量均为一元函数

定理

若函数 $u = u(x)$ 及 $v = v(x)$ 都在点 x 可导, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 处可微,



复合函数的中间变量均为一元函数

定理

若函数 $u = u(x)$ 及 $v = v(x)$ 都在点 x 可导, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 处可微, 则复合函数 $z = f[u(x), v(x)]$ 在点 x 可导, 且

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx}$$



复合函数的中间变量均为一元函数

定理

若函数 $u = u(x)$ 及 $v = v(x)$ 都在点 x 可导, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 处可微, 则复合函数 $z = f[u(x), v(x)]$ 在点 x 可导, 且

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx} \quad (\text{全导数公式})$$



复合函数的中间变量均为一元函数

定理

若函数 $u = u(x)$ 及 $v = v(x)$ 都在点 x 可导, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 处可微, 则复合函数 $z = f[u(x), v(x)]$ 在点 x 可导, 且

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx} \quad (\text{全导数公式})$$

证明: 给 x 以增量 Δx , 则 u, v 有相应的增量 $\Delta u, \Delta v$,



复合函数的中间变量均为一元函数

定理

若函数 $u = u(x)$ 及 $v = v(x)$ 都在点 x 可导, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 处可微, 则复合函数 $z = f[u(x), v(x)]$ 在点 x 可导, 且

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx} \quad (\text{全导数公式})$$

证明: 给 x 以增量 Δx , 则 u, v 有相应的增量 $\Delta u, \Delta v$,

从而 $z = f(u, v)$ 有全增量 $\Delta z = f(u + \Delta u, v + \Delta v) - f(u, v)$,



复合函数的中间变量均为一元函数

定理

若函数 $u = u(x)$ 及 $v = v(x)$ 都在点 x 可导, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 处可微, 则复合函数 $z = f[u(x), v(x)]$ 在点 x 可导, 且

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx} \quad (\text{全导数公式})$$

证明: 给 x 以增量 Δx , 则 u, v 有相应的增量 $\Delta u, \Delta v$,

从而 $z = f(u, v)$ 有全增量 $\Delta z = f(u + \Delta u, v + \Delta v) - f(u, v)$,

因为 $z = f(u, v)$ 在 (u, v) 可微,



复合函数的中间变量均为一元函数

定理

若函数 $u = u(x)$ 及 $v = v(x)$ 都在点 x 可导, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 处可微, 则复合函数 $z = f[u(x), v(x)]$ 在点 x 可导, 且

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx} \quad (\text{全导数公式})$$

证明: 给 x 以增量 Δx , 则 u, v 有相应的增量 $\Delta u, \Delta v$,

从而 $z = f(u, v)$ 有全增量 $\Delta z = f(u + \Delta u, v + \Delta v) - f(u, v)$,

因为 $z = f(u, v)$ 在 (u, v) 可微,

所以 $\Delta z = \frac{\partial z}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial z}{\partial v} \Delta v + o(\rho)$, 其中 $\rho = \sqrt{(\Delta u)^2 + (\Delta v)^2}$.



于是
$$\frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} + \frac{o(\rho)}{\Delta x}.$$



$$\text{于是 } \frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} + \frac{o(\rho)}{\Delta x}.$$

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 可导,



$$\text{于是 } \frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} + \frac{o(\rho)}{\Delta x}.$$

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 可导,

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 处连续,



$$\text{于是 } \frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} + \frac{o(\rho)}{\Delta x}.$$

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 可导,

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 处连续,

即当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta u \rightarrow 0, \Delta v \rightarrow 0$,



$$\text{于是 } \frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} + \frac{o(\rho)}{\Delta x}.$$

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 可导,

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 处连续,

即当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta u \rightarrow 0, \Delta v \rightarrow 0$, 从而 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \rho = 0$.



$$\text{于是 } \frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} + \frac{o(\rho)}{\Delta x}.$$

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 可导,

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 处连续,

即当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta u \rightarrow 0, \Delta v \rightarrow 0$, 从而 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \rho = 0$.

$$\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\Delta x}$$



$$\text{于是 } \frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} + \frac{o(\rho)}{\Delta x}.$$

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 可导,

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 处连续,

即当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta u \rightarrow 0, \Delta v \rightarrow 0$, 从而 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \rho = 0$.

$$\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} \cdot \frac{\rho}{\Delta x}$$



$$\text{于是 } \frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} + \frac{o(\rho)}{\Delta x}.$$

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 可导,

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 处连续,

即当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta u \rightarrow 0, \Delta v \rightarrow 0$, 从而 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \rho = 0$.

$$\begin{aligned}\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} \cdot \frac{\rho}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\pm \sqrt{\left(\frac{\Delta u}{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta v}{\Delta x}\right)^2} \right]\end{aligned}$$



$$\text{于是 } \frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} + \frac{o(\rho)}{\Delta x}.$$

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 可导,

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 处连续,

即当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta u \rightarrow 0, \Delta v \rightarrow 0$, 从而 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \rho = 0$.

$$\begin{aligned}\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} \cdot \frac{\rho}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\pm \sqrt{\left(\frac{\Delta u}{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta v}{\Delta x}\right)^2} \right] \\&= 0 \cdot \left[\pm \sqrt{\left(\frac{du}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dx}\right)^2} \right]\end{aligned}$$



$$\text{于是 } \frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} + \frac{o(\rho)}{\Delta x}.$$

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 可导,

$\therefore u = u(x), v = v(x)$ 都在点 x 处连续,

即当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta u \rightarrow 0, \Delta v \rightarrow 0$, 从而 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \rho = 0$.

$$\begin{aligned}\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} \cdot \frac{\rho}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\pm \sqrt{\left(\frac{\Delta u}{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta v}{\Delta x}\right)^2} \right] \\&= 0 \cdot \left[\pm \sqrt{\left(\frac{du}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dx}\right)^2} \right] = 0.\end{aligned}$$



$$\text{于是 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{o(\rho)}{\Delta x} \right)$$



$$\text{于是 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{o(\rho)}{\Delta x} \right)$$

$$\text{故 } \frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx}, \text{ 得证.}$$



$$\text{于是 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{o(\rho)}{\Delta x} \right)$$

$$\text{故 } \frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx}, \text{ 得证.}$$


全导数公式可以形象地表示为:



$$\text{于是 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{o(\rho)}{\Delta x} \right)$$

$$\text{故 } \frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx}, \text{ 得证.}$$

全导数公式可以形象地表示为:




$$\text{于是 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{o(\rho)}{\Delta x} \right)$$

$$\text{故 } \frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx}, \text{ 得证.}$$

全导数公式可以形象地表示为:

简言之“**按线相乘, 分线相加**”.




$$\text{于是 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{o(\rho)}{\Delta x} \right)$$

$$\text{故 } \frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx}, \text{ 得证.}$$

全导数公式可以形象地表示为:

简言之“**按线相乘, 分线相加**”.



例如: $z = f(u, v, w)$,

其中 $u = u(x)$, $v = v(x)$, $w = w(x)$,




$$\text{于是 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{o(\rho)}{\Delta x} \right)$$

$$\text{故 } \frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx}, \text{ 得证.}$$

全导数公式可以形象地表示为:

简言之“**按线相乘, 分线相加**”.



例如: $z = f(u, v, w),$

其中 $u = u(x), v = v(x), w = w(x),$

则 $z = f[u(x), v(x), w(x)],$



$$\text{于是 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{o(\rho)}{\Delta x} \right)$$

$$\text{故 } \frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx}, \text{ 得证.}$$



全导数公式可以形象地表示为:

简言之“**按线相乘, 分线相加**”.

例如: $z = f(u, v, w)$,

其中 $u = u(x)$, $v = v(x)$, $w = w(x)$,

则 $z = f[u(x), v(x), w(x)]$,



$$\text{于是 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{o(\rho)}{\Delta x} \right)$$

$$\text{故 } \frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx}, \text{ 得证.}$$

全导数公式可以形象地表示为:



简言之“**按线相乘, 分线相加**”.

例如: $z = f(u, v, w)$,

其中 $u = u(x)$, $v = v(x)$, $w = w(x)$,

则 $z = f[u(x), v(x), w(x)]$,

$$\text{则 } \frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dx} + \frac{\partial z}{\partial w} \frac{dw}{dx}.$$



例1. 已知 $z = uv + \arctan x$, 而 $u = e^x$, $v = \cos x$, 求 $\frac{dz}{dx}$.



例1. 已知 $z = uv + \arctan x$, 而 $u = e^x$, $v = \cos x$, 求 $\frac{dz}{dx}$.

解法1.
$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dx} + \frac{\partial z}{\partial x}$$



例1. 已知 $z = uv + \arctan x$, 而 $u = e^x$, $v = \cos x$, 求 $\frac{dz}{dx}$.

解法1.
$$\begin{aligned}\frac{dz}{dx} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dx} + \frac{\partial z}{\partial x} \\ &= ve^x + u(-\sin x) + \frac{1}{1+x^2}\end{aligned}$$



例1. 已知 $z = uv + \arctan x$, 而 $u = e^x$, $v = \cos x$, 求 $\frac{dz}{dx}$.

解法1.
$$\begin{aligned}\frac{dz}{dx} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dx} + \frac{\partial z}{\partial x} \\ &= ve^x + u(-\sin x) + \frac{1}{1+x^2} \\ &= e^x(\cos x - \sin x) + \frac{1}{1+x^2}.\end{aligned}$$



例1. 已知 $z = uv + \arctan x$, 而 $u = e^x$, $v = \cos x$, 求 $\frac{dz}{dx}$.

解法1.
$$\begin{aligned}\frac{dz}{dx} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dx} + \frac{\partial z}{\partial x} \\ &= ve^x + u(-\sin x) + \frac{1}{1+x^2} \\ &= e^x(\cos x - \sin x) + \frac{1}{1+x^2}.\end{aligned}$$

解法2. $z = e^x \cos x + \arctan x$,



例1. 已知 $z = uv + \arctan x$, 而 $u = e^x$, $v = \cos x$, 求 $\frac{dz}{dx}$.

解法1.
$$\begin{aligned}\frac{dz}{dx} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dx} + \frac{\partial z}{\partial x} \\ &= ve^x + u(-\sin x) + \frac{1}{1+x^2} \\ &= e^x(\cos x - \sin x) + \frac{1}{1+x^2}.\end{aligned}$$

解法2. $z = e^x \cos x + \arctan x$,

$$\therefore \frac{dz}{dx} = e^x(\cos x - \sin x) + \frac{1}{1+x^2}.$$



复合函数的中间变量为多元函数



复合函数的中间变量为多元函数

定理3.5'

设 $z = f(u, v)$, 而 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$,



复合函数的中间变量为多元函数

定理3.5'

设 $z = f(u, v)$, 而 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, 若 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 在点 (x, y) 处偏导数都存在, 且 $z = f(u, v)$ 在相应点 (u, v) 可微,



复合函数的中间变量为多元函数

定理3.5'

设 $z = f(u, v)$, 而 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, 若 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 在点 (x, y) 处偏导数都存在, 且 $z = f(u, v)$ 在相应点 (u, v) 可微, 则复合函数 $z = f[u(x, y), v(x, y)]$ 在点 (x, y) 处存在偏导数, 且



复合函数的中间变量为多元函数

定理3.5'

设 $z = f(u, v)$, 而 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, 若 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 在点 (x, y) 处偏导数都存在, 且 $z = f(u, v)$ 在相应点 (u, v) 可微, 则复合函数 $z = f[u(x, y), v(x, y)]$ 在点 (x, y) 处存在偏导数, 且

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \end{cases}$$




复合函数的中间变量为多元函数

定理3.5'

设 $z = f(u, v)$, 而 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, 若 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 在点 (x, y) 处偏导数都存在, 且 $z = f(u, v)$ 在相应点 (u, v) 可微, 则复合函数 $z = f[u(x, y), v(x, y)]$ 在点 (x, y) 处存在偏导数, 且

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \end{cases}$$




复合函数的中间变量为多元函数

定理3.5'

设 $z = f(u, v)$, 而 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, 若 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 在点 (x, y) 处偏导数都存在, 且 $z = f(u, v)$ 在相应点 (u, v) 可微, 则复合函数 $z = f[u(x, y), v(x, y)]$ 在点 (x, y) 处存在偏导数, 且

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \end{cases}$$



链式法则: 按线相乘, 分线相加.





定理3.5

若 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 均在点 (x, y) 处可微,



定理3.5

若 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 均在点 (x, y) 处可微, 且函数 $z = f(u, v)$ 在相应的点 (u, v) 处可微,



定理3.5

若 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 均在点 (x, y) 处可微, 且函数 $z = f(u, v)$ 在相应的点 (u, v) 处可微, 则复合函数 $z = f[u(x, y), v(x, y)]$ 在点 (x, y) 处也必可微,



定理3.5

若 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 均在点 (x, y) 处可微, 且函数 $z = f(u, v)$ 在相应的点 (u, v) 处可微, 则复合函数 $z = f[u(x, y), v(x, y)]$ 在点 (x, y) 处也必可微, 且其全微分为



定理3.5

若 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 均在点 (x, y) 处可微, 且函数

$z = f(u, v)$ 在相应的点 (u, v) 处可微, 则复合函数

$z = f[u(x, y), v(x, y)]$ 在点 (x, y) 处也必可微,

且其全微分为

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) dy.$$



若 $z = f(u, v, w),$

而 $u = u(x, y), v = v(x, y), w = w(x, y),$



若 $z = f(u, v, w)$,

而 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, $w = w(x, y)$,


则 $z = f[u(x, y), v(x, y), w(x, y)]$,



若 $z = f(u, v, w)$,

而 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, $w = w(x, y)$,

则 $z = f[u(x, y), v(x, y), w(x, y)]$,




若 $z = f(u, v, w)$,

而 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, $w = w(x, y)$,

则 $z = f[u(x, y), v(x, y), w(x, y)]$,

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial y} \end{cases}$$



例2. 设 $z = e^u \sin v$, 而 $u = 2xy$, $v = x^2 + y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.



例2. 设 $z = e^u \sin v$, 而 $u = 2xy$, $v = x^2 + y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解:
$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$



例2. 设 $z = e^u \sin v$, 而 $u = 2xy$, $v = x^2 + y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= e^u \sin v \cdot 2y + e^u \cos v \cdot 2x\end{aligned}$$



例2. 设 $z = e^u \sin v$, 而 $u = 2xy$, $v = x^2 + y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= e^u \sin v \cdot 2y + e^u \cos v \cdot 2x \\ &= 2e^{2xy} [y \sin(x^2 + y) + x \cos(x^2 + y)]\end{aligned}$$



例2. 设 $z = e^u \sin v$, 而 $u = 2xy$, $v = x^2 + y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解:
$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= e^u \sin v \cdot 2y + e^u \cos v \cdot 2x \\ &= 2e^{2xy} [y \sin(x^2 + y) + x \cos(x^2 + y)]\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$



例2. 设 $z = e^u \sin v$, 而 $u = 2xy$, $v = x^2 + y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解:
$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= e^u \sin v \cdot 2y + e^u \cos v \cdot 2x \\ &= 2e^{2xy} [y \sin(x^2 + y) + x \cos(x^2 + y)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\ &= e^u \sin v \cdot 2x + e^u \cos v\end{aligned}$$



例2. 设 $z = e^u \sin v$, 而 $u = 2xy$, $v = x^2 + y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解:
$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= e^u \sin v \cdot 2y + e^u \cos v \cdot 2x \\ &= 2e^{2xy}[y \sin(x^2 + y) + x \cos(x^2 + y)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\ &= e^u \sin v \cdot 2x + e^u \cos v \\ &= e^{2xy}[2x \sin(x^2 + y) + \cos(x^2 + y)].\end{aligned}$$



注意: 在复合函数的求导过程中, 如果出现某一函数的中间变量是一元函数, 则涉及它的偏导数的记号应改为一元函数的导数记号.



注意: 在复合函数的求导过程中, 如果出现某一函数的中间变量是一元函数, 则涉及它的偏导数的记号应改为一元函数的导数记号.

例如: 设 $z = f(u, v)$, $u = u(x, y)$ 和 $v = v(x)$,



注意: 在复合函数的求导过程中, 如果出现某一函数的中间变量是一元函数, 则涉及它的偏导数的记号应改为一元函数的导数记号.

例如: 设 $z = f(u, v)$, $u = u(x, y)$ 和 $v = v(x)$,


则 $z = f[u(x, y), v(x)]$,



注意: 在复合函数的求导过程中, 如果出现某一函数的中间变量是一元函数, 则涉及它的偏导数的记号应改为一元函数的导数记号.

例如: 设 $z = f(u, v)$, $u = u(x, y)$ 和 $v = v(x)$,

则 $z = f[u(x, y), v(x)]$,




注意: 在复合函数的求导过程中, 如果出现某一函数的中间变量是一元函数, 则涉及它的偏导数的记号应改为一元函数的导数记号.

例如: 设 $z = f(u, v)$, $u = u(x, y)$ 和 $v = v(x)$,

$$\text{则 } z = f[u(x, y), v(x)],$$

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dx} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} \end{cases}$$



又如: $z = f(u, x, y)$, 其中 $u = u(x, y)$,




又如: $z = f(u, x, y)$, 其中 $u = u(x, y)$,

即 $z = f[u(x, y), x, y]$,



又如: $z = f(u, x, y)$, 其中 $u = u(x, y)$,


即 $z = f[u(x, y), x, y]$,



又如: $z = f(u, x, y)$, 其中 $u = u(x, y)$,

即 $z = f[u(x, y), x, y]$,


$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial x}$$



又如: $z = f(u, x, y)$, 其中 $u = u(x, y)$,

即 $z = f[u(x, y), x, y]$,

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial x}$$




$\frac{\partial z}{\partial x}$: 把函数 $z = f[\varphi(x, y), x, y]$ 中的 y 看作不变对 x 的偏导数;



又如: $z = f(u, x, y)$, 其中 $u = u(x, y)$,

即 $z = f[u(x, y), x, y]$,

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial x}$$



$\frac{\partial z}{\partial x}$: 把函数 $z = f[\varphi(x, y), x, y]$ 中的 y 看作不变对 x 的偏导数;


$\frac{\partial f}{\partial x}$: 把函数 $z = f(u, x, y)$ 中的 u 及 y 看作不变对 x 的偏导数;



又如: $z = f(u, x, y)$, 其中 $u = u(x, y)$,

即 $z = f[u(x, y), x, y]$,

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial x}$$



$\frac{\partial z}{\partial x}$: 把函数 $z = f[\varphi(x, y), x, y]$ 中的 y 看作不变对 x 的偏导数;

$\frac{\partial f}{\partial x}$: 把函数 $z = f(u, x, y)$ 中的 u 及 y 看作不变对 x 的偏导数;


► 有时采用下面的记号更为方便清晰:



又如: $z = f(u, x, y)$, 其中 $u = u(x, y)$,

即 $z = f[u(x, y), x, y]$,

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial x}$$



$\frac{\partial z}{\partial x}$: 把函数 $z = f[\varphi(x, y), x, y]$ 中的 y 看作不变对 x 的偏导数;

$\frac{\partial f}{\partial x}$: 把函数 $z = f(u, x, y)$ 中的 u 及 y 看作不变对 x 的偏导数;

► 有时采用下面的记号更为方便清晰:


$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 u_1 + f_2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f_1 u_2 + f_3,$$



又如: $z = f(u, x, y)$, 其中 $u = u(x, y)$,

即 $z = f[u(x, y), x, y]$,

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial x}$$



$\frac{\partial z}{\partial x}$: 把函数 $z = f[\varphi(x, y), x, y]$ 中的 y 看作不变对 x 的偏导数;

$\frac{\partial f}{\partial x}$: 把函数 $z = f(u, x, y)$ 中的 u 及 y 看作不变对 x 的偏导数;

► 有时采用下面的记号更为方便清晰:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 u_1 + f_2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f_1 u_2 + f_3,$$

其中 f_i ($i = 1, 2, 3$) 表示函数 f 对第 i 个变量的偏导数.



例3. 设 $z = xy + xF(u)$, 而 $u = \frac{y}{x}$, $F(u)$ 为可导函数, 证明:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + xy.$$



例3. 设 $z = xy + xF(u)$, 而 $u = \frac{y}{x}$, $F(u)$ 为可导函数, 证明:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + xy.$$

证明: $\frac{\partial z}{\partial x} = y + F(u) + xF'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = y + F(u) - \frac{y}{x} F'(u),$



例3. 设 $z = xy + xF(u)$, 而 $u = \frac{y}{x}$, $F(u)$ 为可导函数, 证明:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + xy.$$

证明: $\frac{\partial z}{\partial x} = y + F(u) + xF'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = y + F(u) - \frac{y}{x} F'(u),$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x + xF'(u) \frac{\partial u}{\partial y} = x + F'(u),$$



例3. 设 $z = xy + xF(u)$, 而 $u = \frac{y}{x}$, $F(u)$ 为可导函数, 证明:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + xy.$$

证明: $\frac{\partial z}{\partial x} = y + F(u) + xF'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = y + F(u) - \frac{y}{x} F'(u),$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x + xF'(u) \frac{\partial u}{\partial y} = x + F'(u),$$

$$\therefore x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy + xF(u) - yF'(u) + xy + yF'(u)$$



例3. 设 $z = xy + xF(u)$, 而 $u = \frac{y}{x}$, $F(u)$ 为可导函数, 证明:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + xy.$$

证明: $\frac{\partial z}{\partial x} = y + F(u) + xF'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = y + F(u) - \frac{y}{x} F'(u),$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x + xF'(u) \frac{\partial u}{\partial y} = x + F'(u),$$

$$\begin{aligned} \therefore x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} &= xy + xF(u) - yF'(u) + xy + yF'(u) \\ &= z + xy. \end{aligned}$$




例4. 设 $z = f(x - y, xy^2)$, f 有二阶连续偏导数,

$$\text{求 } \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$



例4. 设 $z = f(x - y, xy^2)$, f 有二阶连续偏导数,


求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.



例4. 设 $z = f(x - y, xy^2)$, f 有二阶连续偏导数,

求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 + y^2 f_2,$




例4. 设 $z = f(x - y, xy^2)$, f 有二阶连续偏导数,

求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 + y^2 f_2,$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(f_1 + y^2 f_2)$$




例4. 设 $z = f(x - y, xy^2)$, f 有二阶连续偏导数,

$$\text{求 } \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 + y^2 f_2,$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(f_1 + y^2 f_2)$$

$$= f_{11} + y^2 f_{12} + y^2(f_{21} + y^2 f_{22}) = f_{11} + 2y^2 f_{12} + y^4 f_{22}.$$



例4. 设 $z = f(x - y, xy^2)$, f 有二阶连续偏导数,


$$\text{求 } \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 + y^2 f_2,$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(f_1 + y^2 f_2)$$

$$= f_{11} + y^2 f_{12} + y^2(f_{21} + y^2 f_{22}) = f_{11} + 2y^2 f_{12} + y^4 f_{22}.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(f_1 + y^2 f_2)$$



例4. 设 $z = f(x - y, xy^2)$, f 有二阶连续偏导数,

$$\text{求 } \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$


解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 + y^2 f_2,$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(f_1 + y^2 f_2)$$

$$= f_{11} + y^2 f_{12} + y^2(f_{21} + y^2 f_{22}) = f_{11} + 2y^2 f_{12} + y^4 f_{22}.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(f_1 + y^2 f_2)$$


$$= -f_{11} + f_{12} \cdot 2xy + y^2[f_{21}(-1) + f_{22} \cdot 2xy] + 2yf_2$$



例4. 设 $z = f(x - y, xy^2)$, f 有二阶连续偏导数,

$$\text{求 } \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 + y^2 f_2,$



$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(f_1 + y^2 f_2)$$

$$= f_{11} + y^2 f_{12} + y^2(f_{21} + y^2 f_{22}) = f_{11} + 2y^2 f_{12} + y^4 f_{22}.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(f_1 + y^2 f_2)$$

$$= -f_{11} + f_{12} \cdot 2xy + y^2[f_{21}(-1) + f_{22} \cdot 2xy] + 2yf_2$$

$$= -f_{11} + (2xy - y^2)f_{12} + 2xy^3 f_{22} + 2yf_2.$$



例5. 设 $z = x^3 f(xy, \frac{y}{x})$, f 有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.



例5. 设 $z = x^3 f(xy, \frac{y}{x})$, f 有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

答: $\frac{\partial z}{\partial y} = x^4 f_1 + x^2 f_2$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^5 f_{11} + 2x^3 f_{12} + x f_{22}$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 4x^3 f_1 + 2x f_2 + x^4 y f_{11} - y f_{22}.$$



例6. 设 $u = u(\xi, \eta)$ 具有二阶连续偏导数, 其中 $\xi = x + ay$,
 $\eta = x + by$ ($a \neq b$), 问 a, b 为何值时, 可使
 $u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$ 变换为 $u_{\xi\eta} = 0$.



例6. 设 $u = u(\xi, \eta)$ 具有二阶连续偏导数, 其中 $\xi = x + ay$,

$\eta = x + by$ ($a \neq b$), 问 a, b 为何值时, 可使

$u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$ 变换为 $u_{\xi\eta} = 0$.

解: $u_x = u_\xi + u_\eta$, $u_y = au_\xi + bu_\eta$,



例6. 设 $u = u(\xi, \eta)$ 具有二阶连续偏导数, 其中 $\xi = x + ay$,

$\eta = x + by$ ($a \neq b$), 问 a, b 为何值时, 可使

$u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$ 变换为 $u_{\xi\eta} = 0$.

解: $u_x = u_\xi + u_\eta$, $u_y = au_\xi + bu_\eta$,

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta} + u_{\eta\xi} + u_{\eta\eta} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta},$$



例6. 设 $u = u(\xi, \eta)$ 具有二阶连续偏导数, 其中 $\xi = x + ay$,

$\eta = x + by$ ($a \neq b$), 问 a, b 为何值时, 可使

$u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$ 变换为 $u_{\xi\eta} = 0$.

解: $u_x = u_\xi + u_\eta$, $u_y = au_\xi + bu_\eta$,

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta} + u_{\eta\xi} + u_{\eta\eta} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta},$$

$$u_{xy} = u_{\xi\xi} \cdot a + u_{\xi\eta} \cdot b + u_{\eta\xi} \cdot a + u_{\eta\eta} \cdot b$$



例6. 设 $u = u(\xi, \eta)$ 具有二阶连续偏导数, 其中 $\xi = x + ay$,

$\eta = x + by$ ($a \neq b$), 问 a, b 为何值时, 可使

$u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$ 变换为 $u_{\xi\eta} = 0$.

解: $u_x = u_\xi + u_\eta$, $u_y = au_\xi + bu_\eta$,

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta} + u_{\eta\xi} + u_{\eta\eta} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta},$$

$$u_{xy} = u_{\xi\xi} \cdot a + u_{\xi\eta} \cdot b + u_{\eta\xi} \cdot a + u_{\eta\eta} \cdot b$$

$$= au_{\xi\xi} + (a + b)u_{\xi\eta} + bu_{\eta\eta},$$



例6. 设 $u = u(\xi, \eta)$ 具有二阶连续偏导数, 其中 $\xi = x + ay$,

$\eta = x + by$ ($a \neq b$), 问 a, b 为何值时, 可使

$u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$ 变换为 $u_{\xi\eta} = 0$.

解: $u_x = u_\xi + u_\eta$, $u_y = au_\xi + bu_\eta$,

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta} + u_{\eta\xi} + u_{\eta\eta} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta},$$

$$u_{xy} = u_{\xi\xi} \cdot a + u_{\xi\eta} \cdot b + u_{\eta\xi} \cdot a + u_{\eta\eta} \cdot b$$

$$= au_{\xi\xi} + (a+b)u_{\xi\eta} + bu_{\eta\eta},$$

$$u_{yy} = a^2u_{\xi\xi} + 2abu_{\xi\eta} + b^2u_{\eta\eta},$$



例6. 设 $u = u(\xi, \eta)$ 具有二阶连续偏导数, 其中 $\xi = x + ay$,

$\eta = x + by$ ($a \neq b$), 问 a, b 为何值时, 可使

$u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$ 变换为 $u_{\xi\eta} = 0$.

解: $u_x = u_\xi + u_\eta$, $u_y = au_\xi + bu_\eta$,

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta} + u_{\eta\xi} + u_{\eta\eta} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta},$$

$$u_{xy} = u_{\xi\xi} \cdot a + u_{\xi\eta} \cdot b + u_{\eta\xi} \cdot a + u_{\eta\eta} \cdot b$$

$$= au_{\xi\xi} + (a+b)u_{\xi\eta} + bu_{\eta\eta},$$

$$u_{yy} = a^2u_{\xi\xi} + 2abu_{\xi\eta} + b^2u_{\eta\eta},$$

$$\begin{aligned} \therefore u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} &= (3a^2 + 4a + 1)u_{\xi\xi} + (6ab + 4a + 4b + 2)u_{\xi\eta} \\ &\quad + (3b^2 + 4b + 1)u_{\eta\eta}, \end{aligned}$$



所以根据题意, 由 $u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$ 变换为 $u_{\xi\eta} = 0$ 可得:



所以根据题意, 由 $u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$ 变换为 $u_{\xi\eta} = 0$ 可得:

$$\begin{cases} 3a^2 + 4a + 1 = 0, \\ 3b^2 + 4b + 1 = 0, \\ 6ab + 4a + 4b + 2 \neq 0 \end{cases}$$



所以根据题意, 由 $u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$ 变换为 $u_{\xi\eta} = 0$ 可得:

$$\begin{cases} 3a^2 + 4a + 1 = 0, \\ 3b^2 + 4b + 1 = 0, \\ 6ab + 4a + 4b + 2 \neq 0 \end{cases}$$

解得 $a = -\frac{1}{3}, b = -1$ 或 $a = -1, b = -\frac{1}{3}$.



一阶全微分形式不变性



一阶全微分形式不变性

设 $z = f(u, v)$ 可微,



一阶全微分形式不变性

设 $z = f(u, v)$ 可微,

(1) 若 u, v 是自变量, 则 $dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$,



一阶全微分形式不变性

设 $z = f(u, v)$ 可微,

(1) 若 u, v 是自变量, 则 $dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$,

(2) 若 u, v 是中间变量, 即 $z = f(u, v)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$,
则 $z = f(u(x, y), v(x, y))$ 的全微分为:



一阶全微分形式不变性

设 $z = f(u, v)$ 可微,

(1) 若 u, v 是自变量, 则 $dz = \frac{\partial z}{\partial u}du + \frac{\partial z}{\partial v}dv$,

(2) 若 u, v 是中间变量, 即 $z = f(u, v)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$,

则 $z = f(u(x, y), v(x, y))$ 的全微分为:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$$



一阶全微分形式不变性

设 $z = f(u, v)$ 可微,

(1) 若 u, v 是自变量, 则 $dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$,

(2) 若 u, v 是中间变量, 即 $z = f(u, v)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$,

则 $z = f(u(x, y), v(x, y))$ 的全微分为:

$$\begin{aligned} dz &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \\ &= \left(\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) dy \end{aligned}$$



一阶全微分形式不变性

设 $z = f(u, v)$ 可微,

(1) 若 u, v 是自变量, 则 $dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$,

(2) 若 u, v 是中间变量, 即 $z = f(u, v)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$,

则 $z = f(u(x, y), v(x, y))$ 的全微分为:

$$\begin{aligned} dz &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \\ &= \left(\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) dy \\ &= \frac{\partial z}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \right) + \frac{\partial z}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) \end{aligned}$$



一阶全微分形式不变性

设 $z = f(u, v)$ 可微,

(1) 若 u, v 是自变量, 则 $dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$,

(2) 若 u, v 是中间变量, 即 $z = f(u, v)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$,

则 $z = f(u(x, y), v(x, y))$ 的全微分为:

$$\begin{aligned} dz &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \\ &= \left(\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) dy \\ &= \frac{\partial z}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \right) + \frac{\partial z}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) \\ &= \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv. \end{aligned}$$



- 由此可见, 若 z 是变量 u, v 的函数, 则无论 u, v 是自变量还是中间变量, z 的全微分形式是一样的.



- 由此可见, 若 z 是变量 u, v 的函数, 则无论 u, v 是自变量还是中间变量, z 的全微分形式是一样的.

——全微分形式不变性.



- ▶ 由此可见, 若 z 是变量 u, v 的函数, 则无论 u, v 是自变量还是中间变量, z 的全微分形式是一样的.

——全微分形式不变性.

- ▶ 由一阶全微分形式的不变性, 容易得到全微分的有理运算法则:



- 由此可见, 若 z 是变量 u, v 的函数, 则无论 u, v 是自变量还是中间变量, z 的全微分形式是一样的.

——全微分形式不变性.

- 由一阶全微分形式的不变性, 容易得到全微分的有理运算法则:

- $d(u \pm v) = du \pm dv;$



- 由此可见, 若 z 是变量 u, v 的函数, 则无论 u, v 是自变量还是中间变量, z 的全微分形式是一样的.

——全微分形式不变性.

- 由一阶全微分形式的不变性, 容易得到全微分的有理运算法则:

- $d(u \pm v) = du \pm dv;$
- $d(u \cdot v) = vdu + u dv;$



- 由此可见, 若 z 是变量 u, v 的函数, 则无论 u, v 是自变量还是中间变量, z 的全微分形式是一样的.

——全微分形式不变性.

- 由一阶全微分形式的不变性, 容易得到全微分的有理运算法则:

- $d(u \pm v) = du \pm dv;$
- $d(u \cdot v) = vdu + u dv;$
- $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{1}{v^2}(vdu - u dv).$



例7. 已知 $e^{-xy} - 2z + e^z = 0$, 利用全微分形式不变性, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.



例7. 已知 $e^{-xy} - 2z + e^z = 0$, 利用全微分形式不变性, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解: 由 $d(e^{-xy} - 2z + e^z) = 0$ 得



例7. 已知 $e^{-xy} - 2z + e^z = 0$, 利用全微分形式不变性, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解: 由 $d(e^{-xy} - 2z + e^z) = 0$ 得 $e^{-xy}d(-xy) - 2dz + e^z dz = 0$,



例7. 已知 $e^{-xy} - 2z + e^z = 0$, 利用全微分形式不变性, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$
和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解: 由 $d(e^{-xy} - 2z + e^z) = 0$ 得 $e^{-xy}d(-xy) - 2dz + e^z dz = 0$,

$$\therefore (e^z - 2)dz = e^{-xy}(xdy + ydx),$$



例7. 已知 $e^{-xy} - 2z + e^z = 0$, 利用全微分形式不变性, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$
和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解: 由 $d(e^{-xy} - 2z + e^z) = 0$ 得 $e^{-xy}d(-xy) - 2dz + e^z dz = 0$,

$$\therefore (e^z - 2)dz = e^{-xy}(xdy + ydx),$$

$$\therefore dz = \frac{ye^{-xy}}{e^z - 2}dx + \frac{xe^{-xy}}{e^z - 2}dy,$$



例7. 已知 $e^{-xy} - 2z + e^z = 0$, 利用全微分形式不变性, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解: 由 $d(e^{-xy} - 2z + e^z) = 0$ 得 $e^{-xy}d(-xy) - 2dz + e^z dz = 0$,

$$\therefore (e^z - 2)dz = e^{-xy}(xdy + ydx),$$

$$\therefore dz = \frac{ye^{-xy}}{e^z - 2}dx + \frac{xe^{-xy}}{e^z - 2}dy,$$

$$\text{故 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{ye^{-xy}}{e^z - 2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xe^{-xy}}{e^z - 2}.$$

